

Taunus [7]; *Stachys annua* L. Diez a. Lahn [4]; † *Sideritis montana* L. Eupen, Ufer d. Vesdre [5].

Salix incana Schrk. Eupen (gepflanzt?) [5].

Gymnadenia albida Rehb. Falkenstein im Taunus [1].

Carex brizoides L. Falkenstein im Taunus [1].

Zu berichtigen: *Potentilla recta* L. u. *Trapa natans* L. Kreuznach [1], sind dem dort angeführten Gewährsmanne POLSTORF von diesen Fundorten nicht bekannt [2].

XII. Oberrheinisches Gebiet.

Referent: K. MEZ.

Quellen:

a) Literatur:

1. ZAHN, Flora der Baar und der umliegenden Landestheile (in Schriften des Ver. für Gesch. und Naturgesch. der Baar, Bd. VII); 2. A. KNEUCKER (vergl. Verbr. Phan. Nr. 6); 3. NEUBERGER, Notiz (Mitth. Bot. Ver. Kr. Freib. u. Land Baden II. Nr. 54, S. 31); 4. SCHEUERLE, Die Badischen Weidenarten (a. a. O. II. Nr. 51, 52, S. 1—14); 5. SCHATZ, Die Badischen Ampfer-Bastarde (a. a. O. II. Nr. 51, 52, 53, S. 14—16, 17—23); 6a. M. DÜRER, Der Hengster bei Frankfurt a. M. mit seinen botanischen Schätzen (D. bot. Monatsschr. VI. S. 70—72); 6b. M. DÜRER (Vergl. Hercyn. Geb. Nr. 2a); 7. P. ASCHERSON in Verhandl. Bot. Ver. Brandenb. XXX. S. XXXI—XXXIII. Vergl. auch Verbr. Phan.

Bemerkung. DOSCIU und SCRIBA (vergl. Niederrh. Geb. Nr. 1) [8], enthält auch für unser Gebiet eine grosse Anzahl wichtiger Angaben; da der Raum eine Ausziehung derselben (bis auf die unten mitgetheilte Notiz) nicht zulässt, sei hiermit darauf verwiesen [sowie auch auf die Berichtigungen und Zusätze von GEISENHEYNER, vergl. Niederrhein. Gebiet Nr. 2, P. ASCHERSON].

b) Unveröffentlichte Mittheilung von:

9. M. DÜRER in Frankfurt a. M.

(B. = Baden, E. = Elsass, H. = Hessen, P. = Bayerische Pfalz.)

Neu für das Gebiet:

Lonicera coerulea L. B. Kriegerthal (ENGGESSER) [1].

Rumex aquaticus L. × *obtusifolius* L. (*R. Schmidtii* Hausskn.). B.

zw. Hausen und Aulfingen [1, 5]; *R. conglomeratus* L. × *obtusifolius* L. (*R. abortivus* Ruhmer). B. Geisingen [1].

Salix glabra vulgaris Sch. (= *S. stylaris* Ser., nach KOCH und WIMMER Form von *S. nigricans* Sm., noch [4] „Thalform von *S. glabra* Scop.“ [(?) P. ASCHERSON]. B. Konstanz, Zollhaus, an der Wutach, Bachzimmern, Kirchen, Zimmern, Geisingen, Donaueschingen, Pföhren, Breisach, Dachslanden, Eggenstein, Karlsruhe, Mannheim, Sanddorf (hierher auch die vom Feldberg (B.) angegebene „*S. arbuscula*“ [4]; *S. pentandra* L. × *fragilis* L. (*S. Meyeriana* Willd.) B. Villingen [1]; *S. daphnoides* × *incana* (*S. Reuteri* Moritzi). E. Neuenburger Rheininsel [3]; *S. purpurea* L. × *nigricans* Sm. (*S. Guseuensis* Forb. B. Torfried unter Zollhaus [1].

Eingeschleppt oder verwildert:

Aubrietia deltoidea DC. B. Grötzingen [2].

Spergula flaccida (Roxb.) Aschers. (= *Spergularia fallax* Lowe) B. Mannheim: Oelfabrik [7].

Abutilon Avicennae Gaertn. Frankfurt: Hafenanlagen bei Sachsenhausen [6b, 9].

Cardiospermum Halicaccabum L.,

Ammi Visnaga Lam. u. *Carum copticum* Benth. B. Mannheim: Oelfabrik [7].

Crucianella molluginoides M. B. Donaueschingen [1].

Vernonia cinerea Less., *Gnaphalium indicum* L., *Artemisia scoparia* W. K. und

Ipomoea sessiliflora Rth. B. Mannheim: Oelfabrik [7].

Lycium rhombifolium Dippel H. Darmstadt: Weg nach d. Botanischen Garten [8].

Albersia caudata Boiss., *Amarantus spinosus* L. und *Digera alternifolia* (L.) Aschers. (= *D. arvensis* Forsk.) B. Mannheim: Oelfabrik [7].

Anthoxanthum Puelii Lec. et Lam. H. Heusenstamm [6a]; *Chloris barbata* Sw. und *Eleusine indica* Gärtn. B. Mannheim: Oelfabrik [7].

Wichtigere neue Fundorte:

† *Erysimum hieracifolium* L. B. Möhringen [1]; † (?) *E. crepidifolium* Reichb. B. Mägdeberg; Hohentwiel [1].

Viola collina Bess. B. Osterberg, gegen den Thalhof [1].

Linum perenne L. B. Spöck [1].

† *Malva crispa* L. B. Karlsruhe [2]; † *Hibiscus Trionum* L. B. Mannheim: Oelfabrik [7].

Oxalis corniculata L. B. Blumberger Torfstich [1].

† *Vicia villosa* Rth. B. Donaueschingen [1]; *Ervum pisiforme* Peterm. B. Aselfingen [1].

Potentilla cinerea Chaix B. Zw. Graben und Huttenheim und *P. opaca* L. B. Huttenheim [2]; *P. canescens* Bess. B. Mägdeberg [1]; *Rosa tomentella* Lém. Länge zw. Geisingen und Gutmadingen [1].

Torilis infesta Koch B. Michelberg b. Untergrombach [2]; *Pleurospermum austriacum* Hoffm. B. Unterbaldingen, Ippingen [1].

Cirsium eriophorum Scop. var. *spathulatum* Näg. B. Hausen; *C. palustre* × *bulbosum* (*C. semidecurrrens* Rchb.) B. Geisingen, zw. Donaueschingen und Dürrheim; *C. palustre* × *oleraceum* (*C. hybridum* Kch.) B. Oefingen, Aulfingen, Birkenried; *C. oleraceum* × *acaule* (*C. decoloratum* Koch) B. Amtenhausen, Aulfingen; *C. oleraceum* × *bulbosum* (*C. Lachenalii* [Koch] Döll) B. Geisingen, Aselfingen, Dürrheim; *C. bulbosum* × *acaule* (*C. medium* All.) Geisingen, Neudingen, sämmtlich [1]; *Carduus defloratus* × *nutans* (*C. Brunneri* Döll) B. Geisingen [1]; *Lappa nemorosa* Körn. B. Geisinger Berge [1].

Anchusa italica Retz. † H. Gausalgesheimer Berg unter Esparsette [6b, 9].

Mentha rotundifolia × *silvestris* (*M. velutina* Lej.) B. Moor zw. Graben und Huttenheim [2].

† *Phytolacca decandra* L. B. Karlsruhe [2].

Rumex crispus × *obtusifolius* (*R. pratensis* M. K.) B. Gutmadingen, Hausen, Unter- und Oberbaldingen, Oefingen [1]; Geisingen, Kirchen [5]; *R. aquaticus* × *crispus* (*R. similatus* Hausskn.) B. Pföhren, Geisingen, Unter- und Oberbaldingen, Aulfingen, Unterhölzer Weiher [1]; *R. aquaticus* × *Hydrolapathum* (*R. maximus* Schreb.) a) *subaquaticus*, B. Gutmadingen [5]; *R. conglomeratus* × *maritimus* (*R. limosus* Thuill.?) B. Heidelberg [5].

Salix Caprea × *purpurea* (*S. discolor* Host) a) *subcaprea*, B. Möhringen; b) *Mauternensis* Kern. B. Waldrand der Länge; *S. aurita* × *purpurea* (*S. Brunneri* Döll) b) *cinerascens* Wimm. B. Unterhölzer; *S. Caprea* × *viminalis* (*S. acuminata* Rch.) a) *capreaeformis* Wimm. B. Wartenberg bei Donaueschingen, b) *Neisseana* Kern. B. Waldrand der Länge; *S. fragilis* × *alba* (*S. Russeliana* Kch.) var. *sulcata* Schatz B. Hintschingen, sämmtlich [1].

Potamogeton pusillus L. var. *major* Fries B. Moor zw. Graben und Huttenheim; var. *tenuissimus* M. K. B. Linkenheim [2].

Epipogon aphyllus Sw. B. Amtenhausen [1].

Gagea pratensis Schult. B. Neudingen [1]; † *Hemerocallis fulva* L. P. Rheinwald oberhalb Bayr.-Maxau [2].

Elymus europaeus L. B. Zw. Eggenstein und Leopoldshafen [2].
Zu streichen: *Alyssum montanum* L. für die Baar (B.) [1].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Mez Carl Christian

Artikel/Article: [Oberrheinisches Gebiet. 1100-1102](#)