© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

XV. Böhmen.

Referent: L. Čelakovsky.

Literatur.

1. L. Celakovsky, vgl. Verbr. Phan. Nr. 3 (Nur citirt, wo anderenfalls Irrthümer entstehen könnten); 2. J. B. Wiesbaur (vergl. Bericht pro 1886, Nr. 5c). Vergl. auch Verbr. Phan.

Neu für das Gebiet:

Thalictrum silvaticum Koch (*T. minus* b) *silvaticum* Gke.) Sandberg bei Kounova; *Th. simplex* L. *β. tenuifolium* (Sw. sp.) (*Th. laserpitiifolium* Willd. mittleres Elbthal: Wiesengraben am Walde Doubice bei Sadská und bei Všetat; (*Th. simplex genuinum*, bei Saaz angegeben, hingegen wieder problematisch geworden); *Pulsatilla vernalis* × *pratensis* Neudorf bei Jungbunzlau mit den Eltern.

Helianthemum Fumana Mill. (*Fumana procumbens* Gr. G.) Iserlehnen bei Jungbunzlau zahlreichst.

Drosera intermedia Hayne Torfe bei Eisendorf, nahe an der bayerischen Grenze (Ronsperger Gegend).

Vaccaria pyramidata G. M. Sch. (*V. parviflora* Mnch.) var. **grandiflora** (*V. grandiflora* Jaub. et Spach) Feld am Doubice-Walde bei Sadská, ferner bei Kolin und bei Dablic nächst Prag (schon TAUSCH!) [Bisher nur als Adventiv-Pflanze im Gesammtgebiet bekannt P. A.].

Rubus Sprengelii W. N. var. **pyramidalis** Čel. am Waldrand bei Łukavic unweit Chrudim (neu für Oesterreich); *R. glandulosus* Bell. subsp. **microstemon** Čel. Abhang des Hochwaldberges bei Heilbrunn unweit Gratzen mit subsp. *glaucophyllus* Čel.; *Rosa tomentella* Lém. Prag: Cibulka, Generalka, Königsaal, Karlstein (*R. densiflora* Tausch olim; *R. bohemica* Heinr. Braun); bei Žebrák, Obergraupen im Erzgebirge, Písek an der Wotawa [1, 2]; *R. scabrata* Crép. bei Ebersdorf im böhm. Erzgebirge [1, 2]; *R. Mareyana* Boullu (*R. gallica* × *tomentosa?*) Rosenthal bei Mariaschein [1, 2].

Erigeron acer × *canadensis* (*E. Hülsenii* Vatke) bei Rotschow unweit Schlan mit den Eltern; *Achillea Millefolium* L. var. *crustata* Roch. (*A. asplenifolia* Vent.) Moorwiesen beim Doubice-Wald bei Sadská; *Cirsium arvense* × *acaule* bei Mariaschein am Erzgebirge; *Crepis biennis* L. var. **glanduligera** Čel. im Egerthal bei Laun; *Hiera-*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

cium murorum L. var. **oblongifolium** Čel. Sobochleben bei Teplitz, var. *pilosissimum* Tausch Kuchelbad bei Prag, Mariaschein; *H. vulgatum* Fr. var. **nudiceps** Čel. im Erzgebirge bei Görkau, Teplitzer Waldthor, Berg Ratsche bei Tschochau.

Phyteuma nigrum × *spicatum* (*Ph. adulterinum* Wallr.) bei Eger hinter Stein am Egerufer.

Gentiana obtusifolia Willd. Erzgebirge bei Voitsdorf und Ebersdorf.

Primula officinalis L. var. *pannonica* (Kerner; *P. officinalis* var. *inflata* Pax) Rabney-Berg bei Türmitz, auch bei Prag; *P. elatior* Jacq. var. **mirabilis** Čel. bei Rovensko unweit Turnau, im August blühend.

Potamogeton mucronatus Schrad. (*P. pusillus* a) *major* Koch, Fries) Libic nächst Poděbrad.

Neu eingeschleppt bezw. verwildert:

Erigeron speciosus DC. (*Stenactis speciosa* Lindl.) Wiese bei Holic.

Centaurea nigrescens Willd. var. *Candollei* Koch bei Wittingau im Park bei St. Aegidi, wohl eingeschleppt.

Im Freien angepflanzt:

Salix incana Schrank Wittingau nächst der St. Dreifaltigkeit, etwa 30 Sträucher ♂; *S. nigricans* Sm. Wittingau beim Opatovicer Teiche 5 Stämme ♀.

Wichtigere neue Fundorte:

Delphinium elatum L. Felsige Iserlehne bei Semil, etwas über 500 *m*.

Glaucium corniculatum Curt. bei Slatinan nächst Chrudim, erster Standort im Osten.

Arabis petraea (Lam.?) Koch Režný Ujezd bei Lobositz; *A. Halleri* L. Pilsen: bei der Lopatárna; *Erysimum crepidifolium* Rchb. auf Bergen bei Kaden, Radonic, Maschau; bei Pilsen im Radbuzathal, südlichster Standort; *Erucastrum Pollichii* Schimp. et Spenn. Milovic bei Lissa zahlreich; † *Bunias orientalis* L. bei Pardubitz und Chrudim.

Viola mirabilis × *Riviniana* Radotíner Thal bei Prag.

Cerastium alsinefolium Tausch (*C. Kablikianum* Wolfr., *C. Tauschianum* Wolfn.) in der Rauschenbacher Haide bei Marienbad neuerdings wieder gesammelt (scheint eine eigene Art zu sein).

Malva neglecta × *rotundifolia* bei Pardubitz, Dvakacovic und Libčan.

Lathyrus heterophyllus L. Berg Kozinec bei Třeskonic nächst Měcholup spärlich.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rosa vestita God. f. *Uechtritziana* (Strähl.) Čel. (*R. spinulifolia* Uechtr., Čel. Predr. nec Dematra, *R. Hampeliana* Wiesb.) Basaltfelsen des Rabney bei Türmitz, zweiter böhm. Standort [1, 2]: *R. villosa* L. (*R. umbelliflora* Sm., *R. cuspidatoides* Crép. etc.) Berg Sovice bei Raudnitz, Franzensbad, Eger [1]; *R. trachyphylla* Rau b) *piloso-glandulosa* Čel. Sovice bei Raudnitz [1]; *Pirus intermedia* Ehrh. Berg Prácheň bei Horažd'ovic, vielleicht wild.

Epilobium trigonum Schrank Oberer Hüttengrund bei Gottesgab an der sächsischen Grenze; *E. nutans* Tausch unter dem Tillenberge bei Sandau.

Xanthium italicum Mor. (*X. riparium* Lasch) bei Jaroměř, Pardubitz, östlichste Standorte; †*Senecio vernalis* W. K. bei Raudnitz in 1 Expl. aufgetaucht; *S. fluviatilis* Wallr. (*S. sarracenicus* Koch) Iserufer bei Benátek und bei Wegstädtel; *Cirsium pannonicum* Gaud. Poběžovic bei Holic, östlichster Standort; *C. lanceolatum* × *acaule* bei Pardubitz; *C. pannonicum* × *canum* Roblíner Thal bei Prag; *Carlina vulgaris* L. var. *nigrescens* Formánek, Wittingreut bei Tachau; *Achyrophorus maculatus* Scop. Burberg bei Kaden; *Lactuca quercina* L. Roblíner Thal bei Prag, Lobosch bei Lobositz; *Hieracium Schmidtii* Tausch var. *grandidentatum* Čel. Ufer der Tepl bei Einsiedel (von SCHNEIDER wird diese Form mit Unrecht für *H. anfractum* Fries erklärt); *H. graniticum* Schultz Bip. var. *quarciticum* (Freyn), St. Prokop und Závist bei Prag, Burberg bei Kaden; *H. barbatum* Tausch bei Rovensko unweit Turnau, Rabney bei Türmitz, Turner Park bei Teplitz, Geiersberg bei Mariaschein, Unter-Rotschow bei Schlan.

Pulmonaria angustifolia × *officinalis* im Vesecer Hain bei Jičín.

Solanum villosum Lam. Trnová bei Pardubitz, östlichster Standort.

Veronica officinalis L. var. *alpestris* Čel. Quinau im Erzgebirge, Karlsbad: zwischen Schönfeld und Lauterbach, Tillenberg bei Sandau, Berg Haltrow bei Taus; *V. austriaca* L. (*V. dentata* Schm.) Rabney-Berg bei Türmitz; Burberg bei Kaden; *V. agrestis* L. β. *glabrescens* Wiesb. bei Mariaschein; *Orobanche pallidiflora* W. et Grab. (*O. procera* Koch) Wickenfeld an der Strasse zwischen Lobositz und Wellemin; *O. Picridis* F. Schultz Weltruser Lehne bei Prag.

† *Elssholzia cristata* Willd. (*E. Patrinii* Gke.) Kalkbrüche bei Volavec nächst Rovensko; *Ajuga pyramidalis* L. bei Lomnitz a. Lužnic; *A. Chamaepitys* Schreb. Allerheiligenberg bei Rábí nächst Horažd'ovic, zweiter Standort für Südböhmen.

Rumex maritimus × *conglomeratus* bei Pardubic mehrfach.

Thesium ebracteatum Hayne bei Běchovic und am Doubice-Walde bei Sadská an zwei Stellen.

Scheuchzeria palustris L. am Teiche bei Kamenice Trhová nächst Hlinsko, erster Standort im Osten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gladiolus paluster Gaud. bei Bilichau unweit Schlan und am Walde Doubice bei Sadská.

Lilium bulbiferum L. f. *lanata* bei Ebersdorf im Erzgebirge in Feldern wild; *Gagea bohemica* Schult. bei der Randnitzer Fasanerie; *Muscari botryoides* DC. im Erzgebirge oberhalb Mariaschein auf Aeckern (heisst dort „Blaue Zaucken"); *Streptopus amplexifolius* DC. bei Hlinsko.

Veratrum album L. (*V. Lobelianum* Bernh. Bořkov bei Semil, in niedriger Lage.

Scirpus silvaticus × *radicans* (*S. intermedius* Čel.) bei Písek mit den vermuthlichen Eltern; *Eriophorum gracile* Koch Moor unter dem Tillenberge bei Sandau mit *Carex pauciflora* Lightf.; *Carex pediformis* C. A. Meyer im Kaliwoder Thal bei Rentsch zahlreich; *C. Buxbaumii* Wahl. bei Pardubitz, Hlinsko, um Horažd'ovic nicht selten; *C. secalina* Wahl. Pistian bei Lobositz.

Coleanthus subtilis Seidl Abzugsgraben des Teiches Reka bei Kreuzberg, erster Standort im Osten; *Sesleria coerulea* Ard. a) *calcarea* Čel. (vergl. Verbr. Phan.) Wald Háj im Berounkathale bei Pilsen, südlichster Standort; b) *uliginosa* Čel. auf feuchten Wiesen bei Všetat, Velenka, Sadská und Poděbrad im Elbthale; *Melica picta* C. Koch unter dem Georgenberg bei Randnitz, zwischen Budin und Mženo, im Loděnitzer Thal bei Unhošt, bei Pilsen im Walde Pytel und bei Písek am Abhange der Wotawa; *Poa silvatica* Chaix b) *remota* (Fr.) Jičín: am Bache bei der Dreifaltigkeit; *Festuca glauca* Lam. b) *psammophila* Hackel, auf Felsen an der Eger bei Karlsbad (nicht *F. amethystina* L. BORBáS in Osterr. Bot. Zeit. 1888, S. 71).

XVI. Mähren.

Referent: AD. OBORNY.

Quellen:

---

a) Literatur.

1. J. BUBELA (vergl. Verbr. Phan. Nr. 1); 2. E. FORMÁNEK (vergl. Schles. Nr. 2); 3. E. FORMÁNEK, Correspondenzen Oesterr. bot. Zeitschr. XXXVIII, S. 34, 72, 73, 107, 217, 217, 252, 324; 4. E. FORMÁNEK, Mährisch-schlesische Menthen, Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn XXX, S. 193—206; 5. E. FORMÁNEK,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Celakovsky Ladislav Josef

Artikel/Article: Böhmen 1109-1112