© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gladiolus paluster Gaud. bei Bilichau unweit Schlan und am Walde Doubice bei Sadská.

Lilium bulbiferum L. f. *lanata* bei Ebersdorf im Erzgebirge in Feldern wild; *Gagea bohemica* Schult. bei der Randnitzer Fasanerie; *Muscari botryoides* DC. im Erzgebirge oberhalb Mariaschein auf Aeckern (heisst dort „Blaue Zaucken"); *Streptopus amplexifolius* DC. bei Hlinsko.

Veratrum album L. (*V. Lobelianum* Bernh. Bořkov bei Semil, in niedriger Lage.

Scirpus silvaticus × *radicans* (*S. intermedius* Čel.) bei Písek mit den vermuthlichen Eltern; *Eriophorum gracile* Koch Moor unter dem Tillenberge bei Sandau mit *Carex pauciflora* Lightf.; *Carex pediformis* C. A. Meyer im Kaliwoder Thal bei Rentsch zahlreich; *C. Buxbaumii* Wahl. bei Pardubitz, Hlinsko, um Horažd'ovic nicht selten; *C. secalina* Wahl. Pistian bei Lobositz.

Coleanthus subtilis Seidl Abzugsgraben des Teiches Reka bei Kreuzberg, erster Standort im Osten; *Sesleria coerulea* Ard. a) *calcarea* Čel. (vergl. Verbr. Phan.) Wald Háj im Berounkathale bei Pilsen, südlichster Standort; b) *uliginosa* Čel. auf feuchten Wiesen bei Všetat, Velenka, Sadská und Poděbrad im Elbthale; *Melica picta* C. Koch unter dem Georgenberg bei Randnitz, zwischen Budin und Mženo, im Loděnitzer Thal bei Unhošt, bei Pilsen im Walde Pytel und bei Písek am Abhange der Wotawa; *Poa silvatica* Chaix b) *remota* (Fr.) Jičín: am Bache bei der Dreifaltigkeit; *Festuca glauca* Lam. b) *psammophila* Hackel, auf Felsen an der Eger bei Karlsbad (nicht *F. amethystina* L. BORBáS in Osterr. Bot. Zeit. 1888, S. 71).

XVI. Mähren.

Referent: AD. OBORNY.

Quellen:

---

a) Literatur.

1. J. BUBELA (vergl. Verbr. Phan. Nr. 1); 2. E. FORMÁNEK (vergl. Schles. Nr. 2); 3. E. FORMÁNEK, Correspondenzen Oesterr. bot. Zeitschr. XXXVIII, S. 34, 72, 73, 107, 217, 217, 252, 324; 4. E. FORMÁNEK, Mährisch-schlesische Menthen, Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn XXX, S. 193—206; 5. E. FORMÁNEK,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

[H. Braun] Mährische Thymus-Formen (Oesterr. bot. Zeitschr. XXXVIII, S. 186 bis 190); 6. W. Spitzner, Correspondenzen a. a. O. S. 144, 145, 395 und 430, 431. Vergl. Verbr. Phan.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

7. Professor Simböck in Römerstadt und 8. Fachlehrer L. Niessner in Zwittau.

Neu für das Gebiet:

Rubus moestus Holuby Březová unter dem Lopenník in den Karpathen; *R. gracilescens* Progel und *R. Caflischii* Focke beim Forsthause hinter Lultsch nächst Wischau; **R. gracilis** Holuby (nec Presl) Protiwanow nächst Boskowitz [6]; *Rosa albo-lutescens* Rip. Hutberg bei Gr. Ullersdorf [2]; *R. canina* L. f. *fallax* Pug. Neudorf u. f. *fissidens* Borb. Wüstseibersdorf [2]; **R. Carioti** Chab. Gr.-Ullersdorf [2]; *R. leiostyla* Rip. Karlshöhe bei Gr.-Ullersdorf [2]; *R. dumalis* Bechst. f. *laxiflora* Borb. Neudörfl [2]; *R. brevipedunculata* Opiz Grundwald bei Römerstadt [2]; *R. coriifolia* Fries f. *lucida* Bräucker Brandgrund, schwarze Strive bei Gr.-Ullersdorf und Wüstseibersdorf [2].

Mentha candicans Crantz b) *discolor* Opiz Schwarzawa-Ufer bei Tischnowitz; c) *serrata* Opiz Billowitz, Blansko, Boskowitz, Kromau, Gaya, Strassnitz, Sternberg, Odrau, Neudörfl; d) *cuspidata* Opiz Obřan, Brünn, Adamsthal, Kromau, Gr. Ullersdorf, Goldenstein; e) *reflexifolia* Opiz Czernowitz, Kromau, Olmütz; f) *semiintegra* Opiz Adamsthal, Blansko, Wall. Klobouk, M. Ostrau; g) *Brittingeri* Opiz Adamsthal, Blansko, D. Märzdorf, Nikles; *M. serotina* Host Czeitsch; *M. verticillata* L. b) *atrovirens* Host Brünn, Wölkingsthal bei Zlabings, Znaim, M. Schönberg, Liebau u. Saar; c) *calaminthoides* H. Braun Adamsthal, Gr. Ullersdorf, D. Märzdorf; *M. prachinensis* Opiz Kl. Tesswitz bei Znaim, Sicherteiche bei Zlabings, Paradeisau bei Czernowitz; *M. ovalifolia* Opiz Znaim, Kl. Tesswitz, Gr. Maispitz, Obřan bei Brünn, Czernowitz; b) *peckaensis* Opiz Kromau u. Sternberg; *M. Weidenhofferi* Opiz Wasathal bei Ostrawitz; *M. elata* Host b) *tortuosa* Host Lhota nächst Teltsch; e) *montana* Host bei Boskowitz [4]; *M. clinopodiifolia* Host Vašan nächst Austerlitz, Bystřic; *M. origanifolia* Host a) *elatior* H. Braun, Nikles, Böhm.-Märzdorf; *M. austriaca* Jacq. b) *sparsiflora* H. Braun Wien nächst Gr.-Meseritsch; c) *slichoviensis* Opiz Střelitz, Billowitz, Blansko, Boskowitz, Petersdorf, Gr.-Ullersdorf etc.; d) *foliicoma* Opiz, Saar, Brandwald bei Deutsch-Märzdorf: *M. pulchella* Host b) *approximata* Wirtg. Jundorf, Blansko, Sloup, Boskowitz, Gr.-Ullersdorf, Rožnau etc.; c) *lanceolata* Opiz Kromau, Teltsch, Gr.-Ullersdorf, Grumberg; *M. silvatica* Host; *M. žatecensis* Opiz bei Boskowitz, Saar; *M. Paulina* F. Schultz, Mannersdorf, Gross-Ullersdorf [3], Stramberg [3]; *M. arvensis* L. b) *distans* H. Braun Karlsberg bei Gr.-Ullersdorf;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

c) **diffusa** Lejeune Militärschiessstätte bei Sebrowitz; d) *polymorpha* Host Neustadtl, Dreibrunn, Unt. Obrova etc.; e) *varians* Host Felder bei Sebrowitz, Janowitz fast sämmtlich [4]; *Thymus lanuginosus* Mill. b) *pilosus* Opiz Karthaus, Husowitz, Jimitz, Obřan, Sobieschitz, Sokolnitz, Austerlitz etc.; c) *Kosteleckyanus* Opiz bei Obřan, Lösch, am Misskogel bei Wedrowitz und auf den Polauer Bergen; *T. ovatus* Mill. Billowitz; b) *substriatus* Schreb. Hadyberg bei Obřan, Billowitz, Gurein, Tischnowitz, Lettowitz, Wischau, Kromau, M. Budwitz etc.; e) *concolor* Opiz im Punkwathale bei Blansko [3]; bei Střelitz [3]; Bystritz, Vsetin etc.; *T. parvifolius* Opiz Karthaus, Lösch, Brünn, Auerschitz; *T. Lövyanus* Opiz bei Husowitz, Obřan, Lösch, Horkau, Karthaus, Rečkowitz, Metlanko, Sokolnitz; b) *bracteatus* Opiz Hadyberg bei Obřan; c) *sparsiflorus* H. Braun (= *T. interruptus* H. Braun nec Opiz) St. Anton nächst Brünn, bei Schimitz, Jundorf, Lundenburg; d) *serpens* Opiz Obřan u. Karthaus; e) *stenophyllus* Opiz Seelowitz und Schimitz; f) *brachyphyllus* Opiz St. Anton nächst Brünn; Schimitz, Obřan, Seelowitz, Doubrava bei Bisenz; g) *angustissimus* H. Braun (= *T. pinifolius* Heuffel) Kühberge bei Sebrowitz; h) *piligerus* Opiz Střelitz; *T. Reineggeri* (Opiz) Katov bei Wranau; *T. praecox* Opiz b) *spathulatus* Opiz Kleidowka bei Brünn und Billowitz; c) *ciliatus* Opiz Wald Borky bei Schimitz; d) *caespitosus* Opiz Sazowitz sämmtlich [5].

Festuca myuros Ehrh. Kiesbänke der Ostrawitza bei Mistek [1]; Waldschlag bei Plumenau [6].

Neu eingeschleppt bezw. verwildert:

Lupinus luteus L. Spitzberg bei Wermsdorf [2]

Wichtigere neue Fundorte:

Ranunculus paucistamineus Tausch bei Stětowitz [6].

Glaucium corniculatum Curt. einmal bei Žechau [6].

Camelina microcarpa Andrzj. selbst noch bei Römerstadt [2]; †*Lepidium perfoliatum* L. an der Bečva bei Lásky 1882 massenhaft [1].

Viola hirta × *odorata* bei Wsetin [1].

Anthyllis Vulneraria L. Karlshöhe [2] und an Rainen von Kleefeldern bei der Glasfabrik nächst Ullersdorf!! †*Colutea arborescens* L. zwischen Czeitsch u. Kobyla wie wildwachsend [6].

Rubus serpens W. N. u. *R. apricus* Wimm. bei Protiwanow nächst Boskowitz [6]; *R. macrophyllus* W. N. auf der Jahodová bei Drahan, bei Určic u. Lultsch [6]; *Potentilla aurea* L. am Radhošt [1]; *Rosa myriodonta* Christ bei Römerstadt [2]; *R. montivaga* Deségl. bei Kl.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mohrau [2]; *R. oblonga* Deségl. bei Liebesdorf und Neudorf [2]; *R. squarrosa* Rau bei Kleppl [2]; *R. Boreykiana* Bess. bei Wsetin [1]; *R. apricorum* Rip. bei Wsetin [1]; *R. urbica* Gren. f. *subglabra* Borb. bei Neudörfl [2]; *R. coriifolia* Fr. bei Römerstadt [2] und bei Hombock [6]; f. *intermedia* Kit. bei Neudorf [2]; *R. incana* Kit. bei Irmsdorf, Gr. Ullersdorf, Grumberg, Woizdorf u. Liebesdorf [2]; *R. cuspidatoides* Crép. bei Neudorf u. Wüstseibersdorf; f. *minor* Scheutz bei Kl. Mohrau und Neudörfl [2].

Sedum villosum L. Grumberg, Krummwasser [2].

Ribes nigrum L. Wald Bzinek bei Bisenz [1].

Galium verum L. b) *Wirtgeni* F. W. Schultz bei Gnadlersdorf!! *G. palustre* L. var. *elongatum* (Presl) zw. Přihoz u. Náklo bei Olmütz [6]; *G. austriacum* Jacq. um Wsetin [1]; *G. scabrum* Jacq. um Liliendorf und Schönwald!!

Achillea Millefolium L. c) *pannonica* Scheele bei Dřisitz [6]; *Doronicum austriacum* Jacq. am Radhošt [1]; *Arnica montana* L. Waldwiesen bei Zwittau [8]; *Hieracium auriculaeforme* Fr. bei Drahlov [6]; *H. glomeratum* Fröhl. bei Wsetin [1]; *H. canum* N. P. subsp. *praelongum* N. P. am Kosiř bei Prossnitz [6]; *H. setigerum* Tausch a) *seticaule* N. P. Kühberge bei Edelspitz!! *H. magyaricum* N. P. subsp *hispidissimum* Rehm. u. subsp. *filiferum* Tausch bei Dřisitz [6]; *H. brachiatum* Bert. am Wesniker Friedhofe [1]; subsp. *pseudobrachiatum* N. P. u. subsp. *brachiatum* N. P. bei Dřisitz [6]; *H. leptophyton* N. P. am Wesniker Friedhofe [1]; ssp. *atriceps* N. P. zu Dřisitz bei Wischau [6]; *H. floribundum* Wimm. bei Grügau nächst Olmütz [6]; bei Chwalkowitz [6]; *H. maculatum* Smith bei Ropotitz [3]; *H. tridendatum* Fr. γ. *angustifolium* Uechtr. bei Wsetin [1]; *H. barbatum* Tausch bei Kl. Bukowina [6].

Gentiana verna L. Wiesen an der Johnsdorfer Koppe und am Braunelstein bei Römerstadt [7]; *Gentiana obtusifolia* W. bei Wsetin [1].

Physalis Alkekengi L. bei Rottalowitz [1].

Orobanche Kochii F. Schultz Nikoltschitz bei Auspitz [1].

Mentha palustris Mnch. var. *ballotaefolia* Opiz bei Wsetin [1].

Salix repens L. Zaisa nächst Frain!!

Colchicum auctumnale L. f. *vernale* Heuff. var. *speciossimum* Bubela Prossnitz, Freiberg [1].

Carex paradoxa Willd. bei Oels [1].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Oborny Adolf

Artikel/Article: Mähren 1112-1115