

XXIV. Characeae.

Referent: P. MAGNUS.

Quellen:

a) Literatur:

1. F. HAUCK: Die Characeen des Küstenlandes (Hedwigia, XXVII. 1888, S. 17, 18);

b) Unveröffentlichte Mittheilung von:

2. Dr. JOST in Strassburg i. E. (durch Prof. H. Graf ZU SOLMS-LAUBACH).

Nitella hyalina (DC.) A. Br. Die Angabe von SYDOW (Europ. Characeen, S. 33), dass diese Art K Triest vorkomme, wird bestritten [1].

Chara stelligera Bauer OR in einem Tümpel bei der Sternwarte in Strassburg i. E. [2] (in den Mittheilungen der Badischen Botanischen Vereins II. Nr. 67, 68, (1889) S. 139 theilt F. FÖRSTER mit, dass er diese Art (ebenfalls OR) in der Bayrischen Pfalz in Menge in der Tiefe des Mundenheimer Alt-Rheins im Oktober 1888 gefunden hat); *Ch. intermedia* A. Br. K See von Vrana auf Cherso [1].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Magnus Paul Wilhelm

Artikel/Article: [Characeae 1137](#)