

VII. Hercynisches Gebiet.

Referent: K. Haussknecht.

Quellen:

a) Literatur:

1. O. Appel (s. Verbr. Phan. Nr. 3). **2. Th. Beling**, Fünfter Beitrag zur Pflanzenkunde des Harzes (D. Bot. Monatsschr. VII, S. 12—14). **3. Bliedner** (Bot. Ver. Ges.-Thür. VIII, S. 16—26 [1890]). **4. Brückner** (a. a. O. S. 2 [1889]). **4b. L. Čelakovský** *Viola ambigua* W. K. in Böhmen und Mähren (Oester Bot. Zeitschr. 1889, S. 231, 232). **5. Grube-Einwald**. (Bot. V. Thür VIII. S. 18 [1890]). **6. K. Haussknecht** (s. Verbreitete Phanerogamen Nr. 12). **7. Lutze** (Bot. Ver. f. Ges.-Th. VIII, S. 15 [1890]). **8. Rottenbach** (a. a. O. S. 15). **9. Sagorski**, *Plantae criticae Thuringiae* IV. (D. Bot. Monatsschr. VII, S. 97—99). **10. M. Schulze** (Bot. Ver. f. Ges.-Th. VIII, S. 15). **10b. H. Steinvorth**, Fremde Flora in der Nähe von Wollwäschereien (Jahreshefte naturw. Ver. Lüneb. XI, 1888/89 [1890], S. 127—129). **11. E. Torges** (Bot. Ver. f. Ges.-Th. VIII, S. 3—4 [1889]). **12. E. Torges**, *Epilobium hirsutum* × *roseum* (a. a. O. S. 8—10). **13. E. Torges** (a. a. O. S. 16—17 [1890]). **14. K. Wiefel**, Bastard *Digitalis purpurea* × *ambigua* (D. Bot. Monatsschr. VII, S. 87—88). **15. O. Wünsche** (s. Obers. Geb. Nr. 1). **16. Wuth** (Bot. Ver. Ges.-Thür. VIII, S. 4 [1889]). **17. A. Zimmeter** (s. Verbr. Phan. Nr. 21).

b) Unveröffentlichte Beobachtungen von:

18. Seminar-Lehrer **F. Alpers-Hannover**. **19.** Lehrer **Klinkmann** in Celle (beide durch Prof. P. Ascherson mitgetheilt). **20.** Dem Referenten.
Vergl. auch Verbr. Phan. c, g, k, hh—kk.

Abkürzungen:

HDW = Hannover: Döhrener Wollwäscherei.

Neu für das Gebiet:

Viola ambigua W. K. wahrscheinlich von Wallroth in Thüringen gesammelt; event. neu für das deutsche Reich [4b].

Rosa gallica × *graveolens* var. *calcareæ* (*R. subtristis* Sag.), Spitzer Hut b. Bibra [9]; *Potentilla procumbens* × *silvestris* (*P. suberecta* Zimm.) Jena: Zeitzgrund b. Waldeck [17]; Gr.-Teich b. Ilmenau [6].

Convolvulus sepium L. var. *roseus* DC. Jena [10]; Meiningen [8]; Weimar [6].

Tithymalus Cyparissias × *Esula* Buttelstedt: Klein-Brembach [6].

Neu eingeschleppt oder verwildert:

Cytisus ratisbonensis Schaff. Johannisthal b. Eisenach [3].

Bowlesia tenera Spr. und *Ammi Visnaga* Lam. HDW [18].

Telekia speciosa Baumg. Eisenach: Wilhelmsthal [3]; *Baccharis Pin-graea* DC., *Bidens pilosus* L., *Tagetes glandulifer* Schrk. und *Artemisia afra* Jacq. HDW [18]; *A. annua* L. Hildesheim [19]; *Tanacetum macrophyllum* Schultz Bip. Weimar: Belvedere; Greussen an Hecken; Sondershausen: Loh [20]; Schleiz: Heinrichsruher Park [15, als *Achillea tanacetifolia*, vergl. S. 118].

Albersia crispa Aschers. ms. (= *Euxolus c.* Lesp. et Thév. Bull. Soc. Bot. France VI (1859), pag. 656, *Amarantus c.* N. Terraciano (S. A. aus Atti R. Accad. Sc. fis. e mat. Napoli, Vol. IV, Ser. 2, Append. No. 2, 1890, pag. 7, fig. 2); *A. emarginata* Aschers. ms. (= *Euxolus* A. Br. et Bouché, Ind. sem. h. Berol. 1852, sämtlich HDW [18]; *A. deflexa* Aschers. (*Amarantus prostratus* Balb.) HDW [10b, 18]; *A. melancholicus* L.? var. *parvifolius* Moq. Tand.; *Scleropus crassipes* Moq. Tand.; *Chenopodium carinatum* R. Br.; *Roubieva multifida* Moq. Tand.?

Juncus microcephalus Humb. Bonpl. Kth.

Chloris radiata Sw.; *Eleusine indica* Gaertn.; *E. tristachya* Kth.; *Diplachne fascicularis* P. B. [cf. *Leptochloa* sp., Ber. pro 1888, S. (104)]; *Polypogon monspeliensis* Desf.; *Bromus unioloides* Humb. Bonpl. Kth. sämtlich HDW [18].

Wichtigere neue Fundorte:

Fumaria Schleicheri Soy. Will. Kölleda: Schloss Beichlingen [6].

Sisymbrium Loeselii L. † HDW [18]; † *S. Sinapistrum* Crtz. Blankenburg i. T.: Chrysopras [18]; † *Sinapis juncea* auct. (vergl. S. 110), Eisenach an der Hörsel [3]; Meiningen [8]; † *Coronopus didymus* Sm. HDW [10b, 18].

Viola collina Bess. Hörnekuppe b. Allendorf [6].

Sagina apetala L. b) *ciliata* Fr. Seesen [2].

Malva rotundifolia L. † HDW [10b, 18].

† *Erodium moschatum* L'Hér. desgl. [18].

Ononis repens × *spinosa* (*O. mitis* Wend.) zwischen Albungen und dem Bielstein b. Allendorf a. W. [6]; *Medicago hispida* Gaertn. † HDW [10b, 18]; † *M. arabica* All. HDW [10b, 18]; † *Melilotus parviflorus* Desf. Eisenach [3]; HDW [10b, 18]; *Trifolium striatum* L. Buschleite b. Eisenach [16]; *Vicia villosa* Rth. † Eisenach: Stedtfeld [3]; *Lathyrus silvester* L. b) *ensifolius* Buek Höllenthal am Bielstein [6].

Rosa repens Scop. Vogelberg zw. Wiershausen und Ildehausen [2]; *Potentilla pilosa* W. Hügel b. Koburg [4].

Epilobium hirsutum × *roseum* (*E. Schmalhausenanum* M. Sch.) Berka a. I. [12].

† *Helosciadium leptophyllum* DC. (früher bei Bernburg gefunden, vergl. Verh. Bot. Ver. Brandenb. IX, 1867, S. 135) HDW [18]; *Peucedanum officinale* L. Kölleda: Burgwenden [6]; *Chaerophyllum aureum* L. Sooden b. Allendorf [6]; *Pleurospermum austriacum* Hoffm. Wälder südl. von Weimar [11].

Asperula tinctoria L. Finne b. Burgwenden [6].

Valeriana sambucifolia Mik. Höllenthal beim Bielstein [6].

Inula hirta × *salicina* (*I. rigida* Döll) Finne b. Burgwenden [6]; † *Xanthium spinosum* L. HDW [18]; † *Anthemis ruthenica* M. B. Eisenach: Ramsberg [3]; *Senecio aquaticus* Huds. Wutha [3]; *S. nemorensis* L. Frankenhausen: Udersleben [5]; † *Centaurea transalpina* Schl. Sondershausen [7]; *Lactuca virosa* Kyffhäuser [5]; Sooden b. Allendorf [6].

Campanula Rapunculus L. Eisenach [3]; *C. Cervicaria* L. südlich von Weimar [11].

Gentiana verna L. Wiesen b. Eisfeld im Werrathal [4].

† *Datura Stramonium* L. var. *D. Tatula* L. HDW [10b, 18].

Digitalis purpurea × *ambigua* (*D. fucata* Ehrh.) Mittelberg b. Leutenberg [14].

Orobanche pallidiflora W. G. Weimar: Ettersberg auf *Cirsium arvense* Scop. [11]; *Mentha nemorosa* Willd. Frau-Holle-Teich am Meissner; *M. aquatica* × *silvestris* (*M. nepetoides* Lej.) zw. Witzzenhausen und Unterrieden; *M. arvensis* × *piperita* (*M. gentilis* L. p. p.) Bäche b. Ettersburg, sämmtlich [6]; *Stachys palustris* × *silvatica* (*St. ambigua* Sm). Eisenach: Wilhelmsthal [3]; Ettersburg [6]; *S. alpina* L. Hainberg b. Bodenstern [2].

† *Salsola Kali* L.; † *Chenopodium ambrosioides* L. † *Atriplex tataricum* L., sämmtlich HDW [18].

Rumex aquaticus × *crispus* (*R. similatus* Hsskn.) Allendorf a. W.; *R. arifolius* All. Schmücke: Oberhof [6].

Ulmus montana With. Meissner: Bielstein [6].

Betula alba × *pubescens* (*B. hybrida* Bechst.) Weimar: Hopfgarten; südl. Harzrand [6].

Gymnadenia albida Rich. Meisenstein b. Thal [3]; *Epipogon aphyllus* Sw. Wausterberge, Upen [2]; *Epipactis violacea* Dur. D. Buchenwälder b. Greene [2]. Ist gute Art!

Carex cyperoides L. Gr.-Teich b. Ilmenau [6]; *C. brizoides* × *remota* (*C. Ohmülleriana* Lang) Wildpark b. Mönchröden b. Koburg [1]; Mühlenthal b. Eisenberg [6]; Werrateich b. Eisfeld [1]; *C. strigosa* Huds. Stauffenburg [2].

Cynodon Dactylon Pers. † HDW [10b, 18]; *Festuca myuros* Ehrh. und *F. sciuroides* Rth. † HDW [18]; *F. elatior* × *Lolium perenne* (*F. loliacea* Curt.) Eisenach: Wiesen unterhalb des Hörselbergs [6]; *Triticum glaucum* Desf. Monrburg b. Burgwenden [6, 13].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Haussknecht Heinrich Carl [Karl]

Artikel/Article: [Hercynisches Gebiet. 1120-1122](#)