

## XI. Niederrheinisches Gebiet.

Referent: L. Geisenheyner.

---

### Quellen:

---

#### a) Literatur:

**1. H. Wagner**, Flora des unteren Lahnthales mit besonderer Berücksichtigung von Ems. Bad Ems **2. M. Melsheimer** in Verh. des naturh. Ver. für Rheinland u. Westfalen XLVI, Correspondenzbl. S. 60. **3. P. Ascherson** u. **P. Magnus** (s. Verbr. Phan. Nr. 4).

#### b) Unveröffentlichte Aufzeichnungen von:

**4. O. Kobbe** in Bingen. **5.** Realgymnasiallehrer **F. Meyer** in Oberhausen. **6.** Gymnasiallehrer **Dr. Spamer** in Düren. **7.** Gymnasiallehrer **Dr. H. Zimmermann** in Limburg a. Lahn. **8.** Dem Referenten.

---

#### Neu für das Gebiet:

*Veronica agrestis* L. var. *V. ciliata* Kitt. Oberstein a. d. Nahe [8].

---

#### Neu eingeschleppt:

*Brassica elongata* Ehrh. f. *typica* (bisher nur var. *armoracioides* Aschers.) Kreuznach: Schuttstelle am Naheufer [8].

---

#### Wichtigere neue Fundorte:

† *Sisymbrium Columnae* Jacq. Kreuznach: Schuttstelle am Naheufer [8].

*Berteroa incana* DC. † desgl. [8]; *Lepidium Draba* L. Unweit Frücht [1]; Michelbach im Aarthal [7]; *Neslea panniculata* Desv. Diez [7]; † *Soria syriaca* Desv. Kreuznach: Schuttstelle am Naheufer [8]; *Coronopus Ruellii* All. Dietersheim bei Bingen [4].

† *Silene dichotoma* Ehrh. Kreuznach: Schuttstelle am Naheufer [8].

*Geranium pyrenaicum* L. Aarthal [7].

*Sanicula europaea* L. zwischen Sporkenburg und Denzerheide; zw. Nassau u. Misselberg; oberes Fachbachthal; Nieverner Fähre [1]; *Oenanthe fistulosa* L. unterh. Fachbach [1]; *Oenanthe Phellandrium* Lam. unterh. Nievern [1]; *Meum athamanticum* Jacq. bei Düren [6].

† *Aster abbreviatus* Nees. Lahnufer bei Ems [1]; *Filago arvensis* L. und *Anthemis Cotula* L. fehlen bei Ems [1]; *Doronicum Pardalianches* L. Waldblösse bei Misselberg; Mohrendell [1]; *Senecio erucifolius* L. und *Lappa tomentosa* Lam. fehlen bei Ems [1]; † *Crepis setosa* Hall. fil. zwischen Dorf Ems und Kemmenau; Fachbachthal [1].

*Vaccinium Myrtilus* L. var. *leucocarpum* Wender. Nussbaum (Kr. Kreuznach); Goedenroth (Kr. Simmern); Stipshausen (Kr. Bernkastel) sämmtlich im Hunsrück [8]; Schleiden i. d. Eifel [3].

*Lycium rhombifolium* Dipp. bei Burg Klopp in Bingen, Rheinufer oberh. Coblenz [4].

*Veronica scutellata* L. Kreuznach am Weiherrand im Walde beim Forsthaus [8]; *V. Anagallis* L. nicht bei Ems [1]; *V. montana* L. Malberg im Wald [1].

*Stachys palustris* × *silvatica* (*S. ambigua* Sm.) Fischbachufer bei Hargesheim [8]; *S. silvatica* L. weissblühend. Bahndamm b. Heddesheim [8]; *S. annua* L. Aecker bei Diez [7]; bei Ems [1].

*Utricularia vulgaris* L. nicht mehr bei Ems [1].

*Limodorum abortivum* Sw. Casbachthal bei Linz neu für das rechte Rheinufer im Gebiet [2].

*Juncus bufonius* L. var. *J. ranarius* Perr. et Song. Kreuznach: Bretzenheim [8].

*Phleum asperum* Vill. Diez [7]; *Melica nutans* L. und *Molinia coerulea* Mnch. fehlen bei Ems [1]; *Festuca heterophylla* Lam. am Winterberg [1]; *Bromus tectorum* L. fehlt bei Ems [1].

## XII. Oberrheinisches Gebiet.

Referent: L. Klein.

### Quellen:

#### a) Literatur:

1. H. Zahn (s. Oberrh. Geb. 1888, Nr. 1)<sup>1)</sup>. 2. Winter, Am Isteiner Klotze (Mitth. Bad. Bot. Ver., II, S. 49–63; der Aufsatz schildert eine vor fünf bis sechs Jahren gemachte Excursion!). 3. A. Kneucker, *Carduus nutans* × *acanthoides* Koch u. s. w. (a. a. O. S. 65, 66). 3b. Sterk, *Corylus glandulosa*

1) Im vorjährigen Bericht bereits theilweise benutzt; es werden hier indess zahlreiche Thatsachen nachgetragen, welche dem Autor (der die Güte hatte für den gegenwärtigen Referenten einen Auszug der neuen Angaben anzufertigen) sowie dem letzteren erwähnenswerth erschienen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Geisenheyner Ludwig

Artikel/Article: [Niederrheinisches Gebiet. 1131-1132](#)