

XVII. Nieder-Oesterreich.

Referent: G. Ritter Beck von Mannagetta.

Quellen:

a) Literatur:

1 bis 15. Oesterr. botan. Zeitschr. XXXIX. 1. R. v. Wettstein, *Pinus digenea* [*nigra* × *montana*] (S. 108—110). 2. H. Braun, Flora von Oesterreich-Ungarn. Nieder-Oesterreich (S. 115—116 vergl. A. v. Kerner, Nieder-Oesterreich 1888, Nr. 32). 3. J. Freyn, Ueber einige kritische *Arabis*-Arten (S. 101—108, 128—134, 167—171). 4. K. Fritsch, Notiz (S. 153). 5. H. Braun, Syst. Uebersicht und Verbreitung der Gattung *Thymus* in Nieder-Oesterreich (S. 186—188). 6. Hingerl, v. Pernhoffer, R. v. Wettstein, Neue Standorte (S. 309). 7. R. v. Wettstein und G. Sennholz, Zwei neue hybride Orchideen (S. 319—322). 8. G. Sennholz, *Adenostyles canescens* (*glabra* × *Alliariae*) (S. 332, 333). 9. G. Sennholz, Notizen (S. 342). 10. V. v. Borbás, Ueber Arten der Gattung *Tilia* mit sitzenden Bracteen (S. 361—364). 11. V. v. Borbás, Notiz (S. 375). 12. R. v. Wettstein, Notiz (S. 375). 13. R. v. Wettstein, Studien über die Gattungen *Cephalanthera*, *Epipactis*, *Limodorum* (S. 395—399, 422—430, Taf. III). 14. Tscherning, Kronfeld, R. v. Wettstein, V. v. Borbás, Notizen (S. 414—415). 15. H. Braun, Ueber einige kritische Pflanzen der Flora von Nieder-Oest. (S. 440 bis 448). 16. H. Braun, Bemerkungen über einige Arten der Gattung *Mentha* (Abh. der zool. bot. Ges. Wien XXXIX S. 41—46). 17. R. v. Wettstein, Untersuchungen über „*Nigritella angustifolia* Rich.“ (Ber. der deutsch. bot. Ges. VII S. 306—317, Taf. XIII). 18. A. Callier, Ueber *Alnus glutinosa* × *incana* (Deutsche Botan. Monatsschr. (S. 51—55 bes. Beilage). 19. H. Sabransky, Batographische Miscellaneen (a. a. O. S. 129—152).

b) Unveröffentlichte Mittheilung von:

20. Prof. Dr. A. Kornhuber.

Neu für das Gebiet:

Arabis Ovirensis Wulf. am Göller [3].

Viola cyanea Čelak. Kalksburg, Neumühle [14].

Tilia aenobarba Borb. et Braun; *T. apiculata* Court. (= *T. oxycarpa* Rchb.) bei Ober-St. Veit; *T. pyramidalis* Host v. *sphenophylla* Borb. bei Mödling [10].

Geum rivale × *montanum* (*G. inclinatum* Schleich.) auf der Schneearalpe [9].

Adenostylis albifrons × *alpina* (*A. canescens* Sennh.) Krummbachgraben des Schneebergs [8]; *Petasites albus* × *niveus* (*P. Lorezianus*

Brügg.) *Rax-* und Schneeberggebiet [9]; *Lappa officinalis* \times *tomentosa* (*L. ambigua* Čelak.) Wien, Bruck a. d. Leitha [14].

Echium Wierzbickii Hab. im Prater bei Wien [11].

Mentha diversifolia Dumort. Niederösterreich [16] (*Thymus Braunii* Borbás Bernstein an der niederösterreichischen Grenze); *Th. parviflorus* Opiz Dornbach und Neuwaldegg [5].

Ceratophyllum submersum L. var. **C. Haynaldianum** Borb. Simmering [11].

Quercus Robur L. var. *Q. hiemalis* Stev. (*longepedunculata* Lasch) Laxenburg [11].

Orchis speciosa \times **sambucina** (*O. speciosissima* Wettst. et Sennh.) zwischen der Brenn- und Reisalpe; **O. speciosa** \times **maculata** (*O. pentecostalis* Wettst. et Sennh.) ebendaselbst [7]; **Gymnadenia (Nigritella) rubra** Wettst. auf den niederösterreichischen Kalkalpen verbreitet; (*Nigritella angustifolia* Rich. wird *Gymnadenia nigra* Rchb. fil.; *N. suaveolens* Koch wird *G. conopea* \times *nigra* (*G. suaveolens* Wettst.); *N. Heufleri* Kern. wird *G. odoratissima* \times *nigra* (*G. Heufleri*) Wettst. und *N. micrantha* Kern wird *G. nigra* \times *albida* (*G. micrantha* Wettst.) [17]; **Cephalanthera grandiflora** (= *Epipactis alba* Wettst.) \times **Epipactis rubiginosa** (*Epipactis speciosa* Wettst.) Luggraben bei Scheibbs; (*Cephalanthera Xiphophyllum* Rchb. fil. und *C. rubra* Rich. werden *Epipactis longifolia* Wettst. und *E. rubra* All.; *Limodorum abortivum* Sw. wird *Epipactis a.* Wettst.) [13].

Carex brizoides \times *remota* (*C. Ohmülleriana* Lg.) zwischen Mauerbach und Gablitz, gegen den Troppberg [9].

Pinus nigra \times **montana** (*P. digenea* Wettst. nec G. Beck [1888] = *P. Wettsteinii* Fritsch [4]) im Wiener botan. Garten [1].

Namensveränderungen: *Rubus eurythrysus* Sabr. et H. Braun (s. Nieder-Oesterreich 1887 S. CXL) nec G. Braun wird **R. Vindobonensis** Sabr. et H. Braun [19].

Alnus superincana \times *glutinosa* [*A. ambigua* Beck erweitert vgl. Nieder-Oesterr. 1888 S. (118)] wird *A. Beckii* Callier [18].

Wichtigere neue Fundorte:

Phyteuma nigrum Schm. zwischen Silberberg und Harmanschlag im oberen Lainsitzthale [20].

Rhododendron ferrugineum \times *hirsutum* (*R. intermedium* Tausch) auf dem Sonnwendsteine [12]; *Pirola media* Sw. im oberen Lainsitzthale [20].

Myosotis variabilis Ang. auf dem Sonnwendstein und Pinkenkogl [12].

Verbascum Thapsus \times *phlomoides* (*V. Kernerii* Fritsch) Weyer [12].
Scirpus supinus L. im Donausande bei Kagran [14].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Beck Günther [Gunthero] Ritter von Mannagetta

Artikel/Article: [Nieder-Oesterreich 1149-1150](#)