

Lappa tomentosa Lam. bei St. Nicola a. d. Lieser [10]; *Centaurea axillaris* Willd. var. *C. stricta* W. K. auf der Wischbachelpe [7].

Vincetoxicum laxum Bartl. an Zäunen bei Pontafel [5].

Anchusa arvensis M. B. bei St. Nicola a. d. Lieser [10].

Verbascum Thapsus L. am Katschberg, im Lieserthal bei Eisentratten und Gmünd nicht selten [10]; *V. thapsiforme* Schrad. im Möllthal [8]; sehr häufig bei Eisentratten und Gmünd a. d. Lieser [10]; *V. austriacum* Schott im Lieserthal und oberen Drauthal sehr häufig [10].

XXII. Krain.

(1886—1889).

Referent: R. Ritter von Wettstein.

Quellen:

Literatur:

1888.

1. R. v. Wettstein, Ueber *Rhamnus Hydriensis* Hacq. (Sitzungsber. der k. k. zool. botan. Ges. XXXVIII, S. 11).

1889.

2. A. v. Kerner (s. Nieder-Oesterr. 1888, Nr. 32). 3 bis 5. Oesterreichische botanische Zeitschrift XXXIX. 3. R. v. Wettstein, Ueber die Gliederung der Gattungen *Arabis*, Sectio *Euarabis* (S. 195). 4. V. v. Borbás, Flora von Oesterreich-Ungarn, Krain (S. 275). 5. M. Kronfeld (s. Steiermark Nr. 27). 6. V. Schiffner (s. Kärnten Nr. 12). 7. W. Voss, Florenbilder aus den Umgebungen Laibachs (Jahresber. der Staats-Ober-Realschule in Laibach für 1889). 8. R. v. Wettstein (s. Nieder-Oesterr. 1889, Nr. 17).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen bzw. Beobachtungen von:

9. Prof. W. Voss in Laibach. 10. Dem Referenten.

Neu für das Gebiet:

Helleborus niger subsp. *H. macranthus* (Freyn) Schiffn. in Krain [6]; (= *H. altifolius* Aut. Carn.).

Arabis crispata Willd. auf dem Nanos, Krainer Schneeberg [3, 10].

Vaccinium Myrtilus L. var. *leucocarpum* Wender. Kamen vrh bei

Wurzen, Davča am Fusse des Blegoš bei Bischoflack, Kumberg, Berg Sitariuc bei Littai, Golovec bei Laibach [7, 9]¹⁾.

Thymus carniolicus Borb. auf dem Sovičberge bei Adelsberg [4].

Gymnadenia rubra Wettst. (= *Nigritella fragrans* Fleischm. nec Saut.) Grintovac, Tošec bei Bel Pole, Cerna Prst, Krainer Schneeberg [8].

Typha minima Funck Krain, ohne nähere Standortsangabe [5].

Wichtigere neue Fundorte:

Nuphar luteum Sm. Veldeser See [7].

Rhamnus cathartica L. Berge b. Idria (= *R. Hydriensis* Hacq.) [1].

Epilobium Dodonaei Vill. an Eisenbahndämmen bei Laibach [7].

Saxifraga tenella Jacq. bei Sagor [2].

Eryngium amethystinum L. bei Kaltenbrunn [7]; *Tommasinia verticillaris* Bert. Auen bei Ješca u Stožce [7]; *Peucedanum Schottii* Bess. am Veldeser See; zwischen Buchheim und Asp bei Veldes [9].

Monotropa Hypopitys L. var. *H. hypophegea* Wallr. auf dem Schlossberge bei Veldes [7].

Ilex Aquifolium L. am Vini vrh bei Zirknitz [7].

Pedicularis acaulis Scop. Schalkendorf bei Veldes und von dort über den nördlichen Abhang der Straž bis zum Gipfel [7].

Galeopsis canescens Schult. in Feldern bei Adelsberg; *G. pubescens* Bess. an Bächen bei Adelsberg [4].

Hottonia palustris L. bei Kaltenbrunn [7].

Daphne Blagayana Frey. Razorhügel bei Alt-Oberlaibach [7].

Alnus viridis DC. auf dem Golovec; tiefster Standort [7].

Scheuchzeria palustris L. auf Sumpfwiesen der Rosenbacher Berge [7].

Gymnadenia nigra Rehb. fil. Wochein: Alpe Tošec [18]; *Herminium Monorchis* R. Br. auf Auwiesen bei Ješca [7].

Crocus albiflorus Kit. auf dem Laibacher Schlossberge [9].

† *Hemerocallis fulva* L. auf dem Nordabhange der Rosenbacher Berge; *Colchicum auctumnale* L. β . *vernum* Rehb. Stadtwaldwiesen bei Laibach, Jauerburg [7].

Picea excelsa Poir. var. *viminalis* Casp. im Savethal bei Zwischenwässern [7].

1) Der Nachweis, dass diese Pflanze die bezeichnete Form und nicht die von *Sclerotinia baccharum* Rehm hervorgerufene Missbildung sei, wurde von Ascherson und Magnus erbracht (vergl. Potonié, Naturwissenschaftliche Wochenschrift V. [1890] S. 107).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Wettstein Richard

Artikel/Article: [Krain. 1164-1165](#)