

XXIII. Oesterreichisches Küstenland¹⁾.

Referent: J. Freyn.

Quellen:

a) Literatur.

Nachtrag aus dem Jahre 1887:

1. C. v. Marchesetti, Florula von St. Canzian in **Friedr. Müller**: Führer in die Grotten und Höhlen von St. Canzian. Triest (H. Schimpf) 1887, S. 100—104 (enthält keine Standorte).

1889²⁾:

2. Vinc. v. Borbás, Oesterr. Botan. Zeitschrift XXXIX, S. 232. **3. Vinc. v. Borbás**, Európa nagyobbpikkelyes tölgyeinek öszeállitása. (Nach dem Referate im Bot. Centralbl. XI, S. 118.) **4. J. Bornmüller**, Ein Beitrag zur Eichenflora des südöstl. Europa. (Bot. Centralbl. XXXVII, S. 129—131.) **5. H. Braun** (s. Nieder-Oester., Nr. 16). **6. E. v. Halácsy**, Viola Eichenfeldii [adriatica × scotophylla]. (Oester. Botan. Zeitschr. XXXIX, S. 181—183). **7. M. Kronfeld** (s. Steiermark, Nr. 27). **8. V. Schiffner** (s. Kärnten, Nr. 12). **9. Ettore de Toni**, Note sulla Flora Friulana. Serie seconda³⁾. Estratto dalla Cronaca della Società Alpina Friulana. Anno VII e VIII. Udine (1889), 12°, 47 p. **10. Ettore de Toni**, eadem; Serie terza. Malpighia. Anno III, Vol. III (1890), p. 3—15.

b) Unveröffentlichte Mittheilung von:

11. C. v. Marchesetti in Triest.

Helleborus niger L. subsp. *H. macranthus* (Freyn) Schiffn. im Littorale; *H. odoratus* Kit. var. *istriacus* Schiffn. (*H. viridis* Freyn, exsicc. istr.) [also auch der Flora von Süd-Istrien. Ref.]; *H. multifidus* Vis. Istrien; speciell Moschienizze!! [sämmtlich 8]; *Delphinium fissum* W. K.; *Iberis divaricata* Tausch [beide 1]; *Viola adriatica* × *scotophylla* (V.

1) Im Berichte für 1888 ist durch ein Versehen der Redaction der Name des Autors unter Titel 4 ausgefallen; dort muss es heissen: J. Freyn in A. Kerner Schedae ad flor. exsicc. Austr. Hung.

2) In diesem Jahre erschien auch Parlatore-Caruel's Flora Italiana, VIII. fasc. 2 u. 3 [p. 177—773].

3) Die an derselben Stelle (1888) erschienene Serie prima enthält nur Standorte aus dem nicht österreichischen Antheile von Friaul; sie sind, wengleich hart an der Grenze gelegen, hier nicht berücksichtigt.

Eichenfeldii Hal.) bei Lussin piccolo [6]; *V. scotophylla* Jord. [nicht, wie es in [1] heisst *heterophylla*] bei St. Canzian [11] und Lussin piccolo [6].

Dianthus monspessulanus L.; *Cerastium silvaticum* W. K.;

Linum narbonense L.;

Genista diffusa Willd.; *Medicago Carstiensis* Jacq.; *Orobus variegatus*

Ten. [sämmtlich 1].

Tamarix gallica L. bei Grado [9].

Sedum reflexum L. am Matajur [9];

Saxifraga crustata Vest.; *S. Ponae* Sternb.;

Haquetia Epipactis DC.; *Peucedanum Schottii* Bess. [alle 1]; *Laserpicium latifolium* L. Matajur [10].

Inula crithmoides L. bei Grado [9]; *Leucanthemum montanum* DC. und *Centaurea cristata* Bartl. [1]; *C. Calcitrapa* L. [1] und Grado [9];

Scolymus hispanicus L. [1] und Grado [9]; *Tragopogon Tommasinii* C. H. Schultz Bip.; *Crepis chondrilloides* Jcq.; *Hieracium illyricum* Fr.;

Campanula pyramidalis L.;

Vincetoxicum contiguum Koch;

Gentiana angulosa M. B.;

Borrago officinalis L.;

Digitalis laevigata W. K. [alle 1].

Mentha incana Willd. an den Küsten der Adria [5]; *Satureia illyrica* Host [1]; *Calamintha grandiflora* Mönch [1]; *C. subnuda* Freyn Flora von Süd-Istrien = *C. Nepeta* Kern. Veg.-Verh. [2, ist unrichtig. Ref.]; *Stachys silvatica* × *palustris* (*St. ambigua* Sm.) bei Abbazia [2]; *Betonica Alopecurus* L. am Matajur [9].

Primula Auricula L.;

Globularia cordifolia L. [beide 1].

Anisophyllum Peplis Haw. bei Grado [9]; *Tithymalus fragifer* Kl. et Geke. [1]

Quercus crispata Stev.; *Q. tergestina* Wenzig; *Q. Vukotinovičii* Borb. bei Triest [4]; *Q. occidentalis* „Wg.“ aus Istrien (*Q. semisempervirens* Borb. [3; da es eine Kork-Eiche ist, also jedenfalls die istrische *Q. Pseudo-Suber* Santi, saltem Grisebach, Freyn etc. Ref.).

Taxus baccata L. [1].

Typha angustifolia L. ist die bisher unbestimmt gebliebene Brackwasser-*Typha* von der Insel Orsera; Veglia [7].

Iris illyrica Tomm.;

Leucojum aestivum L.;

Asparagus scaber Brign.; *Allium saxatile* M. B.; *Veratrum Lobelianum* Bernh. [alle 1].

Scirpus mucronatus L. Grado [9]; *Carex dioica* L. [? Ref.]; *C. ornithopoda* Willd. [beide 1].

Crypsis aculeata Ait.; *Polypogon monspeliensis* Desf. und *Ammophila arenaria* Lk. bei Grado [alle 9]; *Bromus squarrosus* L. [1].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Freyn Joseph Franz

Artikel/Article: [Oesterreichisches Küstenland. 1166-1167](#)