

VII. Hercynisches Gebiet.

Referent: K. Haussknecht.

Quellen.

a) Litteratur:

1. O. Appel, Beiträge zur Kenntniss der Gattung Carex (Mitth. Bot. Ver. Ges. Thüringen IX¹⁾ S. 23—26.)
2. O. Appel, Coburgs Cyperaceen (D. bot. Monatsschr. VIII²⁾ S. 102—6).
3. M. Dürer in B V T S. 39—41 (1891).
4. K. Eck, Beobachtungen und Bemerkungen über die Capreaceen und deren Bastarde Forts. (D B M S. 140—150).
5. K. Haussknecht, Floristische Notizen (B V T S. 43—47, 1891).
6. Fr. König, Zur Flora von Kassel D B M. S. 91.
7. Lutze, im B V T S. 35 [1891].
8. W. Mütze, im 36., 37. Ber. des Vereins f. Naturkunde Kassel S. 33.)
9. E. Sagorski, im B T V S. 37 [1891].
10. Fr. v. Sandberger, Notizen zur Flora des Hanauer Oberlandes (Bericht der Wetter. Ges. f. d. ges. Naturk. [1889] S. 14—18).
11. M. Schulze, in B V T S. 41 [1891].
12. E. Torges, in B V T S. 9.
13. E. Torges, Calamagrostis arundinacea × villosa n. hybr. (B V T S. 26—28.)
14. E. Torges, in B V T S. 38, 39, [1891].
15. R. Wohlfarth, in Koch-Wohlfarth Synops. III. Aufl. S. 336, [1891].

b) Briefliche Mittheilung von:

16. M. Dürer in Frankfurt a. M. (an Prof. P. Ascherson).
Vergl. auch Allg. Nr. 10, 13, 15, 23, 27, 72, 80, 98, 100.

Neu für das Gebiet:

Melampyrum silvaticum L var. *laricetorum* Kern. Dittersdorf (Kr. Neustadt) [5].

Salix livida × *nigricans* (?) Hannover [4].

Gymnadenia conopea × *albida* (G. Schweinfurthii Hegelm.) Fischbachswiese bei Neuhaus a. R. [5].

Calamagrostis Halleriana × *arundinacea* (C. *indagata* Torg. et Hsskn.) Thüringer Wald: Schmücke [13].

Neu eingeschleppt oder verwildert:

Sisymbrium Columnae Jacq., *Brassica elongata* Ehrh. var. *B. armacioides* Czern. und *Lepidium perfoliatum* L. Frankfurt a. M.: Lagerhaus am Hafen, wie die folgenden Adventivpflanzen [16].

Vaccaria parviflora Mnch. var. *V. grandiflora* Jaub. et Sp. Eisenleben: Aecker nach der Hüneburg hin [15]; Weimar einzeln unter *V.*

1) Weiterhin B V T abgekürzt.

2) Weiterhin D B M abgekürzt.

parviflora auf Aeckern [14]; *Silene vulgaris* Gcke. var. *S. saponariifolia* Schott (= *S. Cserei* auct. an Baumg.) Frankfurt a. M. [3].

Achillea asplenifolia Vent. (= *A. crustata* Roch.) Frankfurt a. M. [3].
Lappula patula Aschers. Frankfurt a. M. [16].

Wichtigere neue Fundorte:

Corydallis intermedia P. M. E. Reichenbach b. Lichtenau [8].

Cardamine amara × *pratensis* Schwarzburger Thal [12]. *Sisymbrium Loeselii* L. + *S. Sinapistrum* Crtz. und Frankfurt a. M. [3]; *S. strictissimum* L. zwischen Kranichfeld und Dienstedt [14]; *Erysimum repandum* L., + *B. lanceolata* Lange (*Sinapis juncea* auct.) Frankfurt a. M. [3].

Dianthus caesius Sm. Stoppelberg im Hanauer Oberlande [10]; + *Silene dichotoma* Ehrh. Frankfurt a. M. [3].

+ *Trifolium elegans* Savi Frankfurt a. M. [3].

Epilobium obscurum × *palustre* (*E. Schmidtianum* Rostk.) f. *apetala* Steinaufer bei Sachsa am Südharz [5].

Herniaria hirsuta L. + Sondershausen: Park in Bendeleben [7].

+ *Torilis nodosa* Gaertn. Naumburg: Güterbahnhof [9].

+ *Anthemis ruthenica* M. B. Frankfurt a. M. [3]; + *Echinopus sphaerocephalus* L. Waldweiler bei Teichel zw. Weimar und Rudolstadt [14]; *Lappa nemorosa* Körn. Eube bei Gersfeld in der Rhön [3]; *Centaurea nigra* L. Weichersbach im Hanauer Oberlande [10]; *Hieracium pratense* Tausch Katzhütte im Schwarzthale [4].

Gentiana obtusifolia W. Ringberg b. Suhl [5].

Scrophularia Neesii Wtg. Frankfurt a. M. [3]. *Melampyrum nemorosum* L. β *angustifolium* Neilr. Bergwiesen des Harzes bei Rothetütte [5].

Mentha aquatica × *silvestris* und *M. arvensis* × *silvestris* Jena [11]; *Lamium album* × *maculatum* Nordhausen [14]; *Ajuga pyramidalis* × *repens* Oberweissbach bei Katzhütte im Schwarzgebiet [5].

Salix aurita × *repens*, *S. aurita* × *cinerea*, *S. aurita* × *Caprea*, *S. Caprea* × *cinerea*, *S. Caprea* × *repens*, *S. Caprea* × *viminalis*, *S. cinerea* × *repens*, *S. cinerea* × *viminalis*, *S. repens* × *purpurea* Hannover [4].

+ *Elodea canadensis* Rich. Kassel: Schönenfelder Teich [6]; Frankfurt a. M. Metzgerbruch bei Seckbach [3]; *Stratiotes aloides* L. ebenda-selbst [3].

Orchis mascula L. var. *foetens* Rosb. Schwarzburg [12].

Juncus tenuis W. Kassel: zwischen Reichenbach und Harmuthsachsen [8].

Eriophorum vaginatum L. Hanfssee bei Schlotheim [7].

Carex Pairaei F. Schultz, *C. Leersii* F. Schultz, *C. Chaberti* F. Schultz, *C. divulsa* Good., Formen der *Muricata*-Gruppe [1] bei Coburg [2]; *C. Chaberti* auch bei Weimar [1]; *C. teretiuscula* × *panniculata*

(*C. germanica* Richter) Ebersdorf [2]; *C. praecox* Schreb. subsp. *C. curvata* Knauf Coburg [1, 2]; Hildburghausen; Leutenberg; Saalfeld; Rudolstadt; Weimar (Ettersberg) [1]: *C. brizoides* × *remota* Mönchröden, *C. pendula* Huds. Garnstedt; *C. flava* × *lepidocarpa* Hohenstein, *C. lepidocarpa* × *Oederi* Thann; *C. rostrata* × *vesicaria* (*C. Friesii* Blytt) Ketschenbach [sämmlich 2] Sperserteich bei Sondershausen [7], Seeufer bei Mackenroda (Südharz) [5].

Arrhenatherum elatius M. K. var. *biaristatum* Peterm. Weimar [14].

VIII. Schleswig-Holstein (incl. Helgoland).

Referent: P. Prahl.

Quellen.

a) Litteratur:

1. H. Petersen, Beiträge zur Flora von Alsen (Beilage zum Programm des K. Realprogymnasium zu Sonderburg 1891). **2.** J. Schmidt, Die eingeschleppten und verwilderten Pflanzen der Hamburger Flora. Hamburg 1890 (Schulprogramm der Unterrichtsanstalten des Klosters St. Johannis zu Hamburg¹⁾). **3.** K. Haussknecht (s. Verbr. Phan. 1889 No. 12). **4.** K. W. v. Dalla Torre, (s. Nieders. Geb. 1889 Nr. 6).

Nachtrag aus dem Jahre 1889.

4b. L. M. Neuman, Berättelse öfver en resa till Danmark år 1888 (Sep. ur Sundevalls Högre Almänna Läroverks årsredogörelse, 1889, 7 S.).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

5. C. Bock, Landmann in Mühlenbrück, Kr. Flensburg. **5b.** M. Dinklage, Ebeafälle (Kamerungsgebiet). **6.** Eschenburg, Lehrer in Holm bei Uetersen. **7.** O. Jaap, und **8.** K. Kausch, Lehrer in Hamburg. **9.** H. Petersen, Realgymnasiallehrer in Sonderburg. **10.** v. Pöppinghausen, Beamter, **11.** J. Schmidt, Lehrer und **12.** C. T. Timm, em. Lehrer, alle in Hamburg. **13.** W. Timm, Lehrer in Wandsbek. **14.** K. Wagenknecht, (†) Realgymnasiallehrer in Altona. **15.** Dr. K. Weber, Lehrer an der landwirtschaftlichen Schule in Hohenwestedt. **16.** D. F. Westphal, Lehrer in Apenrade. **17.** W. Zimpel, Kaufmann in Hamburg.

Vgl. auch Allg. No. 22 b, 23.

Abkürzungen:

H = Hamburg-Altona und Umgebung; Hst = Holstein und Fürstenthum Lübeck excl. H.; S = Schleswig.

Bemerkung: Die aus der Zutheilung von Helgoland zu der Provinz Schleswig-Holstein sich ergebenden Veränderungen (S. Ber. d. Comm. für 1889 S. (127 und 128) sind im Folgenden berücksichtigt. Die Bestimmungen einiger Adventivpflanzen machte Prof. ASCHERSON.

1) Mehrere Angaben dieses Verzeichnisses, welche noch der Bestätigung bedürfen, sind hier unberücksichtigt geblieben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Haussknecht Heinrich Carl [Karl]

Artikel/Article: [Hercynisches Gebiet. 1123-1125](#)