

alpinus L. var. *E. Prantlii* Dalla Torre S Gutenalp bei Oberstdorf [5]; *Filago germanica* L. Mf Rollhofen bei Schnaittach; *Gnaphalium luteoalbum* L. Mf an der Bahnlinie Fürth-Vach; *Thrinicia hirta* Rth. Mf † Nürnberg auf Schutt; *Podospermum laciniatum* Bisch. Mf Hellmitzheim [sämmtlich 1]; *Crepis taraxacifolia* Thuill. Of Staffelberg [3]; *C. alpestris* Tausch Mf Nagelberg bei Treuchtlingen [1].

Gentiana brachyphylla Vill. Ob Gabelschrofen bei Hohenschwangau; *G. aestiva* R. et Sch. S Siebentischwald bei Augsburg [5].

Asperugo procumbens L. Of Kühlenfelser Thal [1].

Solanum nigrum L. b) *S. humile* Bernh. Mf Nürnberg: Gostenhof [1].

Salvia silvestris L. Mf an der Strasse Fürth-Erlangen; *S. verticillata* L. Mf Langenfeld bei Neustadt a. A. [1].

Lysimachia punctata L. Mf Treuchtlingen: Nagelberg [1].

Tithymalus exiguus Mnch. var. *truncatus* Koch Mf Obermichelbach westl. von Erlangen [1].

Carex flacca Schreb. var. *erythrostachys* Hoppe Mf bei Lauf; *C. flava* L. f. *polystachya* Mf bei Steinach [1].

Setaria verticillata P. B. Mf Nürnberg: Wöhrd [1]; *Avena pubescens* Huds. var. *glabrescens* Rchb. Mf Fürth: Leyher Wäldchen [1].

Bemerkung: Das im Bericht für 1889, S. 140 genannte Hilpoltstein ist nicht der in Of sondern der in Mf (bei Roth) gelegene Ort d. N.

XV. Böhmen.

Referent: L. Čelakovský.

Litteratur:

1. L. Čelakovský (s. Schlesien No. 2). 2. L. Čelakovský (s. Allg. 9). Der Raumersparniss halber ist die Nummer 2 ausser in den beiden *Petasites Kabl.* und seinen Bastard betreffenden Angaben weggelassen.

Vgl. auch Allg. No. 2, 13, 15, 25, 39.

Neu für das Gebiet:

Rosa involuta Sm. (*R. Sabini* Woods) am Steinberge bei Ritschen (Mittelgeb.), drei Sträucher; *Rubus glandulosus* Bell. (*R. Bellardii* W. et N.) subsp. **echinaceus** Čel. (cf. *R. Bayeri* Focke) Schneckenberg bei Brünnl nächst Grätzen.

Petasites officinalis Mönch *β. fallax* Uechtr. bei Oberhohenelbe; im Raubbachthal; bei Harta; **P. albus** × **Kablikianus** im Elbthal zwischen Spindelmühle und Hohenelbe mit den muthmasslichen Eltern [1, 2]; *Hieracium florentinum* All. f. *pauciflorum* N. P. Křeliner Wälder

bei Jičín; Obergraupen bei Mariaschein; *H. Pilosella* × *setigerum* Postelberg: am Weinberge; Ratschenberg bei Hlinai.

Melica nutans × *picta* (*M. Aschersonii* M. Schulze) bei Nimburg mit den Eltern.

Wichtigere neue Fundorte:

Thalictrum foetidum L. Basaltfelsen des Buschberges bei Stein-Teinitz (zweiter Standort im böhm. Mittelgebirge); *Pulsatilla patens* Mill. Tobiaschberg bei Bělošic; *Ranunculus Petiveri* Koch Peruc; *Helleborus viridis* L. † Reichenau, wohl verwildert; *Delphinium elatum* L. Silbergrund bei Schwarzenenthal am Riesengebirge.

Cardamine trifolia L. Hlinsko in Wäldern.

Viola ambigua WK. Fuss des Breitenberges bei Brüx.

Polygala amara L. c. *P. austriaca* Crtz. Weiss-Oujezd; Solnic; Lhotský-Teich bei Opočno (östlichste Standorte Böhmens).

Gypsophila fastigiata L. Postelberg: Kalklehne bei Lipenec.

Linum austriacum L. Laun: bei Kožov und am Kožover Berge.

Trifolium parviflorum Ehrh. Postelberg; *Lotus corniculatus* L. b) *tenuifolius* L. Grosse Wiesen zwischen Seidowitz, Počerad und Postelberg; Brüx: Tschauisch.

Rosa trachyphylla Rau b) *piloso-glandulosa* Čel. (*R. Jundzilliana* Bess.?) Gipfel des Geltsch; Abhang oberhalb Košir bei Prag; *R. canina* × *gallica* Reichenau; *R. tomentella* Lem. Mittelgeb. am Běloš bei Bělošic; Libes bei Liebshausen; Sollau; Fuss des Hoblík; zwischen Hochpetsch und Milay; *R. scabrata* Crép. Postelberg; Schwarzer Berg bei Brüx; *Agrimonia odorata* Mill. Holetin bei Hlinsko.

Peucedanum alsaticum L. Fasanerie am Jiřetin bei Klapay.

Petasites Kablikianus Tsch. Riesengebirge: im Elbthal zwischen Hoheneibe und Spindelmühl häufig; ferner auch bei Harta; vergleiche auch oben S. (116) [2, 1]; *Doronicum austriacum* Jacq. Trekadorf im Adlergebirge; Heilbrunn bei Gratzen; *Lappa nemorosa* Körn. Laun: nächst dem Červený vrch; *Scorzonera parviflora* Jacq. Grosse Wiesen zwischen Seidowitz, Počerad und Postelberg; *Taraxacum leptcephalum* Rchb. Welkan bei Libochovic; am Teich bei Klapay; *Hieracium Pilosella* × *praealtum* α. *microcephalum* Čel. (*H. brachiatum* Prodr. Fl. Böhm.) Slatinan bei Chrudim; Ziegenberg bei Wesseln; Brüxer Schlossberg, β *macrocephalum* Čel. (*H. bifurcum* Prodr. Fl. Böhm. z. Th.) Chrudim mit den Eltern; *H. bifidum* Kit. Wrkoč-Berg bei Aussig; Ziegenberg; Steinberg; Gross-Wostray; Hügel Kusov bei Tribilitz; *H. barbatum* Tausch Erzgebirge: oberhalb Johnsdorf; Presei bei Aussig; Berg Panna bei Triebtsch.

Veronica Anagallis L. b) *V. aquatica* Bernh. f. *glandulifera* bei Oberrnitz; Bach bei Seidowitz; *V. montana* L. Potenstein; Albathal oberhalb Solnic; *Orobanche Epithimum* DC. f. *major* Čel. Klampenbergl bei Seido-

witz und Hügel oberhalb der Sedlitzer Haltestelle, auf *Salvia silvestris*, am zweiten Standort auch auf *Salvia pratensis*; *O. Picridis* F. Schultz Anhöhen zwischen Stadic und Hlinai; *O. coerulescens* Steph. Gross-Wostray; zwischen Stadic und Hlinai; Schwarzer Berg bei Brůx; *O. bohemica* Čel. Anhöhen zwischen Stadic und Hlinai auf *Artemisia campestris*.

Stachys alpina L. Thal der Alba bei Solnic; Adlergebirge: unter der Deschnayer Koppe.

Primula officinalis L. var. *pannonica* Kerner Gross-Wostray; Eichberg bei Kosten; Johannisberg bei Luschitz; Milayer; Hoblik; Levanicer Fasanerie bei Postelberg.

Rumex maximus Schreb. Bielathal: bei Hertine mit *R. aquaticus* L.; gegen Gross-Tschochau für sich, beiderorts ohne *R. Hydrolapathum* Huds.

Najas major All. Elbe bei Wegstädtel.

Orchis globosa L. Holová stráň und Homole bei Solnic; auch bei Kwasiny (neu für den Osten); *O. palustris* Jacq. Grosse Wiesen zwischen Seidowitz und Počerad; *Epipogon aphyllus* Sw. Erzgebirge: bei Ebersdorf; *Microstylis monophyllos* Lindl. sumpfige Waldwiese bei Puchers in Südböhmen einzeln.

Iris sambucina L. Bielathal: bei Kosten; zwischen Stadic und Hlinai.

Allium strictum Schrad. Hügel Kusov bei Trblitz im Böhm. Mittelgebirge; *Muscari botryoides* DC. Obstgärten von Rosenthal bei Mariachein, sehr viel.

Veratrum Lobelianum Bernh. Steinberg bei Puchers.

Eriophorum gracile Koch Sumpfwiesen bei Habstein; *Carex limosa* L. Deschnayer Koppe im Adlergebirge; *C. secalina* Wahl. bei Počerad gegen Postelberg und besonders gegen Seidowitz auf den Grossen Wiesen massenhaft.

Stipa Grafiana Stev. Klampenbergr; Schusterberg bei Hochpetsch; *S. Tirsia* Stev. Spitzberg bei Brůx; Klampenbergr; Schusterberg; Langer Berg und Buschberg bei Stein-Teinitz; *Sesleria coerulea* Ard. b. *S. uliginosa* Opiz. Reichenau; Solnic; Weiss-Oujezd auf Wiesenmooren; *Melica picta* C. Koch Woparner Thal bei Mileschau; Postelberger Fasanerie; *Poa Chaixi* Vill. Hlinsko; *Catabrosa aquatica* P. B. Pardubic gegen Studánka häufig; *Glyceria nemoralis* Uechtr. et Körn. Adler-Kostelec: Waldbächlein bei Gross-Čermná; *Bromus asper* Murr. b. *B. serotinus* Benek. häufig um Reichenau; Wamberg; Opočno; Geltschberg; *Triticum caninum* L. *β. glaucum* Hackel Lewiner Thurmberg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Celakovsky Ladislav Josef

Artikel/Article: [Böhmen 1141-1143](#)