

XVI. Mähren.

Referent: A. Oborny.

Litteratur:

1. Vinc. v. Borbás (s. Allg. 1). 2. H. Braun (s. Allg. m). 3. A. Makowsky, Floristische Beiträge (Sitzungsber. des naturf. Vereines in Brünn. XXVII für 1888 [1889], S. 44, 45). 4. A. Oborny, Berichte über die floristische Durchforschung Mährens. Oesterr. bot. Zeitschr. 1890, S. 204—207, 419—423. 5. A. Schierl, Florist. Notizen (a. a. O., S. 26). 6. A. Tomaschek, Floristische Mittheilung (Sitzungsber. des naturf. Vereines in Brünn. XXVII, S. 29). 7. O. Appel (s. Herc. Geb. No. 1). 8. L. Čelakovský (s. Allg. q).
Vgl. auch Allg. No. 13, 39.

Neu für das Gebiet:

Thalictrum foetidum L. Felswände bei Klentnitz nächst Nikolsburg [5, 4].

Viola gymnocarpa Janka Brünn; Bisenz [1].

Silene italica Pers. oberhalb der Zwittawa-Quelle bei Zwittau [4].

Centaurea montana L. am südlichen Abhange des Czumberges bei Gewitsch; *Hieracium pilosella* L. subsp. *mediofurcum* N. Pt. Kühberge bei Znaim; *H. Holubyanum* N. Pt. Baumöhl und im Thajathale bei Znaim; *H. megalophyllum* N. Pt. Kühberge und Poppitzer Schlucht bei Znaim; *H. canum* N. Pt. subsp. *genuinum* γ. *pilosicanum* N. Pt. Baumöhler Wald bei Znaim; *H. leptophyton* subsp. *discolor* N. Pt. Kühberge bei Znaim; *H. euchaetium* N. Pt., der Typus und die subsp. *longum* 1. *longipilum*, 2. *brevipilum* N. Pt. Kühberge bei Znaim [sämmtlich 4].

Mentha heleonastes H. Braun Bisenz [2]; † *M. cordato-ovata* Opiz Hausgärten um Neutischein [2]; *M. exaltata* H. Braun Iglau [2]; *M. Ortmanniana* Opiz Lundenburg; Kostel; Czeitsch! Grussbach! Neusiedel! [2]; *M. riparia* Schreb. γ. *acuta* Opiz um Lundenburg [2]; δ. *angustata* Opiz Bisenz! [4]; Lundenburg; *M. obtusifolia* Opiz Namiest; *M. Viennensis* Opiz Namiest und Lundenburg; *M. elongata* Pérard Czeitsch; *M. Hystrix* H. Braun Namiest und Lundeuburg; *M. verticillata* L. var. *obtusata* Opiz Seelowitz; var. *arguta* Opiz Czernowitz; var. *sciaphila* H. Braun Traussnitzmühle bei Znaim! var. *vinacea* H. Braun Granitzthal bei Znaim!; var. *florida* Tausch Thajathal bei Znaim! *M. parietariifolia* Becker var. *Thayana* H. Braun Znaim! var. *longibracteata* H. Braun Bisenz; var. *tenuifolia* Host Mühlfraun! Znaim! und Tasswitz! *M. austriaca* Jacq. var. *lamiiifolia* Host Znaim! *M. pa-*

lustris Mneh. var. *salebrosa* Boreau Znaim! var. *segetalis* Opiz Karlsberg bei Gr. Ullersdorf; var. *Nusleensis* Opiz Namiest; *M. arvensis* L. var. *Scordiastrum* F. Schultz Zlabings! Neustadt; var. *Auneticensis* Opiz Znaim! var. *submollis* H. Braun Znaim! Namiest; var. *diversifolia* Dumort. Znaim! var. *lata* Opiz Brünn [sämmtlich 2]; *M. Pulegium* L. var. *subtomentella* H. Braun Neusiedel [4].

Carex Chaberti F. Schultz Bärn [7].

Wichtigere neue Fundorte:

Thalictrum collinum Wallr. Rosenberge und alte Heide bei Neusiedel [4]; *Batrachium divaricatum* Wimm. Fröllersdorf; Zwittau massenhaft [4].

Erucastrum obtusangulum Rchb. am Wege zwischen Auspitz und Tracht [4].

Viola ambigua W. K. Auspitz: Gr. Steurowitz [8].

Linum flavum L. Gurdau bei Auspitz; *L. hirsutum* L. im Oeden Thale, nahe der Matzocha [4].

Geranium palustre L. Neudorf bei Gr. Ullersdorf! [4].

Astragalus danicus Retz. Wiesen bei Auspitz; Gödinger Ziegelofen; *A. austriacus* Jacq. zwischen Mühlfraun und Tasswitz; *Lathyrus latifolius* L. Gurdauer Wald! *L. hirsutus* L. Freiberg: Hojov! [4].

Rosa pendulina L. *β. intercalaris* Déségl. Gr. Ullersdorf; *Rubus macrophyllus* Whe. und *R. moravicus* Sabransky Žbanover Wald bei Plumenau; *R. fossicola* Holuby Jessonitz bei Konitz; *R. rivularis* M. et Wrtg. an der Babka bei Hartmanitz [4].

Bupleurum tenuissimum L. zwischen Fröllersdorf und Grussbach [4]; *B. Gerardi* Jacq. im Granitzthal bei Znaim! [4]; *Siler trilobum* Scop. im Divaker Wald bei Auspitz [5]; *Anthriscus vulgaris* Pers. am Franzensberg bei Brünn [6].

Galium verum L. b) *G. Wirtgeni* F. W. Schultz Grafendorf [4] und Kukrowitz bei Znaim! *G. austriacum* Jacq. am Radhost [4].

Valerianella carinata Loisl. um Zwittau [4].

Centaurea Jacea L. var. *tomentosa* Aschers. um Oujezd; *Scorzonera purpurea* L. zwischen Czeitsch und Czeikowitz; *S. parviflora* Jacq. zwischen Schakwitz und Kl. Steurowitz; *Hieracium floribundum* W. Grab. und *H. flagellare* Willd. Olmütz: Weg nach dem heil. Berg; *H. acrothyrsum* N. Pt. Poppitzer Schlucht bei Znaim [sämmtlich 4].

Phyteuma orbiculare L. Wiesen des Klinger zwischen Zwittau und dem Schönhengst; *Campanula bononiensis* L. bei Mutenitz [4].

Gentiana Amarella L. Wiesen und Waldplätze bei Zaisa! [4].

Echium rubrum Jacq. Gurdauer Wald [4].

Linaria spuria Mill. Brachfelder bei Höflein; *Limosella aquatica* L. Neusiedel und Höflein; *Lindernia Pyxidaria* All. beim Trabinger Hof nächst Grafendorf! *Euphrasia lutea* L. Rosenberge und alte Heide bei

Neusiedel! *Orobanche elatior* Sutt. Grafendorf am Trabinger Hofe, im Hohlwege zwischen Kl. Tesswitz und Znaim! *O. ramosa* L. Grafendorf [sämmtlich 4].

Mentha serrulata Opiz Znaim! Brünn; *M. montana* Host Znaim! *M. austriaca* Jacq. var. *sparsiflora* H. Braun Znaim! var. *prostrata* Host Znaim! *M. palustris* Mneh. var. *silvicola* H. Braun Brünn; Hadiberg bei Obřan; Lilienfeld!, Fröllersdorf!, Neusiedel!, Czernowitz; *M. arvensis* L. var. *Marrubiastrum* F. Schultz Brünn: Adamsthal; † *M. rubra* Smith Olmütz, Znaim und Iglau; var. *resinosa* Opiz Olmütz und Göding; *M. Pauliana* F. Schultz Thajathal bei Znaim! † var. *variegata* Sole Bauerngärten um Nikolsburg; *M. gentilis* L. Klobouk; Kaschwitz; Auspitz [sämmtlich 2]; *M. Braunii* Oborny im Verlaufe des ganzen Granitzthales bei Znaim an vielen Stellen! [4]; *Salvia austriaca* Jacq. zwischen Bilowitz und Czeikowitz und bei Mutenitz [4]; *S. Aethiopsis* L. Obrowitzer Friedhof bei Brünn [6]; *Teucrium Scordium* L. Neusiedel und Höflein [4].

Trientalis europaea L. Ober-Bory nächst Křižanau [3]; *Hottonia palustris* L. Eisenbahngräben zwischen Göding und Lužitz [4].

† *Kochia Scoparia* Schrad. Höflein und Grafendorf; bei Joslowitz [4].

Rumex pratensis M. et Koch Neu-Prerau und Höflein [4].

Salix repens L. Wiesen zw. Gr. Ullersdorf und Reutendorf [4].

† *Elodea canadensis* Rich. in der Valová bei Kralitz; Gräben in den Niederungen um Zwittau, 1889 zuerst bemerkt [4].

Arum maculatum L. Wälder bei Schirmsdorf nächst Zwittau.

Orchis Rivini Gouan Musslau auf Wiesen und bei Brüsau; *O. ustulata* L. zwischen Trübau und Zwittau und um Zwittau! *O. mascula* L. Zwittau [4].

Gagea bohemica Schult. Grafenberg bei Gnadlersdorf, Nähe der niederösterr. Landesgrenze! [4].

XVII. Nieder-Oesterreich.

Referent: G. Ritter Beck von Mannagetta.

Litteratur:

1. bis 9. Oesterr. botan. Zeitschr. XL. 1. V. v. Borbás, Notiz (S. 26). 2. V. v. Borbás (s. Allg. I). 3. H. Braun und G. Sennholz, *Calamintha mixta* (S. 158—160). 4. R. v. Wettstein, C. Rechinger, Notizen (S. 248). 5. C. Fritsch, Notiz (S. 279). 6. R. v. Wettstein (s. Allg. ee). 7. V. v. Borbás, L. Wiedermann, F. Höfer, E. Hackel, Notizen (S. 427—428). 8. E. v. Halácsy, Neue Brombeerformen aus Oesterreich (S. 431—434). 9. G. v. Beck, Bericht über die floristische Durchfor-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Oborny Adolf

Artikel/Article: [Mähren 1144-1146](#)