Ber. naturhist. Ges. Hannover	128	171 - 173	Hannover 1985
-------------------------------	-----	-----------	---------------

## Palynologische Untersuchung einer Braunkohlenprobe aus der Tertiärsenke von Oldenrode-Düderode-Willershausen am Harz

#### von

### **ULRICH FRANTZ**

In der Umgebung von Oldenrode-Düderode am Harz wurden Anfang des Jahrhunderts zahlreiche Bohrungen niedergebracht, um die dort vorhandenen Braunkohlenablagerungen zu
erkunden. Dabei ergab sich, daß verschiedene Braunkohlenflöze vorhanden waren. Nach
WEGELE kommt dem als Hauptflöz bezeichneten Vorkommen untermiozänes Alter zu,
während er für das Oberflöz Obermiozän angibt. Darüber folgen obermiozäne Ablagerungen
wie Sand, Ton und Kohleflözchen. Der Abbau der Kohlen in diesem Gebiet ist längst eingestellt, und es gibt auch keine Zugänge zu den Aufschlüssen mehr. A. Straus hat von einer
ehemaligen Abraumhalde eine Probe mitgebracht, die pollenanalytisch untersucht wurde.
Im folgenden seien zunächst die Ergebnisse der Sporen- und Pollenflora vorangestellt:

Filicinae	Osmundaceae Polypodiaceae	Osmunda sp. Athyrium sp.
Coniferae	Taxodiaceae	cf. <u>Glyptostrobus eur.</u> cf. <u>Taxodium</u> Sciadopitys
	Pinaceae	Tsuga car. foss. cf. Pseudotsuga Picea Abies Pinus (mehrere Arten)
	Cupressaceae	Thuja cf. orient. foss. Juniperus
Monocotyledoneae Dicotyledoneae	Betulaceae	Lemna sp. Betula Alnus Carpinus

Fagaceae

**Fagus** Castanea

Quercus (mehrere Arten)

cf. Lithocarpus

Juglandaceae Salicaceae Ulmaceae Hamamelidaceae Nyssaceae Tiliaceae

Carya Salix **Ulmus** Liquidambar

Aquifoliaceae

Nyssa Tilia llex

Rhamnaceae Ericaceae

cf. Rhamnus cf. Rhododendron

Symplocaceae

Symplocos

Es wurden insgesamt 800 Pollenkörner gezählt. Das mikroskopische Bild wird beherrscht von 44 % Athyriumsporen und 28 % Alnuspollen. Alle anderen Sporomorphenformen bleiben unter Werten von 2.3 %.

Die Liste der vorkommenden Mikrofossilien deckt sich weitgehend mit den Angaben verschledener Autoren (NAGY, E.; PFLUG, H. D.; POTONIÉ, R.; THOMSON, P. W. und THIERGART, F.; TRAKA, H.; SZAFER, W.; THIERGART, F.; WEGELE, H.) über den Sporomorphengehalt pliozäner Ablagerungen, besonders auch mit den Angaben über das Pliozän von Willershausen. Sie ist nicht sehr reichhaltig und keineswegs vollständig, denn es stand lediglich ein einzelnes Stück Braunkohle zur Verfügung. Das Massenvorkommen von Alnuspollen und Athyriumsporen zeigt jedoch mit Sicherheit, daß diese Braunkohle entweder von den erwähnten "Braunkohlenflözchen" stammen muß, oder daß das sogenannte "Oberflöz" zum Pliozän gehört.

#### Literatur

AXELROD, D. J. und TING, W. S.: Early Pleistocene Floras from the Chagoopa surface Southern Sierra Nevada. Geolog. Sciences Vol. 39 Nr. 2.

BEUG, H. J.: Leitfaden der Pollenbestimmung Stuttgart 1961.

ERDTMANN, G.: Pollen Morphology and Plant Taxonomy.

- Pollen Morphology and Plant Taxonomy Gymnospermae, Pteridophyta, Bryophyta Stockholm 1957.
- FRANTZ, U.: Untersuchungen zur Sporen- und Pollenflora des Pllozäns von Willershausen. Monatsber. d. Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 3, Heft 7 - 8, 1961.
- NAGY, E.: Pollenanalytische Untersuchungen einer ungarischen pliozänen Braunkohle. -Acta Scient. Hung. Tomus V fasc. 3 - 4, 1959.
- PFLUG, H. D.: Zur Altersfolge und Faziesgliederung mitteleuropäischer Braunkohlen. Notizbl. d. hess. Landesamts f. Bodenforschung 85, 1957.
- POTONIÉ, R., THOMSON, P. W. und THIERGART, F.: Zur Nomenklatur und Klassifikation der neogenen Sporomorphae. Geol. Jb. 65, 1950.

- STRAKA, H.: Pollenanalyse und Vegetationsgeschichte Wittenberg, 1957.
- STRAUS, A.: Beitrag z. K. der Pliozänflora von Willershausen. III. Die niederen Pflanzengruppen bis zu den Gymnospermen. – Paläontogr. B. 93, 1952.
- SZAFER, W.: The Pliocene Flora of Kroszlenko in Poland. Krakow 1947.
- THIERGART, F.: Die Mikropaläontologie als Pollenanalyse im Dienste der Braunkohlenforschung, Stuttgart 1940.
  - Die Sciadopityszone und der Sciadopitysvorstoß in der niederrheinischen Braunkohle. – Braunk., Wärme und Energie, 1949.
- THOMAS, P. W. und PFLUG, H. D.: Pollen und Sporen des mitteleuropäischen Tertiärs. Paläontogr. B 94, 1 4, 1950.
- WEGELE, H.: Stratigraphie und Tektonik der tertiären Ablagerungen von Oldenrode-Düderode-Willershausen. - Diss. Göttingen, 1914.

Manuskript eingegangen am 22. 10. 1984

Anschrift des Verfassers:

Dr. Ulrich FRANTZ Speerweg 66 b 1000 Berlin 28

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft

<u>Hannover</u>

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: 128

Autor(en)/Author(s): Frantz Ulrich

Artikel/Article: Palynologische Untersuchung einer

Braunkohlenprobe aus der Tertiärsenke von Oldenrode-Düderode-

Willershausen am Harz 171-173