Die Najaden des Main-Gebietes

von Hans Modell

109.

Die Najaden des Main-Gebietes

von Hans Modell, Weiler im Allgäu

I. Einleitung	Seite 3
II. Die Najaden des Gebietes	
1. Margaritifera auricularia Spglr.	Seite 5
2. Margaritifera margaritifera L.	Seite 5
3. Pseudanodonta complanata elongata Hol.	Seite 8
4. Anodonta anatina avonensis Mont.	Seite 9
5. Anodonta cygnea stagnalis Turton.	Seite 17
6. Unio crassus nanus Lam.	Seite 19
7. Unio tumidus depressus Don.	Seite 27
8. Unio pictorum deshayesi Mich.	Seite 32
III. Schriftenverzeichnis	Seite 37
IV. Abbildungen (Tafeln und Karten)	Seite 40

OÖLM LINZ

+XOM1931209

Augsburg, 20. Juni 1966

**O. O. LANDESMUSEUM
BIBLIOTHEK**

688/1968

Einleitung

Als Teil des Rheingebietes hat der Main seine eigene Flussgeschichte, die im wesentlichen durch Reck und Levy geklärt wurde. Ursprünglich mit geringem Einzugsgebiet in das Mainzer Becken mündend, begann er nach Ausbildung des Rheinsystems und besonders nach der Tieferlegung von dessen Erosionsbasis an die heutige Rheinmündung, sich nach rückwärts einzuschneiden. Durch verschiedene Spaltensysteme rheinischer und herzynischer Richtung, die sich bis heute im Main als Dreieck und Viereck ausprägen, erweiterte er sein Gebiet bis an die Steigerwaldlinie. Vorher hatte lange Zeit, bis in die Mitte des Diluviums der obere, Fichtelgebirgsmain, seinen Lauf über Bamberg-Nürnberg-Beilngries-Alt Mühl und das Rennertshofer Tal zur Donau gehabt. Fichtelgebirgsgesteine im Untergrund der Alt Mühl weisen heute noch darauf hin.

In der Najadenfauna ist von dieser Entwicklung des Flusssystemes nichts mehr zu bemerken. Wohl hat Haas und Schwarz 1913 die Zugehörigkeit der Regnitznajaden südlich der Linie Aisch-Erlangen zur Donau behauptet und die Aischformen selbst als Hybriden bezeichnet. Eigene Untersuchungen veranlassten mich bereits 1924 diese Annahme, die sich auf palaeogeographische Faktoren, aber nicht auf die Muscheln selbst stützten, abzulehnen. Von Freund L.Hässlein bekam ich ausreichendes Material, nirgends ergaben sich echte Donaformen, auch nicht solche, die als Hybriden deutbar gewesen wären.

Geologisch ist das Maingebiet ein Teil des südwestdeutschen Stufenlandes mit ausgesprochener Kalksandführung der Flüsse, wovon nur die Gebiete des Fichtelgebirges (im Main bis Banz bemerkbar) und die reinen Buntsandsteingebiete Mittelfrankens und des Odenwaldes eine Ausnahme machen. Sonst herrschen Jurakalke Keuper und Muschelkalk vor.

Von der Eiszeit wurde das Gebiet nicht direkt berührt, lag vielmehr in der eisfreien Zone Mitteleuropas, der Region der Lösses und hat demgemäß kaum in der Faunenumwandlung, die die norddeutschen und alpennahen Gebiete betrafen, teilgenommen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass *Anodonta cygnea*, die typische Eisrandmuschel nur auf gewissen Wanderwegen längs der Haupttäler auftritt.

Betrachten wir uns das Gesamtbild der Najadenentwicklung im Flussgebiet des Mains, so müssen wir feststellen, dass das Gebiet seit Jahrmillionen Land war und eine Festlandsfauna getragen haben muss.

Von alledem ist keine Spur erhalten geblieben. Erst gegen das Ende des Pliozäns erkennen wir im Randgebiete am Spessart zwei Arten, die der allgemein-europäischen Fauna zugehören, *Unio tumidus*, eine Anodonta und auch einen *Potomida littoralis*, der schon seit dem Unterpliozän in Gebietsnähe (Oberrhein) nachweisbar ist. Fröhilduvial dürften die Sande von Mosbach sein, die wieder *littoralis* bringen, daneben *crassus*, *pictorum*, Anodonta, alle schon mit heutigem Gepräge. Das Auf- und Abklingen der Eiszeiten wurde durch das grosse Inter-glazial unterbrochen; auch dieses hat in unserem Gebiete keine Najadenreste hinterlassen. Im Neckargebiete hat Mauer wenigstens kleine *crassus* und *pictorum* geliefert. So müssen wir für die letzten Eiszeiten eine arme periglaziale Fauna, bestehend aus *U. crassus* und Anodonta annehmen, letztere auch nur in einer kleinen Form, die unmittelbar an die voreiszeitlichen Pliozänformen anschloss. Als Resultat wenigstens der ausgehenden Lösszeiten kann die heutige kleine anatina-Form *suevica* gewertet werden, die ausser im Muschelkalkgebiet des unteren Neckar auch im Taubergebiet auftritt. Alles andere, die Einwanderung der grossen Stromformen aller Arten der Jetztzeit, wie auch der Pseudanodonta muss sich auf einen kurzen Zeitraum nach Abklingen der letzten Eiszeitauswirkungen auf das Maingebiet konzentriert haben und eiszeitlich muss selbst die Ausbildung der grossen Najadenformen der Jetztzeit sein. *An. cygnea cellensis* selbst ist kaum im Gebiete entstanden - ihre Verbreitung spricht dagegen. Und heute erleben wir das Aussterben der Najadenfauna auf weiten Strecken der regulierten und missbrauchten Flüsse, Regnitz, Untermain, aber auch in der Nähe der Dörfer durch Kunstdüngung usw. Wenn noch etwas von der alten Fauna gerettet werden soll, ist es höchste Zeit. Die letzten fünfzig Jahre haben bereits schwere, nicht mehr auszufüllende Lücken gerissen.

Die bisherige Erforschung des Gebietes ging von den grossen Städten aus, in denen lange Zeit blühende naturwissenschaftliche Vereine bestanden und sich immer wieder ein Bearbeiter der Lokalfauna fand, der uns die Aufzeichnungen des einstigen Bestandes hinterliess; Frankfurt, Hanau, Aschaffenburg, Würzburg, Bamberg, Coburg, Elangen, Nürnberg waren der Sitz der Vereine. Die Bearbeiter finden sich im Schriftenverzeichnis aufgeführt. Neben kleineren Museen liegt das Hauptmaterial heute im Senckenbergmuseum in Frankfurt. Von persönlichen Mitarbeitern habe ich vor allem Herrn Ludwig Hässlein-Lauf zu danken, der mir durch Jahre regelmässige Belegstücke seiner Ausbeuten überliess. Im Verein mit der überkommenen Literatur kam so ein, wenigstens in

grossen Zügen befriedigendes Resultat zustande, wenn auch noch grosse Lücken ersichtlich sind, die eine dankenswerte Aufgabe für Lokalsammler bilden können.

Die bei den Einzelangaben immer wiederkehrende Bezeichnung (M) bedeutet: in Sammlung Modell, nunmehr Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates.

1.Familie: Margaritiferidae Ortm., Subfam.Margaritiferinae Modell

1. Margaritifera auricularia Spengler 1793

Heute westeuropäisch und auf die grossen Ströme beschränkt, hat die Art zwei bis drei mal das Gebiet betreten. Das erste mal im Früh-Diluvium der Mosbacher Sande, das zweite mal in der Mittelterrasse, das dritte mal zur Steinzeit und dann über die Römerzeit wohl bis ins frühe Mittelalter ausdauernd.

Da die Ablagerungen längs des Süd-Taunus vom heutigen Main her stammen, nehme ich sie hier mit auf. Einzelfunde aus Abfallgruben der Römerzeit deuten wenigstens das Vorkommen in der Nähe an. Früher hat man auf römischen Import aus Gallien geschlossen.

1. Diluvium von Wiesbaden-Mosbach. Haas 1910, Taf.13, Fig.4,5.
2. Ältere Mittelterrasse von Bad Soden am Taunus. Wenz 1944, Bild 1,2.
3. Alluvium des Mains bei Kl.Ostheim. Wenz 1944.
4. Alluvium des Mains bei Biebrich. Haas 1910.
5. Ausgrabung eines römischen Kastells bei Wiesbaden. Sandberger 1873; Haas 1910, T.13, Fig.3.
6. Alluvium, Kalktuff von Homburg am Main, ob.Wertheim, eine Schale in Küchenabfällen einer römischen Siedlung. Sandberger 1883, 1885.
7. Steinzeitliches Grab bei Weikersheim im Taubertal. Hässlein 1953.

2. Margaritifera margaritifera L.1758

Diese Art der kalkarmen Gewässer hat im Maingebiet eine sehr zerrissene Verbreitung. Die Funde am Rande des Fichtelgebirges schliessen sich wahrscheinlich unmittelbar an die der sächsischen Saale an und es ist bei der Bedeutung, die früher der Perlmutterzucht beigemessen wurde, durchaus nicht unwahrscheinlich, dass sie schon in alter Zeit aus dem Saalegebiet in die Bäche des Maingebietes verpflanzt wurde.

Schalenmässig schliessen sie sich durchaus an die Formen der Böhmi-
schen Masse an, die man zeitweise als *M. margaritifera minor* Rossm.
abtrennen wollte.

Autochthon scheinen dagegen die erst in jüngerer Zeit bekannt gewor-
denen Vorkommen im Buntsandsteingebiet des Odenwaldes und Spessarts
zu sein, die durchwegs kleiner bleiben. Haas hat sie als *parvula* be-
nannt, aber neuerdings auch diese Form wieder eingezogen. Zu ihnen
zählt auch die Form aus der Steinach im Koburger Land, die ganz iso-
liert steht.

A. Ober-Main

1. Ölsnitz oberhalb Streitau. Bachgrund kiesig bis schlammig. An
schlammigen Stellen die Muscheln sehr häufig, durchwegs in der
langen Form. Perlmutterfarbe sehr wechselnd, Erosion sehr stark.
Nach Hessling 1854 muschelhaltig von Tennersreuth bis Berneck,
15 km weit. Seit etwa 1500 bekannt. Modell 9.8.1921 11 Stücke.
L 124 H 58 D 35 mm
121 61 36
120 61 40
2. Lübnitz oberhalb Gefrees. Bach raschfliessend in kurzen Zickzack-
bögen. Bachbett steinig und schlammig. Die Muscheln meist im
Schutze eines Steines. Flache, langgezogene Form, jedoch kürzer
und höher als in der Ölsnitz. Erosion mittelstark, Perlmutter
stark fleckig von messinggelb bis rotviolett und hellblau. Nach
Hessling 1854 von der Lübnitzmühle an bis Gefrees. 1779 aus der
Lanitz und Ölsnitz besetzt, 2,5 km lang. Modell 9.8.1921
12 Stücke. L 130 H 61 D 39 mm
129 59 36
118 56 35
3. Weisser Main bei Kauerndorf. Nach Hessling von der Brücke bei
Berneck abwärts bis zur Schafbrücke bei Kieselhof mit wenig Mu-
scheln, von da ab über Lanzendorf bis Waizendorf mit zahlreichen
Muscheln. 1650 entdeckt, 1831 aus dem Mühlgraben bei Berneck be-
setzt. Ich selbst fand zwei Stück kurz vor der Einmündung der
Steinach. Grund feiner grauer Schlamm zwischen groben Geröllblök-
ken. Mässig erodiert, fast regelmässige Form. Modell 11.8.1921
2 Stück. L 120 H 56 D 36 mm
110 51 31
4. Ziegenburger Bach bei Ziegenburg (=Schorgastbach). Nach Hessling
1854 etwa 200 Schritte aufwärts gegen Ziegenburg. 1796 eingesetzt.
Der Bach ist hier kiesig und sandig, die Strömung rasch. Die Mu-
scheln sind im Alter verkürzt, ziemlich bauchig und dickschalig.
In einer Muschel befanden sich 18 kleine Perlen im vorderen
Schliessmuskel eingewachsen. Eine zweite hatte eine braune Perle.
Modell 9.8.1921 8 Stück. L 140 H 75 D 41 mm
123 61 38
123 65 37
5. Steinach zwischen Hüttensteinach und Leutendorf bei Koburg. Fa.
parvula Haas, etwas bauchig, schwach erodiert, lang eirund. Zur
Rodach fliessend, vgl. Brückner 1926. Brückners Material befindet
sich heute ausser im Koburger Museum in der Bayr. Staatssammlung.

Ein Einbürgerungsversuch 1835 in der Lauter scheiterte.

L	102	H	47	D	34	mm
	100		51		33	
	81		40		26	

B. Unter-Main

a. Ost-Spessart und Rhön

Dieses Gebiet wurde erst durch die Untersuchungen Seidlers besser bekannt. Es enthält durchwegs die parvula-Form.

6. Schmale Sinn bei Schwarzenfels, Oberzell und Mottgers, Speyer 1850, von Seidler nicht wiedergefunden.
7. Sinn bei Zeitlofs. Im Mühlgraben zusammen mit U.crassus.
8. Jossa bei Meinerts (Mernes). Entdeckt von Gärtner 1813. Seidler 1922.
9. Jossa bei Jossa, cf. Fahrer 1864. In meiner Sammlung 1 Stück, leg. Haas

L	112	H	49	D	30	mm
	91		42		26	
	89		45		30	
10. Lohr oberhalb der Waldschlossbrauerei Frammersbach. Entdeckt von Harms 1907. Seidler 1922. Kiesiger Grund, fa. parvula Haas, Hässlein 25.8.1927 4 Stück

L	112	H	55	D	34	mm
	98		48		30	
	84		47		27	
11. Aubach (zur Lohr) unterhalb Partenstein. Harter Sandboden. Seidler 29.7.1919

L	95	H	45	D	31	mm
---	----	---	----	---	----	----
12. Flossbach (zur Lohr) mit stark verschälertem Vorderteil, bedingt durch harten Sandboden. Seidler 1920, 1922

L	105	H	45	D	28	
	90		52		33	
13. Hafenlohr Unterlauf Seidler 1922. Häufig zwischen Hafenlohr und Windheim

L	95	H	45	D	30	mm
	84		42		22	
14. Heinrichsbach bei der Pfeuffermühle. Wenige Muscheln. Seidler 1920 und 1922

L	79	H	37	D	32	mm
---	----	---	----	---	----	----

b. Odenwald

15. Mudau oberhalb Miltenberg, Haas und Schwarz 1913 1 Stück, Seidler 1922 wenige Exemplare

L	108	H	52	D	38	mm
---	-----	---	----	---	----	----
16. Mudau bei Breitendiel, Seidler 1922.
17. Marbach (zur Mümling) bei Hüttental, Seidler 1922.

L	106	H	51	D	33	
	90		45		28	
18. Mümling bei Ebersberg, Seidler 1922. Früher häufig, zuletzt nur mehr zwei tote Stücke gefunden.

c. Bieber (West-Rhön)

19. Bieber bei Röhrig, Heynemann 1850; von Seidler nicht mehr gefunden.
20. Lützelbach (zur Bieber) bei Lanzingen, oberhalb des Niederhofes,

aufwärts bis Breitenborn, Heynemann 1850; Seidler 1922.

L 95 H 46 D 25 mm
84 42 22

21. Kasselbach (zur Bieber), bei Kassel, Kr.Gelnhausen, spärlich,
Seidler 1922.

L 90 H 46 D 26 mm

3. Pseudanodonta complanata elongata Holandre 1835

Haas hat einmal die Formen des oberen Mains als *Pseudanodonta elongata* siliqua Haas abtrennen wollen, ist aber davon abgekommen. Die Formen des Maingebietes gehören mit den Rheinformen zusammen. Im allgemeinen ist die Art im Maingebiet sehr spärlich. Nur einmal habe ich im oberen Main bei dem tiefen Wasserstand des Jahres 1921 drei Stücke und drei Schalen auf einmal gefunden, Haas in der Tauber bei Dittigheim einmal sechs Stücke und Flach bezeichnet die Art um 1880 als nicht selten bei Aschaffenburg. Ich selbst habe unter hunderten von Najaden aus den Baggerungen des Aschaffener Hafens, die ich von K.Wehner erhielt, keine einzige *complanata* gesehen, ebenso nicht unter der grossen Serie aus einer Mainbühne bei Viereth, die Dr.Schneid sammelte. Die Art muss also als äusserst spärlich im Gebiete bezeichnet werden.

A. Ober-Main

1. Main zwischen Lichtenfels und Banz, Haas und Schwarz 1913 1 Stück.

2. Main bei Reundorf. Die Entwicklung geht hier von der langgestreckten Jugendform mit gelbgrüner Farbe zu den entsprechenden, sehr langgestreckten Altersformen mit starker Erosion und dunkelbrauner Farbe, andererseits zu Stücken der var.*arenicola*, die nur am Schalenunterrand weiterbauen und hoch-viereckig werden. Der Einfluss des quarzitäischen Fichtelgebirgssandes macht sich noch in starker Abschleifung bemerkbar. Modell 12.8.1921, 3,3/2 Stücke, abgebildet in Modell 1922.

L 84 H 40 D 26 mm
75 21 24
52 27 28

3. Main bei Banz, Haas und Schwarz 1913, Fig.1, 2 Stücke; Modell 12.8.1921, 1 Schale der var.*arenicola*

L 75 H 39 D -- mm

4. Main bei Hallstadt, Haas und Schwarz 1913, nur 1 Stück.

B. Regnitz

5. Regnitz bei Erlangen, Küster, *Anodonta*, Taf.14, Fig.5 als *Anodonta siliqua* Kstr.; ohne Fundort, Universitätssammlung Erlangen, eine var.*tenuis* L.75 H 36 D 24 mm. Weiter von Küster ein Stück aus der Regnitz ebenda abgebildet, Taf.3, Fig.2. Haas und Schwarz 1913 bilden ein weiteres Stück aus der Bayr.Staatssammlung ab, Taf.4, Fig.2, leg.Michahelles und betrachten diese Funde als Hybriden zwischen Donau- und Rheinrasse, was nicht zutrifft, da die Donaurasse im Regnitzgebiet nicht vorkommt.

6. Regnitz bei Bamberg, Schedel 1886.
7. Regnitz bei Elmerspitze, Küster 1852.
8. Ludwigskanal bei Strullendorf ein Bruchstück var. *biol.tenuis*, Modell 17.8.1921 L 63 H 32 D 17 mm

C. Unter-Main

9. Fischteich bei der Ultramarinfabrik Schweinfurt, Schneider 1856.
10. Main bei Ochsenfurt, Clessin 1880 "ein paar alte Schalen".
11. Fränkische Saale, Stadler 1924.
12. Sinn bei Gemünden, Stadler 1924.
13. Main bei Würzburg, Haas und Schwarz 1913.
14. Main oberhalb Lohr, Stadler 1928 1 Stück var. *typica*, leicht erodiert. L 66 H 39 D 18 mm
15. Tauber bei Dittigheim, Haas und Schwarz 1913, Fig.5 als Pseud. *elongata nicarica* Haas, 6 Stücke.
16. Main beim Haderäckerwald, Hässlein 1954, selten. Sandiger ertrunkener Buhenteich. L 75 H 41 D 23 mm
Diese, wie die folgenden Funde, sind schon nach der Umgestaltung des Mains zum Grossschiffahrtsweg gesammelt und, wie Hässlein berichtet, ohne jeden Nachwuchs an ihren Fundplätzen.
17. Main bei Fluss-km 108, Hässlein 1954, häufig; schlammiges Buhnenfeld. L 77 H 43 D 27 mm
18. Main bei Fluss-km 107, Hässlein 1954, selten; steiniger ertrunkener Buhenteich. L 82 H 42 D 23 mm
19. Main bei Obernburg-Ort, Hässlein 1954, selten; schmales, schlammiges Buhnenfeld. L 71 H 40 D 19,3 mm
20. Main bei Sulzbach, Hässlein 1953; sandige Uferbank. L 60 H 34 D 16 mm
21. Main bei Obernau, linkes Ufer, Hässlein 1953; von Flach als nicht selten bezeichnet.
22. Main bei Aschaffenburg, Flach 1885; Geyer 1927, T.27, F.5. Unter sehr reichlichem Najadenmaterial 1920 keine einzige *complanata*!
23. Kinzig bei Langenselbold, Haas 1913; Kobelt 1911, Icon.N.F.17, Fig.2553.
24. Kinzig bei Hanau-Bulauwald, Seidler-Hanau 1923, var. *typica* mit leichtem *tenuis*-Einschlag, 4 Stück (M). L 67 H 38 D 19 mm
52 30 14
46 24 13
25. Wetter, Stadler 1924.
26. Nidda, Stadler 1924.

4. Anodonta anatina avonensis Montagu.1803

Die Anodonten des Rheingebietes werden heute, soweit sie zu den "*An. piscinalis*"-Formen gehören, in der Rasse *avonensis* Montagu zusammengefasst, deren Nominatform aus dem Avon in England stammt. Im Main-

gebiet ist sie wenig variabel. Herrschend sind die Sandformen (var. biol.arenicola) des Maines und seiner kleinen Zuflüsse, daneben entsprechende ponderosa-Formen der Altwasser und Teiche. Ganz selten tritt rostrata Held auf, auch die ähnliche kleine suevica Geyer ist sehr spärlich. Das bezeugt allein schon, dass das Maintal infolge seiner geschützten Lage von den Stürmen der Eiszeit nicht sehr stark berührt wurde. Dementsprechend ist auch die Verbreitung der A.cellensis Gmel.(=An.cygnea L.s.str.) auf die Hauptwanderungswege beschränkt, das Maintal selbst und eine Übergangszone am Frankenwald, die die Verbindung zu einer Saale-Zone der eiszeitlichen Entstehung der Art darstellt.

Die Anodonten des Ludwigs-Donau-Main-Kanals müssen hier vollständig mitbehandelt werden. Einerseits gehen Formen, die auf die Rheinrasse deuten, durch den ganzen Kanal, also auch in das nominelle Donaugebiet, andererseits deuten die wenigen bisher gefundenen cellensis-Stücke ebenfalls auf die Rheinrasse. Es scheint also, dass bei der Besiedlung des Kanals die Rheinrasse bevorzugt war. Offenbar konnte sich die Art leichter aus den am Regnitzende des Kanals vorhandenen grossen piscinalis- und Sandformen an die Teichverhältnisse des Kanals anpassen als aus den ganz zwerghaften Sandformen der unteren Altmühl. Daneben mag der Umstand mitgespielt haben, dass auf der Regnitzseite die Einschleppungsmöglichkeit aus benachbarten Teichen von vornherein mindestens bis in die Nürnberger Gegend gegeben war, während die übrige Kanalstrecke im Gebiete der Anodonten-armen Sandbäche verläuft.

A. Ober-Main

1. Roter Main bei Bodenmühle, Haas und Schwarz 1913, als "Etmannsberg", 50 Stück; Schneid 3 Stück (M), sehr kleine var.tenuis.

L	70	H	39	D	20	mm
	60		36		20	
	55		32		16	
2. Main-Altwater bei Höchststadt, kleine var.tenuis 1 Stück, Michel 1920.

L	80	H	41	D	23	mm
---	----	---	----	---	----	----
3. Main zwischen Lichtenfels und Banz, Haas und Schwarz 1913, 6 St.
4. Main bei Schwürbitz. Main-Stromform, dann kleine verlängerte Stücke, breitschnäblige tenuis und endlich fas cellensoide, W.Michel 1923, 14 Stücke.

L	104	H	57	D	23	mm
	100		53		29	
	99		49		24	
5. Main bei Michelau. Flachere und bauchigere Formen, ziemlich stark erodiert, Modell 12.8.1921, 3 Stücke (M).

L	90	H	46	D	34	mm
	78		46		24	
	69		40		24	

6. Main bei Reundorf, var. *archaica*, bedingt durch die Fichtelgebirgs-
gesteine und -sande, Krüppelformen, Modell 12.8.1921, 3 Stücke (M).
7. Main bei Ebing. Ebenfalls noch var. *arenicola/palaeozoica*, Modell
13.8.1921, 4 Stücke (M).
L 102 H 59 D 54 mm
80 58 28
63 36 21
8. Main-Altwasser bei Ebing. Kleine Altwasserform der var. *tenuis*,
leicht erodiert, gelbgefärbt. Das Altwasser liegt kurz oberhalb
der Brücke am linken Ufer, Modell 13.8.1921, 3 Stücke (M).
L 70 H 40 D 20 mm
70 40 21
64 37 20
9. Main bei Hallstadt, Haas und Schwarz 1913, 52 Stücke; Modell 13.8.
1921, 1 Stück, juv. dickschalig (M). L 80 H 44 D 27 mm
10. Main zwischen Hallstadt und Regnitzmündung, Haas und Schwarz
1913, 6 Stücke.
11. Kreck bei Heldburg (zur Rodach), var. *typica/arenicola*, Brückner
1890, 2 Stücke (M). L 76 H 44 D 21 mm
62 37 20
12. Sulz bei Neuses, var. *arenicola* (*suevica*-ähnlich), Brückner 1901,
1 Stück (M). L 79 H 39 D 24 mm
13. Mittelwasung bei Coburg, var. *typica/tenuis*, Brückner 1911, drei
Stücke (M). L 85 H 49 D 25 mm
61 35 19
51 34 15
14. Tambach bei Coburg, var. *crassa*, Brückner 1890, 2 Stücke (M).
L 92 H 49 D 30 mm
82 48 29
15. Waldsachsener Bach, var. *tenuis*, Brückner 1904, 1 Stück (M).
L 104 H 55 D 33 mm
16. Bei Fürth am Berg, Brückner 1926. Nach Brückner ist im Osten des
Landes die *piscinalis* vorherrschend, im Westen die *cellensis*.
17. Rittersteich und Schützenteich bei Coburg, "wohl nur Entwick-
lungsstadien der *A. cellensis*", Brückner 1926, 138.
18. Finkenauer Teich, 7 km südlich Coburg, als *A. lacustris*, Brück-
ner 1926.
19. Weisach bei Maroldsweisach, als *A. piscinalis*, *anatina*, *gibba* Held,
Schneider 1856.

B. Regnitz

a. Rednitz

20. Schwäbische Rezat bei Pleinfeld, Haas und Schwarz 1913, 7 Stücke.
21. Fränkische Rezat zwischen Ansbach und Neuses, var. *arenicola/tenuis*,
suevica-Form, Hässlein 10.12.1930, 17 Stücke (M).
L 84 H 39 D 22 mm
78 40 21
75 38 22
22. Mühlbach oberhalb Merkendorf, var. *arenicola/tenuis* und *typica/are-*
nicola; "ehedem ungemein häufig, jetzt fast ausgestorben", ver-
kürzt, dickbauchig, eines *cellensoid*, Hässlein 1937 (M).

- L 90 H 50 D 29 mm
75 43 26
73 43 28
23. Weiher bei Bommersdorf (bei Merkendorf), zum Zandtbach, Rezat, Hässlein, 7 Stücke 1937 (M).
L 91 H 50 D 33 mm
83 52 26
82 51 30
24. Rezat oberhalb Georgensgmünd, Haas und Schwarz 1913, 3 Stücke.
- b. Pegnitz
25. Pegnitz-Altwasser bei Mögelsdorf, Haas und Schwarz 1913, 2 Stück.
- c. Mittlere Regnitz
26. Zenn bei Siegelsdorf, Haas und Schwarz 1913, leg. Zwanziger, 3 St.
27. Aurach zwischen Frauenaarach und Ziegenbrunn, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück.
28. Weiher bei Mögelsdorf, Koch 1899, als piscinalis.
29. Dutzendteich bei Nürnberg, Koch 1899, als piscinalis.
30. Bubenreuther Weiher, Lindinger 1899.
31. Oberndorfer Weiher, Lindinger 1899.
32. Kosbacher Weiher, Lindinger 1899.
33. Kutscherweiher unterhalb des Erlanger Wasserwerkes, Lindinger 99.
34. Weiher bei Erlangen, Küster, Anodonta, Taf. 16, Fig. 1, Fundort der Type Anodonta opalina Küster.
35. Ausfluss eines Sees bei Erlangen in die Regnitz, Küster, Anodonta, als An. ponderosa Pf.
36. Regnitz bei Erlangen, Küster, Anodonta, als An. inornata Kstr. Taf. 3, Fig. 6, Typenfundort; An. cariosa Küster, Taf. 10, Fig. 1, 2, Typenfundort; Taf. 4, Fig. 3, Taf. 5, Fig. 1; An. nilsonii Küster, Typenfundort, Taf. 17, Fig. 3, 4, Taf. 18, Fig. 2.
- d. Wiesent
37. Ailsbach unterhalb des Schlosses Rabenstein, Schermer 1912, als cygnea L.
- e. Aisch
38. Aisch bei Windsheim, Haas und Schwarz 1913, 10 Stücke.
39. Abzugsgraben der Mühle bei Pahres, Kr. Neustadt, var. arenicola/tennis, Hässlein 1933, 4 Stücke (M).
L 83 H 45 D 26 mm
66 40 21
61 39 19
40. Aisch oberhalb Neustadt, var. typica/arenicola, Hässlein 1937, 4 Stücke
L 72 H 42 D 22 mm
65 35 20
56 34 15
41. Aisch bei Neustadt, Eisenbahnbrücke, var. typica/arenicola, Hässlein 1930, 6 Stücke; Haas und Schwarz 1913, 3 Stücke.
L 68 H 41 D 21 mm
65 37 19
62 35 18

42. Aisch bei Schlammersdorf, var.arenicola, Modell 17.8.1921, zwei Stücke (M).
L 79 H 40 D 25 mm
68 37 22

f. Untere Regnitz

43. Rauhe Ebrach bei Pettstadt, Haas und Schwarz 1913, 10 Stücke.
44. Regnitz bei Hirschaid, var.arenicola/tenuis, Modell 17.8.1921, 1 Stück (M).
L 98 H 57 D 28 mm
45. Regnitz bei Pettstadt, var.crassa, Modell 17.8.1921, 1 Stück (M).
L 97 H 48 D 32 mm
46. Regnitz bei Bamberg, Küster 1852, als ponderosa und rostrata (selten!); Schedel 1886 als piscinalis.
47. Regnitz bei Bamberg (östl.Arm oberhalb Bamberg), Haas und Schwarz 1913, 19 Stücke. Werden bei Hochwasser herabgeschwemmt, Modell 29.7.1934, 1 Schale.

C. Ludwigs-Donau-Main-Kanal

Die Anodonta hat bereits den ganzen Kanal durchwandert, ihre Formen gehören vorwiegend der Rheinrasse an, sodass die Darstellung hier beide Rassen zusammenfassen muss.

a. Rheingebiet

48. Ludwigskanal zwischen Regnitzmündung und Erlangen, Haas und Schwarz 1913, 16 Stücke.
49. bei Strullendorf, Modell 17.8.1921, juv.var.typica, 3 Stücke (M).
L 64 H 38 D 20 mm
61 37 17
57 34 18
50. bei Hirschaid var.tenuis/arenicola, Modell 17.8.1921, 1 Stück, Grund sandig (M).
L 76 H 42 D 23 mm
51. bei Kersbach, juv.var.typica, Modell 18.8.1921, 2 Stücke (M).
L 79 H 48 D 25 mm
71 40 21
52. bei Erlangen, Haas und Schwarz 1913, 4 Stücke.
53. bei Doos, Haas und Schwarz 1913, 6 Stücke.
54. bei Kronach, Haas und Schwarz 1913, 4 Stücke.
55. Kanalhafen Fürth, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück.
56. bei Schwarzenbruck, var.typica/arenicola, Rheinrasse, Modell 7.8.1921, 1 Stück (M).
L 79 H 47 D 23 mm
57. bei Ochsenbruck, Haas und Schwarz 1913, 5 Stücke.
58. bei Pfeifferhütte, Haas und Schwarz 1913, 4 Stücke, var.typica/arenicola, Rheinrasse, Modell 7.8.1921, 1 Stück (M).
L 73 H 30 D 21 mm
59. bei Rübleinshof, Haas und Schwarz 1913, 11 Stücke.
60. bei Schwarzenbach, var.typica, Modell 7.8.1921, 1 Stück (M).
L 77 H 45 D 24 mm

61. bei Rasch, var.arenicola, Rheinrasse, Modell 7.8.1921, 1 Stück (M). L 102 H 56 D 35 mm
62. bei Berg, var.tenuis/recurvirostris und var.typica/ponderosa, Rheinrasse, Modell 7.8.1921, 2 Stücke (M). L 108 H 59 D 35 mm
77 49 29
63. bei Neumarkt, Haas und Schwarz, 8 Stücke.
64. bei Dörrlbach, Haas und Schwarz 1913, 2 Stücke.
65. bei Schleuse 66, Haas und Schwarz 1913, 4 Stücke.
66. bei Richtheim, var.typica, Donaurasse, Modell 7.8.1921, 1 Stück L 93 H 49 D 34 mm
67. bei Loderbach, grosse, flache var.typica/tenuis, Rheinrasse, Modell 7.8.1921, 1 Stück (M). L 126 H 69 D 40 mm

b. Altmühl-Gebiet

68. bei Buchberg, var.crassa, z.T.Krüppelformen, Modell 6.8.1921, 3 Stücke (M). L 82 H 55 D 35 mm
80 44 29
67 42 22
69. bei Berching, var.arenicola, verkürzt, Donaurasse, Modell 6.8.1921, 1 Stück (M). L 75 H 46 D 22 mm
70. bei Eglasmühle, var.typica/arenicola, Donauform, Modell 6.8.1921, 1 Stück (M). L 114 H 62 D 33 mm
71. bei Plankstetten, var.typica, Donaurasse, Modell 6.8.1921, eine Schale (M). L 75 H 49 D -- mm
72. bei Beilngries, var.typica, wohl Rheinrasse, Modell 6.8.1921, 1 Stück (M). L 122 H 66 D 42 mm
73. bei Ottmaring, var.arenicola/tenuis, Modell 5.8.1921, 2 Stücke (M). L 94 H 52 D 32 mm
89 50 29
74. bei Dietfurt, kleine Kümmerform und Altwasserform, var.arenicola/tenuis, Donaurasse, Modell 5.8.1921, 2 Stücke (M). L 104 H 65 D 36 mm
48 31 18

D. Unterer Main

a. Main zwischen Regnitz und Tauber

75. Main-Altwasser bei Viereth, var.typica fa.ponderosa, Schneid 1920, 1 Stück (M). L 98 H 53 D 28 mm
76. Main-Altwasser gegenüber Stammheim bei Schweinfurt, var.crassa, Stromform, Stadler 1925, 2 Stücke (M). L 85 H 46 D 29 mm
76 48 28
77. Main-Altwasser oberhalb des Schweinfurter Stadtparkes, var.typica Hässlein 1937, 2 Stücke (M). L 78 H 53 D 29 mm
76 49 23
78. Main bei Schweinfurt, Schneider 1856.
79. Main um Ochsenfurt, Clessin 1880 als cygnea und piscinalis.
80. Pleichach, Sandberger 1885, als anatina.

81. Main oberhalb Würzburg, var. *typica*, Stromform, Andreas Modell
5.4.1920, 5 Stücke (M).
L 103 H 67 D 37 mm
89 57 30
76 44 26
82. Sinn bei Gemünden, Seidler 1922.
83. Main oberhalb Lohr, var. *arenicola* bis *tenuis*, Stadler 1928, 30
Stücke (M).
L 126 H 67 D 48 mm
99 58 33
98 49 36
84. Main bei Lohr, var. *crassa*, Stadler 1925, 1 Stück (M).
L 80 H 46 D 27 mm
85. Main bei Neustadt, juv. Stadler 1925, 3 Stücke (M).
L 74 H 47 D 22 mm
66 41 25
56 38 14
86. Main zwischen Triefenstein und Marktheidenfeld, var. *arenicola/te-*
nuis, Stadler 1925, 1 Stück (M).
L 91 H 53 D 26 mm

b. Tauber

87. Tauber bei Wettringen, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück.
88. Tauber zwischen Diebach und Klein-Ansbach, ebenda, 10 Stücke.
89. Tauberkanal im Schlosspark Mergentheim, ebenda, 1 Stück.
90. Tauber bei Brombach, ebenda, 10 Stücke.
91. Tauber bei Dittigheim, ebenda, 6 Stücke.
92. Tauber bei Rothenburg, Pürkhauer 1856, als *anatina*.
93. Tauber bei Creglingen, var. *arenicola*, teilweise vom *suevica*-Ty-
pus, Zwiesele 1910, 35 Stücke (M).
L 78 H 43 D 22 mm
74 43 24
68 41 18
94. Tauber bei Archshofen, kleine *suevica*-ähnliche Form, Zwiesele
1910, 10 Stücke (M).
L 64 H 34 D 21 mm
63 37 18
62 35 22
95. Tauber bei Wertheim, var. *arenicola*, Alt 1925, 1 Stück (M).
L 97 H 53 D -- mm

c. Main von der Tauber bis zur bayrischen Grenze

96. Main beim Haderäckerwald, Hässlein 1954, sehr häufig.
97. Main bei Fluss-km 108, Hässlein 1954, sehr häufig.
98. Main bei Fluss-km 107, Hässlein 1954, steiniger, ertrunkener Buh-
nenteich, sehr häufig.
L 115 H 65 D 42 mm
99. Main bei Obernburg-Ort, Hässlein 1954, sehr häufig.
100. Main unterhalb Elsave-Mündung, Hässlein 1954, 1 Stück.
101. Main bei Fluss-km 102, Hässlein 1954, nur mehr einzelne Stücke.
102. Main bei Sulzbach, Hässlein 1953, sandig-schlammige Mulde der
Uferbank, häufig.
L 65 H 45 D 18 mm
103. Main bei Niedernburg, Hässlein 1953, ertrunkener Buhnenteich.
Selten.
L 53 H 35 D 15 mm

A.curta Bourg.Fig.9	A.nilsonii Küster Fig.29
A.dupuyi Ray et Drouet Fig.34	A.ocnerella Serv.Fig.10
A.elachista Bourg.Fig.7	A.opalina Küster Fig.13
A.friedlanderiana Serv.Fig.27	A.racketti Bourg.Fig.16
A.inornata Küster Fig.4	A.scaphidella Loc.Fig.38
A.intermedia Bourg.Fig.20	A.sedentaria Bourg.Fig.2
A.journei Ray Fig.14	A.sterra Serv.Fig.11
A.maculata Bourg.Fig.41	A.tricassina Bourg.Fig.44
A.maritzana Bourg.Fig.18	

Unter allen diesen Formen, die ja wissenschaftlich wertlos sind, aber in ihrer Gesamtheit doch ein Bild der damaligen Mainfauna geben, befindet sich kein Stück der *A.cygnea-cellensis*-Gruppe!

5. Anodonta cygnea stagnalis Turton.

Die langgestreckte Anodontenart *cellensis* Gmel. hat im Gebiete eine ziemlich beschränkte Verbreitung. Sie ist hauptsächlich längs des Main- und Regnitzlaufes vertreten und tritt sonst sehr sporadisch auf. Nach meiner Auffassung ist *cygnea cellensis* als Art das Produkt ausgesprochener Kälte- und Eisrandlagen in der Eiszeit, die Entstehung im Maingebiete selbst also sehr unwahrscheinlich. Es kommt nur Einwanderung in Frage. Dafür standen anscheinend zwei Wanderwege zur Verfügung, Überwanderung aus dem Altmühlgebiet, wo aber die Art selbst sehr spärlich ist und Überwanderung aus dem Entstehungszentrum am Südrand der norddeutschen Vergletscherung, also dem Gebiet der Sächsischen Saale. Für letztere Möglichkeit spricht die relativ grosse Verbreitung im Koberger Gebiet. Aus dem Diluvium von Mosbach ist die Art nicht benannt worden.

A. Ober-Main

1. Main-Altwasser bei Höchststadt. Grosse *cellensis*-Formen, ziemlich bauchig werdend, z.T.verkürzt, ziemlich stark erodiert, Michel 1920, 5 Stücke (M).

L 150	H 73	D 48	mm
126	60	38	
117	62	37	
2. Main bei Unter-Wallerstadt. Verkürzte, sehr bauchige Strömungsform, var.*arenicola*, am Wehr oberhalb der Ortschaft, Modell 12.8. 1920, 1 Stück (M).

L 133	H 71	D 41	mm
-------	------	------	----
3. Main-Sümpfe bei Lichtenfels, Study 1881, als var.*cygnea*.
4. Hofmannsteiche bei Weiltramsdorf (zur Tambach), Brückner 1894, eine Schale (M).

L 157	H 80	D --	mm
-------	------	------	----
5. Reichardsbrunn, var.*typica/tenuis*, hellgrün gefärbt, Brückner 1896, 1 Stück (M).

L 145	H 70	D 48	mm
-------	------	------	----
6. Coburg, Var.*typica/tenuis*, Brückner 1909, 1 Stück (M).

L 124	H 60	D 37	mm
-------	------	------	----
7. Finkenauer Teich, 7 km südl.Coburg, Brückner 1926, als *cygnea*.

8. Weischau bei Sonnefeld, Brückner 1926, bis 210 mm lang.
9. bei der Meschenbacher Brücke, Brückner 1926.
10. Gross-Walbur, Brückner 1926
11. Rodach, Brückner 1926
12. Niederfüllbach, Brückner 1926, 200 mm, als *cygnea* bezeichnet.
13. Neuensee, Brückner 1926.
14. Rittersteich bei Coburg, Brückner 1926.
15. Baunach, Sandberger 1885, als *cellensis*.
16. Weisach, Sandberger 1885, als *cellensis*.

B. Regnitz

17. Mainbach bei der Weihersmühle, Gde. Walpersdorf (zur Rednitz).
Altes Stück, etwas verkürzt, Hässlein 15.3.1932, 7 Stücke (M).
L 133 H 69 D 49 mm
126 55 39
107 52 33
18. Teich vor der Weihersmühle bei Walpersmühle, Hässlein, 13 Stück
13.3.1932 (M). L 178 H 89 D 61 mm
160 82 54
163 80 53
19. Dutzendteich bei Nürnberg, Koch 1899, als *cygnea*, *cellensis*.
20. Mögeldorfer Weiher, Koch 1899, als *cellensis*.
21. Weiher bei Gleishammer, Koch 1899, als *cellensis*.
22. Weiher in den Wöhrder Wiesen, Koch 1899, als *cellensis*.
23. Dechsendorfer Weiher bei Erlangen, Lindinger 1899, vermutlich hieher gehörig.
24. Ebrach, Sandberger 1885, als *cellensis*.
25. Regnitz bei Bug.Grosse, var. *typica*, Schneid 14.8.1921, 1 Stück,
cf. *cygnea* und *cellensis* bei Schedel 1886. L 132 H 67 D 43 mm
26. Regnitz bei der Elmerspitze, Küster 1852.

C. Ludwigskanal

27. Ludwigskanal bei Erlangen, Walser 1870, als *cellensis*.
Die beiden anderen Fundorte der Rheinrasse von *cellensis* im Kanal, Dietfurt und Plankstetten, sind bei der Fauna der oberen Donau behandelt.

D. Unter-Main

28. Main-Altwasser bei Viereth, Schneid 1920, 1 Stück, var. *arenicola* (M). L 88 H 50 D 23 mm
29. Kanal am Bahnhof Schweinfurt, Schneider 1856, als *cellensis*.
30. in der Pfinz, Altwasser am Main, Schneider 1856, als *cellensis*.
31. Schweinfurt, Fischteich bei der Ultramarinfabrik, Schneider 1856, als *cygnea*.

Nachdem Haas die von ihm 1911 abgegrenzten Kleinrassen 1940 selbst wieder eingezogen hat, bleibt uns nur übrig festzustellen, dass auch die von ihm aus der Aisch beschriebenen Hybriden keine solchen sind, da auch das südliche Regnitzgebiet durchaus die "Batavoide" Ausbildung des *Unio crassus* aufweist, was ich bereits 1924 festgestellt habe.

Unter-Pliozän: Pont

1. Braunkohlenton von Praunheim bei Frankfurt und von Frankfurt-Ginnheim, Haas und Wenz 1923, als *U. batavus taunicus* Kob.
2. Braunkohlenton von Salzhausen.
3. Braunkohlenton von Erbstadt-Kaichen, Haas und Wenz 1923, Taf. 5, F. 2.

Diluvium

4. Sande von Mosbach, häufig.

Die Niederterrasse des unteren Mains liefert das Material für die Verbindung zur Gegenwart.

A. Ober-Main

a. Quellgebiet

5. Roter Main bei Emtmannsberg (Bodenmühle), Haas und Schwarz 1913, Taf. 1, kleine Bachform, var. *tenuis*, dunkelrotbraun und stark erodiert, aber mit deutlichem nanus-Umriss, Schneid 1923, 3 Stücke, Haas etwa 300 Stücke (M). Typenfundort des *U. batavus kobeltianus* Haas.

L	57	H	29	D	23	mm
	50		28		21	
	41		25		19	

b. Rodach

Bisher keine Feststellungen bekannt.

c. Itz

6. Waldbach bei Scherneck, Brückner 1926, S. 137, var. *tenuis/arenicola*, 1887, 2 Stücke (M).

L	50	H	27	D	20	mm
	48		26		22	
	49		29		19	
7. Tambach bei Koburg (zur Rodach), var. *typica/arenicola*, Brückner, 1 Stück und Schalen (M).

L	57	H	33	D	25	mm
	49		29		19	
8. Steinach bei Fürth am Berg, Brückner 1895, kleine var. *tenuis*, tief erodiert, schwarz (M).

L	51	H	25	D	18	mm
	48		26		18	
	44		25		19	
9. Sulz bei Neuses, Brückner 1925, 6 Stücke (M).

L	58	H	32	D	25	
	53		31		21	
	51		32		22	
10. bei Rohrbach, Brückner 1926, S. 137.

30. Felchbach bei Höttingen, Haas und Schwarz 1913; Schneid 9 Stück.
31. Fränkische Rezat bei Ansbach, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück.
32. Fränkische Rezat zwischen Ansbach und Neuses. Schöne normale Form, dunkelgefärbt, Hässlein 10.12.1930, 60 Stücke (M).
L 71 H 37 D 25 mm
70 34 26
55 31 20
33. Fränkische Rezat bei Bechhofen. Stein- und Sandgrund, verkürzte Formen, Hässlein 9.6.1927, 6 Stücke (M). L 54 H 32 D 22 mm
51 31 25
50 29 18
34. Mühlgraben der Fränkischen Rezat oberhalb Georgensgmünd, Haas und Schwarz 1913, 37 Stücke.
35. Fischbach (Zandt bach) unterhalb der Weidenmühle bei Zandt. Kleine Strömungsform, sehr kräftig und bauchig, Hässlein 1931, 33 Stücke (M). L 55 H 32 D 27 mm
53 31 23
50 32 22
36. Zandt bach unterhalb Wattenbach (Ansbach). Sandiger Grund, stark erodiert, Hässlein 1932, 7 Stücke (M). L 67 H 34 D 25 mm
63 34 25
63 34 25
37. Graben zwischen Buschschwabach und Kottendorf (z. Schwabach), Haas und Schwarz 1913, 9 Stücke.
38. Schwarzach, Prätachmühle bei Prakenfels, Haas und Schwarz, 30 St.
39. Schwarzach bei Grünsberg, leg. Stromer, Haas und Schwarz 1913, 14.
40. Schwarzach bei Altsorf, Haas und Schwarz 1913, leg. Stromer, 4 St.
41. Schwarzach bei Oberölsbach. Feinsandig, var. aren. Modell 7.8.21, 6 Stücke (M). L 60 H 32 D 26 mm
58 30 27
57 30 21
42. Schwarzach bei Nerreth. Reiner Kalksand. Kleine Bachform, var. aren./tenuis, Modell 7.8.1921, 7 Stücke (M). L 47 H 27 D 17 mm
45 25 15
44 25 13
43. Aurach zwischen Frauenaarach und Ziegenbrunn, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück.
44. Bibert bei Weinzierlein. Kleine var. aren. leg. v. Ammon 1880, 1 St. (M). L 49 H 25 D 18 mm
- b. Erlanger Gegend
45. Farnbach bei Hiltmannsdorf, var. aren. Haas und Schwarz 1913, 16 Stücke, leg. Zwanziger (M) 3 Stücke. L 47 H 26 D 16 mm
45 26 19
41 22 16
46. Zenn bei Adelsdorf, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück
47. Zenn bei Neuhoof, ebenso, 54 Stücke
48. Zenn bei Siegeldorf, var. aren. ebenso, 12 Stücke, leg. Zwanziger 2 Stücke (M). L 43 H 25 D 18
43 24 17

49. Gründlach bei Fürth, Haas und Schwarz 1913, 11 Stücke, Taf.2,F.8.
50. Gründlach bei Hundsmühle, nahe Heroldsberg, ebenda, 3 Stücke.
51. Gründlach bei der Königsmühle, var.tenuis, Grund sandig, Modell
18.8.1921, 5 Stücke (M); Lindinger 1905. L 55 H 31 D 23 mm
50 26 22
45 26 18
52. Banderbach bei Fürth, Haas und Schwarz 1913, 23 Stücke.
53. Schwabach, östlich vom Buckenhof, Lindinger 1905.
54. Seebach, westlich vom Heusteg, Lindinger 1905.

c. Wiesent

Aus dem Gebiete der Pegnitz ist die Art noch nicht bekannt geworden.

55. Ailsbach bei Neumühle, Haas und Schwarz 1913, 23 Stücke.
56. Ailsbach, ohne genaueren Fundort, leg.Jäckel, ebenda, 18 Stücke.
57. Ailsbach unterhalb Schloss Rabenstein, Schermer 1912.
58. Püttlach bei der Behringersmühle, var.tenuis, Brückner 1913, 3
Stücke (M); Haas und Schwarz 1913, 6 Stücke L 59 H 33 D 23 mm
51 27 17
47 26 17
59. Wisent bei Ebermannstadt, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück.

d. Aisch

60. Aisch bei Windsheim, Haas und Schwarz 1913, 11 Stücke.
61. Goldbach bei der Hölzleinsmühle. Bach schmal, tief eingerissen.
Die Muscheln in mehreren Lagen übereinander, dunkel gefärbte te-
nuis/aren. Modell 10.8.1923, 20 Stücke (M). L 79 H 44 D 39 mm
69 36 23
66 36 24
62. Aisch bei Pahres, Kreis Neustadt, var.typica, Hässlein 1933, 2
Stücke (M). L 56 H 30 D 21 mm
53 29 20
63. Aisch bei Neustadt, Eisenbahnbrücke. Grund Gipsletten und Sand,
var.tenuis/arenicola, sehr cytherea-ähnlich, Hässlein 1926, 11
Stücke (M). Haas und Schwarz 1913, 120 Stücke, Taf.1, Fig.13-17.
64. Flussbad Neustadt-Aisch; subfossil, langgestreckte Flussform,
Hässlein 1926, 1 Stück und Klappen (M). L 58 H 30 D 21 mm
74 37 --
63 33 --
65. Engleinsgraben bei Reinhardshofen, Kreis Neustadt, Schwarzgefärb-
te var.ten./aren. Hässlein 1933, 13 Stücke. L 69 H 39 D 27 mm
68 37 25
64 37 23
66. Abzugsgraben der Mühle bei Pahres, var.arenicola, Hässlein 1933,
6 Stücke (M). L 60 H 31 D 24 mm
59 35 23
58 34 23
67. Aisch bei Höchststadt, Haas und Schwarz 1913, 10 Stücke.
68. Aisch bei Schlammersdorf, var.arenicola, sehr variabel. Grund fein
sandschlammig, Modell 17.8.1921, 27 Stücke (M).

L	58	H	31	D	21	mm
	55		30		20	
	55		30		20	

e. Untere Regnitz

69. Regnitz bei Erlangen, Küster, Unio et Hyria.
70. Regnitz bei Seussling, Modell 17.8.1921, 1 Klappe (M).
L 63 H 33 D -- mm
71. Regnitz bei Hirschaid, nur eine Klappe, Modell 17.8.1921 (M).
L 55 H 30 D -- mm
72. Regnitz bei Pettstadt, var.arenicola, starkschalig, Modell 17.8.1921, 2 Stücke (M).
L 50 H 26 D 18 mm
42 24 16
63 26 --
73. Untere Regnitz oberhalb Bamberg (Löwensteg=östl.Regnitzarm), Haas und Schwarz 1913, 19 Stücke; Modell 17.8.1921, meist Klappen im Hochwasserflutbett (M).
L 60 H 31 D -- mm
51 29 --
46 25 16
74. Bamberg, Kanal im Nonnengraben, Küster 1856, 2 Stücke, leg.Cavallo.
75. Alluvialer Regnitzkies, Hafenbau nördlich Bamberg, Haas und Schwarz 1913, 2 Stücke.
76. Baunach, Sandberger 1885.

c. Mittlerer Maina. Main von Schweinfurt bis Fränkische Saale

77. Main-Altwasser gegenüber Stammheim, var.crassa, Stadler 1925, 1 St.
78. Main bei Schweinfurt, Schneider 1856.
79. Main bei Marktbreit, 1 Schale, Modell 1938 (M)
80. Main bei Ochsenfurt, Clessin 1880 "sehr häufig".
81. Main bei Würzburg, Gaschott' 1922.
82. Main unterhalb Würzburg, Haas und Schwarz 1913.
83. Plaichach bei Rimpf, Sandberger 1885, Stadler 1926, eineinhalb Stücke (M).
L 24 H 15 D -- mm
55 29 --
84. Mühlgraben der Sinn bei Zeitlofs, Seidler 1922.
85. Main zwischen Triefenstein und Marktheidenfeld, Stadler, var. crassa, 1 Schale (M).
86. Wern, Sandberger 1885.
87. Fränkische Saale, Sandberger 1885.

b. Tauber

88. Tauber, 2 km unterhalb der Quelle, Haas und Schwarz 1913, Taf.1, Fig.1, 55 Stücke.
89. Tauber bei Wettringen. Haas und Schwarz 1913, Taf.1, Fig.3, 26 St.
90. Tauber bei Dittigheim, ebenda, Taf.1, Fig.2, 32 Stücke.

91. Tauber bei Brombach, ebenda, 13 Stücke.
 92. Tauber bei Gamberg, ebenda, 7 Stücke.
 93. Tauber zwischen Diebach und Klein-Ansbach, ebenda, 26 Stücke.
 94. Tauber bei Aichshofen, var.arenicola, H.Zwiesele, 60 Stücke (M).
 L 57 H 33 D 22 mm
 46 26 17
 45 27 17
 95. Tauber bei Kreglingen, var.arenicola, H.Zwiesele, 20 Stücke (M).
 96. Tauber bei Mergentheim, H.Zwiesele, 110 Stücke. Kleine pseudo-
 consentaneus-Form, var.arenicola (M).
 L 53 H 30 D 21 mm
 52 28 20
 51 30 20
 97. Tauber-Kanal im Schlosspark Mergentheim, Haas & Schwarz 1913, 18
 98. Tauber bei Wertheim, H.Stadler 1925, var.arenicola, 1 Stück (M).
 L 54 H 33 D 22 mm

c. Spessart-Main

99. Main bei Miltenberg, H.Zwiesele, 3 Stücke (M).
 L 63 H 35 D 24 mm
 53 29 20
 55 31 20
 100. Main beim Haderäckerwald, Hässlein 1954, sandiger, ertrunkener
 Buhnenteich, häufig. L 75 H 38 D 27 mm
 101. Main bei Fluss-km 108, Hässlein 1954, schlammiger, ertrunkener
 Buhnenteich, häufig. L 77 H 40 D 29 mm
 102. Main bei Fluss-km 107, Hässlein 1954, steiniger, ertrunkener
 Buhnenteich, selten. L 77 H 40 D 29 mm
 103. Main bei Obernburg-Ort, Hässlein 1954, selten.
 104. Main bei Sulzbach, Hässlein 1953, sandig-schlammige Mulde der
 Uferbank, sehr selten. L 74 H 37 D 28 mm
 105. Main bei Niedernberg. Ertrunkener Buhnenteich mit Quellwasser.
 Hässlein 1953, häufig, Taf.2, Fig.9. L 76 H 41 D 26 mm
 106. Main bei Obernau, rechts, Hässlein 1954, sehr selten.
 107. Main bei Obernau, links, Kraftwerk, lehmiger Uferhang, sehr sel-
 ten, Hässlein 1954. L 61 H 32 D 22 mm
 108. Main bei Nilkheim, nur tote Stücke, Hässlein 1953.
 109. Main bei Aschaffenburg, var.crassa, Flach 1885; Al.Weber 1919,
 1 Stück (M). L 61 H 33 D 26 mm
 110. Main bei Mainaschaff, Hässlein 1953, Taf.2, Fig.8, unterhalb der
 Staustufe auf Geröllpflaster, sehr selten. L 59 H 33 D 21 mm
 111. Main bei Kleinostheim, untere Staustufe, nur tote Stücke, Häss-
 lein 1953.
 112. Main bei Grosswelzheim, nur tote Stücke, Hässlein 1953.
 113. Main bei Kahl, nur tote Stücke, Hässlein 1953.
 Auch bei dieser Art lebt kein junger Nachwuchs in der Untersu-
 chungsstrecke!
 114. Mudau, Sandberger 1885; Haas 1911, Taf.4, Fig.6.

115. Mümling, Haas 1911.
 116. Gersprenz bei Ohlenbach, Haas 1911.

d. Kinzig

117. Salzfluss, Haas 1911.
 118. Gründau, Haas 1911.
 119. Krebsbach, Haas 1911.
 120. Bach bei Salmünster, Haas 1911.
 121. Kinzig bei Langenselbold, sehr häufig, Haas 1908, 1911, Taf.4,
 Fig.1. Haas stellte damals die Form zum norddeutschen crassus!
 122. Kinzig bei Hanau-Bulauwald, Seidler 1923, 5 Stücke (M).

L	54	H	29	D	19	mm
			49		28	19
			48		27	18

 123. Kinzig oberhalb Hanau, Haas 1908, Fundort der Type von *Unio riparius* C.Pfeiffer 1821.

e. Nidda

124. Seemenbach, Haas 1911.
 125. Nidder, ebenda.
 126. Usa, ebenda.
 127. Erlenbach, ebenda
 128. Eschbach mit Hardtbach, ebenda.
 129. Nidda, ebenda.
 130. Kesselbach oberhalb Neuenhasslau, Seidler 1922.
 131. Berkigsbach unterhalb Niedermittlau, Haas 1911.
 132. Bracht oberhalb Schlierbach, ebenda.
 133. Krebsbach nördlich Hanau, ebenda.
 134. Ohm, ebenda.

f. Unterer Main

135. Bieber, Haas 1911 mit *Unio batavus sabulosus* Haas. Der Bach geht aus dem nördlichen Odenwald zum Main.
 136. Sulzbach bei Schwalbach, Haas 1911.
 137. Wickerbach bei Flörsheim, Haas 1911, Taf.4, Fig.6.
 138. Main bei Frankfurt, C.R.Böttger 1907; Kobelt 1912, der die von Servain von hier benannten formen abbildet und einzieht. Es sind:

<i>Unio crassus</i> Retz.Fig.40	
<i>Unio alpecanus</i> Bourg.Fig.33.	(Kobelt sah die Form als Krüppel von
<i>Unio batavellus</i> Locard.Fig.37.	tumidus an!)
<i>Unio cyprinorum</i> Bourg.Fig.39.	
<i>Unio feliciani</i> Bourg.Fig.28.	
<i>Unio jourdheული</i> Bourg.Fig.42.	(der echte jourdh.ist eine mancus-
<i>Unio matronicus</i> Bourg.Fig.43.	Form!)
<i>Unio socardianus</i> Bourg.Fig.26	

7. Unio tumidus depressus Donovan

Die Rheinrasse des *Unio tumidus* Retz. bevorzugt im Maingebiet, wie überall in den Bergländern, die Strömung der Hauptflüsse, also den Mainlauf selbst, aufwärts bis Hochstadt, die Regnitz etwa bis Nürnberg und den Ludwigskanal bis zur Wasserscheide. Sonst kommt sie nur in den Unterläufen der kleineren Nebenflüsse vor, in etwas grösserem Umfange nur im östlichen Koburger Gebiet und in der Aisch. In der Regnitz selbst ist sie heute zu einem guten Teil sehr selten geworden.

Nach Sandberger ist die Art erst im Diluvium ins Maingebiet eingewandert. Das dürfte aber nicht stimmen, da ihr Vorläufer *Unio tumidus pinguis* Sandberger (= *U. tumidus ludwigi* Wenz, *viridis* Ludw., *münzenbergensis* Ludwig) bereits im Pliozän der Rhön vorkommt.

Die Ausbildung geht vorwiegend in der Richtung der *var. arenicola* bis *crassa*, seltener zu grossen Altwasserformen, die am Unterrand weiterbauen (*fa. heckingi* Colb.), ganz selten zu *tenuis*.

A. Oberer Main

1. Main-Altwasser bei Hochstadt. Das Altwasser liegt am rechten Ufer etwas oberhalb der Strassenbrücke; *var. tenuis*, klein bleibend, zierlich und dünnchalig; Wirbel erodiert, Farbe dunkelrotbraun, G. Michel 1920, 3 Stücke (M).

L	59	H	30	D	21	mm
	56		28		19	
	54		27		18	
2. Main bei Hochstadt. Grosse kräftige Flussform, langgestreckt mit flacher Schale und stark zerstörter Epidermis, *var. aren./archaica*, Modell 12.8.1921, 3 Stücke (M).

L	96	H	46	D	31	mm
	94		46		27	
	86		43		31	
3. Mühlgraben des Mains oberhalb Lichtenfels, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück.
4. Main bei Schwürbitz. Grosse Flussformen, *var. aren./archaica*, alle stark erodiert. Ausser spitzschnabligen Formen wie bei Hochstadt treten auch dekurvierte Stücke auf, weiter solche, die später nur am Unterrande weiterbauen, endlich Krüppelformen. Epidermis gelbgrün bis dunkelbraun. Grund grobsandig, W. Michel 1923, 5 Stücke (M).

L	95	H	48	D	32	mm
	88		45		30	
	80		45		28	
5. Main bei Unterwallerstadt. Langgestreckte Form wie bei Hochstadt, aber mit breiterem, mittelständigem Schnabel. Farbe dunkelbraun, sehr stark erodiert, Modell 12.8.1921, 2 Stücke (M).

L	87	H	45	D	28	mm
	77		39		26	
6. Main zwischen Lichtenfels und Banz, Haas und Schwarz 1913, 29 St.

7. Main bei Mainroth, Brückner 1922, 1 Schale var.tenuis, stark erodiert (M).
L 82 H 39 D -- mm
8. Main bei Michelau, var.typica, leicht erodiert, Brückner 1889, 2 Stücke (M).
L 72 H 35 D 22 mm
73 35 23
9. Main bei Lichtenfels, erodierte var.arenicola/tenuis, Brückner 1914, 1 Stück (M).
L 78 H 38 D 27 mm
10. Main bei Reundorf. Regulierte Strecke. Sehr viel Quarzgeröll, unterbrochen von Sand und an den Ufern etwas schwarzer Schlamm. Formen mittelgross, im Alter stark erodiert. Häufig durch Beschädigungen verkürzt. Farbe hellbraun bis grünlich, var.aren./archaica, Modell 12.8.1921, 8 Stücke (M).
L 72 H 38 D 24 mm
64 34 25
57 31 19
11. Main bei Ebing. In der Nähe der Eisenbahnbrücke. 2 Stücke, das eine, reine var.typica, hellfarbig und grün gestrahlt, mit spitzen, mittelständigem Schnabel, das andere hoch, flach, am Vorderende abgestutzt, var.typica/arenicola. Perlmutter leicht orange. Wirbel etwas erodiert, Modell 13.8.1921, 2 Stücke (M).
L 88 H 44 D 25 mm
80 41 25
12. Main bei Kemmern. Kurze Strömungsformen mit Schalenverletzung. Im Alter wird an der Unterseite weitergebaut, dunkelbraun gefärbt. Schneid 1921, 2 Stücke (M).
L 76 H 43 D 30 mm
66 37 25
13. Main bei Hallstadt, Haas und Schwarz 1913, 31 Stücke. Ich fand nur ein Bruchstück am 13.8.1921 (M).
14. Main zwischen Hallstadt und Regnitzmündung, Haas und Schwarz 1913 17 Stücke.
15. Tambach bei Coburg (zur Rodach), Brückner 1926 "nicht gerade selten", 2 Schalen leg.Brückner (M).
L 88 H 47 D -- mm
82 44 --
16. Weitraisdorf, Brückner 1926, bis 115 mm lang.
17. Heldburg (Kreck), Brückner 1926.
18. Neuensee, Brückner 1926.

B. Regnitz

Im Regnitzgebiet ist die Art infolge der Entwicklung der Grosstädte Nürnberg und Fürth im eigentlichen Flusslauf stark im Rückgang begriffen. Schon 1921 konnte ich hinab bis Hirschaid nur vereinzelt Najaden finden, die alle tot waren und schon lange dalagen.

20. Zenn, Lindinger 1899. Von Zwanziger 1911 nicht mehr bestätigt.
21. Aurach, Lindinger 1899.
22. Oberndorfer Weiher, Lindinger 1899.
23. Flussbad Neustadt-Aisch. Subfossil, im Lehm Boden, var.arenicola, Hässlein 12.8.1926, 2 Stücke (M).
L 57 H 29 D 21 mm
57 29 20
24. Aisch bei Schlammersdorf. Fundstelle von der Mündung aufwärts

- gegen Schlammersdorf, feiner Kalksand. Etwas langgestreckte var.
typica/aren. Modell 10.8.1921, 8 Stücke (M). L 79 H 38 D 28 mm
76 37 25
72 36 24
25. Regnitz bei Erlangen, Küster, Unio et Hyria, Taf.18, Fig.6,7,1,3,
4; Lindinger 1899.
26. Regnitz bei Seussling. Verkürzte var.aren./crassa. Flussbett
steinig und sandig, Modell 17.8.1921, eine rechte Schale (M).
L 70 H 37 D -- mm
27. Regnitz bei Hirschaid, var.arenicola. Flussbett sehr steinig, Mo-
dell 17.8.1921, 1 Schale (M). L 78 H 30 D -- mm
28. Regnitz bei Pettstadt. Langgestreckte var.aren./crassa auf stei-
nigem und sandigem Grund. Stark abgerieben, Modell 17.8.1921, 5
Stücke (M). L 78 H 37 D 26 mm
76 37 26
71 37 25
29. Untere Regnitz bei Bamberg (=östl.Regnitzarm oberh.B.) var.cras-
sa, braungelb, stark erodiert, Modell 1911; 17.8.1921, 4 Stücke;
Haas und Schwarz 1913, 17 Stücke. Wird bei Hochwasser an der obe-
ren Regnitz herabgeschwemmt (M). L 77 H 39 D -- mm
68 37 --
52 28 --

C. Ludwigskanal

30. Ludwigskanal zwischen Regnitzmündung und Erlangen, Haas und Schw.
1913, 12 Stücke.
31. bei Strullendorf var.tenuis und arenicola. Wirbel leicht erodiert.
Grund sandig, starker Pflanzenwuchs. Massenhaft Dreissenia, Mo-
dell 17.8.1921, 1 1/2 Stücke (M). L 54 H 27 D 19 mm
32. bei Kersbach. Jugendform var.typica mit kräftig betontem Wirbel.
Ausgewachsene sind keilförmig, bauchig. Epidermis gelb mit grünen
Strahlen und weitstehenden Ringen, die vom 6. ab eng werden. Fa.
heckingi Colb. Im Alter, d.h. nur am Unterrande wachsen die Mu-
scheln weiter. Modell 18.8.1921, 6 St.(M). L 101 H 57 D 40 mm
84 45 32
79 42 29
33. bei Erlangen, Haas und Schwarz 1913, 3 Stücke, Museum Nürnberg
34. bei Fürth, Kanalhafen, Haas und Schwarz 1913, 2 Stücke, leg.Zwan-
ziger var.typica/tenuis, Wirbel erodiert, die Schnabelspitzen wie
bei vielen Kanalmuscheln durch darüberstreichende Kähne bei nied-
rigem Wasserstand beschädigt (M). L 60 H 33 D 22 mm
35. bei Doos, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück, leg.Zwanziger.
36. bei Kronach, Haas und Schwarz 1913, 2 Stücke.
37. bei Rübleinshof, Haas und Schwarz 1913, 3 Stücke. Äusserster Fund-
punkt bei Haas.
38. bei Röthenbach, var.crassa, 1 Stück, Modell 8.8.1921 (M).
L 82 H 47 D 33 mm
39. bei Schwarzenbruck, var.crassa/aren. jung, mit mehr mittelständi-
gem Wirbel, weiten Ringen, dickschalig, gelbbraunlich, Wirbel
leicht erodiert, Modell 7.8.1921, 2 St.(M). L 70 H 38 D 26 mm
42 22 15

40. bei Pfeifferhütte, 1 sehr junges Stück der limicola-Form, das andere oval-keilförmig mit Schalenverkrümmung nach links! var.aren./crassa, Wirbel leicht erodiert, Modell 7.8.1921, 2 Stücke (M).
L 79 H 44 D 27 mm
56 30 25
41. bei Schwarzenbach, var.aren./crassa, starkschalig, dunkelgelbbraun, am Wirbel abgerieben, Unterrand gegen die Schnabelspitze etwas eingeschnürt, Modell 7.8.1921, 1 Stück (M).
L 77 H 41 D 28 mm
42. bei Rasch, 2 Stücke, eine stark verlängerte typica und eine var.arenicola, die am Hinter- und Unterrande weiterbaut, flach und starkschalig wird. Wirbel leicht erodiert, Modell 7.8.1921 (M).
L 95 H 57 D 25 mm
74 37 25
43. bei Oberölsbach, Jugendform var.typica, Altersformen typica und var.crassa, die nur mehr Unter- und Hinterrand weiterbauen, wobei letzterer obtus wird. Grund sandig, Modell 7.8.1920, 4 Stücke (M).
L 98 H 50 D 37 mm
95 54 39
91 49 37
33 18 11
44. bei Kettenbach. Altersformen der typica/crassa, sehr bauchig und dickschalig. Häufig verkürzt, da ausschliesslich am Unterrand weiterbauend. Dunkelbraun. Grund feinsandschlammig, Modell 7.8.1921, 4 Stücke (M).
L 101 H 55 D 39 mm
92 49 33
80 47 35
62 39 25
45. bei Neumarkt, Zwanziger 1938
46. bei Richtheim, 1 Schale einer verkürzten var.typica und 1 ganz junges Stück. Südlichster Fundpunkt, Modell 1921, 7.8.1921 (M).
L 66 H 39 D 26 mm
26 14 9

D. Mittlerer Main (Maindreieck)

47. Main-Altwasser bei Viereth, var.typica bis aren./crassa, starkschalig und var.tenuis/arenicola, Schneid 1918, 3 Stücke (M).
L 85 H 47 D 31 mm
83 42 26
83 42 28
48. Main-Altwasser gegenüber Stammheim (Schweinfurt). Von verkürzter var.typica zu tenuis und bauchiger crassa gehend, starkschalig, Stadler 1925, 8 Stücke (M).
L 82 H 42 D 30 mm
75 41 28
75 39 24
49. Main südlich Nordheim, var.tenuis/arenicola, Stadler 1925, 1 St., (M).
L 73 H 37 D 23 mm
50. Main-Altwasser bei Marktstett, var.typica/crassa mit leicht erodierten Wirbeln, Stromform, grüngestrahlt mit spitzem Schnabel, Hässlein 11.9.1932, 7 Stücke (M).
L 85 H 43 D 28 mm
80 41 29
89 45 21
66 33 23
51. Main bei Ochsenfurt, Clessin 1880 "weniger häufig als pictorum

- und batavus"; var. crassa, verkürzt und abgerundet, starkschalig und braungefärbt, Zwiesele, 1 Stück (M). L 69 H 39 D 26 mm
52. Main bei Heidingsfeld. Kurze var. aren./crassa, starkschalig, Gaschott 1922, 2 Stücke (M). L 76 H 44 D 29 mm
70 39 25
53. Main bei Würzburg, Gaschott 1922.
54. Main oberhalb Lohr, grosse Stromform, var. crassa, von verkürzter typica ausgehend. Im Alter dunkelbraun und etwas stärker erodiert, Stadler 1928, 6 Stücke (M). L 93 H 49 D 37 mm
90 45 33
84 47 33
55. Main bei Sendelbach-Lohr, 2 grosse Schalen, Stadler 1925 (M). L 85 H 48 D -- mm
56. Main zwischen Triefenstein und Marktheidenfeld, Stromform, var. aren./crassa, Stadler 1925, 2 Stücke (M). L 87 H 45 D 31 mm
70 35 27
57. Tauber bei Brombach, Haas und Schwarz 1913, 4 Stücke, leg. Hashagen.
58. Main bei Miltenberg, Zwiesele, 2 Stücke, grosse var. aren./crassa, Stromform (M). L 87 H 46 D 32 mm
79 44 30
59. Main bei Haderackerwald, Hässlein 1954, häufig.
60. Main bei Fluss-km 108, schlammiger, ertrunkener Buhnteich, Hässlein 1954, häufig, Altersformen L 105 H 53 D 41 mm
61. Main bei Fluss-km 107, steiniger, ertrunkener Buhnteich, häufig, Hässlein 1954. L 104 H 53 D 35 mm
62. Main bei Obernburg-Ort, Hässlein 1954, selten.
63. Main bei Sulzbach, Hässlein 1953, nur tote Stücke.
64. Main bei Niedernberg, ertrunkener Buhnteich, Hässlein 1953, selten. L 97 H 53 D 31 mm
65. Main bei Obernau, links, Kraftwerk, Schlammulde und Geröllpflaster der Uferbank, Hässlein 1953, selten. Taf. 1, Fig. 6, 7, var. biol. typica und aren./crassa. L 89 H 45 D 30 mm
66. Main bei Nilkheim, Hässlein 1953, nur tote Stücke.
67. Main beim Turnerbad, Aschaffenburg, Hässlein 1953, nur tote Stücke.
68. Main bei Aschaffenburg, Flach 1885, sehr häufig; Karl Wehner 1920, grosse var. typica bis crassa, beim Neubau des Mainhafens ausgebagert, starkschalig mit Neigung zur Dekurvierung und zum Weiterbau am Unterrande (fa. heckingi Colb.) Perlmutter an frischen Stücken prachtvoll violett, 40 Stücke (M). L 95 H 50 D 35 mm
93 50 34
90 45 35

Die von Hässlein betonten wulstigen Perlmutterauflagen der heutigen Formen dieser Mainstrecke traten damals schon bei dieser Serie auf. Ich vermutete damals Übersättigung mit nicht verarbeiteten Kalkstoffen. Inzwischen bin ich durch zahlreiche andere Funde (archaische Gebiete Nordamerikas wie unterer Regen) zu dem Schluss gekommen, dass bei Strömungsformen kalkarmer Gebiete schon eine relativ schwache Kalküberfütterung solche Erscheinungen auslösen kann.

69. Main bei Mainaschaff, Hässlein 1953, nur tote Stücke.

70. Main bei Kleinostheim, unterhalb der Staustufe, Hässlein 1953, nur tote Stücke.
71. Main bei Grosswelzheim, Hässlein 1953, nur tote Stücke.
72. Main bei Kahl, Hässlein 1953, nur tote Stücke.
So betrüblich es ist, es bleibt nur übrig festzustellen, dass die Mainstrecken um Obernburg und Aschaffenburg für *Unio tumidus* tote Zonen sind, in denen nur einzelne zähe alte Stücke sich noch fortquälen. Ein Nachwuchs ist nicht mehr vorhanden!
73. Tongrube bei Dettingen, Niederterrasse des Mains, Gaschott 1923, 2 Vorderendbruchstücke (M).
74. Main bei Frankfurt, C.R.Böttger 1907, 1908: sehr häufig vor der Regulierung und zur Schweinemast verwendet; Kobelt 1872, Fig.2: nicht selten eine kleine Form; Kobelt 1912.
75. Nidda-Altwasser bei Rödelheim. Kleine Strömungsform, var.aren./tenuis, F.Haas 1923, 2 Stücke (M).
L 71 H 34 D 24 mm
67 34 23

8. Unio pictorum deshayesi Mich.

Die Rheinrasse des *Unio pictorum* L. ist, wie die Art überhaupt, weitgehend an weichen Grund angepasst. Ihre Verbreitung geht daher längs des mittleren und unteren Mains nur wenig in die Nebenflüsse hinein. In der von harten Schichten ausgeräumten Mulde der Regnitzlinie dagegen ist sie weiter verbreitet und geht in Aisch, Rezat und einigen anderen Zuflüssen weit hinauf. Sie hat auch den Kanal in seiner ganzen Erstreckung besiedelt und sich in der Neumarkter Gegend mit der Donaurasse der gleichen Art getroffen.

Aus dem Diluvium von Mosbach bei Biebrich wird die Art von Sandberger 1875 gemeldet, Haas bringt Abbildungen dazu, Taf.14, Fig.6,7.

A. Ober-Main

1. Main bei Lichtenfels, Brückner 1926, var.aren./tenuis, leg.Brückner 1914, 2 Schalen (M).
L 88 H 35 D -- mm
67 29 --
2. Main bei Michelau, Brückner 1926, häufig.
3. Main zwischen Lichtenfels und Banz, Haas und Schwarz 1913, 12 St.
4. Main bei Reundorf. Vorherrschend ist eine langgestreckte var.arenicola mit flacher Schale und langquadratischem Umriss, die sich zur Schlammform aren./tenuis verlängern kann, weiter eine verkürzte Geröllform, die fast nicht von tumidus zu trennen ist und mittelständigen Wärbel hat, Modell 12.8.1921, 8 Stücke (M).
L 89 H 36 D 25 mm
84 41 27
77 37 26
5. Main bei Banz, 1 Schale der Geröllform, Modell 12.8.1921 (M).
L 69 H 33 D -- mm

6. Main bei Ebing, var. *typica* mit leichter Neigung zur Sandform durch flacheren Schalenbau, Farbe gelb, Modell 13.8.1921, 4 Stücke (M).
L 87 H 41 D 27 mm
65 29 19
55 26 17
7. Main bei Hallstadt, Haas und Schwarz 1913, 2 Stücke.
8. Main zwischen Hallstadt und Regnitzmündung, Haas und Schwarz 1913, 9 Stücke.
9. bei der Meschendorfer Brücke (Land Coburg), Brückner 1926.
10. Teich bei Schweighof, Brückner 1926.
11. Teich bei Neuensee, Brückner 1926.
12. Teich bei Schney, Brückner 1926.
13. Teich bei Tambach-Weitramsdorf, bis 129 mm lang, Brückner 1926
2 Schalen. L 108 H 49 D -- mm
106 44 --
14. Sulz, Study 1881.
15. Itz, Brückner 1926.
16. Baunach unterhalb Gemeinfeld, Sandberger 1885.

B. Regnitz

17. Rezat zwischen Ansbach und Neuses. Kleine var. *typica/tenuis* wie in der Aisch. Wirbelskulptur wie bei dieser vergrößert, viele re-curvirostre Stücke darunter, Hässlein 10.12.1930, 11 Stücke (M).
L 68 H 30 D 22 mm
67 28 19
62 26 19
18. Rezat oberhalb Georgensgmünd, 4 Stücke, Haas und Schwarz 1913, von ihm zur Donaiform gestellt.
19. Rednitz bei Reichelsdorf, Koch 1899.
20. Zenn bei Siegelsdorf, Lindinger 1905; Haas und Schwarz 1913, als Donaiform bezeichnet.
21. Aurach zwischen Frauenaarach und Ziegenbrunn, Haas und Schwarz 1913, zur Donauratione gestellt.
22. Aurach bei Erlangen, Lindinger 1905.
23. Untere Dechsendorfer Weiher bei Erlangen. Vereinzelt Riesensexemplare, Lindinger 1905.
24. Alt-Erlanger Weiher, Lindinger 1905.
25. "See bei Erlangen", Küster, *Unio et Hyria*, Taf. 24, Fig. 3.
26. Aisch bei Windsheim, Haas und Schwarz 1913, 7 Stücke.
27. Aisch bei Pahres, Kr. Neustadt. Fast var. *typica*, etwas länger gestreckt, Hässlein 1933, 1 Stück (M). L 80 H 33 D 23 mm
28. Steinach bei Gutenstetten, Kr. Neustadt-Aisch. Grosse var. *arenicola*, Hässlein 1933, 1 Stück (M). L 83 H 42 D 28 mm
29. Aisch, Flussbad Neustadt, kleine langgestreckte var. *tenuis/arenicola*, subfossil im Lehmboden, Hässlein 12.8.1926, 3 Stücke (M).
L 65 H 27 D 18 mm
62 27 --
63 25 --

30. Aisch bei Neustadt, Abfluss der Badeanstalt. Kleine langgestreckte var.tenuis/arenicola, Wirbel nicht erodiert, sondern mit langgestreckter Skulptur (Unio quinqueannulatus Küster, Unio et Hyria Taf.25, Fig.3,4); Haas und Schwarz 1913 meldet von hier 27 Stücke, abgebildet Taf.2, Fig.11, Taf.3, Fig.10. Er betrachtet die Aischform als Hybriden zur Donaurasse, eine Auffassung, die ich nicht teilen kann. Die Skulptur der Wirbel ist bei pictorum-Formen des Schlammes häufig erweitert, die Form ist eindeutig Bachform der Rheinrasse. Da auch die Rezatform zweifellos Rheinrasse ist, ist die Haas'sche Auffassung, die er noch 1940 aufrecht erhielt, hinfällig. Hässlein 12.8.1926, 7 Stücke (M).
L 71 H 29 D 20 mm
69 29 20
68 27 18
31. Aisch bei Schlammersdorf, lange, flache Sandform var.aren./tenuis Modell 17.8.1921, 4 Stücke (M).
L 85 H 35 D 24 mm
68 28 21
68 26 20
32. Rauhe Ebrach bei Pettstadt, Haas und Schwarz 1913, 8 Stücke.
33. Regnitz bei Erlangen, Rossmässler, Ikon.II,1839,Taf.45, Fig.599; Küster, Unio et Hyria, Taf.23, Fig.1,2, Taf.24, Fig.7; Koch 1899; Lindinger 1905; Haas und Schwarz 1913, 2 Stücke, von ihm als Hybriden bezeichnet.
34. Regnitz bei Vach, Sturm, Deutsche Fauna.
35. Regnitz bei Pettstadt, var.arenicola, Modell 17.8.1921, 1 Schale (M).
L 65 H 28 D -- mm
36. Untere Regnitz bei Bamberg, Küster 1852; Haas und Schwarz 1913, als Hybriden bezeichnet; Schedel 1886, 1 rechte Klappe der var. crassa, W.Michel 1917 (M).
L 81 H 34 D -- mm
(stimmt mit der Form der Haas'schen "Hybriden" überein).

C. Ludwigskanal

37. Zwischen Mündung und Erlangen, Haas und Schwarz 1913, 12 Stücke, Taf.3, Fig.8.
38. bei Strullendorf, 1 Schale eines jungen Stückes, Wirbelskulptur vorne strich- hinten punktförmig, Modell 17.8.1921.
39. bei Erlangen, Walser 1870; Lindinger 1905.
40. bei Kersbach, var.typica/arenicola mit parallelem Ober- und Unter- rand und flacher, dünner Schale, ähnlich den typischen Neckarfor- men. Im Alter wird der obere Teil des Vorderrandes weit nach vorne gezogen und die Schnabelspitze etwas herabgebogen. Auch var.crassa Modell 18.8.1921, 8 Stücke (M).
L 115 H 47 D 32 mm
111 52 34
99 39 27
41. bei Nürnberg, var.typica/tenuis, E.Pfeiffer, 1 Stück (M).
L 95 H 43 D 29 mm
42. bei Doos, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück.
43. bei Schwarzenbruck, flache Form, var.typica/arenicola, Vorderrand fast senkrecht abgestutzt, Modell 7.8.1921, 1 Stück (M).
L 80 H 35 D 23 mm
44. bei Pfeifferhütte, Haas und Schwarz 1913, 1 Stück, Form wie die vorige; Modell 7.8.1921, 1 Stück (M).
L 73 H 30 D 21 mm

45. bei Schwarzenbach, var.typica/aren., gelb, weitringig, die Area grün, Wirbel ganz leicht erodiert, Modell 7.8.1921, 2 Stücke (M).
L 81 H 34 D 24 mm
68 30 22
46. bei Ochsenbruck, Haas und Schwarz, 2 Stücke.
47. bei Rübleinshof, Haas und Schwarz 1913, 12 Stücke.
48. bei Burgthann, 3 Stücke, leg.E.v.Stromer, Mus.München
49. bei Rasch, ein kleineres Stück der Rheinrasse, daneben bereits Donaurasse, Modell 7.8.1921, 1 Stück (M). L 80 H 34 D 25 mm
50. bei Schleuse 66, Haas und Schwarz 1913, 3 Stücke.
51. bei Neumarkt, Haas und Schwarz 1913, 5 Stücke; Zwanziger 1938.
- D. Mittlerer Main (Maindreieck)
52. Main-Altwasser bei Viereth, var.typica bis arenicola. Im Museum München noch eine grössere Serie; Schneid 1920, 3 Stücke (M).
L 78 H 34 D 24 mm
77 32 23
75 32 23
53. Main-Altwasser gegenüber Stammheim (b.Schweinfurt), var.aren./crassa, typische Mainform, Stadler 1925, 3 Stücke (M).
L 84 H 37 D 26 mm
84 37 24
81 37 26
54. Main bei Schweinfurt, Schneider 1856 "namentlich schön im Winterhafen".
55. Main südlich Nordheim (Eschendorf), var.aren./crassa, Stadler 1925, 1 Stück (M). L 80 H 37 D 23 mm
56. Main-Altwasser bei Marktstef (I), sandiger Grund, var.typica, weitringig, im Alter mit leicht erodierten Wirbeln, Hässlein 1932, 9 Stücke (M). L 91 H 38 D 26 mm
89 37 26
79 33 24
57. Main-Altwasser bei Marktstef (II), schlammiger Grund, mehr zu var.tenuis neigend, weitringig, Wirbel mehr abgerieben, Epidermis fahlgelb, Hässlein 1932, 8 Stücke (M). L 99 H 43 D 27 mm
91 36 26
84 34 23
58. Main bei Ochsenfurt, Clessin 1880, häufig.
59. Main bei Heidingsfeld, var.arenicola, teilweise verkürzt, immer ziemlich stark abgeriebene Epidermis, Gaschott 1922, 3 Stücke (M).
L 88 H 38 D 28 mm
63 32 20
59 30 19
60. Main bei Würzburg, var.typica bis crassa, im Überschwemmungsgebiet oberhalb der oberen Brücke, Gaschott 1922; Andreas Modell 5.4.1920 5 Stücke (M). L 79 H 33 D 24 mm
67 28 20
58 26 19

E. Unterer Main

61. Saale, Sandberger 1885.

62. Untere Sinn, Sandberger 1885
63. Main oberhalb Lohr, var.typica/aren.bis crassa, z.T.mit erodierten Wirbeln, gelb bis dunkelbraun gefärbt, Stadler 10.4.1928 (M).
L 88 H 41 D 27 mm
79 36 25
79 36 22
64. Main zwischen Triefenstein und Markttheidenfeld, var.typica/aren. 1 Stück, Stadler 1925 (M). L 82 H 34 D 23 mm
65. Main bei Sendelbach-Lohr, var.crassa, 2 Schalen, Stadler 1925 (M). L 91 H 40 D -- mm
79 34 --
66. Tauber bei Dittigheim, Haas und Schwarz 1913, 3 Stücke.
67. Tauber bei Brombach, Haas und Schwarz 1913, 5 Stücke.
68. Tauber bei Gamberg, Haas und Schwarz 1913, 6 Stücke.
69. Tauber bei Wertheim, kleine var.tenuis/aren. Stadler 1925, 1 St. (M). L 42 H 18 D 16 mm
70. Main bei Miltenberg, var.arenicola, klein, weitringig, Zwiesele, 2 Stücke (M). L 65 H 30 D 21 mm
51 25 18
71. Main beim Haderäckerwald, Hässlein 1954, sehr häufig.
72. Main bei Fluss-km 108, sehr häufig, Hässlein 1954.
73. Main bei Fluss-km 107, Hässlein 1954, steiniger, ertrunkener Buhenteich, var.typica, sehr häufig. L 99 H 44 D 30 mm
74. Main bei Obernburg-Ort, Hässlein 1954, sehr häufig.
75. Main unterhalb Elsave-Mündung, Hässlein 1954, 1 Stück.
76. Main bei Sulzbach, Hässlein 1953, häufig.
Sandschlammige Mulde der Uferbank L 83 H 36 D 29 mm
Steinige Stelle der Uferbank 49 24 18
77. Main bei Nidernburg, Hässlein 1953, ertrunkener Buhenteich, häufig. L 84 H 40 D 31 mm
78. Main bei Obernau, rechts, Hässlein 1953, selten.
79. Main bei Obernau, links, Hässlein 1953, häufig.
Uferbank, schlammige Mulde, var.typ.T.1,F.1 L 89 H 41 D 29 mm
Uferbank, harter Sand, var.crassa, T1,F.4 62 31 22
Prallseite, Geröllpflaster, var.aren.T1,F.2,3 45 26 17
80. Main beim Turnerbad, Aschaffenburg, Hässlein 1953, selten.
81. Teich bei Aschaffenburg, K.Wehner 1905. Der Teich wurde bei der Regulierung zum Bahnbau verschüttet, var.crassa, Altwasserform, rotbraun mit leicht erodierten Wirbeln, 1 Stück (M).
L 99 H 37 D 29 mm
82. Main bei Aschaffenburg, K.Wehner 1921. Ausgebaggert beim Hafeneubau, var.typica über arenicola bis crassa, var.biol.arenicola am flachsten, 55 Stücke (M). L 101 H 41 D 29 mm
99 41 34
89 38 27
83. Main bei Mainaschaff, Hässlein 1953, nur tote Stücke.
84. Main bei Kleinostheim-Ort, Hässlein 1953, sehr selten.
85. Main bei Kleinostheim oberhalb der Staustufe, nur tote Stücke.

86. Main bei Kleinostheim unterhalb der Staustufe, sehr selten.
87. Main bei Grosswelzheim, sehr selten.
88. Main bei Kahl, schlammige Stelle der Uferbank, Müsslein 1953, sehr selten, var. *typica*. Taf. 2, Fig. 10. L 102 H 42 D 35 mm
89. Tongrube bei Dettingen-Main, Niederterrasse, 2 kräftige Schalen-vorderteile, Gaschott 1923 (M).
90. Gersprenz bei Babenhausen, Haas und Schwarz 1913.
91. Main bei Hanau, C. Pfeiffer 1825, Taf. 5, Fig. 8, als *U. rostratus*; Paulstich 1908, nicht selten.
92. Main bei Frankfurt. Kobelt 1912 führte von hier bei der Bearbeitung der Servain'schen Najaden folgende Formen an:
Unio limosus Nilss., Fig. 48, eine var. *aren./crassa*.
Unio rhynchetinus (Let.) Bourg., T. 12, Fig. 45, eine var. *aren./crassa*.
Unio rostratellus Bourg. Fig. 46, eine var. *typ./aren.* mit verkürztem Schnabel.
Unio rostratus, Fig. 47, eine var. *typica/tenuis*, spitzschnäblig.
93. Kinzig bei Hanau, Paulstich 1908.
94. Nidder bei Gronau, F. Haas, 2 Stücke (M).
95. Nidda bei Eschersheim, C. R. Böttger 1907.

Schriftenverzeichnis

- Böttger, C. R., Zur Fauna von Frankfurt a. M. - Nachr. bl. 39, 1907.
- Die Molluskenfauna des Maines bei Frankfurt, einst und jetzt. - Nachr. bl. 40, 1908.
- Brückner, A., Mollusken des Herzogtums Coburg. - 1. Ber. Tier- u. Pflanzen-schutzver. Herz. Cob. 1888.
- Die Tierwelt des Coburger Landes. Wirbeltiere. Weichtiere. Coburger Heimatkunde I, 3. Heft, Coburg 1926.
- Clessin, Stef., Beitrag zur Molluskenfauna von Unterfranken. - Malak. Bl. N. F. II, S. 138-150, 1880.
- Flach, K., Die Molluskenfauna Aschaffenburgs. - Verh. phys.-med. Ges., 19, Würzburg, 1885.
- Die Molluskenfauna von Aschaffenburg nebst Beiträgen zur Fauna des Spessarts. - ebenda, 19, Nr. 7, 1886.
- Gaschott, Otto, Die Strommolluskenfauna des Mains bei Würzburg. - Arch. f. Naturgesch. 88A, S. 67-68. 1922.
- Haas, F., Neue und wenig bekannte Lokalformen unserer Najaden. - Nachr. bl. 40, 1908.
- Die Najadenfauna des Oberrheins vom Diluvium bis zur Jetztzeit. - Diss. Heidelberg. Abh. Senck. Naturf. Ges. Frankfurt, 32, 1910.
- Neue und wenig bekannte Lokalformen unserer Najaden. Nachr. bl. 42. 1910.
- Die geographische Verbreitung der westdeutschen Najaden. - Verh. naturf. Ver. Rheinl. u. Westf. 68. 1911.
- und Schwarz, E., Die Unioniden des Gebietes zwischen Main und deutscher Donau in tiergeographischer und biologischer

- Hinsicht, Abh. Bay. Ak. Wiss. mth.-phys. Kl. 26, S. 1-34, Taf. 1-4, 1913.
- und Wenz, W., Tertiäre Vorfahren unserer lebenden Najaden.- Arch. Moll. kde 55, S. 116-117, Taf. 5. 1923.
- Hässlein, L., Zur Weichtierfauna des Aschaffener Mains.- Nachr. Naturw. Mus. Stadt Aschaffenburg, Heft 39, 1953, S. 1-43, 4 Taf.
- Zur Weichtierfauna des Obernburger Mains, ebenda, Heft 45, 1954, S. 29, 2 Taf.
- Held, Friedr., Die Wassermollusken Bayerns.- Jahresber. Kreislandw. Gewerbeschule München 1847.
- Hessling, Th. v., Die Perlenmuscheln und ihre Perlen. Leipzig 1859.
- Kobelt, Wilh., Fauna der nassauischen Mollusken.- Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk. 25/26, 1872, S. 1-286.
- Zur Erforschung der Najadenfauna des Rheingebiets.- Nachr. bl. 40, 1908.
- Rossmässler's Ikonographie der europäischen Land- und Süßwassermollusken, N. F. XVII, 1911.
- Servain, Die Najaden von Frankfurt a. M.- Ber. Offenbacher Ver. f. Naturk. 51/53, 1912, S. 75-115.
- Koch, L., Verzeichnis der bis jetzt in der Umgebung von Nürnberg beobachteten Mollusken.- Abh. naturhist. Ges. Nürnberg 12, 1899, 83-98.
- Küster, H. C., Martini-Chemnitz, Syst. Conch. Cab. IX, 1. Die Gattung Anodontina. S. 1-64, Taf. 1-17, 1838-42.
- ebenda. Die Flussperlmuscheln (Unio et Hyria), S. 1-318, Taf. 1-100. 1842-62.
- Die Binnenmollusken der Umgebung Bamberg's.- Ber. Nat. Ges. Bamberg I, S. 42-53. 1852.
- Levy, Friedr., Die Entwicklung des Rhein- und Maas-Systems seit dem jüngeren Tertiär.- Ber. naturf. Ges. Freiburg, 23, 1. H., 1921.
- Lindinger, L., Verzeichnis der in und um Erlangen beobachteten Mollusken.- Abh. Naturhist. Ver. Nürnberg, 15, S. 65-85. 1903.
- Modell, Hans, Beiträge zur Najadenforschung I. Zur Systematik unserer Najaden. II. Die Najaden, Viviparen und Neritinen Bayerns. III. Die Najaden des Ludwigs-Donau-Main-Kanals.- Arch. f. Naturg. 88, 1922, S. 156-183, 1922.
- Neue Wege der Najadenforschung.- Arch. Mollkde 56, S. 17-54, 1924.
- Die Anodontinae Ortm. Eine Studie über die Zusammenhänge von Klimazonen und Entwicklungsgeschichte. Jen. Ztschr. f. Med. u. Naturw. 78, 1945, S. 58-100, 27 Abb.
- Die Najaden der Bamberger Gegend. Naturf. Ges. Bamberg, 31. Ber., 1948, S. 129-132.
- Paulstich, D., Verzeichnis der im Kreise Hanau vorkommenden Schnecken und Muscheln.- Festschrift Wetterau. Ges. Naturk., 1903, S. 78-83.
- Pfeiffer, Carl, Naturgeschichte der deutschen Land- und Süßwassermollusken. 3 Bände, 1821-28.
- Pürkhauer, Die Binnenmollusken des Tauber-Grundes.- Ber. Naturf. Ges. Bamberg, 3, 1859, S. 69-73.
- Reck, Hans, Die morphologische Entwicklung der süddeutschen Schichtstu-

- fenlandschaft im Lichte der Davis'schen Cyklustheorie.-
Ztschr.Dtsch.Geol.Ges.64,1912.
- Sandberger,Frid., Die Conchylienfauna der Gegend von Würzburg.-
Würzb.Naturw.Zeitschr.8,S.38-48,1867.
- Über *Unio sinuatus* Lam. und seine archäologische
Rolle.- Malak.Bl.20,1873,S.95-99.
- Die Mollusken von Unterfranken diesseits des Spes-
sarts.-Verh.phys.-med.Ges.Würzburg,19,1885.
- Die Verbreitung der Mollusken in den einzelnen na-
türlichen Bezirken Unterfrankens.-ebenda,1885.
- Schedel,J., Verzeichnis der Land- und Süßwassermollusken Bambergs.-
Nachr.bl.18,S.129,1886.
- Schneider,Gustav, Die Binnenmollusken der Umgebung von Schweinfurt.-
Ber.Nat.Ges.Bamberg,3,1856.
- Schermer,Ernst, Einige Bemerkungen über den Einfluss der Trockenheit
des Sommers 1911 auf die Molluskenfauna.-Nachr.bl.44,
1912
- Servain,Georg, Histoire des Mollusques acéphales des environs de
Francfort,Poissy 1882,68S.
- Seidler,Aug., Über seither unbekannte Fundorte der Flussperlmuschel
im Spessart.-Arch.Mollkde 52,1920,S.142-143.
- Die Verbreitung der echten Flussperlmuschel im fränk.u.
hessischen Buntsandsteingebiete.-Ber.Wetterau.Ges.Nat.
1922,S.83-125.
- Stadler,Hans, Vorarbeiten zu einer Limnologie Unterfrankens.-Verh.In-
tern.Ver.Limnol.Innsbruck 1924,S.136-176.
- Einiges über die Tierwelt Unterfrankens II.-Arch.f.Na-
turgesch.90,A,S.169-203.
- Study,E., Verzeichnis der von mir in der Umgebung von Coburg und in
den angrenzenden Teilen des fränkischen Jura gefundenen
Mollusken.-Malak.Bl.,N.F.4,1881,S.31-42.
- Sturm,Jakob, Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Be-
schreibungen. 8Bde,1803-1809.
- Wenz,Wilh., Zur Nomenklatur tertiärer Land- und Süßwassergastropoden.
Senckenbergiana V,S.114-116,1923.
- Unsere Flussperlmuscheln in Vergangenheit und Gegenwart.
Natur und Volk,74,1944,S.155-167.
- Wittich,E., Beitrag zur Kenntnis der alt-alluvialen Fauna im Maintal.
Nachr.bl.35,1903.
- Diluviale Conchylienfaunen aus Rheinhessen.-Nachr.bl.34,
1902,S.122-130.
- Zwanziger,Georg, Mollusken von Neumarkt(Bayr.Ostmark).-Arch.f.Moll.
kde 71,1939,S.115-127.

Abbildungen

Tafel 1

Margaritifera margaritifera L. 1.Ziegenburger Bach b.Ziegenburg, 2.Weisser Main b.Kauerndorf, 3.Lübnitz oberh.Gefrees, 4.Ölschnitz oberh.Streitau, 5.Steinach b.Koburg, 6.Untere Jossa b.Jossa, 7.Lohr oberh.Waldschlossbrauerei Frammersbach.

Margaritifera auricularia Spengler 8.Bad Soden, Taunus (nach Wenz), Pseudanodonta complanata elongata Hol. 9.Kinzig b.Hanau-Bulauwald, 10-11.Main b.Reundorf, 12.Main ob.Lohr.

Anodonta anatina avonensis Mont. 13.Waldsachsener Bach, 14.Nidder b.Gronau, 15.Tambach b.Coburg.

Tafel 2

Anodonta anatina avonensis Mont. 1.Main-Altob.Hochstadt, 2.Main b.Michelau, 3.Sulz b.Neuses, 4.Roter Main b.Bodenmühle, 5.Main b.Ebing, 6.Bommersdorf b.Merkendorf, 7.Rezat zw.Ansbach u.Neuses, 8.Regnitz b.Pettstadt, 9.Mühlbach ob.Merkendorf, 10.Aisch b.Schlammersdorf, 11.Aisch b.Neustadt, 12.Regnitz b.Hirschaid, 13.Main-Altob.Viereth, 14.Main ob.d.Schweinfurter Stadtparkes, 15.Main ob.Lohr, 16.Main zw.Triefenstein u.Marktheidenfeld, 17-18.Tauber b.Creglingen, 19.Main b.Aschaffenburg.

Tafel 3

Anodonta anatina avonensis Mont. 1.Ludwigskanal b.Kersbach, 2.b.Rasch, 3.b.Schwarzenbach, 4.b.Strullendorf, 5.b.Richtheim, 7.b.Loderbach, 9.b.Berching.

Anodonta anatina attenuata Held 6.b.Dietfurt, 8.b.Buchberg.

Anodonta cygnea stagnalis Turt. 10.Main-Altob.Viereth, 11.Ludwigskanal b.Plankstetten, 12.Ludwigskanal b.Dietfurt, 13.Teich v.d.Weihersmühle b.Walpersdorf.

Tafel 4

Anodonta cygnea stagnalis Turt. 1.Main b.Unterwallerstadt, 2.Regnitz b.Bug, 3.Reichardsbrunn, 4.Coburg, 5.Main-Altob.Lohr,

Unio crassus nanus Lam. (=batavus Lam.) 6.Roter Main b.Bodenmühle, 7.Main b.Kemmern, 8.Main b.Michelau, 9.Main b.Ebing, 10-11.Main bei Reundorf, 12.Steinach b.Fürth am Berg, 13.Tambach b.Coburg, 14.Sulz b.Neuses, 15.Rezat zw.Ansbach u.Neuses, 16.Rezat b.Bechhofen, 17.Zandt bach b.Wattenbach, 18.Fischbach b.d.Weidenmühle, 19.Püttlach b.

d. Behringersmühle, 20. Zenn b. Siegeldorf, 21. Goldbach b. d. Hölzleinsmühle.

Tafel 5

Unio crassus nanus Lam. 1. Gründlach b. d. Königsmühle, 2. Schwarzach b. Oberölsbach, 3. Neustadt-Aisch, subfossil, 4. Abzugsgraben d. Mühle b. Pahres, 5. Aisch b. Pahres, 6. Aisch b. Schlammersdorf, 7. Engleinsgraben b. Reinhardshofen, 8. Regnitz b. Pettstadt, 9. Unt. Regnitz b. Bamberg, 10. Tauber b. Mergentheim, 11. Tauber b. Archshofen, 12. Pleichach b. Rimpf, 13. Main zw. Triefenstein u. Marktheidenfeld, 14. Main-Altw. gegenüber Stammheim, 15. Main b. Aschaffenburg, 16. Main b. Miltenberg.

Unio tumidus depressus Don. 17. Main b. Hochstadt, 18. Main b. Michelau, 19. Main b. Schwürbitz, 20. Main b. Unterwallerstadt, 21. Main b. Lichtenfels, 22. Main b. Reudorf, 23. Tambach b. Coburg, 24. Main-Altw. b. Hochstadt, 25. Aisch b. Schlammersdorf, 26. Neustadt-Aisch, subfossil, 27. Regnitz b. Pettstadt, 28. Regnitz b. Bamberg, 29. Main b. Schwürbitz, 30. Nidder b. Gronau.

Tafel 6

Unio tumidus depressus Don. 1-2. Ludwigskanal b. Kersbach, 3-4. b. Oberölsbach, 5. b. Richtheim, 6. b. Rasch, 7. b. Fürth, 8. b. Kettenbach, 9. bei Strullendorf, 10. Main-Altw. b. Viereth, 11. Main-Altw. geg. Stammheim, 12. Main zw. Triefenstein u. Marktheidenfeld, 13. Main südlich Nordheim, 14. Main b. Ochsenfurt, 15. Main b. Aschaffenburg.

Unio pictorum deshayesi Mich. 16. Main b. Lichtenfels, 17-18. Main bei Reudorf, 19. Main b. Ebing, 20. Tambach b. Coburg, 21. Regnitz b. Pettstadt.

Tafel 7

Unio pictorum deshayesi Mich. 1. Aisch b. Schlammersdorf, 2. Aisch bei Pahres, 3. Aisch b. Neustadt, 4. Steinach b. Gutenstetten, 5. Neustadt, subfossil, 6. Unt. Regnitz b. Bamberg, 7. Tauber b. Mergentheim, 8. Rezat zw. Ansbach u. Neuses, 9. Main-Altw. geg. Stammheim, 10. Main b. Nordheim, 11. Main-Altw. b. Viereth, 12. Main b. Heidingsfeld, 13. Nidder b. Gronau, 14. Main b. Würzburg, 15. Main zw. Triefenstein u. Marktheidenfeld, 16. Main b. Sendelbach-Löhr, 17. Main-Altw. b. Marktsteft I, 18. ebenda II, 19. Main b. Aschaffenburg, 20. Main b. Miltenberg, 21. Ludwigskanal bei Rasch, 22. b. Peifferhütte, 23. b. Kersbach, 24. b. Schwarzenbruck, 25. bei Nürnberg, 26. bei Schwarzenbach.

Tafel 1

Tafel 2

Tafel 3

Tafel 4

Tafel 5

Tafel 6

Tafel 7

+ *Marg. auricularia* Spgr.

● *margaritifera* L.

○ *Pseudanodonta complanata* Rossm.

○ *Anodonta anatina* L.

● *var. rostrata* Heid

○ *Anodonta cellensis* Omel.

● *Unio crassus* Retz.

▲ *Unio tumidus* Retz

● *Unio pictorum* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft
Augsburg](#)

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: [019 1966](#)

Autor(en)/Author(s): Modell Hans

Artikel/Article: [Die Najaden des Main-Gebietes. 1-51](#)