

BERICHTE DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT DER OBERLAUSITZ

Band 17

Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 17: 99–114 (Görlitz 2009)

ISSN 0941-0627

Manuskriptannahme am 30. 3. 2009
Erschienen am 20. 8. 2009

Floristische Beobachtungen 2008 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von HANS-WERNER OTTO, PETRA GEBAUER
und HANS-JÜRGEN HARDTKE

(Bearbeitung der *Taraxacum*-Arten von INGO UHLEMANN)

Mit 5 Abbildungen

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung floristischer Beobachtungen im Jahre 2008 in Oberlausitz und Elbhügelland enthält:

1. Erstnachweise von *Eragrostis multicaulis*, *Galega orientalis*, *Geranium rotundifolium*, *Hieracium rothianum*, *Taraxacum aberrans*, *Taraxacum stenoglossum* und *Taraxacum urbicola*.
2. Abbildungen von *Taraxacum deltoidifrons*, *T. stenoglossum* und *T. urbicola*.
3. Neue Fundorte bzw. Fundortbestätigungen zahlreicher weiterer einheimischer und adventiver Arten, von denen *Carex buekii*, *Ceratocarpus claviculata*, *Chenopodium opulifolium*, *Erysimum cuspidatum*, *Galium boreale*, *Linnaea borealis*, *Oenothera deflexa*, *Oenothera flaemingina*, *Oenothera mediomarchica*, *Oenothera roxfraseri*, *Platanthera chlorantha*, *Rubus kulescae*, *Rubus sciocharis* und *Sisymbrium irio* besonders bemerkenswert sind.

Vorbemerkungen

Nachdem die AG Sächsischer Botaniker 2008 beschlossen hat, in der geplanten Neuauflage vom WÜNSCHE-SCHORLER (Die Pflanzen Sachsens) bemerkenswerte Fundorte den Naturräumen nach der neuen Naturraumkarte von Sachsen (HAASE & Mannsfeld 2002) zuzuordnen, geschieht dies von nun an im wesentlichen auch mit den hier veröffentlichten Funden. Dabei bedeuten

ČBL: Nordböhmen (im Bereich der topografischen Karten 1:25000 von 4951, 4952, 5051–5053, 5150–5153, 5250),

ELH: Elbhügelland (nur eigentliches Elbtal von Pirna bis Meißen – ohne Nebentäler)

ESG: Elbsandsteingebirge (inkl. Cottaer Spitzberg)

ERO: Osterzgebirge (einschließlich Östliches Erzgebirgsvorland)

GHP: Großenhainer Pflege

MLH: Mulde- und Mittelsächsisches Lößhügelland

OLT: Oberlausitzer Tiefland (Königsbrück-Ruhlander Heiden, Oberlausitzer Bergbaurevier, Lausitzer Grenzwall, Muskauer Heide, Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet)

OLH: Oberlausitzer Hügelland (Westlausitzer Hügel- und Bergland, Oberlausitzer Gefilde, Östliche Oberlausitz)

OLB: Oberlausitzer Bergland (einschließlich Zittauer Gebirge)

POL: Polnische Oberlausitz

Es ist zu beachten, dass nun nicht alle mit OL gekennzeichneten Fundorte innerhalb der historischen West- und Südwestgrenze der Oberlausitz liegen.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in Sachsen (jeweils nach dem Artnamen in Fettdruck) nach SCHULZ (1999): 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potentiell gefährdet, R = extrem selten, V = Vorwarnliste.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen nach JÄGER & WERNER (2005).

Beobachter: A. Alexowski (Freiberg), A. Beck (Struppen, OT Naundorf), B. Böhme (Dippoldiswalde), Dr. S. Bräutigam (Görlitz), Dr. A. Doege (Triebischtal, OT Miltitz), V. Dittmann (Doberschütz OT Sprotta), R. Franke (Görlitz), M. Friese (Oberförstchen), P. Gebauer (Dürrbach), Dr. P. Gutte (Markkleeberg), S. Fröhner (Dresden), R. Goldberg (Greifswald), A. Hager (Königswartha), St. Hahn (z. Z. Chile), Prof. Dr. H.-J. Hardtke (Possendorf), Dr. H. Jage (Kemberg), W. Jansen (Itzehoe), N. Langner (Königswartha), M. Menzel (Niesky), B. Müller (Dresden), Dr. F. Müller (Dresden), S. Müller (Bretnig), H.-W. Otto (Bischofswerda), M. Pfeifer, (Herrnhut), ? Reich (Dresden?), W. Reißmann (Dresden), Prof. Dr. K. Rostański (Katowice/ Polen), Dr. F. Sander (Schöpstal, OT Ebersbach), K. Sbrzesny (Zittau), Ch. Schluckwerder (Löbau), R. Schröder (Dresden), D. Schulz (Freiberg), A. Schurig (Zittau), M. Siegel (Dresden), W. Schweigler (Meißen), H. Thomaschke (Ottendorf-Okrilla), D. Töppich (Ullersdorf), Dr. I. Uhlemann (Liebenau), A. Wünsche (Görlitz).

Einheimische (Indigene und Archäophyten)

Abies alba MILL. – Weiß-Tanne **1**

OLB 4952/24 Bautzen SSO: Wurbis, südlich des Ortes im Wald westlich der Wurbiskurve (Goldberg).

Aira caryophyllea L. – Nelken-Haferschmiele **2**

MLH 4746/43 Meißen NNW: Nieschütz, Golkwaldabhang, Felsdurchragung am Weinberg, vereinzelt (Doege).

Aira praecox L. – Frühe Haferschmiele **V**

GHP 4746/44 Meißen NNW: Golkwald, Waldkante zwischen Naundörfel und Teichgrund, vereinzelt (Doege, confirm. F. Müller).

Alchemilla micans BUSER – Zierlicher Frauenmantel

MLH 4746/34 Meißen NNW: Widderbachtal von Eckardsberg aus, vereinzelt (Doege, det. D. Schulz).

Alchemilla propinqua H. LINDB. ex JUZ – Verwandter Frauenmantel

ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg, nordöstlich vom Großen Galgenteich (Fröhner).
Selten im Osterzgebirge.

Alchemilla reniformis BUSER – Nierenblättriger Frauenmantel

ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg, Ufer Großer Galgenteich (Fröhner).
Seit 40 Jahren erstmals wieder im Osterzgebirge nachgewiesen.

Alchemilla subglobosa C. G. WESTERL. – Kugel-Frauenmantel

ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg, Großer Galgenteich (Fröhner).
ERO 5248/23 Dippoldiswalde SSO: Altenberg, Stadtgebiet (Fröhner).

Allium ursinum L. – Bär-Lauch **V**

OLH 4855/42 Görlitz, 10 Exemplare am Neißeufer an der Obermühle (Wünsche).

Alopecurus myosuroides HUDS. – Acker-Fuchsschwanzgras **2**

MLH 4745/42 Riesa S: Getreidefeld an der Straße nach Pahrenz, kleiner Bestand (Doege).

MLH 4746/33 Riesa S: Wölkisch, Ochsenstraße, Acker mit *Phaseolus vulgaris*, vereinzelt (Doege).

MLH 4946/23 Dresden W: Getreidefeld an der alten Autobahntrasse am Tanneberger Loch, kleiner Bestand (Doege).

Anemone ranunculoides L. – Gelbes Windröschen **V**

GHP 4746/44 Meißen N: Gosebach, Winzerwiese, vereinzelt (Doege).

MLH 4746/43 Meißen NNW: Nieschützbach, zwischen Neumühle und Nieschütz, ca. 30 Exemplare (Doege).

Anthemis arvensis L. – Acker-Hundskamille

GHP 4746/44 Meißen N: Ackerrand am Weg von Naundörfel nach Kmehlen, vereinzelt (Doege, confirm. D. Schulz).

Anthemis tinctoria L. – Färber-Hundskamille 3

ESG 5150/13 Pirna SSW: Tongrube Raum (Hardtke).

ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg WSW, Grabenrand oberhalb der Rehefelder Straße in Nähe der Raupennest-Klinik, mehrere kleine Trupps (Otto).

Arnica montana L. – Arnika, Berg-Wohlverleih 2

OLT 4752/24 Bautzen NNO: Brehmen, Wacholderwiese, 2008 nur 1 Pflanze angetroffen (Hager).

Blechnum spicant (L.) ROTH – Rippenfarn 3

ERO 5048/33 Dippoldiswalde NNO: Dippoldiswalder Heide, Flügel F und Leingrund (Böhme).

Botrychium matricariifolium (RETZ.) A. BRAUN ex W. D. J. KOCH – Ästiger Rautenfarn 1

OLT 4552/12 Hoyerswerda NO: 1,2 km sw Spreewitz, zwischen den Bahnstrecken auf einer Waldschneise parallel zur Straße, >100 Explare, teilweise noch im angrenzenden Kiefernforst unter *Padus serotina*, zusammen mit ca. 20 Exemplaren *Botrychium lunaria* (Beck).

Butomus umbellatus L. – Schwänenblume 3

ELH 4948/41 Dresden-Gruna, Koitschgraben (B. Müller).

Bromus secalinus L. – Roggen-Trespe 1

OLH 4851/42 Bautzen SW: Günthersdorf b. Gaußig, Straßenrand, wenige Exemplare (Otto, det. Gutte).

Campanula persicifolia L. – Pfirsichblättrige Glockenblume

OLH 5154/21 Zittau SW: Althalde Olbersdorf (Sbrzesny u. Schurig).

Carex bohémica SCHREB. – Zypergras-Segge 3

OLH 4954/44 Zittau N: Großhennersdorf, Großer Teich (Schurig).

Carex buekii WIMM. – Banater Segge 1

ELH 4949/33 Dresden-Laubegast, Graben vor Mündung in Lockwitzbach (Fröhner).

Carex caryophyllea LATOURR. – Frühlings-Segge 2

GHP 4746/42 Meißen N: Blatterslebener Grund, Südhänge, mäßig häufig (Doege).

MLH 4746/43 Meißen NNW: Nieschütz, Golkwaldabhang an der Teichstraße, mäßig häufig (Doege).

Carex digitata L. – Finger-Segge 3

ELH 4847/21 Meißen NO: Oberau, nahe Buschmühle (Hardtke).

ERO 5048/41 Dippoldiswalde ONO: Lungkwitz, Buchenwald am rechten Lockwitzhang (Hardtke).

Carex flava L. s. str. – Gewöhnliche Gelb-Segge 2

OLH 5055/14 Zittau NO: Rosenthal, Quellsumpf am Kemnitzbach, wenige Exemplare (Wünsche – GLM).

Carex hartmanii CAJANDER – Hartman-Segge 2

OLH 4853/31 Bautzen SO: Meschwitz S, Feuchtwiese, 3 blühende Exemplare (2004 Sbrzesny).

OLH 4853/32 Bautzen SO: Hochkirch S, Malinawiese, mehrere Horste (2004 Sbrzesny).

Carex otrubae PODB. – Falsche Fuchs-Segge 3

GHP 4746/41 Meißen NNW: Döschütz, Teich am Ortsausgang Richtung Seußlitz, vereinzelt (Doege).

Carex paniculata L. – Rispen-Segge **V**
OLB 4953/11 Bautzen SO: Cunewalde, Ufer am Teich westlich Zieglertal (Goldberg).
Fundortbestätigung (Th. Schütze 1946).

Carex pendula HUDS. – Hänge-Segge **3**
ESG 5051/13 Pirna OSO: Krippen, Quellaustritt an der Eisenbahn (Fröhner).

Carex pseudobrizoides CLAVAUD – Reichenbach-Segge **3**
OLT 4654/33 Niesky W: Mücka NW, Wegränder südlich der Bahnlinie (Gebauer).
OLH 4849/24 Radeberg NO: Leppersdorf, Waldrand südlich Autobahn (S. Müller).

Carex vulpina L. – Fuchs-Segge **3**
MLH 4746/31 Riesa S: Wölkisch, Feuchtwiese am Wölkischen Wiesenbach an der Straße nach
Oberlommatsch, mäßig häufig (Doege, det. F. Müller).
OLH 4955/41 Görlitz S: Leuba, feuchte Senke im Höhenrücken am Hofeberg, > 100 Exemplare
(Wünsche).

Centaurea scabiosa L. – Skabiosen-Flockenblume **3**
OLH 4855/24 Görlitz, mehrfach in mageren Rasen in Görlitz-Königshufen, vermutlich aus
Einsaat (Wünsche).
OLH 4955/21 Görlitz SSW: Berzdorfer See, Halde im NSG „Rutschung P“, einzelne Exemplare
in Böschung (Wünsche).

Chenopodium opulifolium SCHRAD. ex W. D. J. KOCH et ZIZ – Schneeballblättriger Gänsefuß **2**
ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg (Fröhner).

Chondrilla juncea L. – Großer Knorpellattich **3**
MLH 4846/11 Riesa S: Wachnitz, Abzweig Straße nach Großkagen, vereinzelt (Doege).

Conium maculatum L. – Gefleckter Schierling
OLH 4951/11 Bischofswerda SO: Putzkau, im ehemaligen Sandgrubengelände an der neuen
Straße Putzkau–Neustadt/Sa. (Otto).

Corydalis intermedia (L.) MÉRAT – Mittlerer Lerchensporn **V**
GHP 4746/41 Meißen NNW: Seußlitzer Grund, am Fischloch, mäßig häufig (Doege).
ESG 5050/21 Pirna ONO Hohnstein, Schindergraben, im Laubwald unterhalb der Burg
Hohnstein (F. Müller).

Corydalis solida (L.) Clairv. – Gefingertes Lerchensporn **3**
OLT 4655/42 Rothenburg, Park, auf ca. 10 m², verwildert? (Menzel).

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. *epithymum* – Gewöhnliche Quendel-Seide **1**
OLT 4752/24 Bautzen NNO: Brehmen, Wacholderwiese, großflächig auf *Betonica officinalis*
(2007 Hager).

Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ – Fuchs-Fingerknabenkraut **2**
OLT 4752/24 Bautzen NNO: Brehmen, Wacholderwiese (Hager).

Dentaria bulbifera L. – Zwiebel-Zahnwurz **2**
ELH 4948/41 Dresden, Großer Garten (Fröhner). Ob aus dem Botanischen Garten verschleppt?

Dianthus armeria L. – Raue Nelke **3**
OLH 5154/22 Zittau, Mandaudamm am Külzufer zwischen Oybiner und Hochwaldstraße, mehr
als 200 Exemplare (2007 Sbrzesny).

Epipactis purpurata SM. – Violette Stendelwurz, Violette Sitter **1**
OLH 5054/34 Zittau W: Mittelherwigsdorf, Scheibeberg, (Schurig, Wünsche).

Equisetum hyemale L. – Winter-Schachtelhalm **2**
OLT 4652/12 Hoyerswerda SO: Lohsa, Teichanlage, 6–8 m² (2007 Hager).

Equisetum pratense EHRH. – Wiesen-Schachtelhalm **3**
GHP 4746/41 Meißen NNW: Seußlitzer Grund, Feuchtwiesen zwischen Forellen- und
Mühlteich, mäßig häufig (Doege, Schulz).

- Festuca filiformis* POURR. – Haar-Schwengel
OLT 4752/44 Bautzen NO: Niedergurig O, Teichdamm (Jage).
- Filago minima* (SM.) PERS. – Zwerg-Filzkraut **V**
OLH 5154/21 Zittau SW: Althalde Olbersdorf, Wegrund (Schurig).
- F. officinalis* subsp. *wirtgenii* (W. D. J. KOCH) ARCANG. – Wirtgens Erdrauch
OLH 4852/23 Bautzen O, Schuttablagerung (Friese, confirm Gutte).
- Fumaria rostellata* KNAF – Geschnäbelter Erdrauch
ELH 4847/44 Dresden-Radebeul, Weintraube (B. Müller).
- Gagea villosa* (M. BIEB.) SWEET – Acker-Goldstern **2**
GHP 474642 Meißen N: Blattersleben, Trockenmauer unterhalb des Ortes, vereinzelt (Doege).
- Galium boreale* L. – Nordisches Labkraut **2**
ELH 4949/33 Dresden-Kleinzschachwitz, Elbwiesen, zwischen *Galium album* (Fröhner).
- Galium rotundifolium* L. – Rundblatt-Labkraut **2**
OL 5154/12 Zittau WSW: Großschönau O, Breiteberg, zerstreut in mit Laubholz durchsetzten Fichtenbeständen an der Ostseite des Berges (Wünsche).
- Helichrysum arenarium* (L.) MOENCH – Sand-Strohblume **V**
OLH 4849/11 Radeberg NW: Ottendorf-Okrilla, Sandgrube (Thomaschke).
OLH 4855/24 Görlitz-Königshufen, trockener Grünstreifen am Ziegeleiweg, ein Exemplar (Wünsche).
OLH 4855/33 Görlitz SW: Friedersdorf, Einschnitt an der Straße nach Gersdorf (Bräutigam).
OLB 4952/22 Bautzen SO: Weigsdorf-Köblitz, Sandgrube an der Wurbisstraße (Goldberg).
OLH 4955/21 Görlitz SSW: Berzdorfer See, Halde im NSG „Rutschung P“, zerstreut in Graseinsaat in Böschung (Wünsche).
OLH 4955/41 Görlitz S: Leuba, Hofeberg, 1 Horst in Wiesenböschung (Wünsche).
- Hieracium glomeratum* FROEL. – Geknäueltköpfiges Habichtskraut
OLT 4756/31 Görlitz N: Zodel NO, an der Neiße (Bräutigam)
ESG 5052/31 Sebnitz SO: Hinterhermsdorf, Ortseingang (Bräutigam)
- Hieracium peleterianum* MERAT – Peletier-Habichtskraut **0a**
GHP 4746/32 Meißen NW: Diesbar, Göhrisch (Dittmann 2007, confirm. Bräutigam).
- Hieracium piloselloides* subsp. *praealtum* (VILL) NÄGELI & PETER – Florentiner Habichtskraut
OLT 4756/31 Görlitz N: Zodel NO, an der Neiße (Bräutigam).
- Hieracium rothianum* WALLR. – Roth-Habichtskraut **1**
OLH 4852/41 Bautzen S: Singwitz, ehemaliges Bahnhofsgelände (Friese, det. Bräutigam).
Erstnachweis für die Oberlausitz, 2. Nachweis für Sachsen.
- Hypericum hirsutum* L. – Behaartes Hartheu **3**
ELH 4947/24 Dresden, Zschonergrund, Felshang am rechten Talhang ca. 500 m unterhalb der Zschoner-Mühle. (F. Müller). Fundortbestätigung.
- Illecebrum verticillatum* L. – Quirliges Knorpelkraut **2**
OLH 4849/11 Radeberg NW: Ottendorf-Okrilla, Sandgrube (Thomaschke).
Wiederfund nach 30 Jahren auf dem Messtischblatt Radeberg.
- Inula conyzae* (GRIESS.) MEIKLE – Dürrwurz-Alant **V**
OLH 5055/14 Zittau NO: Ostritz, Neißetal, trockene Felsrippe mit lockerer Bestockung auf südexponiertem Hang (Wünsche). Fundortbestätigung (Glott 1960 – GLM).
- Inula salicina* L. – Weidenblättriger Alant **2**
ELH 4947/24 Dresden: Zschonergrund, Laubwald am rechten Talhang ca. 300 m unterhalb der Zschoner-Mühle (F. Müller). Fundortbestätigung.
- Juniperus communis* L. – Gewöhnlicher Wacholder **2**
OLB 4853/33 Bautzen SO: Cunewalde, Gehölz am Teich östlich Klipphausen (Goldberg).

Kickxia elatine (L.) DUMORT. – Spießblättriges Tännelkraut **1**
ESG 5050/14 Pirna O: linkselbisch am Elbufer bei Pötzscha (Stadt Wehlen), 1 kräftige Pflanze
am trockengefallenen, sandigen Uferstreifen (Beck).

Koeleria macrantha (LEDEB.) SCHULT. – Zierliches Schillergras **3**
GHP 4746/42 Meißen N: Blatterslebener Grund von Blattersleben aus, rechter Hang, mäßig
häufig (Doege, Schulz).
GHP 4746/44 Meißen NNW: Golkwald, Waldkante zwischen Naundörfel und Teichgrund,
vereinzelt (Doege).

Leontodon autumnalis L. subsp. *pratensis* (LINK) ARCANG. – Herbst-Löwenzahn
OLT 4753/14 Bautzen NO: Guttau (Friese, det. Bräutigam).

Linnaea borealis L. – Moosglöckchen **2**
OLT 4553/22 Weißwasser, Weißkeibelweg (Schröder). Standort ist durch *Prunus serotinus* ge-
fährdet.

Luzula pallidula KIRSCHNER – Bleiche Hainsimse **2**
OLT 4452/42 Weißwasser NW: Schleife NW, Kiefernforst n der Bahnlinie Weißwasser-
Spremberg (Gebauer).
OLT 4755/34 Niesky SO: Ober-Rengersdorf WSW, lichter Wald am Ostrand des Teiches (2003
Sander, det. Bräutigam 2004).

Lycopodiella inundata (L.) HOLUB – Gewöhnlicher Moorbärlapp **1**
OLT 4652/42 Bautzen NNO: Milkeler Moor, Teilfläche im Nordosten, spärlich in
Zwischenmoorbereichen (F. Müller).
OLT 4654/12 ehemals Viereichen b. Rietschen, Feuchtsenke in Sandgrube südlich Lindfeld,
Massenvorkommen (Franke).
OLT 4654/33 Mücka W: Zwischenmoor an den kleinen Teichen im Nordteil der Malschwitzer
Heide noch südlich der Eisenbahnlinie (F. Müller).

Lycopodium annotinum L. – Sprossender Bärlapp **2**
OLH 4752/23 Bautzen N: Luttowitz, wechselfeuchter Eichen-Birkenbestand, 10 m² (Wünsche).

Mentha ×villosonevata OPIZ [*M. longifolia* × *M. spicata*] – Gezähnte Minze
OLH 4852/12 Bautzen WNW: Salzenforst (2003 Friese, det. Gutte).

Menyanthes trifoliata L. – Fieberklee **3**
OLH 4953/21 Löbau SW: Lawalde N, Wiese an der Litte, 6 blühende Exemplare (2006
Sbrzesny).

Misopates orontium (L.) RAF. – Feldlöwenmaul **2**
ERO 5048/14 Dresden S: Possendorf, Spitzberg (Alexowski). Seit Jahrzehnten wieder ein Nach-
weis auf dem Messtischblatt!

Monotropa hypopitys L. – Echter Fichtenspargel **2**
OLT 4754/21 Niesky SW: Wolfsberg 0,5 km SW, ein Exemplar (Menzel).
OLH 5054/23 Zittau N: Niederoderwitz NO, Königsholz, Buchenbestand am Nordhang des
Sonnenhübels (Wünsche). Fundortbestätigung (Passig 1975 – GLM).
OLH 5154/11 Zittau SW: Bertsdorf, Breiteberg, Hasel-Eichenwald, wenige Exemplare
(Wünsche).

Odontites vernus (BELLARDI) DUMORT. – Acker-Zahnrost, Frühlings-Z. **3**
OLH 4955/14 Görlitz SSW: Schönau-Berzdorf, Massenbestände an Waldwegen auf der Kippe
Berzdorf (Wünsche).

Oenanthe aquatica (L.) POIR. – Wasser-Pferdesaat, Wasserfenchel
OLH 4954/44 Zittau N: Großhennersdorf, Großer Teich (Schurig).

Oenothera acutifolia ROSTA...SKI – Spitzblättrige Nachtkerze
OLH 4951/11 Bischofswerda SO: Putzkau SW, Erd- und Bauschuttablagerung in ehemaliger
Sandgrube (Otto, det. ROSTA...SKI U. GUTTE).

- Oenothera parviflora* L. – Kleinblütige Nachtkerze
OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Medewitz (2007 Friese, det. Gutte u. Rostański).
- Oenothera royfraseri* GATES – Royfraser-Nachtkerze
ESG 4949/34 Pirna NW: Graupa, Brache an der Richard-Wagner-Straße (2002 Ihl, det. Rostański). Erstnachweis für das Elbhügelland.
- Parietaria officinalis* L. – Aufrechtes Glaskraut **2**
MLH 4746/41 Meißen NNW: Diesbar, Beginn des Wanderweges nach Löbsal und Radewitz. kleiner Bestand (Doege).
- Peplis portula* L. – Sumpfqüendel **3**
OLH 4955/34 Zittau NO: Ostritz, zerstreut in Fahrspuren feuchter Waldwege im Klosterwald (Wünsche).
OLH 5054/22 Zittau N: Großhennersdorf, Oberwald bei Heuscheune, zerstreut in Fahrspur auf Waldweg (Wünsche).
OLH 5054/23 Zittau NW: Mittelherwigsdorf, Kohlige, zerstreut in feuchten, staunassen Waldwegesenken (Wünsche).
- Petrorhagia prolifera* (L.) P. W. BALL & HEYWOOD – Sprossendes Nelkenköpfchen **2**
OLT 4551/43 Hoyerswerda S: Ehemalige Spargelfelder zwischen Spohla und Zeißig, in Ausbreitung (seit 2006 beobachtet, Hager).
OLH 5053/22 Zittau NW: Neugersdorf, ehem. Deponie an der Neueibauer Straße, 2007 mehr als 1000 Exemplare, 2008 mehrere Hundert Exemplare (Sbrzesny).
- Phleum bertolinii* DC. – Knolliges Lieschgras
OLT 4555/34 Niesky NNO: NSG Niederspree, Wegrand am westlichen Rand des Waldteiches, etwa in der Mitte des Westufers des Teiches (Sander).
OLB 5053/44 Zittau NW: FND Großer Stein bei Spitzkunnersdorf, steiniger Rasen am südlichen Hangfuß (Sander).
- Platanthera chlorantha* (CUSTER) RCHB. – Grünliche Waldhyazinthe **1**
OLB 5154/32 Zittau SW: Oybin OT Hain, (2007 u. 2008 Sbrzesny u. Schurig).
- Poa bulbosa* L. – Zwiebel-Rispengras **3**
OLH 4855/24 Görlitz, Rand des Stadtparkes, Ecke Joliot-Curie-Str./Schützenweg, am Fußgängerweg unter Bäumen (Sander).
- Potentilla recta* L. – Hohes Fingerkraut **3**
OLH 4755/32 Niesky SSO: zwischen Rengersdorf und Wiesa, zahlreich in angesäter Wiese (Bräutigam).
- Potentilla sterilis* (L.) GARCKE – Erdbeer-Fingerkraut **2**
ELH 4948/41 Dresden, Ostteil vom Großen Garten, in Wiesen und an Waldsäumen südlich der Querallee (F. Müller).
- Potentilla supina* L. – Niedriges Fingerkraut **3**
OLH 4951/11 Bischofswerda SO: Putzkau, mehrfach in ehemaligem Sandgrubengelände an der neuen Straße Putzkau–Neustadt/Sa. (Otto).
- Primula veris* L. – Wiesen-Schlüsselblume, Wiesen-Primel **3**
MLH 4846/11 Meißen NW: Daubnitz, Streuobstwiese westl. der Straße zur Straße Zehren–Lommatzsch, ca. 10 Exemplare (Doege).
- Ranunculus trichophyllos* CHAIX – Haarblättriger Wasserhahnenfuß
OLH 4949/14 Dresden-Weißen, FND Prießnitzteiche (Töppich).
Zweiter aktueller Fund auf dem Messtischblatt 4949.
- Rorippa ×armoracioides* (TAUSCH) FUSS [*R. austriaca* × *R. sylvestris*]
OLB 4953/13 Löbau SW: Oppach W, Teichufer (Friese, det. Gutte).
- Rubus fasciculatus* P. J. MÜLL. – Büschelblütige Haselblattbrombeere
OLH 4852/11 Bautzen W: Bloaschütz, Straßenrand (2007 Friese, det. Jansen 2008).

Rubus gothicus FRID. & GELERT ex E. H. L. KRAUSE – Gotische Haselblattbrombeere
MLH 4746/43 Meißen NNW: Kleinzadel, Gebüschkante der Steinbrüche am Heimatmuseum,
vereinzelt (Doege, confirm. M. Ranft).

Rubus kulescae ZIELINSKI – Kulesca-Haselblattbrombeere **R**
OLH 4851/12 Bischofswerda NNO: Taschendorf, Gebüsch an der Einmündung vom Sandweg in
die zwischen Taschendorf und Schönbrunn verlaufende Straße (2007 Sander, det.
2008 Sander).

Rubus laciniatus WILLD. – Schlitzblättrige Brombeere
GHP 4746/44 Meißen N: Wäldchen zwischen Naundörfel und Kmehlen an der B101, vereinzelt
(Doege).

Rubus montanus LIB. ex LEJ. – Mittelgebirgs-Brombeere
OLH 4851/42 Bautzen SW: Brösang, Aufschüttung (2007 Friese, det. Sander 2007).
OLH 4852/21 Bautzen NO: Niederkaina, Ödland (2006 Friese, det. Sander 2007).

Rubus radula WEIHE – Rospel-Brombeere
OLH 4752/43 Bautzen N: Neuteichnitz, Waldrand am Stausee (2005 Friese, det. Sander 2007).
OLB 4853/33 Bautzen SO: Cunewalde, Czorneboh Nähe Parkplatz (2007 Friese, det. Sander
2007).

Rubus wessbergii A. PEDERSEN & WALSEMANN – Wessbergs Haselblattbrombeere
OLH 4852/21 Bautzen-Teichnitz, Straßenrand (2007 Friese, det. Sander 2007).

Rumex maritimus L. – Strand-Ampfer
OLH 4954/44 Zittau N: Großhennersdorf, Großer Teich (Schurig).

Rumex sanguineus L. – Blut-Ampfer, Hain-Ampfer
OLH 4853/14 Bautzen O: Ober-Drehsa, „Drehsaer Schweiz“, Waldweg (Jage u. Boyle).

Saxifraga tridactylites L. – Finger-Steinbrech **2**
ELH 5048/21 Dresden SO: Goppeln, Straßenrand nach Golberode (Rissmann).
Zweiter aktueller Nachweis in Dresden:Ö.

Sisymbrium strictissimum L. – Steife Rauke **2**
ELH 5049/13 Dresden SO: Heidenau an der Malzfabrik am Elbradweg (Fröhner).

Stachys ×ambigua SM. – Zweifelhafter Ziest
OLT 4651/24 Commerau b. Königswartha, Teichrand am Wolschank (2006 Hager).
OLT 4651/34 Eutrich, Dorfteich (2006 Hager).

Succisa pratensis MOENCH – Gewöhnlicher Teufelsabbiss **3**
ERO 5148/21 Dresden SO: Schlottwitz, rechter Hang im Schlottwitzbachgrund (Hardtke).
Seit Jahrzehnten wieder aktueller Nachweis auf MTB 5148.

Taraxacum aberrans HAGEND., SOEST & ZEVENB.
OLH 4851/42 Bautzen SW: Gaußig, Straßenrand im Ort (2008 Otto, det. Uhlemann).
Erstnachweis für die Oberlausitz.

Taraxacum capillosum H. ØLLGARD & UHLEMANN [*T. marchicum*, nom. prov. inval.
(UHLEMANN 2003)]
Die Art wurde vor kurzem neu beschrieben (UHLEMANN et al. 2007). – In nördlicher Oberlausitz
und Osterzgebirge sehr zerstreut, z. B.
OLT 4552/11 Hoyerswerda NO: Burghammer W, sandiger Wegrand (8.5.1996 leg. Hahn – herb.
Uhlemann).
OLT 4650/22 Hoyerswerda SW: Zeißholz N, Kiesgrube (16.5.1996 leg. Hahn – herb.
Uhlemann).
ERO 5248/41 Dippoldiswalde SSO: Zinnwald, Straßenrand (29.5.2004 leg. Uhlemann – herb.
Uhlemann).

Taraxacum deltoidifrons H. ØLLGAARD

- OLH 4755/44 Görlitz W: Bahngelände von Charlottenhof, ehemaliges Stellwerk, ca. 500 m südöstlich der Häusergruppe am Bahnübergang (13.5.2006, leg. Sander – GLM).
OLT 4650/22 Hoyerswerda SW: Zeiðholz N, wechselfeuchte Sandfläche in der Kiesgrube, 16.5.1996, leg. Hahn (DR 000196).
OLH 4855/24 Görlitz, Virchowstraße/Kummerau, Rasen vor den Neubauten (7.4.1999, leg. Uhlemann – GLM).
ELH 4948/44 Dresden-Leuben, Zamenhofstraße/Breitscheidstraße, Rasen (6.4.2008 leg. Uhlemann – GLM).

Taraxacum stenoglossum BRENNER (syn. *T. dahlstedtii* H. LINDB.)

- OLT 4650/22 Hoyerswerda SW: Zeiðholz O, Waldwegrand (14.5.1995, leg. Hahn – herb. Uhlemann).

T. deltoidifrons wurde von ØLLGAARD (2003) neu beschrieben. Die Art gehört innerhalb der Sektion *Ruderalia* zur *T. stenoglossum*-Gruppe, welche Arten mit deutlich behaarten Blättern und roten Blattstielen umfasst. Sie steht dem klassischen *T. stenoglossum* sehr nahe, unterscheidet sich aber von diesem durch stärker geflügelte, weniger intensiv rot gefärbte Blattstiele, teerfarbige Interlobien und schmutzigröte äußere Involukrallblätter. *T. deltoidifrons* besitzt eine weite Verbreitung in Mitteleuropa und scheint hier das nordeuropäische *T. stenoglossum* zu ersetzen.




Abb.1 Habitusabbildungen typischer Pflanzen von *T. stenoglossum* BRENNER [A] (Zeiðholz, herb. Uhlemann) und *T. deltoidifrons* H. ØLLGAARD [B] (Görlitz, GLM). Maßstab: 5 cm.

Taraxacum ottonis UHLEMANN [*T. sinuatiforme*, nom. prov. inval. (UHLEMANN 2003)]

- Die Art wurde vor kurzem neu beschrieben (UHLEMANN et al. 2007). – In Oberlausitz und Erzgebirge selten, z. B.
OLB 4951/24 Bischofswerda SO: Steinigtwolmsdorf, Straße nach Hielgersdorf, Straßenrand (4.5.2004 Uhlemann u. Otto – DR).
OLB 4952/11 Bischofswerda SO: Weifa W, Weide (10.5.1998 leg. Hahn – herb. Uhlemann).
ERO 5149/13 Pirna SW: Seitenhain, Wiese (16.5.2006 leg. Uhlemann – DR).

Taraxacum subborgvallii UHLEMANN, ŠTĚPÁNEK & KIRSCHNER

- Die Art wurde vor kurzem neu beschrieben (UHLEMANN et al. 2007). – In OL und EZ sehr zerstreut, z. B.
OLT 4753/41 Bautzen NO: Baruth, Schafberg, auf Basaltschotter (28.4.2004 leg. Franke – herb. Franke).
OLH 5154/22 Zittau N: Großhennersdorf, Feldrand östl. Galgenberg (1999 Uhlemann – DR).
OLH 4950/21 Bischofswerda SW: Bühlau NW, Straßenrand (5.2008 Otto).
ERO 5249/13 Dippoldiswalde SO: Fürstenau, Straßenrand (19.5.2002 leg. Uhlemann – DR).

Taraxacum urbicola KIRSCHNER, ŠTĚPÁNEK & TRÁVNÍČEK

- OLT 4552/11 Hoyerswerda NO: Burghammer W, sandiger Wegrand (8.5.1996, leg. Hahn – GLM).
- OLT4554/43 Niesky N: Rietschen NO, Feuchtwiese an der Racklitz (leg. Hahn, 30.4.2000 – GLM).
- OLT 4651/41 Bautzen NNW: Königswartha NW, Commerau W, Wegrand im Teichgebiet (25.4.1998, leg. Hahn – DR 001480).
- OLT 4655/44 Rothenburg SW: Harte östlich von Geheege, zwischen den Gleisen der stillgelegten Bahnlinie (7.5.2006, leg. Sander – herb. Sander).
- OLH 4751/14 Kamenz SO: Höflein, Straßenrand (20.4.2000, leg. Otto – GLM).
- OLH 4751/32 Kamenz SO: Schweinerden N, Wiese (5.5.1996, leg. Hahn – DR 001115).
- OLH 4751/41 Kamenz SO: Crostwitz (18.4.1992, leg. Uhlemann – GLM).
- OLH 4751/44 Bautzen WNW: Prischwitz W (18.5.2003, leg. Otto – GLM).
- OLH 4752/44 Bautzen NO: Burk, Wegrand am Ostufer des Stausees (11.5.2008 leg. Otto – GLM).
- OLT 4753/41 Bautzen NO: Baruth, Brecherwerk (26.4.2002, leg. Otto; GLM).
- OLH 4754/41 Niesky SW: Gebelzig N, nördl. P. 205,0, Magerwiese (2.5.2002, leg. Otto).
- OLH 4755/44 Görlitz W: Bahngelände von Charlottenhof, ehemaliges Stellwerk, ca. 500 m süd-östl. der Häusergruppe am Bahnübergang (13.5.2006, leg. Sander – herb. Sander).
- OLH 4851/21 Bautzen W: Dobranitz W, Böschung (24.4.2002, leg. Otto – GLM).
- OLH 4851/22 Bautzen W: Dahren, Obstplantage, (21.4.2002, leg. Otto; GLM).
- OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz, Güterbahnstraße (25.4.1998, leg. S. Ulbricht – DR 006957).
- OLH 4851/31 Bischofswerda, Stadtkern W, Pflasterfugen (19.5.1999, leg. Otto; GLM).
- OLH 4855/21 Görlitz WNW: Ebersbach, Morgenseite 10 (10.5.2006, leg. Sander – herb. Sander).
- OLH 4855/24 Görlitz, Virchowstraße, Rasen vor den Neubauten (7.4.1999, leg. Uhlemann – DR 033022 und 033021).
- ELH 4948/44 Dresden-Leuben, Zamenhofstraße/Breitscheidstraße, Rasen (2008, leg. Uhlemann – GLM).
- OLH 4950/44 Neustadt/Sa. NW: Langenwolmsdorf, Straße zur Bockmühle (3.5.2003, leg. Otto – GLM).
- OLB 4951/22 Bischofswerda SO: Neukirch/Laus., Bahnhof Neukirch-Ost (5.5.2001, leg. Otto – GLM).
- OLB 4952/11 Bischofswerda SO: Weifa, Wegrand (1.5.1997, leg. Otto – GLM).
- OLB 4952/12 Bautzen SSW: Wilthen, Güterbahnhof, (5.5.2002, leg. Otto, GLM).
- OLH 4954/11 Löbau: Löbauer Berg (5.5.2001, leg. M. Mitter – GLM).
- OLH 4954/31 Herrnhut, südlich des Bades (17.4.1999, leg. S. Winkler – GLM).

T. urbicola wurde vor kurzem neu beschrieben (TRÁVNÍČEK, KIRSCHNER & ŠTĚPÁNEK 2008). Diese Art gehört innerhalb der Sektion *Ruderalia* zur *T. aequilobum*-Gruppe, deren Vertreter sich durch zahlreiche, in linealische Spitzen auslaufende Seitenlappen auszeichnen und zudem häufig irregulär stehende äußere Involukralblätter besitzen. Diese taxonomisch schwierige Gruppe umfasst in Deutschland gegenwärtig *T. aequilobum* DAHLST. (vorwiegend NW- und N-Deutschland), *T. urbicola* = *T. aequilobum*, Typ B (UHLEMANN 2003) mit weiter Verbreitung in Mitteldeutschland, eine bislang unbeschriebene, dem *T. aequilobum* sehr nahe stehende Sippe: *T. aequilobum*, Typ A, (UHLEMANN 2003) mit zahlreichen Vorkommen in Sachsen und das thermophile *T. violaceifrons* TRÁVNÍČEK, welches zwar noch nicht in Deutschland, aber u. a. in Nord-Böhmen, nahe der deutschen Grenze gefunden wurde und in wärmeren Regionen der Lausitz bzw. im Elbtal erwartet werden darf (TRÁVNÍČEK, KIRSCHNER & ŠTĚPÁNEK 2008, TRÁVNÍČEK & ŠTĚPÁNEK 2008).

Außerdem gehören nach Auffassung des Autors zur *T. aequilobum*-Gruppe noch das in ganz Deutschland weit verbreitete *T. exsertiforme* HAG., SOEST & ZEVENB. sowie *T. quadrangulum* RAIL., welches vor allem in Mittel- und Süddeutschland vorkommt (UHLEMANN 2003, UHLEMANN et al. 2005). Beide Arten sind auch aus der Lausitz bekannt.




Abb. 2 *T. urbicola* KIRSCHNER, ŠTĚPÁNEK & TRÁVNÍČEK, Habitus einer typischen Pflanze aus Wilthen (Otto; GLM). Maßstab: 5 cm.

Teucrium scorodonia L. – Salbei-Gamander **V**
OLH 5054/24 Zittau NNO: Wittgendorf, Klosterwald im Wittgendorfer Forst, Wegrand in Fichtenforsten, zerstreut (Wünsche).
OLZ 5154/14 Zittau SW: Jonsdorf, Hänischmühle, Waldrand. ca. 100 m² (Wünsche).
Fundortbestätigung (1940 Mießler).

Valerianella carinata LOISEL. – Gekieltes Rapünzchen **2**
OLH 4750/23 Kamenz, Bahngelände (Friese).
ERO 5047/21 Tharandt, an Wegrändern zwischen Bahnhof und der Stadt (F. Müller).

Veronica agrestis L. – Acker-Ehrenpreis **3**
MLH 4846/21 Meißen: Elbtal zwischen Meißen und Karpfenschänke, vereinzelt (Doege, confirm. F. Müller).
ELH 4847/13 Dresden OSO: Zaschendorf (B. Müller).
ELH 4948/44 Dresden-Laubegast, Gartenland (Fröhner).
ELH 5048/22 Dresden-Nickern, Kaufpark (Fröhner).
In Dresden seit Jahrzehnten erstmals wieder gefunden.

Vicia cassubica L. – Kaschuben-Wicke **2**
ELH 4948/42 Dresden, Koitzschweg (Schröder).

Vicia lathyroides L. – Platterbsen-Wicke **3**
MLH 4746/32 Meißen NNW: Hebelei Niederlommatzsch, vereinzelt (Doege).
MLH 4746/34 Meißen NNW: Nieschütz, Elberadweg am Ortseingang, wenige Exemplare (Doege).

Vicia tetrasperma (L.) SCHREB. – Viersamige Wicke
ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg W, Böschung am Großen Galgenteich (Otto).

Neubürger und Unbeständige (eingebürgerte und nicht eingebürgerte Neophyten)

Abutilon theophrasti MEDIK. – Chinesische Samtpappel
OLH 4753/43 Bautzen ONO: Gröditz W, Deponiegelände (Friese).

Amaranthus blitum subsp. *emarginatus* – Aufsteigender Amarant
OLT 4752/41 Bautzen N: Merka, Aufschüttungsgelände (Friese, det. Gutte).

Ambrosia artemisiifolia L. – Beifuß-Ambrosie
OLT 4651/22 Hoyerswerda S: Brischko, gestörter Sandtrockenrasen, ehemals Gleisbett der Grubenbahn, beidseits der Verbindungsstraße von der B 96 nach Brischko-Wittichenau. in großer Menge (Hager).

MLH 4746/34 Meißen NNW: Niedermuschütz, Straße nach Zehren, Straßenböschung, vereinzelt (Doege).

Ambrosia psilostachya DC. – Stauden-Ambrosie

OLT 4452/43 Weißwasser W: Neustädter Heide östlich der Eisenbahnstrecke, Massenbestände (Schröder).

OLT 4651/22 Hoyerswerda S: Brischko gestörter Sandtrockenrasen, ehemals Gleisbett der Grubenbahn, beidseits der Verbindungsstraße von der B 96 nach Brischko-Wittichenau, in großer Menge (Hager).

OLT 4751/22 Bautzen NW: Waldrand am Weg Zescha–Caßlau, ca. 10 Pflanzen (Hager).

Atriplex micrantha LEDEB. – Verschiedensamige Melde

OLT 4752/41 Bautzen N: Merka, Aufschüttungsgelände (Friese, confirm Gutte).

OLH 4851/31 Bischofswerda, Ruderalstelle (Friese, confirm. Gutte).

Artemisia biennis WILLD. – Zweijähriger Beifuß

ELH 4949/31 Dresden-Laubegast, Elbufer (Fröhner).

Bunias orientalis L. – Orientalische Zackenschote

OLH 4853/44 Löbau, Rand der Umgehungsstraße in Richtung Nechen, 3 Exemplare (Schluckwerder).

Centaurea diffusa LAM. – Sparrige Flockenblume

OLH 4851/32 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz, Bahnhof, 1 Exemplar auf Schotterfläche (Hahn).

OLH 4854/33 Löbau, Güterbahnhof, 2 Exemplare (Schluckwerder).

Ceratocarpus claviculata (L.) LIDÉN – Rankender Lerchensporn

OLB 4953/11 Bautzen SO: Cunewalde S, Gartenland Bielich, mit Baumschulpflanzen eingeschleppt, mehr als 3 m² bedeckend (Friese).

Claytonia perfoliata DONN ex WILLD – Tellerkraut

ELH 4948/44 Dresden-Reick (B. Müller).

Cochlearia danica L. – Dänisches Löffelkraut

ELH 4948/34 Dresden-Nickern, Autobahnstreifen (Hardtke).
Seit 2005 an den Autobahnen in Sachsen in Ausbreitung.

Cucumis melo L. – Melone

ELH 4949/31 Dresden-Laubegast, Elbufer (Fröhner).

Diploaxis muralis (L.) DC. – Mauer-Doppelsame

ELH 4948/44 Dresden: Bahnhof Niedersedlitz (Fröhner). Im Gebiet seltener als *D. tenuifolia*.

Duchesnea indica (ANDREWS) FOCKE – Indische Scheinerdbeere

OLH 4855/21 Görlitz NNW: Dunsteg (Wanderpfad) zwischen Liebstein und Kunnersdorf, im Gebüsch an einem Grundstück am Ortsrand von Kunnersdorf (Sander).

OLH 4855/24 Görlitz, Innenstadt, Krölstr. 18, ruderales, verwildertes Hofgelände (Franke).

OLH 4949/11 Dresden NO: Dresdener Heide, Farbengrubenweg (Töppich).

ERO 5048/21 Dresden SO: Sobrigau (Rißmann).

Eragrostis multicaulis STEUD. – Japanisches Liebesgras

ELH 4948/31 Dresden-Löbtau S Hainsberger Straße, in Pflasterritzen (F. Müller).
Erstnachweis für das Beobachtungsgebiet.

Eranthis hyemalis (L.) SALISB. – Winterling

MLH 4846/44 Meißen S: Kobitzsch, Kesselbachtal (Hardtke).

Erysimum cuspidatum (M. B.) DC.

ELH 4846/24 Meißen, Elbuferstraße (Fröhner).

ELH 4949/33 Dresden-Kleinzschachwitz, Meußlitzer Straße (Fröhner).

- Foeniculum vulgare* MILL. – Fenchel
ERO 5047/22 Dresden SW: Hainsberg, Bahndamm (Hardtke). In Ausbreitung.
- Galega orientalis* LAM. – Orientalische Geißraute
OLT 4653/14 Niesky NW: Tagebausee Bärwalde O, Rekultivierungsfläche, mehrere Trupps (Gebauer).
- Geranium rotundifolium* L. – Rundblättriger Storchschnabel
OLH 4750/21 Kamenz, mehrfach im Gleisbett der ehem. Haltestelle Kamenz-Nord (Otto).
Erstnachweis für die Oberlausitz.
- Helianthus ×laetiflorus* PERS. – Blühfreudige Sonnenblume
ESG 5150/13 Pirna SSW: Raum, Tongrube (Hardtke).
- Hyacinthoides non-scripta* (L.) CHOUARD ex ROTHM. – Atlantisches Hasenglöckchen
OLH 4853/43 Löbau SW: Lawalde N, Wiese an der Litte, 2 blühende Exemplare (2006 Sbrzesny).
- Ilex aquifolium* L. – Stechpalme
ERO 5048/33 Dippoldiswalde NNO: Dippoldiswalder Heide, nahe Dippoldshütte (Böhme).
Seit Jahren eingebürgert.
- Isatis tinctoria* L. – Färber-Waid
OLH 5055/32 Zittau NO: Hirschfelde, Ruderalfläche bei der Biogasanlage an der Hauptstraße, 3
blühende Exemplare (2006 Sbrzesny).
- Lavatera thuringiaca* L. – Thüringer Strauchpappel 1
ELH 4948/32 Dresden-Zschertnitz, Ruderalfläche am Zellescher Weg (F. Müller).
- Lepidium latifolium* L. – Breitblättrige Kresse, Pfefferkraut
MLH 4746/34 Meißen NNW: Obermuschütz, stark erodierte Ruderalfläche am Weg zum
Funkmast, mäßig häufig (Doege).
- Mentha ×gracilis* SOLE – Edel-Minze
OLT 4752/41 Bautzen N: Merka, Aufschüttungsgelände (Friese, confirm. Gutte).
- Muscari botryoides* (L.) MILL. – Kleine Traubenhyazinthe
OLH 4847/21 Meißen NO: Oberau, unterhalb Buschmühle (Hardtke).
OLH 4847/23 Meißen O: Friedewald, beim Wolfsdenkmal (Hardtke).
- Muscaria neglectum* GUSS.ex TEN. – Übersehene Traubenhyazinthe
ELH 4948/41 Dresden, Großer Garten, nahe Hauptallee (Rißmann).
- Nicandra physaloides* (L.) P. GAERTN. – Giftbeere
OLH 4849/22 Kamenz SW: Lichtenberg, Ackerrand, mehrere Exemplare (S. Müller).
- Oenothera biennis* L. × *Oe. coronifera* RENNER
OLH 4852/23 Bautzen, Güterbahnhof (Otto, det. Rostański).
- Oenothera deflexa* R. R. GATES – Abgeogene Nachtkerze
OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Medewitz, Ödland (Friese, confirm. Gutte u. Rostański).
OLH 4855/22 Görlitz N, Straßenrand am Eingang zum NVG-Gelände (Sander, det. Rostański).
- Oenothera flaevingina* HUDZIOK – Fläming-Nachtkerze
OLH 4851/33 Bischofswerda, Ödland an der Putzkauer Straße (seit 2003 Otto, det. Rostański)
OLH 4852/23 Bautzen, Güterbahnhof (Otto, det. Rostański).
- Oenothera flaevingina* HUDZIOK × *Oenothera biennis* L.
OLH 4851/33 Bischofswerda, Ödland an der Putzkauer Straße (Otto, det. Rostański)
- Oenothera mediomarchica* HUDZIOK – Mittelmärkische Nachtkerze
OLH 4951/11 Bischofswerda SO: Putzkau SW, Erd- und Bauschuttablagerung in ehemaliger
Sandgrube (Otto, det. Rostański u. Gutte).

- Panicum capillare* L. – Haarästige Rispenhirse
OLH 4852/21 Bautzen, Ödland beim Friedhof an der Muskauer Straße, 8 Exemplare (Friese).
- Physalis peruviana* L. – Peruanische Blaskirsche
ELH 4948/42 Dresden-Laubegast, Elbufer, seit 6 Jahren (Fröhner).
- Pimpinella peregrina* L. – Fremde Bibernelle
ELH 4948/34 Dresden-Nickern, Autobahndamm (Hardtke). Ob durch Einsaat eingeschleppt ?
- Polystichum lonchitis* (L.) ROTH – Lanzen-Schildfarn
OLH 4851/32 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz, 2 Exemplare an einer Mauer (Friese). In der Oberlausitz bisher nur einmal vorübergehend (im heutigen Polen) an einer Mauer bei Posottendorf (1898 Barber) aufgetreten.
ESG 5150/11 Pirna SSO: Langenhennersdorf, Labyrinth (Reich und Schröder). Mit sporentragenden Wedeln, Neufund in der Sächsischen Schweiz.
- Portulaca oleracea* L. – Gemüse-Portulak
OLT 4651/42 Bautzen NNW: Commerau b. Königswartha, Biwatsch-Teichgruppe (Langner, det. Hager).
- Potentilla intermedia* L. – Mittleres Fingerkraut
ELH 4949/33 Dresden-Laubegast, Straßenrand (Fröhner). In Dresden eingebürgerter Neophyt.
OLH 4951/11 Bischofswerda SO: Putzkau, mehrfach in ehemaligem Sandgrubengelände an der neuen Straße Putzkau-Neustadt/Sa. (Otto).
- Pseudofumaria lutea* (L.) BORKH. – Gelber Lerchensporen
OLH 4855/24 Görlitz, Innenstadt, Krölstr. 50, ruderales, verwildertes Hofgelände (Franke).
- Pulmonaria sacharata* MILL. – Zucker-Lungenkraut
OLH 4954/11 Löbau, Löbauer Berg, am steilen Aufstieg (Friese, confirm. Gutte).
- Rubus sciocharis* SUDRE – Schattenliebende Brombeere
OLH 4852/21 Bautzen N, Straßenrand östlich vom Vorstau (2006 Friese, det. Jansen 2008).
- Rumex patientia* L. – Garten-Ampfer
ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg, Ufer Großer Galgenteich und westlich vom Bahnhof (Fröhner und Siegel).
- Rumex stenophyllus* LEDEB. – Schmalblättriger Ampfer
OLT 4752/41 Bautzen N: Merka, Aufschüttungsgelände (Friese, confirm. Gebauer).
- Saponaria ocymoides* L. – Rotes Seifenkraut
OLH 4852/13 Bautzen SW: Brösang, Aufschüttungsgelände (Friese, confirm. Gutte).
- Securigera varia* (L.) LASSEN – Bunte Kronwicke
ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg WSW, Grabenrand oberhalb der Rehfelder Straße in Nähe der Raupennest-Klinik, mehrere kleine Trupps (Otto).
- Setaria verticilliformis* DUMORT – Täuschende Borstenhirse
OLH 4852/21 Bautzen, Friedhof an der Muskauer Straße (Friese, det. Otto u. Gutte).
- Sisymbrium irio* L. – Glanz-Rauke
OLT 4752/41 Bautzen N: Merka, Aufschüttungsgelände (Friese, confirm. Gutte).
- Sisymbrium volgense* M. BIEB ex E. FOURN. – Wolga-Rauke
OLH 4951/12 Bischofswerda SO: Putzkau, Erdablagerungen in Sandgrube westlich der Kirche, mehrere kräftige Exemplare (Otto).
- Spergularia salina* J. PRESL & C. PRESL – Salz-Schuppenmiere
OLH 4851/12 Bischofswerda NNO: Uhyst a. T., Randstreifen Autobahnauffahrt (Hahn, det. Gebauer).

Symphytum tuberosum L. subsp. *angustifolium* (A. KERN.) NYMAN – Knollen-Beinwell
OLH 4852/32 Bautzen SW: Weißnaußlitz, rekultiviertes Schuttgelände am Hofeweg, 1 Trupp
(Friese).

Tanacetum parthenifolium (WILLD.) SCH. BIP. – Staubige Straußmargerite
MLH 4746/31 Riesa S: Wölkisch, Weg in den Ort vom Ortseingang Richtung Zehren, vereinzelt
(Doege, confirm. D. Schulz).
MLH 4746/34 Meißen NW: Kleinzadel, Elberadweg Richtung Nieschütz, vereinzelt (Doege).

Tellima grandiflora (PURSH) DOUGLAS ex LINDL. – Großblütig. Tellima, Falsche Alraunwurzel
OLH 4750/14 Kamenz, Gebüsch auf dem Hutberg (Friese, det. Gutte).

Trifolium arvense L. – Hasen-Klee
ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg W, Böschung am Großen Galgenteich (Otto).

Verbascum blattaria L. – Schaben-Königskerze
ELH 4948/24 Dresden-Johannstadt, am Elbradweg (Fröhner).
ELH 4948/44 Dresden, Tauerstraße (Fröhner).
ELH 4948/44 Dresden-Reick, Gewerbegebiet (Hardtke).
Seit dem Jahre 2007 wieder im Stadtgebiet.

Viola suavis M. BIEB. – Blau-Veilchen, Kornblumen-V.
OLH 4855/24 Görlitz, Ziegeleiweg, zerstreut am Fuße der Friedhofsmauer (Wünsche).
OLH 4955/43 Zittau NO: Ostritz, Hutberg-Steinbruch, trocken-warmer Standort am Fuß von
Basaltsäulen, wenige Exemplare (Wünsche).

Ansalbung

Stratiotes aloides L. – Krebseschere
OLH 4954/41 Löbau SO: Berthelsdorf, Teich des ehem. Volksgutes, massenhaft (mitgeteilt von
M. Pfeifer).

Literatur

- JÄGER, E. J. & K. WERNER [Hrsg.] (2005): Exkursionsflora von Deutschland, Rothmaler Band 4
Gefäßpflanzen: Kritischer Band. – 10. bearb. Aufl., Spektrum Akademischer Verlag, 980 S.
- HAASE, G. & K. MANNSFELD [Hrsg.] (2002): Naturraumeinheiten, Landschaftsfunktionen und Leitbilder am
Beispiel von Sachsen. – Forschungen zur deutschen Landeskunde 250, Deutsche Akademie für
Landeskunde, Selbstverlag Flensburg, 214 S., CD-ROM
- ØLLGAARD, H. (2003): New species of *Taraxacum*, sect. *Ruderalia*, found in Central and Northern Europe. –
Preslia, Praha, 75: 137–164
- TRÁVNÍČEK B. & J. ŠTĚPÁNEK (2008): New or less known species of *Taraxacum* sect. *Ruderalia* found in
Central Europe. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 67–110
- , J. KIRSCHNER & J. ŠTĚPÁNEK (2008): Five new species of *Taraxacum* sect. *Ruderalia* from Central Europe
and Denmark. – Preslia 80: 27–59
- UHLEMANN, I. (2003): Die Gattung *Taraxacum* (*Asteraceae*) im östlichen Deutschland. – Mitteilungen zur
floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. Sonderheft: 1–136
- , J. KIRSCHNER & J. ŠTĚPÁNEK (2005): *Taraxacum* F. H. WIGG. – In: ROTHMALER, W.: Exkursionsflora von
Deutschland. Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. 10. Aufl. Spektrum Akademischer Verlag
- , -, H. ØLLGAARD & J. ŠTĚPÁNEK (2007): Four new species of *Taraxacum* sect. *Ruderalia* (*Asteraceae*-
Cichorieae) from Central Europe and Scandinavia. *Phyton* 47 (1–2): 103–121

Anschrift des korrespondierenden Verfassers:

Hans-Werner Otto
Putzkauer Straße 5
01877 Bischofswerda
E-Mail: hw.otto@freenet.de



Abb. 3–5 *Geranium rotundifolium* (oben), *Oenothera flaevingina* (unten rechts und links)
Fotos Hans-Werner Otto

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Otto Hans-Werner, Gebauer [Girg] Petra, Hardtke Hans-Jürgen

Artikel/Article: [Floristische Beobachtungen 2008 in Oberlausitz und Elbhügelland 99-114](#)