



BEITRÄGE ZUR LANDSHUTER SCHMETTERLINGSFAUNA

1863 findet sich im 5. Jahresbericht des Naturhistorischen Vereins zu Passau — verfaßt von Dr. Egger — zum erstenmal ein Verzeichnis niederbayerischer Schmetterlinge, in dem auch die Falter um Landshut — gesammelt von Obergeometer Gerstl — lediglich mit Gattungs- und Artnamen aufgeführt sind.

Nachfolgend soll versucht werden, für die Gegend von Landshut und Umgebung (im Radius von ungefähr 10 km), die Großschmetterlinge zusammenzustellen. Der Verfasser sammelt in dieser Gegend über 36 Jahre und darf als Mitarbeiter anführen: Anna Müller (M), Walter Sedlmeier (S), Mich. Reiser (Rs), Oberfinanzrat † Gebhardt (G), Gymnasiast † Bertold Renner (R), die Oberrealschüler Jürgen Bereiter-Hahn (BH), Rainer Holl (H), sämtliche in Landshut und Dr. Eisenberger (E), Freising.

Um auch den zahlreichen Naturfreunden unter den Mitgliedern des Naturwissenschaftlichen Vereins Landshut, die nicht unmittelbar wissenschaftlich an Faltern interessiert sind, gerecht zu werden, ist versucht worden, von allen festgestellten Faltern auch in Klammern die deutschen Bezeichnungen anzuführen. Doch ist sich der Verfasser wohl bewußt, daß dieser Versuch ein noch größeres Stückwerk bleiben muß als seine Arbeit an der Schmetterlingswelt von Landshut und Umgebung.

Das Vorkommen wurde abgestuft mit „sehr selten“ (s. s.), „selten“ (s.), „nicht häufig“ (n. h.), „nicht selten“ (n. s.), „häufig“ (h.) und „sehr häufig“ (s. h.). Feststellungen und Belegexemplare des Verfassers sind ohne besondere Anmerkung; Feststellungen und Belegexemplare von Mitarbeitern sind mit oben angeführten Abkürzungen ihrer Schreibnamen vermerkt.

Bezüglich der Namengebung wurde weitgehend das Werk von † Ludwig Osthelder „Die Schmetterlinge Südbayerns“ neben Spuler „Die Schmetterlinge Europas“ und Lampert „Die Großschmetterlinge Mitteleuropas“ und Eckstein „Die Schmetterlinge Deutschlands“ verwendet.

Die den Falternamen vorangehenden Zahlen beziehen sich auf die Seitenzahlen von Osthelder „Die Schmetterlinge Südbayerns“. — In einem späteren Jahresbericht sollen jeweils weitere Funde verzeichnet werden.

Herrn J. Wolfsberger von der Zoologischen Staatssammlung in München sei für die Überprüfung des hiesigen Schmetterlingsmaterials herzlich Dank ausgesprochen.

DAS SAMMELGEBIET

umfaßt etwa 400 qkm und liegt auf der unteren Hochebene mit ungefähr 10 km Radius im Umkreis von der Kreishauptstadt Landshut (394 m Meereshöhe). Dieses Stück der Schwäbisch-bayerischen Hochebene setzt sich zusammen aus einem Teilstück der Isartalebene von Bruckberg bis Unterahrain und dem rechts und links anschließenden Hügelland mit dem Quellgebiet der Kleinen Vils von Garnzell bis Geisenhausen, des Unterglaimers Mühlbachs, der Pfettrach von Weihmichl bis Landshut, des Osterbachs, des Tiefenbachs, des Gleißbachs und der Ach im Rahmen von 10 km Radius um Landshut.

In das Sammelgebiet eingeschlossen ist der Stadtkreis Landshut, sind vom Landkreis Landshut erfaßt die Gemeinden Altdorf, Eugenbach, Pfettrach, Arth, Münchnerau, Tondorf, Attenhausen (teilweise), Gündlkofen, Eching, Tiefenbach, Kronwinkl, Viecht, Ast, Berghofen, Haunwang, Niederkam, Windten, Müchsdorf, Gundlhausen und Garnzell (teilweise), Vilsheim, Obergangkofen, Götzdorf, Altfraunhofen (LK Vilsbiburg — teilweise), Schönbrunn, Jenkofen, Hoheneggkofen, Adlkofen (teilweise), Deutenkofen, Frauenberg, Wolfsbach und Ohu (teilweise), Ergolding, Altheim, Essenbach und Mirskofen (teilweise), Oberglain.

Die Talebene der Isar ist 4 — 5 km breit und neigt sich nach Norden und Osten. Den Isarlauf begleiten oberhalb und unterhalb Landshuts Auen mit Mischholzbeständen (Weiden, Erlen, Ulmen, Eschen usw.), deren Ursprünglichkeit durch verschiedene bauliche Einwirkungen teilweise zerstört worden ist.

Der Nordrand der Isarebene von Altdorf abwärts über Essenbach besteht aus einer Lößterrasse mit sehr fruchtbarem Ackerland, nordwärts auch stark bewaldet (überwiegend Fichte). Die Hügelrückenzone des Südrandes der Isarebene setzt sich aus spättertiären Ablagerungen und von Ablagerungen der Gewässer der Diluvialzeit zusammen und bildet zahlreiche, leicht gewölbte Höhenrücken, durch viele Quertäler und enge Schluchten unterbrochen. In einigen dieser Schluchten finden wir diluvialen Löß mit den charakteristischen versteinerten Schnecken. Auch Knochen, Zähne der tertiären Fauna wurden gefunden.

Soweit sich das Sammelgebiet nicht aus Wald- und Buschbeständen zusammensetzt, haben wir es mit Kultursteppe zu tun. (Anbau von Getreide und Nutzpflanzen aller Art). Nicht allzu viele Gebiete haben Heidecharakter, wenige Gebiete des Isartales weisen Wiesenmoore auf (unterer Teil des Sammelgebietes der Isarebene).

Anschrift des Verfassers: Hanns Zethner, Landshut/Bayern, Högberg 22

Papilionidae (Ritter)

- | | | |
|----|--|-------|
| 43 | <i>Papilio podalirius</i> L. (Segelfalter) | s. |
| 45 | <i>Papilio machaon</i> L. (Schwalbenschwanz) | n. s. |


Pieridae (Weißlinge)

- | | | |
|----|--|-------------|
| 56 | <i>Aporia crataegi</i> L. (Baumweißling) | s. s. |
| 57 | <i>Pieris brassicae</i> L. (großer Kohlweißling) | s. h. |
| 58 | <i>Pieris rapae</i> L. (kleiner Kohlweißling) | s. h. |
| 59 | <i>Pieris napi</i> L. (Rapsweißling) | s. h. |
| 62 | <i>Pieris daphidice</i> L. (Resedenfalter) | s. M. |
| 62 | <i>Euchloe cardamines</i> L. (Aurorafalter) | h. |
| 63 | <i>Leptidia sinapis</i> L. (Senfweißling) | n. h. G. S. |
| 67 | <i>Colias hyale</i> L. (goldene Acht) | n. s. |
| 68 | <i>Colias edusa</i> F. (Postillon) | n. h. G. S. |
| 72 | <i>Gonepteryx rhamni</i> L. (Zitronenfalter) | s. h. |

Nymphalidae (Flecken- oder Dornraupenfalter)

- | | | |
|----|--|--------------|
| 72 | <i>Apatura iris</i> L. (großer Schillerfalter) | s. G. |
| 72 | <i>Apatura ilia</i> Schiff. (kleiner Schillerfalter) | s. s. G. |
| 73 | <i>Apatura ilia clytie</i> Schiff. (Rotschiller) | s. S. |
| 73 | <i>Limenitis pupuli</i> L. (großer Eisvogel) | s. s. |
| 74 | <i>Limenitis sibilla</i> L. (kleiner Eisvogel) | s. |
| 75 | <i>Pyrameis atalanta</i> L. (Admiral) | h. |
| 75 | <i>Pyrameis cardui</i> L. (Distelfalter) | h. |
| 76 | <i>Vanessa io</i> L. (Tagpfauenauge) | s. h. |
| 77 | <i>Vanessa urticae</i> L. (kleiner Fuchs) | h. |
| 78 | <i>Vanessa polychloros</i> L. (großer Fuchs) | n. s. |
| 78 | <i>Vanessa antiopa</i> L. (Trauermantel) | n. s. |
| 79 | <i>Polygonia C album</i> L. (C-Falter) | n. s. |
| 79 | <i>Arachnia levana</i> L. (Frühlings-Landkärtchen) | h. |
| 80 | <i>Arachnia prorsa</i> L. (Sommer-Landkärtchen) | n. s. |
| 80 | <i>Arachnia porima</i> O. | s. H. |
| 80 | <i>Melitaea maturna</i> L. (kl. Scheckenfalter) | s. G. |
| 82 | <i>Melitaea aurinia</i> Rott. (Skabiosen-Sch.falter) | n. h. |
| 84 | <i>Melitaea cinxia</i> L. (gemeiner Scheckenfalter) | h. |
| 85 | <i>Melitaea phoebe</i> Knoch. (Flockenbl.-Scheckenf.) | s. s. M. R. |
| 87 | <i>Melitaea athalia</i> Rott. (Wachtelweizen-Scheckenf.) | h. G. R. Rs. |
| 88 | <i>Melitaea athalia</i> F. navarina Selys | n. h. BH. |
| 91 | <i>Melitaea dictynna</i> Esp. (Silber-Scheckenf.) | s. G. |
| 92 | <i>Argynnis aphirape</i> Hb. (Randring-Perlmutterf.) | n. h. G. |
| 94 | <i>Argynnis selene</i> Schiff. (mondfleck. Perlmutterf.) | n. s. |
| 94 | <i>Argynnis euphrosyne</i> L. (Veilchen-Perlmutterf.) | s. G. |

97	Argynnis dia L. (gem. Perlmutter-Falter)	n. s.	BH.
99	Argynnis ino Rott. (violettbrauner Perlm.-F.)	n. s.	BH.
99	Argynnis latonia L. (kleiner Perlmutterf.)	h.	
100	Argynnis aglaia L. (großer Perlmutterf.)	n. s.	
101	Argynnis niobe L. (Stiefmütterchen-Perlmutterf.)	n. s.	G.
101	Argynnis niobe eris Meig.	n. h.	
102	Argynnis adippe L. (Märzveilchen-Perlm.-F.)	n. h.	G. R.
102	Argynnis adippe F. baiuvarica Spul.	n. h.	
103	Argynnis paphia L. (Kaisermantel)	h.	
103	Melanargia galathea L. (Dambrettflatter)	h.	
104	Melanargia galathea mod. fulvata Lowe	n. h.	
111	Erebia medusa F. (Mohrenfalter)	n. h.	G. R.
122	Satyrus circe F. (Schattenkönigin)	n. h.	
123	Satyrus briseis L. (Felsenfalter)	s. s.	
123	Satyrus semele L. (gelber Waldportier)	n. h.	
124	Satyrus dryas Scop. (blauäug. Waldportier)	s.	G. R.
124	Pararge egeria egerides Stgr. (Queckenfalter)	h.	
125	Pararge megaera L. (Mauerfuchs)	n. h.	G.
126	Pararge maera L. (Braunaug)	h.	BH.
127	Aphantopus hyperantus L. (Hirsengras-F.)	n. h.	R.
127	Epinephele jurtina L. (großes Ochsenauge)	s. h.	
128	Epinephele lycaon Rott. (kleines Ochsenauge)	s.	M.
129	Coenonympha iphis Schiff. (rostbraun. Wiesen- vögelchen)	n. h.	R. Rs.



DIE FÜHRENDE ZEITSCHRIFT IHRER ART
UNTERRICHTET IN MEHR ALS 40 LÄN-
DERN DIE FREUNDE VON NATUR UND
TECHNIK ÜBER ALLES WISSENSWERTE
DIESER GEBIETE IN STETS AKTUELLEN,
LEBENDIG GESCHRIEBENEN BEITRÄGEN
MIT ZAHLREICHEN ABBILDUNGEN

Es empfiehlt sich

F. P. Attenkofer
Buchhandlung
LANDSHUT

- | | | | |
|-----|--|-------|-----------|
| 130 | <i>Coenonympha arcania</i> L. (weißbind. Wiesenvögelch.) | n. h. | G. R. Rs. |
| 132 | <i>Coenonympha pamphilus</i> L. (Kammgras-Falter) | s. h. | |

Erycinidae (Würfelfalter)

- | | | | |
|-----|--|-------|----|
| 133 | <i>Nemeobius lucina</i> L. (Perlbinde) | n. h. | G. |
|-----|--|-------|----|

Lycaenidae (Bläulinge)

- | | | | |
|-----|---|-------|-----------|
| 134 | <i>Thecla spini</i> Schiff. (Schlehen-Zipfelfalter) | n. h. | G. M. |
| 134 | <i>Thecla W album</i> Kn. (Ulmen-Zipfelfalter) | s. | M. |
| 135 | <i>Thecla ilicis</i> Esp. (Eichen-Zipfelfalter) | s. s. | G. |
| 135 | <i>Thecla acaciae</i> F. (Akazien-Zipfelfalter) | s. | M. R. |
| 135 | <i>Thecla pruni</i> L. (Pflaumen-Zipfelfalter) | n. h. | G. M. |
| 136 | <i>Callophrys rubi</i> L. (Brombeer-Zipfelfalter) | n. s. | |
| 137 | <i>Zephyrus betulae</i> L. (Birken-Zipfelfalter) | n. h. | |
| 137 | <i>Chrysophanus virgaureae</i> L. (Dukatenfalter) | s. | G. Rs. |
| 139 | <i>Chrysophanus phlaeas</i> L. (Feuervögelchen) | n. s. | |
| 140 | <i>Chrysophanus dorilis</i> Hufn. (brauner Feuerf.) | n. h. | |
| 142 | <i>Lycaena argiades</i> Pall. kurzschwänziger Bläuling) | s. | G. |
| 144 | <i>Lycaena argyrognomon</i> Bgstr. (unbedornter Bläuling) | h. | G. |
| 147 | <i>Lycaena astrarche</i> Bgstr. (dunkelbrauner Bläuling) | s. | R. |
| 148 | <i>Lycaena icarus</i> Rott. (gemeiner Bläuling) | s. h. | |
| 150 | <i>Lycaena bellargus</i> Rott. (himmelblauer Bläuling) | s. | |
| 151 | <i>Lycaena coridon</i> Poda. (silbergrüner Bläuling) | s. | G. R. |
| 153 | <i>Lycaena minimus</i> Fuessl. (Zwerg-Bläuling) | n. h. | G. |
| 154 | <i>Lycaena semiargus</i> Rott. (violetter Wald-Bläuling) | n. h. | G. R. BH. |
| 155 | <i>Lycaena cyllarus</i> Rott. (Waldbläuling) | n. h. | Rs. |
| 156 | <i>Lycaena euphemus</i> Hb. (großer Moorbläuling) | s. | G. |
| 158 | <i>Cyaniris argiolus</i> L. (Brombeer-Bläuling) | n. h. | |

Hesperidae (Dickkopffalter)

- | | | | |
|-----|--|-------|--------|
| 159 | <i>Pamphila palaemon</i> L. (Kaisermantel) | n. s. | G. R. |
| 159 | <i>Adopaea lineola</i> O. (ockerfarb. Beistrichfalter) | n. s. | |
| 159 | <i>Adopaea thaumas</i> Hfn. (ockergelber Dickkopff.) | n. s. | R. BH. |
| 160 | <i>Adopaea actaeon</i> Rott. (mattscheck. Dickkopff.) | n. h. | R. |
| 160 | <i>Augiades comma</i> L. (Komma-Dickkopffalter) | n. s. | |
| 160 | <i>Augiades sylvanus</i> Esp. (Wald-Dickkopffalter) | n. s. | |
| 163 | <i>Hesperia alveus</i> Hb. (gr. Malven-Dickkopffalter) | n. s. | G. |
| 165 | <i>Hesperia malvae</i> L. (kl. Malven-Dickkopffalter) | h. | |
| 165 | <i>Thanaos tages</i> L. (dunkler Dickkopffalter) | h. | |

Sphingidae (Schwärmer)

- | | | | |
|-----|--|----|--|
| 169 | <i>Acherontia atropos</i> L. (Totenkopf) | s. | |
|-----|--|----|--|

171	<i>Smerinthus populi</i> L. (Pappelschwärmer)	n. s.	
172	<i>Smerinthus ocellata</i> L. (Abendpfauenaug)	h.	
173	<i>Dilina tiliae</i> L. (Lindenschwärmer)	h.	
176	<i>Daphnis nerii</i> L. (Oleanderschwärmer)	s. s.	
176	<i>Sphinx ligustri</i> L. (Ligusterschwärmer)	h.	
176	<i>Protoparce convolvuli</i> L. (Windenschwärmer)	h.	
177	<i>Hyloicus pinastri</i> L. (Kiefernswärmer)	n. s.	
178	<i>Deilephila galii</i> Rott. (Labkrautschwärmer)	s.	
179	<i>Deilephila euphorbiae</i> L. (Wolfsmilchschwärmer)	n. h.	
179	<i>Deilephila lineata livornica</i> Esp. (Linienschwärmer)	s.	S.
180	<i>Chaerocampa elpenor</i> L. (mittl. Weinschwärmer)	n. s.	
180	<i>Metopsilus porcellus</i> L. (kleiner Weinschwärmer)	n. s.	
181	<i>Pterogon proserpina</i> Pall. (Nachtkerzenschwärmer)	s.	
182	<i>Macroglossa stellatarum</i> L. (Taubenschwänzchen)	h.	
182	<i>Hemaris fuciformis</i> L. (Hummelschwärmer)	n. h.	
183	<i>Hemaris scabiosae</i> Z. (Skabiosenschwärmer)	n. h.	

Notodontidae (Zahnspinner)

183	<i>Cerura furcula</i> Cl. (Buchengabelschwanz)	n. h.	G. M. S.
185	<i>Cerura bifida</i> Hb. (kleiner Gabelschwanz)	n. h.	
185	<i>Dicranura erminea</i> Esp. (Hermelinspinner)	s.	M.
185	<i>Dicranura vinula</i> L. (großer Gabelschwanz)	n. s.	
186	<i>Stauropus fagi</i> L. (Buchenspinner)	n. h.	G. R.
187	<i>Hoplitis milhauseri</i> F. (Pergamentspinner)	s.	
187	<i>Gluphisia crenata</i> Esp. (Kerbstreifenspinner)	s.	S.
188	<i>Drymonia chaonia</i> Hb. (Steineichenspinner)	n. h.	S.
188	<i>Drymonia trimacula</i> f. <i>dodonaea</i> Hb. (3fleck. Zahn-Spinner)	s.	BH.
189	<i>Pheosia tremula</i> Cl. (Pappel-Zahnspinner)	n. s.	
190	<i>Notodonta ziczac</i> L. (Zickzackspinner)	n. s.	
190	<i>Notodonta dromedarius</i> L. (Dromedarspinner)	n. h.	
190	<i>Notodonta phoebe</i> Sieb. (brauner Zahnspinner)	s.	S.
191	<i>Notodonta tritophus</i> Esp. (gelber Zahnspinner)	s.	S.
191	<i>Notodonta anceps</i> Goeze (Goldmälchen)	n. h.	
192	<i>Leucodonta bicoloria</i> Schiff. (schneeweiß. Zahnsp.)	s.	R.
193	<i>Lophopteryx camolina</i> L. (Kamel-Zahnspinner)	s.	
194	<i>Pterostoma palpina</i> L. (Palpenspinner)	n. s.	
194	<i>Ptilophora plumigera</i> Esp. (Frostspinner)	s.	G.
195	<i>Phalera bucephala</i> L. (Mondvogel)	h.	
195	<i>Pygaera curtula</i> L. (rotgelber Erpelschwanz)	n. h.	G.
196	<i>Pygaera anachoreta</i> F. (großer Erpelschwanz)	n. h.	S.
196	<i>Pygaera pigra</i> Hufn. (kleiner Erpelschwanz)	n. s.	

Lymantriidae (Trägspinner)

196	<i>Orgyia gonostigma</i> F. (Zwetschgen-Spinner)	s.	G. M.
197	<i>Orgyia antiqua</i> L. (Schlehen-Spinner)	h.	
198	<i>Dasychira pudibunda</i> L. (Rotschwanz)	n. s.	
198	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> L. (Goldafter)	s.	G. M.
198	<i>Porthesia similis</i> Fuessl. (Schwan)	s.	
199	<i>Stilpnotia salicis</i> L. (Weidenspinner)	s.	
199	<i>Lymantria dispar</i> L. (Schwammspinner)	s.	G. M.
200	<i>Lymantria monacha</i> L. (Nonne)	n. h.	G.

Lasiocampidae (Glucken)

200	<i>Malacosoma neustria</i> L. (Ringelspinner)	n. h.	
201	<i>Trichiura crataegi</i> L. (Weißdornspinner)	s.	G. M.
202	<i>Poecilocampa populi</i> L. (Pappelspinner)	n. h.	S.
204	<i>Eriogaster lanestris</i> L. (Birkenwollafter)	n. h.	
205	<i>Lasiocampa quercus</i> L. (Eichenspinner)	s.	
206	<i>Lasiocampa trifolii</i> Esp. (Kleespinner)	n. h.	
208	<i>Macrotylacia rubi</i> L. (Brombeerspinner)	h.	
208	<i>Cosmotriche potatoria</i> L. (Grasglucke)	n. s.	
210	<i>Epicnaptera ilicifolia</i> L. (Weidenglucke)	s.	
212	<i>Epicnaptera quercifolia</i> L. (Kupferglucke)	n. s.	
213	<i>Odonestis pruni</i> L. (Feuerglucke)	s.	
213	<i>Dendrolimus pini</i> L. (Kiefern-glucke)	n. h.	

Endromididae (Birkenspinner)

216	<i>Endromis versicolora</i> L. (Birkenspinner)	s.	
-----	--	----	--

Saturniidae (Pfauenspinner)

217	<i>Saturnia pavonia</i> L. (kleines Nachtpfauenaugen)	s.	
219	<i>Aglia tau</i> L. (Nagelfleck)	n. h.	

Drepanidae (Sichelflügler)

221	<i>Drepana falcataria</i> L. (Sichelflügel)	n. h.	
221	<i>Drepana binaria</i> Hufn. (zweipunkt. Sichel-Spinner)	n. h.	Rs.
222	<i>Drepana cultraria</i> F. (Buchen-Sichelflügler)	s.	S.

Thyrididae (Fensterflügler)

222	<i>Thyris fenestrella</i> Scop. (Fensterfleck)	s.	R.
-----	--	----	----

Noctuidae (Eulen)**Acronyctinae (Pfeileulen)**

225	<i>Panthea coenobita</i> Esp. (Klosterfrau)	s.	S.
225	<i>Diphtera alpium</i> Gb. (Seladon)	n. h.	
226	<i>Demas coryli</i> L. (Hasel-Eule)	s.	G. M.
227	<i>Acronycta aceris</i> L. (Ahorn-Eule)	h.	
227	<i>Acronycta megacephala</i> L. (Großkopf-Eule)	n. h.	M. R.
227	<i>Acronycta alni</i> L. (Erlen-Eule)	n. h.	M.
228	<i>Acronycta tridens</i> Schiff. (Dreizack-Eule)	n. h.	
228	<i>Acronycta psi</i> L. (Pfeil-Eule)	h.	
229	<i>Acronycta cuspis</i> Hb. (Spitz-Eule)	h.	
229	<i>Acronycta auricoma</i> F. (Goldhaar-Eule)	n. h.	M.
230	<i>Acronycta euphorbiae</i> F. (Wolfsmilch-Eule)	s.	M. R.
230	<i>Acronycta rumicis</i> L. (Ampfer-Eule)	s. h.	
231	<i>Craniophora ligustri</i> F. (Liguster-Eule)	s.	G. M. S.

Trifinae

233	<i>Agrotis janthina</i> Esp. (Aronstab-Eule)	s.	S.
233	<i>Agrotis fimbria</i> L. (gelbe Bandeule)	n. h.	
233	<i>Agrotis fimbria</i> f. <i>virescens</i> Tutt.	s.	
234	<i>Agrotis punicea</i> Hb. (purpurfarb. Erdeule)	s. s.	
234	<i>Agrotis pronuba</i> L. (Hausmutter)	h.	
235	<i>Agrotis pronuba</i> f. <i>innuba</i>	n. s.	BH.
235	<i>Agrotis comes</i> Hb. (der Begleiter)	s.	Rs.
236	<i>Agrotis triangulum</i> Hufn. (Dreieck-Eule)	n. h.	BH.
236	<i>Agrotis baia</i> F. (unscheinbare Lila-Eule)	n. h.	Rs.
237	<i>Agrotis c nigrum</i> L. (schwarzes „C“)	n. s.	
237	<i>Agrotis ditrapezium</i> Bkh. (Gänseblumen-Eule)	n. s.	M.
238	<i>Agrotis xanthographa</i> Schiff. (veränderl. Saat-Eule)	n. s.	
239	<i>Agrotis brunnea</i> F. (Primel-Eule)	n. h.	M.
239	<i>Agrotis dahlia</i> Hb. (Dahls-Eule)	s.	BH.
241	<i>Agrotis plecta</i> L. (Cichorien-Eule)	h.	
242	<i>Agrotis lucipeta</i> F. (Huflattich-Eule)	s. s.	Rs.
245	<i>Agrotis putris</i> L. (Ampfer-Eule)	n. h.	G. S.
245	<i>Agrotis cinerea</i> Hb. (aschgraue Eule)	s.	
246	<i>Agrotis exclamationis</i> L. (Ausrufungszeichen)	h.	
247	<i>Agrotis tritici</i> L. (Weizen-Eule)	n. h.	
248	<i>Agrotis tritici aquilina</i> Hb.	s.	
248	<i>Agrotis corticea</i> Hb. (rindengraue Erdeule)	s.	G. M.
248	<i>Agrotis ypsilon</i> Rott. (Ypsilon-Eule)	h.	
249	<i>Agrotis segetum</i> Schiff. (Saat-Erdeule)	h.	G.
250	<i>Agrotis praecox</i> L. (grüne Beifuß-Erdeule)	s. s.	

251	<i>Agrotis prasina</i> F. (lauchgrüne Eule)	n. s.	S.
252	<i>Pachnobia rubricosa</i> F. (Labkraut-Eule)	s.	
254	<i>Epineuronia popularis</i> F. (Lolch-Eule)	n. s.	
254	<i>Epineuronia cespitis</i> F. (Quecken-Eule)	n. h.	S.
255	<i>Mamestra leucophaea</i> View. (Besenstrauch-Eule)	n. h.	
255	<i>Mamestra advena</i> F. (der Fremdling)	s.	G.
256	<i>Mamestra nebulosa</i> Hufn. (Nebel-Eule)	n. h.	G. M. R.
257	<i>Mamestra brassicae</i> L. (Kohl-Eule)	h.	
257	<i>Mamestra persicariae</i> L. (Flohkraut-Eule)	h.	
258	<i>Mamestra oleracea</i> L. (Gemüse-Eule)	h.	
258	<i>Mamestra genistae</i> Bkh. (Ginster-Eule)	n. h.	
259	<i>Mamestra dissimilis</i> Knoch. (Zuckerrüben-Eule)	n. h.	
259	<i>Mamestra thalassina</i> Rott. (Pfriemen-Eule)	n. h.	BH.
260	<i>Mamestra contigua</i> Vill. (Kreuzkraut-Eule)	n. h.	G.
260	<i>Mamestra pisi</i> L. (Erbsen-Eule)	h.	
260	<i>Mamestra trifolii</i> Rott. (Klee-Eule)	n. h.	
261	<i>Mamestra dentina</i> Esp. (Zahn-Eule)	n. s.	
265	<i>Dianthoecia albimacula</i> Bkh. (weißgefl. Nelken-E.)	s. s.	S.
266	<i>Dianthoecia nana</i> Rott. (kleine Nelken-Eule)	n. s.	G.
266	<i>Dianthoecia compta</i> F. (weißbindige Nelken-Eule)	n. h.	G.
266	<i>Dianthoecia capsicola</i> Hb. (Kapsel-Eule)	n. s.	
266	<i>Dianthoecia cucubali</i> Fuessl. (Taubenkropf-Eule)	n. s.	
268	<i>Miana ophiogramma</i> Esp. (Schlangen-Eule)	s.	S.
268	<i>Miana strigilis</i> Cl. (Striegel-Eule)	h.	
269	<i>Miana strigilis</i> F. fasciata Tutt.	n. h.	BH.
269	<i>Miana latruncula</i> f. aerata Esp.	n. h.	BH.
269	<i>Miana latruncula</i> f. aethiops Hw. (helle Gras-Eule)	n. h.	Rs.
269	<i>Miana bicoloria</i> Vill. (Schmielen-Eule)	n. h.	
271	<i>Bryophila raptricula</i> Hb. (die Räuberin)	n. h.	M.
272	<i>Diloba caeruleocephala</i> L. (Blaukopf)	n. s.	
272	<i>Apamea testacea</i> Hb. (Grasstengel-Eule)	s. s.	BH.
273	<i>Hadena porphyrea</i> Esp. (Purpur-Eule)	n. h.	Rs.
275	<i>Hadena sordida</i> Bkh. (dunkle Weizen-Eule)	n. s.	
276	<i>Hadena monoglypha</i> Hufn. (Wurzel-Eule)	h.	
277	<i>Hadena monoglypha</i> f. obscura Th. Miegl.	n. h.	
277	<i>Hadena lateritia</i> Hb. (Ziegel-Eule)	s.	S.
277	<i>Hadena lithoxylea</i> F. (fahlgelbe Wurzel-E.)	n. h.	
278	<i>Hadena sublustris</i> Esp. (gelblichbraune Gras-Eule)	n. h.	BH.
278	<i>Hadena rurea</i> F. (Feld-Eule)	n. h.	Rs.
279	<i>Hadena scolopacina unicolor-brunnea</i> F. Wagner (Zittergras-Eule)	s. s.	S.
280	<i>Hadena basilinea</i> F. (Ähren-Eule)	n. h.	

281	<i>Hadena secalis</i> L. (Roggen-Eule)	n. s.	S.
284	<i>Polia chi</i> L. (griechisches Chi)	n. h.	
285	<i>Miselia oxyacanthae</i> L. (Weißdorn-Eule)	n. h.	
286	<i>Dichonia aprilina</i> L. (April-Eule)	n. h.	S.
287	<i>Dipterygia scabriuscula</i> L. (dunkle Knöterich-Eule)	s.	G.
288	<i>Rhizogramma detersa</i> Esp. (Berberitzen-Eule)	n. h.	
288	<i>Cloantha polyodon</i> Cl. (Vielzahn-Eule)	s.	G. S.
289	<i>Trachea atriplicis</i> L. (Melden-Eule)	h.	
289	<i>Euplexia lucipara</i> L. (Schöllkraut-Eule)	n. h.	
290	<i>Brotolomia meticulosa</i> L. (Reben-Eule)	h.	
291	<i>Naenia typica</i> L. (Gespenst-Eule)	h.	
291	<i>Helotropa leucostigma</i> Hb. (Weißfleck-Eule)	n. h.	G.
293	<i>Hydroecia nictitans</i> Bkh. (Blinzel-Eule)	n. h.	Rs.
294	<i>Hydroecia lucens</i> Frr. (Sumpfglanz-Eule)	s.	
294	<i>Hydroecia micacea</i> Esp. (Schachtelhalm-Eule)	s.	S.
296	<i>Calamia lutosa</i> Hb. (Rohrtöter-Eule)	n. h.	BH.
298	<i>Leucania pallens</i> L. (bleiche Schilfgras-Eule)	n. h.	
299	<i>Leucania comma</i> L. (Komma-Eule)	s.	G.
300	<i>Leucania L album</i> L. (Weiß-L-Eule)	n. h.	
301	<i>Leucania conigera</i> F. (Zapfenträgerin)	n. h.	G. R.
301	<i>Leucania albipuncta</i> F. (Weißpunkt-Schilfeule)	n. h.	
302	<i>Leucania lithargyrea</i> Esp. (Stein-Eule)	n. h.	
302	<i>Leucania turca</i> L. (Türken-Eule)	s. s.	
303	<i>Grammesia trigrammica</i> Hufn. (Dreilinien-Eule)	n. h.	
305	<i>Caradrina quadripunctata</i> F. (der Eindringling)	h.	
306	<i>Caradrina morpheus</i> Hufn. (Träumer-Eule)	s.	G. S.
306	<i>Caradrina alsines</i> Brahm. (Mieren-Eule)	n. h.	
307	<i>Caradrina taraxaci</i> Hb. (Löwenzahn-Eule)	n. s.	Rs.
307	<i>Caradrina ambigua</i> F. (bräunl. Boden-Eule)	n. h.	
309	<i>Rusina umbratica</i> Goeze (Erdbeer-Schatten-Eule)	n. h.	G.
309	<i>Amphipyra tragopoginis</i> L. (graue Glanzeule)	n. s.	
310	<i>Amphipyra pyramidea</i> L. (Pyramiden-Eule)	n. s.	
311	<i>Taeniocampa gothica</i> L. (gotische Eule)	n. s.	G. S.
312	<i>Taeniocampa miniosa</i> F. (Mennig-Eule)	s.	G. S.
313	<i>Taeniocampa pulverulenta</i> Esp. (Eichenbusch-Eule)	s.	G.
314	<i>Taeniocampa stabilis</i> View. (Edelkastanien-Eule)	n. s.	G.
315	<i>Taeniocampa incerta</i> Hufn. (Camäleon-Eule)	s.	
315	<i>Taeniocampa incerta</i> f. <i>fuscata</i> Hw.	n. h.	S.
315	<i>Taenicampa incerta</i> f. <i>pallida</i> Lamp.	n. h.	S.
315	<i>Taenicampa opima</i> Hb. (Feist-Eule)	s.	S.
317	<i>Taeniocampa munda</i> Esp. (bleiche Pflaumen-Eule)	n. h.	S.
317	<i>Panolis griseovariegata</i> Goeze (Kiefern-Eule)	n. h.	

318	Mesogona oxalina Hb. (Sauerklee-Eule)	n. h.	BH.
319	Calymnia pyralina View. (Birnbäum-Eule)	n. h.	BH.
320	Calymnia trapezina L. (Trapez-Eule)	n. s.	
320	Calymnia affinis L. (Ulmen-Eule)	s.	BH.
321	Plastensis retusa L. (Pappeltrieb-Eule)	n. s.	
322	Orthosia lota Cl. (Lota-Eule)	s.	
324	Orthosia pistacina F. (Gewürz-Eule)	s.	
326	Xanthia lutea Ström. (Veilgelb-Eule)	n. s.	G. R.
327	Xanthia fulvago L. (bleiche Gelb-Eule)	n. h.	E.
327	Hoporina croceago F. (Safran-Eule)	n. h.	E.
329	Orrhodia vaccinii L. (Heidelbeer-Eule)	n. s.	G.
330	Orrhodia rubiginea F. (roströte Eule)	s.	G.
330	Scopelosoma satellitia L. (der Trabant)	n. s.	G. M.
331	Scopelosoma satellitia brunnea Lampa	s.	BH.
333	Calocampa vetusta Hb. (braunes Moderholz)	n. h.	
333	Calocampa exoleta L. (graues Moderholz)	n. h.	
334	Xylomiges conspicularis melaleuca View. (auffallende Lila-Eule)	s.	S.
334	Calophasia lunula Hufn. (weißer Halbmond)	s.	
335	Cucullia verbasci L. (brauner Mönch)	n. h.	
337	Cucullia umbratica L. (Schattenmönch)	n. s.	
338	Cucullia lucifuga Hb. (Möhrenmönch)	s.	
338	Cucullia lactuae Esp. (Lattichmönch)	s.	
343	Heliaca tenebrata Sc. (Hornkraut-Eule)	n. s.	G. R.
343	Heliothis ononis F. (Hauhechel-Eule)	s.	G.
344	Heliothis dipsacea L. (Karden-Eule)	s.	
—	Heliothis maritima Grasl. Nur einmal gefunden!		S.
345	Pyrrhia umbra Hufn. (Umbra-Eule)	s.	
346	Erastria argentula Hb. (Cypergras-Eule)	s.	G.



PH. KRÜLL'SCHE Universitäts-Buchhandlung

Landshut, Theaterstraße

Alle naturwissenschaftlichen Fachbücher neu und antiquarisch. Der Große Brockhaus - 12 Bände - Neuauflage, mit zahlreichen, zum Teil farbigen Abbildungen und Tafeln, sowie Karten und Plänen, Leinen je DM 42.-, Halbleder je DM 49.-

Alle Bücher, insbes. naturwissenschaftliche Werke, neu u. antiquarisch

347	<i>Erastria deceptor</i> Sc. (Trug-Eule)	s.	G.
347	<i>Erastria fasciana</i> L. (Binden-Eule)	s.	G.

Gonopterinae

349	<i>Scoliopteryx libatrix</i> L. (Zucker-Eule)	n.	s.
-----	---	----	----

Quadriinae

349	<i>Abrostola triplasia</i> L. (ockerfarb. Brennessel-Eule)	n.	s.
351	<i>Plusia moneta</i> F. (Eisenhut-Eule)	n. h.	G.
352	<i>Plusia modesta</i> Hb. (Lungenkraut-Eule)	s.	S.
352	<i>Plusia chrysitis</i> L. (Messing-Eule)	h.	
352	<i>Plusia chrysitis</i> f. <i>juncta</i> Tutt.	h.	
353	<i>Plusia chrysitis</i> f. <i>aurea</i> Huene	h.	
353	<i>Plusia chryson</i> Esp. (Goldfleck-Eule)	n. h.	BH.
355	<i>Plusia gutta</i> Esp. (Schafgarben-Eule)	s.	G. S.
356	<i>Plusia pulchrina</i> Hw. (Ziest-Eule)	s.	Rs.
356	<i>Plusia jota</i> L. (Jota-Eule)	s.	R.
357	<i>Plusia gamma</i> L. (Gamma-Eule)	s. h.	
359	<i>Euclidia mi</i> Cl. (Mi-Eule)	n. h.	
359	<i>Euclidia glyphica</i> L. (Luzernen-Eule)	n.	s.
361	<i>Catocala fraxini</i> L. (blaues Ordensband)	s.	
361	<i>Catocala electa</i> Bkh. (Weidenkarmin)	n. h.	G. S. R.
362	<i>Catocala nupta</i> L. (rotes Ordensband)	n. h.	G.
363	<i>Catocala sponsa</i> L. (mittl. Eichenkarmin)	s.	
364	<i>Toxocampa pastinum</i> Tr. (Hacken-Eule)	s.	G.

Hypeninae

365	<i>Laspeyria flexula</i> Schiff. (Nadelwald-Flechten-E.)	n. h.	S.
366	<i>Parascotia fuliginaria</i> L. (Hängematten-Eule)	s.	S.
367	<i>Madopa salicalis</i> Schiff. (Aspen-Eule)	s.	G.
368	<i>Herminia tentacularia</i> L. (Palpen-Eule)	n. h.	E.
368	<i>Herminia derivalis</i> Hb. (Ocker-Eule)	s. s.	Rs.
370	<i>Hypena proboscidalis</i> L. (Rüssel-Eule)	n.	s.
370	<i>Hypena obesalis</i> Tr. (Schnurrbart-Eule)	n. h.	
370	<i>Hypena rostralis</i> L. (Schnauzen-Eule)	h.	
371	<i>Hypena rostralis radiatalis</i> Hb.	n. h.	S.

Cymatophoridae

371	<i>Habrosyne derasa</i> L. (Pracht-Eule)	s.	G. M. S.
372	<i>Thyatira batis</i> L. (Rosenfleck-Eule)	n.	s.
372	<i>Cymatophora or</i> F. (Pappel-Eule)	n.	s.

Brephidae

375	<i>Brephos parthenias</i> L. (der Jungfernsohn)	n. h.	G. S.
375	<i>Brephos nothum</i> Hb. (der Vaterlose)	s.	G.

Geometridae (Spanner)**Geometrinae**

379	<i>Geometra papilionaria</i> L. (Grünling)	n. s.	
380	<i>Geometra vernaria</i> Hb. (grün. Waldreben-Spanner)	n. h.	
381	<i>Nemoria viridata</i> L. (grüner Hain-Spanner)	s. s.	G. BH.
382	<i>Thalera fimbrialis</i> Sc. (lauchgrüner Spanner)	n. h.	
382	<i>Thalera lactearia</i> L. (Milch-Spanner)	s.	G.
383	<i>Hemithea strigata</i> Müll. (grüner Weiden-Spanner)	s.	G.

Acidaliinae

383	<i>Acidalia trilineata</i> Se. (goldgelber Ampfer-Spanner)	s. s.	G.
384	<i>Acidalia similata</i> Thnbg. (braungestr. Klein-Sp.)	s.	G.
385	<i>Acidalia virgularia</i> Hb. (Ruten-Spanner)	n. s.	M.
389	<i>Acidalia aversata</i> L. (Mauseohr-Spanner)	n. s.	
389	<i>Acidalia aversata spoliata</i> Stgr.	n. s.	
389	<i>Acidalia immorata</i> L. (Heidekraut-Spanner)	n. s.	G.
390	<i>Acidalia rubiginata</i> Hufn. (Rost-Klein-Spanner)	s.	
390	<i>Acidalia marginepunctata</i> Goeze (Schmuckspanner)	n. s.	
392	<i>Acidalia immutata</i> L. (Wegerich-Spanner)	n. h.	BH.
393	<i>Ephyra pendularia</i> Cl. (Ringfleck-Spanner)	n. s.	R. S.
394	<i>Ephyra porata</i> L. (gelbbrauner Ringfleck-Spanner)	n. s.	E.
394	<i>Ephyra punctaria</i> L. (punktierter Spanner)	s.	S. R.
396	<i>Timandra amata</i> L. (schrägstreif. Ampfer-Spanner)	h.	

Larentiinae

396	<i>Lythria purpuraria</i> L. (Purpur-Spanner)	s.	G.
398	<i>Ortholita limitata</i> Sc. (Platterbsen-Spanner)	h.	
398	<i>Ortholita moeniata</i> Sc. (Mauer-Spanner)	s.	G.
399	<i>Ortholita bipunctaria</i> Schiff. (Doppelpunkt-Spa.)	s. s.	BH.
401	<i>Odezia atrata</i> L. (Kälberkropf-Spanner)	n. h.	R.
403	<i>Anaitis efformata</i> Guen.	n. s.	
408	<i>Operopthera boreata</i> Hb. (weißgrauer-Frost-Sp.)	n. s.	
409	<i>Operopthera brumata</i> L. (kleiner Frost-Spanner)	s. h.	
410	<i>Triphosa dubitata</i> L. (Keller-Spanner)	h.	
411	<i>Eucosmia certata</i> Hb. (Sauerach-Spanner)	s. s.	G. BH.
412	<i>Eucosmia undulata</i> L. (wellenstreif. Spanner)	s.	G.
412	<i>Scotosia vetulata</i> Schiff. (Düten-Spanner)	n. s.	
413	<i>Scotosia rhamnata</i> Schiff. (Faulbaum-Spanner)	n. h.	S.
—	<i>Lygris associata</i> Bkh. (Johannisbeer-Spanner)	s. s.	
414	<i>Lygris prunata</i> L. (Zwetschgen-Spanner)	n. s.	
416	<i>Larentia dotata</i> Cl. (schwefelgelber Spanner)	n. h.	H.
416	<i>Larentia fulvata</i> Forster (breitbind. Blatt-Spanner)	s.	

417	<i>Larentia ocellata</i> L. (Schwarzauge)	n. s.	
417	<i>Larentia bicolorata</i> Hufn. (Steinobst-Spanner)	s.	R. BH.
418	<i>Larentia variata</i> Schiff. (Nadelholz-Spanner)	n. s.	
421	<i>Larentia juniperata</i> L. (Wacholder-Spanner)	n. h.	B.H.
422	<i>Larentia siterata</i> Hufn. (olivgrüner Spanner)	s.	
422	<i>Larentia truncata</i> Hufn. (Heckenkirschen-Spanner)	s. s.	Rs.
424	<i>Larentia firmata</i> Hb. (braunköpf. Kiefern-Spanner)	s. s.	Rs.
427	<i>Larentia viridaria</i> F. (Taubnessel-Spanner)	s.	
431	<i>Larentia fluctuata</i> Hb. (gem. Blatt-Spanner)	h.	
433	<i>Larentia montanata</i> Schiff. (Primelblatt-Spanner)	n. s.	G.
435	<i>Larentia quadrifasciaria</i> Cl. (vierbind. Blatt-Sp.)	n. h.	G.
436	<i>Larentia ferrugata</i> Cl. (Gundermann-Blatt-Spanner)	n. s.	
437	<i>Larentia pomoeriaria</i> Ev. (Balsaminen-Blatt-Sp.)	n. s.	G.
448	<i>Larentia cucullata</i> Hufn. (Kutten-Blatt-Spanner)	n. h.	G.
449	<i>Larentia galiata</i> Hb. (Labkraut-Blatt-Spanner)	n. h.	G.
449	<i>Larentia sociata</i> Bkh. (der Genosse)	h.	
451	<i>Larentia albicillata</i> L. (Himbeer-Blatt-Spanner)	n. s.	G. M. R.
451	<i>Larentia procellata</i> F. (Sturmvogel)	n. s.	G.
452	<i>Larentia hastata</i> L. (Speerspitzen-Blatt-Spanner)	n. h.	G. R.
454	<i>Larentia tristata</i> L. (gr. Labkraut-Trauer-Spanner)	n. s.	G.
454	<i>Larentia luctuata</i> Hb. (Mondfleck-Blatt-Spanner)	s.	G. R.
456	<i>Larentia molluginata</i> Hb. (Labkraut-Blatt-Spanner)	n. s.	G.
457	<i>Larentia affinitata</i> Stph. (Pechnelken-Blatt-Sp.)	s.	G.
458	<i>Larentia alchemillata</i> L. (Frauenmantel-Spanner)	s.	BH.
458	<i>Larentia unifasciata</i> Hw. (Einbinden-Blatt-Sp.)	s.	G.
460	<i>Larentia albulata</i> Schiff. (Klappertopf-Spanner)	n. h.	Rs.
461	<i>Larentia obliterata</i> Hufn. (Erlen-Blatt-Spanner)	n. h.	G.
462	<i>Larentia bilineata</i> L. (Löwenzahn-Blatt-Spanner)	s. h.	
463	<i>Larentia autumnalis</i> Ström. (dreibind. Blatt-Sp.)	n. h.	G.
465	<i>Larentia badiata</i> Hb. (Rosen-Blatt-Spanner)	n. h.	G.
466	<i>Larentia berberata</i> Schiff. (Berberitzen-Blatt-Sp.)	n. s.	
467	<i>Larentia rubidata</i> F. (Rötling)	s.	
467	<i>Larentia comitata</i> L. (Gänsefuß-Blatt-Spanner)	n. s.	
469	<i>Tephroclystia oblongata</i> Thnbg. (Fenchelblüten-Sp.)	n. h.	
471	<i>Tephroclystia pusillata</i> F. (Nadelwald-Spanner)	n. s.	S.
473	<i>Tephroclystia venosata</i> F. (Silenenblüten-Spanner)	s.	G.
475	<i>Tephroclystia assimilata</i> Gn. (Hopfenblüten-Sp.)	n. h.	BH.
475	<i>Tephroclystia absinthiata</i> Cl. (Absinth-Spanner)	n. h.	BH.
476	<i>Tephroclystia denotata</i> Hb. (Glockenbl.-Blüten-Sp.)	s. s.	G.
486	<i>Tephroclystia innotata</i> Hufn. (Tamarisken-Sp.)	s.	G.
488	<i>Chloroclystis rectangulata</i> L. (grauer Apfelbl.-Sp.)	n. h.	G. M.
490	<i>Phibalapteryx tersata</i> Hb. (Waldreben-Spanner)	h.	

492	<i>Abraxas grossulariata</i> L. (Harlekin)	s.	
492	<i>Abraxas sylvata</i> Sc. (Traubenkirschen-Spanner)	s.	
492	<i>Abraxas marginata</i> L. (Schwarzrand-Spanner)	n. s.	
493	<i>Abraxas adustata</i> Schiff. (Spindelbaum-Spanner)	n. h.	G.
494	<i>Bapta bimaculata</i> F. (Zweifleck-Spanner)	n. h.	G. M. R.
494	<i>Bapta temerata</i> Hb. (Schattenbinden-Spanner)	n. h.	
494	<i>Deilinia pusaria</i> L. (schneeweißer Erlen-Spanner)	n. h.	
496	<i>Metrocampa margaritata</i> L. (Perlglanz-Spanner)	s.	
497	<i>Ennomos autumnaria</i> Wrnbg. (Erl.-Zackenrand-Sp.)	n. h.	
497	<i>Ennomos quercinaria</i> Hufn. (der Reiter)	s.	G. S.
498	<i>Ennomos erosaria</i> Hb. (gelber Eichen-Spanner)	s.	Rs.
499	<i>Selenia bilunaria</i> Esp. (dreistreif. Mondfleck-Sp.)	n. h.	
500	<i>Selenia tetralunaria</i> Hufn. (Vier-Mondfleck-Sp.)	n. h.	S.
500	<i>Hygrochroa syringaria</i> L. (Flieder-Spanner)	s.	M.
500	<i>Therapis evonymaria</i> Schiff. (Spindelbaum-Sp.)	s. s.	BH.
501	<i>Himera pennaria</i> L. (Hagebuchen-Spanner)	s.	M.
502	<i>Crocallis elinguaris</i> f. <i>trapezaria</i> B. (Mord-Spanner)	s.	
502	<i>Angerona prunaria</i> L. (Schlehen-Spanner)	n. h.	M. R.
503	<i>Ourapteryx sambucaria</i> L. (Holunder-Spanner)	n. s.	G. S.
503	<i>Opisthograptis luteolata</i> L. (Zitronen-Spanner)	n. s.	
504	<i>Epione apiciaria</i> Schiff. (schwarzes „V“)	n. h.	G.
504	<i>Epione advenaria</i> Hb. (Heidelbeer-Spanner)	n. h.	G.
505	<i>Venilia macularia</i> L. (Tigerchen)	n. s.	G.
506	<i>Semiothisa signaria</i> Hb. (Fichten-Spanner)	n. h.	R.
506	<i>Semiothisa liturata</i> Cl. (Kiefern-Spanner)	n. h.	G.
507	<i>Hibernia bajaran</i> Schiff. (grauer Liguster-Sp.)	n. h.	BH.
507	<i>Hibernia leucophaearia</i> Schiff. (weißgr. Frost-Sp.)	n. s.	G. S.
	<i>Hibernia marg.</i>	s.	
509	<i>Hibernia defoliaria</i> Cl. (gr. Frostnacht-Spanner)	n. s.	G. S.
509	<i>Anisopteryx aescularia</i> Schiff. (Wintereichen-Spa.)	n. h.	
510	<i>Phigalia pedaria</i> F. (Schlehen-Frost-Spanner)	n. s.	S.
512	<i>Biston hirtarius</i> Cl. (Kirschen-Spanner)	n. h.	
512	<i>Biston strataris</i> Hufn. (großer Pappel-Spanner)	n. h.	G. S.
513	<i>Amphidasys betularia</i> L. (großer Birken-Spanner)	h.	
513	<i>Boarmia cinctaria</i> Schiff. (schwarzes „O“)	n. h.	G.
514	<i>Boarmia gemmaria</i> Brahm. (Zweifleck-Baum-Sp.)	n. s.	
514	<i>Boarmia secundaria</i> Schiff. (weißl. Kiefern-Spa.)	n. h.	Rs.
515	<i>Boarmia repandata</i> L. (marmorierter Baum-Sp.)	n. h.	G.
515	<i>Boarmia roboraria</i> Schiff. (Steineichen-Baum-Sp.)	s.	G.
516	<i>Boarmia consortaria</i> F. (aschgrauer Baum-Spanner)	n. s.	
516	<i>Boarmia lichenaria</i> Hufn. (Flechten-Baum-Sp.)	n. s.	
518	<i>Boarmia bistortata</i> Goeze (Pflaumen-Spanner)	n. s.	
519	<i>Boarmia punctularia</i> Hb. (Erlen-Spanner)	n. h.	G.

520	Gnophos obscuraria Hb. (Mauerpfeffer-Spanner)	n. h.
532	Ematurga atomaria L. (brauner Heidekraut-Sp.)	n. h. G. R. BH.
533	Bupalus piniarius L. (gem. Kiefern-Spanner)	s. G.M.R.
534	Thamnonoma wauaria L. (braunes „V“)	n. s.
535	Diastictis artesiaria F. Mant. (Weiden-Spanner)	s. G.
536	Phasiane clathrata L. (Gitter-Spanner)	h.
537	Scoria lineata Sc. (weißer Ginster-Spanner)	s. S.

Cymbidae (Grünspinnerchen)

541	Sarrothripus revayanus Scop. (Eichen-Grün-Spinner)	s. M.
-----	--	-------

Chloëphoridae

543	Earias chlorana L. (Weiden-Grün-Spinner)	n. s.
543	Hylophila prasinana L. (Buchen-Kahn-Bärchen)	n. s.

Arctiidae (Bärenspinner)

Arctiinae — Bärenartige

544	Spilosoma lubricipeda Esp. (gelber Bär)	s. G. M. R.
545	Spilosoma menthastri Esp. (Minzen-Bär)	h.
545	Spilosoma urticae Esp. (Nessel-Bär)	n. h. M.
545	Phragmatobia fuliginosa L. (Rostbär)	h.
546	Parasemia plantaginis L. (Wegerich-Bär)	s. M. R.
548	Diacrisia sanio L. (Löwenzahn-Bär)	n. h. G. M. R.
549	Rhyparia purpurata L. (Purpur-Bär)	n. h. S.
550	Arctia caja L. (brauner Bär)	h.
554	Callimorpha dominula L. (Jungfern-Bär)	s.
556	Hipocrita jacobaeae L. (Karmin-Bär)	n. s. G. S.

JOSEF EMLER - (13^b) LANDSHUT IV/NDB.

ANNABERG, DRÄXLMAIRWEG 10 - RUF 3941

AUS MEINEM LIEFERPROGRAMM:

Chirurgische Instrumente und Apparate, Ärztemöbel, Wartezimmer-einrichtung, Orig. Rekordspritzen und Rezepte
Umtausch-Kanülen V2a, chirurgische Nadeln, Mikroskope,
Labor-, Glas- und Krankenhauseinrichtungen, elektromed.,
Ultraschall- und U.K.W.-Apparate, Lichtbäder, Heißluftkeimer,
Sterilisierapparate, Höhensonne Orig. Hanau.

Lithosiinae (Steinflechten-Falter)

557	<i>Endrosa irrorella</i> Cl. (dottergelber Steinflechten-B.)	s.	R.
560	<i>Cybosia mesomella</i> L. (Elfenbein-Flechten-Bär)	s.	G.
561	<i>Gnophria rubricollis</i> L. (Rothals-Flechten-Bär)	s.	G. M. R.
561	<i>Oeonistis quadra</i> L. (Vierpunkt-Flechten-Bär)	s.	G. M. R.
562	<i>Lithosia complana</i> L. (flacher Flechten-Bär)	n. h.	M.

Zygaenidae (Widderchen)

564	<i>Zygaena purpuralis</i> Brünn. (Purpur-Widderchen)	h.	
566	<i>Zygaena achillae</i> Esp. (Tragant-Widderchen)	n. s.	S.
568	<i>Zygaena meliloti</i> Esp. (Steinklee-Widderchen)	h.	G. R. S.
569	<i>Zygaena lonicerae</i> Scheven (Geißblatt-Widderchen)	n. s.	BH.
570	<i>Zygaena filipendulae</i> L. (Steinbrech-Widderchen)	h.	
571	<i>Zygaena angelicae</i> O. (Engelwurz-Widderchen)	s.	M.
576	<i>Zygaena ephialtes peucedani</i> Esp. L. (veränderl. Widderchen)	n. h.	S. BH.
577	<i>Zygaena carniolica modesta</i> (Gürtel-Widderchen)	n. h.	M.
580	<i>Ino statices</i> L. (Kugelblumen-Widderchen)	h.	

Cochliidae

581	<i>Cochlidion limacodes</i> Hufn. (Asselspinner)	s.	M. R.
-----	--	----	-------

Psychidae (Sackträger)

587	<i>Epichnopteryx pulla</i> Esp. (kleiner Wollsackträger)	s.	M. R.
-----	--	----	-------

Sesiidae (Glasflügler)

588	<i>Trochilium apiformis</i> Cl. (Bienen-Glasflügler)	s.	G.
590	<i>Sesia Tipuliformis</i> O. (Johannisbeer-Grasflügler)	h.	

Cossidae (Holzbohrer)

593	<i>Cossus cossus</i> L. (Weidenbohrer)	n. s.	
595	<i>Zeuzera pyrina</i> L. (Blausieb)	n. h.	

Hepialidae (Wurzelbohrer)

595	<i>Hepialus humuli</i> L. (Hopfen-Wurzelbohrer)	n. s.	
596	<i>Hepialus sylvina</i> L. (Ampfer-Wurzelbohrer)	n. s.	
597	<i>Hepialus hecta</i> L. (Heidekraut-Wurzelbohrer)	s.	G. R.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins
Landshut](#)

Jahr/Year: 1956

Band/Volume: [22_1956](#)

Autor(en)/Author(s): Zethner Hanns

Artikel/Article: [Beiträge zur Landshuter Schmetterlingsfauna 27-43](#)