








VEGETATIONSKARTE DES MÜNDUNGSGEBIETES DER ISAR

Maßstab: 1:10 000



Kiefernwaldgesellschaften und Trockenrasen

- Pfeifengras-Kiefernwald (Molinio - Pinetum),
typische Ausbildung
- Pfeifengras-Kiefernwald,
Centaurea scabiosa-Ausbildung
- Pfeifengras-Kiefernwald,
Salix purpurea-Juniperus communis-Ausb.
- Kiesgrubenvegetation mit Entwicklungstendenz
zum Pfeifengras-Kiefernwald
- Trockenrasen (Mesobrometum)
- Quercus robur-Aegopodium podagraria-
Gesellschaft
- Quercus robur-Molinia arundinacea-
Gesellschaft

Eichen-Hainbuchenwälder

- Haselwurz-Eichen-Hainbuchenwald
(Querceto-Carpinetum asaretosum),
typische Ausbildung
- Haselwurz-Eichen-Hainbuchenwald,
Kontaktgesellschaft zur Eschen-Ulmenau
- Haselwurz-Eichen-Hainbuchenwald,
Leucocjum vernum-Hepatica nobilis-Ausb.
- Haselwurz-Eichen-Hainbuchenwald,
Carex glauca-Ausbildung
- Typischer Eichen-Hainbuchenwald
(Gallio-Carpinetum)
- Seegrass-Eichen-Hainbuchenwald
(Querceto-Carpinetum caricetosum brizoidis),
Equisetum sylvaticum-Ausbildung
- Seegrass-Eichen-Hainbuchenwald,
Poa nemoralis-Ausbildung
- Seegrass-Eichen-Hainbuchenwald,
Lamium galeobdolon-Ausbildung

Auwalddgesellschaften

- Typische Eschen-Ulmenau (Fraxino-Ulmetum),
reine Ausbildung
- Eschen-Ulmenau,
Melica nutans-Ausbildung
- Eschen-Ulmenau,
Brachypodium pinnatum-Ausbildung
- Eschen-Ulmenau,
Equisetum hyemale-Fazies
- Tiefe Erlen-Eschen-Ulmenau
- Hohe Erlen-Eschen-Ulmenau
- Roterlen-Eschen-Auenwald
(Pruno-Fraxinetum)
- Weidenwald (Salicetum albo-fragilis),
Tiefe Weidenau
- Tiefe Erlen-Weidenau
- Hohe Weidenau
- Hohe Erlen-Weidenau
- Grauweidenbusch (Salici-Fraguletum)

Bruchwald

- Erlenbruch
(Carici elongatae-Alnetum glutinosae)

Röhrichte u. Großseggenbestände

- Teichröhricht (Scirpo-Phragmitetum),
typische Ausb. und Phragmites-Fazies
- Wasserschwadenröhricht
(Glycerietum maxime)
- Rohrgrasröhricht
(Phalaridetum arundinaceae)
- Durchdringung von Großseggen, Phragmites-
Fazies des Teichröhrichts u. Rohrgrasröhricht,
in typischer Ausbildung
- in Carex panicea-Ausbildung
- Schlankseggenried (Caricetum gracilis),
typ. Ausb. u. Symphytum off. Stachys palustris-Ausb.
- Schlankseggenried,
Carex riparia-Ausbildung
- Schlankseggenried,
Carex panicea-Ausbildung
- Steifseggenried (Caricetum elatae),
typische Ausbildung
- Steifseggenried,
Carex panicea-Ausbildung
- Schneidbinsensumpf
(Mariscetum)

Kopfbinsenrasen und Pfeifengraswiesen


- Kopfbinsenrasen (Schoenetum ferruginei und
Kopfbinsen-Pfeifengraswiese (Molinietum
coeruleo-schoenetosum)
- Kopfbinsen-Pfeifengraswiese,
Übergang zum Molinietum litoralis
- Kopfbinsen-Pfeifengraswiese,
Übergang zum Mesobrometum
- Pfeifengraswiese (Molinietum coeruleo-
schoenetosum sibirica-Ausbildung)
- Pfeifengraswiese,
Carex davalliana-Ausbildung
- Pfeifengraswiese,
Carex fusca-Ausbildung

Vegetation der Wasserflächen

- Teichrosengesellschaft
(Myriophyllo-Nupharetum)
- Wasserfedergesellschaft
(Hottonietum palustris)
- Froschbiß-Krebseschierengesellschaft
(Hydrochareto-Stratiotetum)

Allgemeines

- Gewässer
- Pappelpflanzungen
- Fichtenforst
- Kiefernplanzungen
- Kulturland (Äcker, Wiesen und Weiden)
- Gebäude
- Straßen und Wege
- Hochwasserdämme
- Bahndamm
- Kiesgruben



Halbschematisches Querprofil
(M. 1: 25 000 bei 125-facher Überhöhung)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Landshut](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [24_1964](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vegetationskarte des Mündungsgebietes der Isar 109-111](#)