

Im Jahr Prozenten der jährlichen Regentage, diese = 100.				
	Winter.	Frühling.	Sommer.	Herbst.
Regensburg 115,..	25, <sub>34</sub> .	20, <sub>14</sub> .	31, <sub>56</sub> .	22, <sub>38</sub> .
Passau 92.	24.	24.	31.	21.
Ortenburg 122,..	20, <sub>8</sub> .	24, <sub>11</sub> .	34, <sub>0</sub> .	20, <sub>5</sub> .

---

Verzeichniß  
der  
officinellen Pflanzen Niederbayerns  
nach

Sendtner's „Vegetations - Verhältnisse Niederbayerns und des bähr. Waldes“ und unter Zugrundlage von Schleiden's „botanischer Pharamakognosie“ bearbeitet.

---

NB. Die Beobachtungen der niederbayer. Botaniker, Lehrer Reiß in Deggendorf und prakt. Arzt Dr. Pries in Reisbach, sind in Sendtner's beiden Werken gewissenhaft berükt und finden ihre Verwerthung hier unter Hinweis auf genannte Werke.

---

- | Name, Standort und Höhe des Vorkommens.   | Officinelle Bezeichnung.                                |
|---|---|
| Clematis recta L. längs der Donau Brennkraut. Herba Clematidis von Passau bis Weltenburg, südlich der Donau bis 1400' Höhe.   | Brenntraute. Herba flammulae Jovis.                     |
| Anemone pulsatilla L. wie vorige. Österblume, Windblume, Weißwurz, Küchenschelle. Herba Pulsatillae nigricantis, hb. Puls. minoris, hb. Nolae culinariae, hb. Ventis. |   |
| Anemone hepatica L. durch das Leberkraut. Herba Hepaticae no gethe südl. Gebiet, an der Donau und bei Roding.   | bilis, hb. Trifolii aurei.                              |
| Helleborus niger L. südlich der Schwarze Nieswurz, Christwurz, Donau.   | Winterrose. Radix (rhizoma) Hellebori, rad. Melampodii. |
| Delphinium consolida L. südl. der Rittersporn. Flores (corolla) Delphinii, flor. Calceirapae, flor. Consolidae regalis.   |   |

- Aconitum napellus L. an der Do- Sturmhut, Eisenhut. Herba Aco-  
nau von Ulm bis Passau, ob. und niti, hb. Napelli.  
unt. Wald 960—4414'.
- Actaea spicata L. südl., ob. u. unt. Christophs-, Wolf-, Schwarzwurz, Radix (rhizoma) Actaeae, radix Christophoriana, radix Aconiti racemosi.
- Berberis vulgaris L. südlich 4374', Berberisen, Sauräucherbeeren. Bac-  
ob. u. unt. Wald 890—2314'. cace Berberum. Fructus Oxy-  
canthae.
- Nymphaea alba L. südl. 3261', ob. Wasserlilie, Seulwurzel. Radix  
u. unt. Wald 980—1760'. (rhizoma) Nymphaeae.
- Papaver rhocas L. südl. 2450', ob. Wilder Mohn, Klatschrose, Klatsch-  
u. unt. Wald 1680'. mohn, Kornrose. Flores (corolla) Rhocados, flor. Papave-  
ris rubri.
- Chelidonium majus L. südl. 2450', Schöllkraut, Schwalbenwurz. Her-  
ob. u. unt. Wald 890—2500'. ba Chelidonii.
- Fumaria officinalis L. südl. 2600',  
ob. u. unt. Wald 2500'. Erdrauch. Herba Fumariae.
- Fumaria Vaillantii Lois. südlich 1880'.  
Nasturtium officinale R. Br. südl. Brunnenkresse. Herba Nasturtii.  
durch das ganze Gebiet 5662', ob.  
u. unt. Wald 3916'. Weisse Rübe. Caudex Rapae.
- Brassica rapa L. südl. 3388'. Raps. Ol. Napi, Ol. Rarparum.
- Brassica napus L. südl. 2500'. Sinapis alba L. ob. Wald 1900'. Weisser Senf. Sem. Sinapis al-  
bac, sem. Erucae.
- Cochlearia officinalis L. südlich 1850'. Löffelfraut. Herba et semen Coch-  
leariae.
- Armoracia rusticana Fl. W. (Coch- Meerrettig. Radix (caudex) Ar-  
learia armoracia L.) ob. Wald 2820'. moraciae.
- Viola tricolor L. südlich 1450—3806', ob. u. unt. Wald 3470'. Freisamtraut, Stiefmütterchen.  
Herba Violae, hb. Jaceae.
- Viola odorata L. südl. 2450', ob. u. unt. Wald 2400'. Märzenbeilchen. Flores (corolla) et  
radix (rhizoma) Violae odora-  
tiae, rad. Violariae.
- Polygala vulgaris L. südl. 3623', Kreuzblumenwurzel. Radix (cau-  
ob. u. unt. Wald 3161'. dex) Polygalae vulgaris.
- Polygala amara L. südl. 6550', ob. Kreuzblume. Herba et radix Po-  
Wald 1285'. lygalae amarae.

- Saponaria officinalis L. südl. 1560', Seifenwurzel. Radix Saponariae.  
ob. u. unt. Wald 890—1900'.
- Linum usitatissimum L. cultivirt Leinsamen. Semen Lini.  
im ganzen südl. Gebiete und im  
Wald 3472'.
- Malva sylvestris L. südl. 2450', ob. Große Räsepappel. Herba Malvae  
u. unt. Wald 2185'. majoris.
- Malva vulgaris L. südl. 2800', ob. Kleine Räsepappel. Flores et her-  
ba Malvae minoris, hb. Malvae  
vulgaris.
- Althea officinalis L. südl. und im Gibisich. Herba et radix Altheae.  
Wald in Gärten 2700'.
- Tilia grandifolia Ehbg. südl. 3100',  
ob. u. unt. Wald 2170—2917'. Linde. Flores et lignum Tiliae.
- Tilia parvifolia Ehbg. südl. 2600',  
ob. u. unt. Wald 890—1892'. Linde. Flores et lignum Tiliae.
- Hypericum perforatum L. südl. Johannis-Kraut, Johannis-Blut,  
6550', ob. u. unt. Wald 2563'. Hartheu, Gegenkraut, Konrads-  
kraut. Herba (flor. et summita-  
tes) Hyperici.
- Esculus hippocastanum L. südl. u. Rößlastranie. Cortex Hippoca-  
stani. im Wald in Anlagen 1980'.
- Vitis vinifera L. südl. u. im Wald Weinrebe. Folia et baccae Vitis.  
cultivirt 1400'.
- Rhamnus frangula L. südl. 3085', Faulbaum. Cortex Rhamni fran-  
gulae.  
ob. u. unt. Wald 3240'.
- Rhamnus cathartica L. südl. 3000', Kreuzbeeren. Baccae (Drupa)  
ob. u. unt. Wald 2300'. Rhamni catharticae, bacc. Spi-  
nae eervinae.
- Ononis spinosa L. südl. 2880', ob. Hauhechel. Radix (caudex) Ono-  
nidis.  
u. unt. Wald 1080'.
- Melilotus officinalis Desr. südl. Meliloten, Steintlee. Herba Me-  
2450', ob. u. unt. Wald 1080'. liloti.
- Prunus avium L. (Cerasus dulcis Süßkirschen. Drupa Cerasi dul-  
Gärtn.) südl. 3400', ob. u. unt. cis, Cerasa nigra.  
Wald 3220'.
- Prunus cerasus L. (Cerasus acida Sauerkirschen. Drupa Cerasi aci-  
dae.  
Gärtn.) cultivirt.
- Prunus domestica L. cultivirt. Pflaumen, Zwetschken. Drupa  
Pruni. Fructus Prunorum.
- Prunus spinosa L. südl. 2490', ob. Schwarzbörn, Schlehen. Flores  
u. unt. Wald 2490'. Pruni spinosae, flores Aca-  
ciarum, flores Pruni sylvestris.

- Prunus padus L. südl. 4450', ob. u. Ahlfirische, Traubentirsche. Cortex  
unt. Wald 2145'. Pruni padi.
- Spiraea filipendula L. südl. 2450', Spierstaude. Radix Filipendulae.  
ob. u. unt. Wald 1010'.
- Geum urbanum L. südl. 2450', ob. Benebittentraut, Nellenwurz. Ra-  
dix (rhizoma) Gei urbani, rad.  
Caryophyllatae, radix Sana-  
mundae.
- Rubus Idaeus L. südl. 5700', ob. Himbeere. Baccae Rubi Idaeui.  
u. unt. Wald 4530'.
- Rubus fruticosus L. südl. 4000', Brombeere. Baccae Rubi vulga-  
ris, baccae Rubi nigri, Mora  
Rubi.
- Fragaria vesca L. südl. 5104', ob. Erdbeeren. Radix (rhizoma) Fra-  
u. unt. Wald 4540'. gariac.
- Rosa gallica L. südl. 1604', ob. u. Buderrose, Essigrose. Flores (co-  
rolla) Rosarum rubrarum.  
Wald 1400'.
- Rosa centifolia L. cultivirt 2500'. Centifolie, Gartenrose. Flores  
(corolla) Rosarum pallidarum,  
flor. Ros. incarnatarum.
- Rosa canina L. südl. 4085', ob. u. Rosenäpfel, Rosensamen, Hain-  
unt. Wald 2910'. butten, Hagebutten. Fructus et  
semen (achenium) Rosae, fruct.  
et semen Cynosbati.
- Agrimonia Eupatoria L. südl. 2086', Obermenig, Adermenig, Leber-  
ob. u. unt. Wald 1080'. Klette, Steinwurz. Herba Lap-  
pulae hepaticae, herb. Eupato-  
rii veterum.
- Alchemilla vulgaris L. südl. 7600', Frauenmantel, Thaurose, Sinau.  
ob. u. unt. Wald 4500'. Herba et radix Alchemillae.
- Cydonia vulgaris L. cultivirt. Quitten. Fructus et semen Cy-  
doniae.
- Pyrus malus L. südl. 2967', Wald Apfel. Fructus Pyri, Poma aci-  
2455'. dula, Fructus mali.
- Cucurbita pepo L. cultivirt 1988'. Kürbis. Semen Cucurbitae.
- Bryonia alba L. südl. u. im ob.)  
Wald 1300'.  
Bryonia dioica L. südl. 1800', ob.)  
Wald 1175'. { Gichtrübe, Zaunrübe. Radix (cau-  
dex) Bryoniae.
- Ribes rubrum L. südl. 1450', ob. Johannisbeeren. Baccae Ribe-  
Wald 1050'. siorum rubrorum. Baccae Ri-  
bium.

- Ribes nigrum L. südl. 1550', ob. Schwarze Johannisbeeren, Ahl-  
Wald wie vorige. beeren, Gichtbeeren. Baccac Ri-  
bis nigri.
- Sanicula europaea L. südl. 3800', Sanikel. Herba Diapensiae.  
ob. u. unt. Wald 3140'.
- Astrantia major L. südl. 4500'. Schwarze Meisterwurz. Radix  
Astrantiac, rad. Imperatoriae  
nigrac.
- Eryngium campestre L. südlich Brach =, Kraus =, Nasen = Ditsel,  
1100'. Glend =, Unruh =, Stech-Wurzel.  
Radix (caudex) Eryngii, rad.  
Asterii inguinalis, rad. Capi-  
tuli Martis, rad. acus Veneris.
- Carum carvi L. südl. 5500', ob. u. Kummel. Semen (mericarpium)  
Wald 2170'. Carvi.
- Pimpinella saxifraga L. südlich Pfefferwurz, Bibernell. Radix  
6900', ob. u. unt. Wald 2600'. (caudex) Pimpinellae, radix  
Dracoselini.
- Foeniculum officinale All. i. Wald Fenchel. Herba, radix (caudex)  
gebaut 2019'. et semen (mericarpium) Foeni-  
culi.
- Oenanthe phellandrium Link. süd- Wasserfenchel, Rößfenchel. Semen  
lich 1460', ob. Wald 1163'. (mericarpium) Phellandrii.
- Levisticum officinale Koch i. Wald Liebstöckel. Semen (mericarpium)  
als Hausmittel gebaut 3000'. et radix (caudex) Levistici.
- Angelica sylvestris L. südl. 5100', Wilde Angelika. Radix (caudex)  
im ob. u. unt. Wald 3300'. Angelicae sylvestris.
- Archangelica officinalis Hoffm. im Engelwurz. Semen (mericar-  
Wald cultivirt 2500'. pium) et radix (caudex) Ar-  
changelicae.
- Peucedanum officinale L. südlich Sau = Fenchel, Schwefel = Wurzel,  
1200', ob. u. unt. Wald 1050'. Haarstrang. Radix (caudex)  
Peucedani, rad. foeniculi por-  
cini.
- Peucedanum palustre Mönch. Delsenich. Radix (caudex) Ols-  
(Thysselinum palustre Hoffm.) nitzii.  
südl. 2700', ob. Wald 3345'.
- Anethum graveolens L. im Wald Dill. Folia et semen (mericar-  
in Gärten gebaut, um Bogen ver- pium) Anethi.  
wildert.
- Heracleum Sphondylium L. südl. Bärenklaue, Heilkraut, Kühpasti-  
3105', ob. u. unt. Wald 2170'. naße. Herb. Heraclei, hb. Bran-  
cae ursinae, hb. Sphondylii.

- Laserpitium siler L. südl. 1569' Rostkummel. Semen (mericarpium) Laserpitii, sem. Sileris montani, sem. Seseleos, sem. Seselineos.
- Laserpitium latifolium L. südlich Hirshwurz, weißer Enzian. Radix Gentianae albae. 5300', ob. Wald 1200'.
- Daucus carota L. südl. 3200', ob. Möhre, Mohrrübe, gelbe Rübe, u. unt. Wald 2230'. gelbe Wurzel. Radix (caudex) Dauci.
- Anthriscus cerefolium Hoffm. südlich u. im Wald verwildert. Kerbel. Folia cerefolii.
- Conium maculatum L. südl. 2306', ob. u. unt. Wald 1740'. Gefleckter Schierling. Herba et semen (mericarpium) Conii maculati, herba et semen Cicutae.
- Coriandrum sativum L. südl. verwildert. Schwindelförner. Semen (mericarpium) Coriandri.
- Viscum album L. südl. 2600', ob. u. unt. Wald 1627'. Mistel. Stipites (truncus) Visci.
- Sambucus nigra L. südlich u. im Glieder, Hollunder. Flores et baccae Sambuci. Wald 3300'.
- Sambucus ebulus L. südl. 4028', ob. u. unt. Wald 1210'. Altich. Baccae Ebuli.
- Asperula odorata L. südl. 2800' ob. u. unt. Wald 1309 — 3289'. Negerkraut. Sternleberfr. Waldmeister. Herba Asperulae, hrb. Matrisylvae.
- Valeriana officinalis L. südl. 3200' ob. u. unt. Wald 2400'. Rottenwurz, Augenwurz, Speerwurz, Kazenwurz, Baldrian. Radix (rhizoma) Valerianae, rad. Polemonii, Nardus agrestis.
- Succisa pratensis Mönch. südlich Teufelsabbiss. Radix (rhizoma) 3200' ob. u. unt. Wald 1600'. Succisae, radix Morsus diaconi.
- Eupatorium cannabinum L. südl. wie vor.; ob. u. unt. Wald 1309'. Wasserhanf, Wassersenf, Wasserbost. Herba Eupatorii, herb. Cannabinæ aquaticeæ, herb. St. Kunigundæ.
- Tussilago farfara L. südl. 4550' ob. u. unt. Wald 2837'. Husflattich, Moßhuf, Brustlattich. Flores et Folia Farfarae, herba Tussilaginis, herba Ungulæ caballinae.
- Petasites officinalis Mönch. südlich Pestwurz, Wasserllette. Radix 4242'. (caudex) Petasitidis.

- Bellis perennis L. südl. 5524' ob. Marienblümchen, Gänseblümchen,  
u. unt. Wald 4068'. Masliebe, Tauendöschön. Flores  
Bellidis minoris, flr. Symphyti  
minimi.
- Solidago virgo aurea L. südl. 5269' Goldrute, Petersstab, gold. Wund-  
ob. u. unt. Wald 1000 — 4500'. fraut. Herba Solidaginis, herb.  
Virgæ aureac, hrb. Consolidae  
Saracenicae.
- Inula helenium L. cultivirt i. Wald, Alant. Radix Euulæ.  
südl. verwilbert.
- Helichrysum arenarium Dec. südl. 1560' Mottenkraut, wildes Strohblüm-  
ob. u. unt. Wald 1350'. chen. Flores et herb. Stöchados  
citrinæ.
- Artemisia absinthium L. südl. 1100' Wermuth. Herba Absinthii.  
ob. u. unt. Wald 2300'.
- Artemisia vulgaris L. südl. 1860' Beifuß. Folia et radix (caudex)  
ob. u. unt. Wald 2300'. Artemisiac.
- Tanacetum vulgare L. südlich wie Rainfarn, Wurmkraut. Herba et  
vorige, ob. u. unt. Wald 1700'. semen (achenium) Tanaceti,  
semen Cinac Germanicae.
- Achillea millefolium L. südl. 4927', Schafgarbe, Sichelkraut. Herba  
ob. und unt. Wald 4500'. Millefolii.
- Matricaria chamomilla L. südlich Kamille. Flores Chamomillæ, flr.  
2545' ob. u. unt. Wald 4068'. Chamaemeli.
- Chrysanthemum parthenium Pers. Mutterkraut, Bertramwurz, Mert-  
ob. u. unt. Wald 1720'. ram, Herba Matricariae, hrb.  
Pyrethri.
- Arnica montana L. südl. 6337' ob. Wohlverlei, Fallkraut. Flores, fo-  
u. unt. Wald 4500'. lia et radix (rhizoma) Arnicæ.
- Lappa major Gärtn. südl. 2600' ob.  
u. unt. Wald 1420'. }  
Lappa minor Dec. südl. 4000'. ob.  
u. unt. Wald 2170'. } Klettenwurzel. Radix Bardanae.  
Lappa tomentosa Lam. südl. 4400'  
ob. u. unt. Wald 1488'. }
- Centaurea cyanus L. südl. 2450' ob. Kornblume, Glodenblume. Flores  
u. unt. Wald 2310'. (corolla) Centaurei, flor. Cyani.
- Cichorium intybus L. südl. 2450' Wegwart, Cichorie. Folia et radix  
ob. u. unt. Wald 1735'. (caudex) Cichoriae.
- Scorzonera hispanica L. südlich Haferwurz, Schwarzwurz, Scorzo-  
1550'. nere. Radix (caudex) Scorzo-  
nærae.

- Taraxacum officinale. Wigg. südl. Löwenzahn, Pfaffenöhrchen, Ruh-  
7745' ob. u. unt. Wald 4510'. blume. Herba et radix Tar-  
raxaci.
- Lactuca virosa L. Um Deggendorf. Giftlattich. Herba Lactucac viro-  
sac.
- Lactuca sativa L. cultivirt. Lactucarium. Thridax.
- Vaccinium myrtillus L. südl. 7040' Schwarz-, Blau-, Vid-, Heidel-Bee-  
ob. u. unt. Wald 4500'. ren. Baccae Myrtilli.
- Arctostaphylos officinalis L. südl. Bärentraube. Folia Arctosta-  
1420—6200'. phyli, Herba Uvac ursi.
- Fraxinus excelsior L. südl. 4200' Esche. Cortex Fraxini.  
ob. u. unt. Wald 2917'.
- Vincetoxicum officinale Mönch. Schwalbenwurz. Radix (rhizoma)  
Cyanchum vincetoxicum R. Br. Vincetoxici, rad. Hirundina-  
südl. 5200' ob. u. unt. Wald 1308'. riae.
- Vinca minor L. südl. 2450' ob. u. Wintergrün, Immergrün. Herba  
unt. Wald 2500'. Vincae minoris, pervincae.
- Menyanthes trifoliata L. sbl. 5600' Bitter-, Fieber-, Magen-Klee, Drei-  
ob. u. unt. Wald 3240'. blatt, Wiesenmangold, Schat-  
tenklee. Folia et rad. (rhizoma)  
Trifolii fibrini.
- Gentiana Pannonica L. südl. 3220  
bis 4500'. } Schweizer Enzian. Rad. (caudex)
- Gentiana cruciata L. südl. 3500'  
ob. W. 1100'. } Gentianac.
- Erythrea centaureum L. sbl. 2500' Tausendguldenkraut. Herba Cen-  
ob. u. unt. Wald 1400'. taurei minoris.
- Cynoglossum officinale L. südl. Hundszungenwurzel. Radix (cau-  
4200' ob. Wald 1050'. dex) Cynoglossi.
- Anchusa officinalis L. südl. 1800' Ochsenzunge. Herba et radix Bu-  
ob. u. unt. Wald 1308'. glossi, hrb. et rd. linquae bovis.
- Symphytum officinale L. südl. Schwarzwurz. Wallwurz. Radix  
3000' ob. u. unt. Wald 3226'. (caudex) Symphyti, radix Con-  
solidae majoris.
- Pulmonaria officinalis L. sbl. 2450' Lungenkraut. Herb. Pulmonariae.  
ob. u. unt. Wald 3450'.
- Lithospermum officinale L. südl. Steinsame, Meerhirse, Steinhirse,  
2450' ob. u. unt. Wald 1150'. Samenhirse. Semen (mericar-  
pium) Lithospermi, sem. Milii  
solis.
- Solanum nigrum L. südl. 2000', ob. Schwarzer Nachtschatten. Herba  
u. unt. Wald 1586'. Solani.

- Solanum tuberosum L. cultiv., im Kartoffel, Erdäpfel, Grundbirne.  
Wald bis 3170'. Tubera Solani tuberosi.
- Physalis Alkekengi L. südl. 1450', Schläuttchen. Judenkirsche. Baccace  
ob. u. unt. Wald 1880'. Alkekengi, Halicababi.
- Solanum Dulcamara L. südl. 2700', Bittersüß, Hirschfrahaut, Halbran-  
ken, Wasserranken. Stipites  
ob. u. unt. Wald 2231'. (truncus) Dulcamarac.
- Atropa Belladonna L. südl. 3450', Tollkirsche. Herba et radix Bella-  
donnae.  
ob. u. unt. Wald 1820'.
- Hyoscyamus niger L. südl. 3200'. Bilzen-, Schlaß-, Zigeuner- Kraut,  
Teufelsauge. Folia, radix et  
semen Hyoscyami.
- Datura stramonium L. südl. 2450', Stech-, Dorn-, Rauh-Apfel. Hrb.  
ob. u. unt. Wald 1010'. et semen Stramonii.
- Verbascum Schraderi Meyer. südl.  
3700', ob. u. unt. Wald 2190'. .
- Verbascum thapsiforme Schrad.  
südl. 1600', ob. u. unt. Wald 1160'. Himmelbrand, Königskerze, Fa-  
delkraut, Wollkraut. Herba et  
flores Verbasci.
- Verbascum phlomoides Linné.  
südlich 2000', ob. u. unt. Wald  
1200'. .
- Gratiola officinalis L. südl. 1460' Gnadenkraut, Gottesgnadenkraut,  
und um Deggendorf. Burgirkraut, wild. Aurin. Her-  
ba Gratiolae.
- Scrophularia nodosa L. südl. 3900', Braunwurz, Knollenwurz. Radix  
ob. u. unt. Wald 3332'. (rhizoma) Scrophulariae.
- Digitalis purpurea L. südl. 1500', Rother Fingerhut. Hrb. Digitalis.  
ob. Wald 1150'.
- Linaria vulgaris Miller. südl. und Frauenflachs. Marienflachs. Lö-  
im Wald bis 2450'. wenmaul. Herba Linariae.
- Veronica officinalis L. südl. 5290', Ehrenpreis, Grundheil. Herba  
ob. u. unt. Wald. 4227'. Veronicae.
- Lathraea squamaria L. südl. 2600', Schuppenwurz. Radix (rhizoma)  
ob. Wald 2020'. Squamariae, rad. Dentariae  
majoris.
- Euphrasia officinalis L. südl. 6900', Augentrost. Herba Euphrasiac.  
ob. u. unt. Wald 3300'.
- Lavandula vera Dec. Im Wald Lavendel. Flores et herba Lavan-  
dulac.
- Mentha piperita L. cultivirt. Pfeffermünze. Herba Menthae pi-  
peritae.

- Mentha sylvestris L. südl. 4500', Krausmünze. Herba Menthae  
ob. u. unt. Wald 1720'. cripsiæ.
- Pulegium vulgare Miller. südl. u. Polei. Herba Pulegii.  
im ob. Wald 1100'.
- Salvia officinalis L. cultivirt.
- Salvia pratensis L. südl. 2450', } Salbei. Herba Salviae.  
ob. u. unt. Wald 1810'.
- Origanum vulgare L. südl. 5500', Dosten. Herba Origanii.  
ob. u. unt. Wald 1892'.
- Thymus serpyllum L. südl. 7800', Quendel, Feldquendel, wild. Thymian. Herba Serpylli.  
ob. u. unt. Wald 2810'.
- Glechoma hederacea L. sbl. 4200', Gundermann, Gundelrebe. Herba  
ob. u. unt. Wald 2810'. Hederae terrestris.
- Lamium album L. südl. 5000', ob. Taube Nessel, Vieenzaug. Flores  
u. unt. Wald 1800'. (corolla) Lamii albi, flor. Urticaceae mortuac.
- Stachys recta L. südl. 2000', ob. u. Beruf-, Ruf-, Schrei-, Glied-Kraut,  
unt. Wald 1300'. Weißer Ziest. Herba Stachydis  
rectae.
- Ballota nigra L. südl. u. im Wald Schwarzer Umborn. Herba Marrubii nigri vel foetidi.
- Prunella vulgaris L. südl. 4800', }  
ob. u. unt. Wald 2754'.
- Prunella grandiflora Jaqu. südl. } Braunheil. Herba Prunellae.  
5500', ob. Wald 1150'.
- Ajuga chamaepitys Schreb. südlich Feldcypresse, Schlagkraut, Erd-  
1480', ob. Wald 1289'. weihrauch. Herba Ivae arthriticae.
- Teucrium scordium L. südl. 1460', Lachenknoblauch. Herba Scordii.  
ob. Wald 990'.
- Teucrium chamaedrys L. südlich Gamander ächter ob. edler, Frau-  
3400', ob. Wald 1250'. enbiß, Rathengel. Herba Trixaginis.
- Primula officinalis Jaqu. sbl. 2450', Schlüsselblume, Himmels-, Peters-  
ob. u. unt. Wald 1980'. Schlüssel. Flores (corolla) Primulae verae, flor. Paralyseos.
- Cyclamen Europaeum L. südlich Erdölhebe, Saubrod. Radix (cau-  
2800', unt. Wald 1300'. dex) Cyclaminis, rad. Arthaniæ.
- Plantago major L. südl. 5550', ob. Wegerich, Wegetritt, Wegeblatt,  
u. unt. Wald 3236'. Wegebret. Radix (rhizoma)  
Plantaginis.

Rumex obtusifolius L. sbl. 4600', ob. u. unt. Wald 3938'.	Grindwurz. Radix (caudex) Ru-	micis, radix Lapathi acuti.
Rumex crispus Lam. südl. 2550', ob. u. unt. Wald 2000'.		
Rumex conglomeratus Munray. südl. 2450', ob. u. unt. Wald 3637'.		
Polygonum bistorta L. südl. 5500', ob. u. unt. Wald 4100'.	Krebs-, Mutter-, Otter-, Schlangen- Wurz. Radix (rhizoma) Bis- tortae.	
Polygonum sagopyrum L. Seltener cultiv., wild am Haunstein 2600'.	Buchweizen. Semen (achenium) Polygoni.	
Daphne mezereum L. südl. 5800', ob. u. unt. Wald 2500'.	Seidelbast, Kellerhals, Knoblauch- Körner, Heilanbrinde. Radix et cortex Mezerei, cort. Thymel- eae, Baccae Daphnes, Semen Coccognidii.	
Aristolochia clematitis L. südlich Österluzei. 1450'.	Aristolochiae clematitidis vel vulgaris.	
Asarum Europaeum L. südl. 3450', ob. u. unt. Wald 2280'.	Hasselwurz. Radix (rhiz.) Asari.	
Urtica dioica L. südl. 5000', ob. u. unt. Wald 4500'.	Nessel. Herb. et semen (achenium)	
Urtica urens L. südl. 2500', ob. u. unt. Wald 2172'.	Urticae majoris et minoris.	
Ulmus campestris L. südl. 3090', ob. u. unt. Wald 3050'.	Ulme. Cortex Ulmi.	
Ulmus effusa Ehbg. südl. 1800', ob. u. unt. Wald 3050'.		
Cannabis sativa L. cultivirt.	Hanf. Semen (achenium) Can- nabis.	
Humulus lupulus L. cultivirt.	Hopfen. Strobuli, coni (fructus) Lupuli.	
Juglans regia L. cultivirt.	Walnuß. Cortex (Sarcocarpium) et Drupa Juglandis immatura.	
Quercus sessiliflora Sm. südlich 1800', ob. Wald 2200'.	Eiche. Cortex et semen (ache- nium) Quercus.	
Quercus pedunculata Willd. südl. 2925', ob. u. unt. Wald 2425'.		
Salix fragilis L. südl. 1600', ob. u. unt. Wald 2330'.	Weide. Cortex Salicis.	
Salix alba L. südl. 2515', ob. u. unt. Wald 1230'.		

- Salix purpurea* L. südl. 3376', ob. Weide. Cortex Salicis.  
u. unt. Wald 2400'.
- Populus nigra* L. südl. 2450', ob. Pappel. Gemmae Populi.  
u. unt. Wald 1050'.
- Taxus baccata* L. südlich 1150 — Eibenbaum. Herba (Folia, rami) Taxi.
- Juniperus communis* L. südl. 4300', Waldholder. Fructus (baccæ) et lignum Juniperi.
- Pinus abies* L. (*Abies excelsa* Dec.) Rotthanne, Schwarzanne, Fichte.  
südlich 5311', ob. u. unt. Wald Lignum et gemmae Pini abietis.  
4500'.
- Pinus sylvestris* L. südl. 4918', ob. Kiefer, Föhre. Lignum et turiones (gemmae) Pini.  
u. unt. Wald 2921'.
- Pinus picea* L. (*Abies pectinata* Dec.) Tanne, Weißtanne. Gemmae (turiones) pini piceae, turiones abietis, ramusculi abietis.
- Alisma plantago* L. südl. 3500', ob. Frostlöffel. Radix (rhizoma) Alismatis, radix Plantaginis aquatica.
- Arum maculatum* L. südl. 1320 — Arons-, Magen-, Zehr-Wurzel.  
2800', ob. Wald 1900'. Radix (rhizoma) Ari, radix Aronis.
- Acorus calamus* L. südl. 2450', ob. Rämlus, deutscher Zittwer. Radix (rhizoma) Acori, rad. Calami aromatici.
- Orchis morio* L. südl. 2450', ob. Wald 1000'.
- Orchis mascula* L. südl. 1500 — 5400', ob. u. unt. Wald 2300'.
- Orchis coriophora* L. wie Orch. morio.
- Orchis ustulata* L. wie vorige.
- Orchis militaris* L. südl. 2200'.
- Anacamptis pyramidalis* Rich. südl. 1460'.
- Platanthera bifolia* Rich. südlich 5000', ob. u. unt. Wald 2500'.
- Platanthera chlorantha* Reichenbach südl. 1450 — 5000', ob. Wald 1500'.
- Iris Germanica* L. als Zierpflanze.
- Iris Pseudacorus* L. südlich 2000, ob. u. unt. Wald 2300'.
- Salep. Radix (tuberidium) Orchidis, rad. Salep.
- Veilchenwurzel. Radix (rhizoma) Iridis.

Asparagus officinalis L. <i>cultivirt.</i>	Spargel. Radix (rhizoma) Asparagi, radix Alticis.
Convallaria majalis L. südl. 4500', ob. u. unt. Wald 2100'.	Maiblumen, Zaunden. Flores Convallariae, flores Liliorum convallium.
Lilium martagon L. ob. u. unt. Radix (bulbus) Asphodeli. Wald 3349'.	
Allium sativum L. <i>cultivirt.</i>	Knoblauch. Radix (bulbus) Allii sativi.
Allium cepa L. <i>cultivirt.</i>	Zwiebel, Gartenzwiebel. Radix (bulbus) Cepae.
Colchicum autumnale L. südlich 4300', ob. u. unt. Wald 1050'.	Zeitlose. Radix (bulbus) et semen Colchici.
Avena sativa L.	Haber. Semen (achenium) Avenae.
Triticum vulgare Vill.	Weizen. Semen (achenium) Tritici.
Triticum Spelta L.	Roggen. Semen (achenium) Secalis.
Secale cereale L.	Gerste. Semen (achenium) Hordei,
Hordeum vulgare L.	
Hordeum hexastichon L.	
Hordeum distichon L.	
Hordeum zeocriton L.	
Triticum repens L. südlich 2500', ob. u. unt. Wald 3226'.	Queckenwurzel, Graswurzel. Radix (rhizoma) Graminis.
Equisetum arvense L. südl. 2400', ob. u. unt. Wald 1050'.	Scheuerkraut, Durok. Herb. Equiseti minoris.
Lycopodium selago L. ob. u. unt. Wald 1090—4500'.	
Lycopodium annotinum L. südl. 1100—5500', ob. u. unt. Wald 2000—2500'.	Herzenmehl, Blüzpulver. Semen (Pulvis) Lycopodii.
Lycopodium complanatum L. südl. 1900.	
Lycopodium clavatum L. südlich 5000', ob. u. unt. Wald 3200'.	
Polypodium vulgare L. sbl. 4200', ob. Wald 1399—4500'.	Engelsfuß, Kropf-, Korallen-Wurzel. Radix Polypodii.
Polystichum filix mas Roth. südl. 5200', ob. u. unt. Wald 3316'.	Wurmfarn, Farnwurzel. Radix Filicis maris.
Asplenia ruta muraria L. südlich 2450', ob. u. unt. Wald 2300'.	Herba Rutaes murariae.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Passau](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Verzeichniß der officinellen Pflanzen Niederbayerns 34-46](#)