© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Nachträge

zur

Flora von Schwaben und Neuburg,

insbesondere

neue Fundorte in der Umgegend von Augsburg.

Helleborus viridis L. Auf Wiesen um Untrasried bei Obergünzburg. Lehrer *Wengenmayr* in Oberrieden bei Mindelheim.

Helianthemum Fumana Mill. Heide vor dem Siebentischwalde. *Weinhart.*

Viola stagnina Kit. Am Stiessberg bei Oberstaufen. *Weinhart.*

Viola calcarata L. Falken-Eck bei Hinterstein. *Schorer.*

Spergularia rubra Presl. (= Lepigonum rubrum Wahlb.) Strassenränder bei Luisensruhe und auf Lehmboden am Ziegelstadel bei Stadtbergen. *Lutzenberger.*

Hypericum pulchrum L. Waldweg zwischen Diebelthal und Bannacker. *Lutzenberger.*

Potentilla collina Wiebel. Sonnige Raine bei Friedberg. *Lutzenberger.*

Potentilla minima Haller fil. Daumen und Nebelhorn. *Wengenmayr.*

Rosa alpina L. var. lagenaria Vill., am Pöllatfall bei Neuschwanstein, bei Hindelang etc.; var. laevis Seringe, Ge-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

büsch am Ufer der Weissach bei Oberstaufen und am Schwansee bei Hohenschwangau, dann am Stuiben bei Immenstadt; var. curtidens Chr. und var. aculeata Seringe, zwischen Schattwald und Oberjoch bei Hindelang; var. pyrenaica Gouan und var. globosa Seringe, in Gebüsch um Faulenbach bei Füssen; var. parvifolia Favrat, am Steineberg bei Immenstadt. *Weinhart.*

Rosa tomentosa Sm. **var. scabriuscula Baker.** Hecke am Wege von Bad Oberdorf zum Wasserfall. *Weinhart.*

Rosa gallica L. Ackerraine bei Friedberg. *Lutzenberger.*

Alchemilla pubescens M. B. Eckwiesen bei Hinterstein, 900 m. *Schorer.*

Peucedanum Chabraei Rchb. Gräben und Raine bei Stadtbergen und Pfersee. *Lutzenberger.*

Myrrhis odorata Scop. An einem Gartenzaune auf dem Schlossberge bei Oberstaufen. (qu. sp.?) *Weinhart.*

Viscum album L. Auf einem Apfelbaume in Oberzell bei Friedberg. *Lutzenberger.*

Aster parviflorus Jacq. In den Wertachauen bei der Schiessstätte. *Henle.*

Achillea Millefolium L. var. alpestris W. u. Gr. (= Ach. magna Haenke.) Am Schnee-Eck, **2200 m.** *Schorer.*

Matricaria discoidea DC. (= Chrysanthemum suaveolens Aschers.) An Wegen bei Alt-Offingen. Stabsveterinär *Kränzle.*

Senecio cordatus × Jacobaea (= S. Reisachii Grembli.) Oberjoch bei Hindelang. *Schorer.*

Cirsium palustre × oleraceum Naeg. (= C. hybridum Koch.) Feuchte Waldränder im Diebelthal. *Lutzenberger.*

Carduus crispus L. Unter der Eisenbahnbrücke bei Oberhausen. *Lutzenberger.*

Saussurea alpina L. Schnee-Eck, 2200 m. und Kugelhorn, 2148 m. *Schorer.*

Saussurea discolor DC. (Neu für Bayern.) Am Kirchdach, 1480 m., Aelpeleskopf und Glasfeldkopf. *Schorer.*

Lactuca Scariola L. Am hohlen Stein bei Unter-Medlingen. *Wengenmayr.*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Azalea procumbens L. Kugelhorn, Kirchdach, Lahner, Wildsee etc. *Schorer.*

Erica carnea L. An der Iller zwischen Kempten und Kottern. *Wengenmayr.*

Orobanche lucorum A. Br. Auf Medicago falcata in der Friedberger-Au. *Lutzenberger.*

Orobanche minor Sutt. Auf Papilionaceen in den Lechauen. *Lutzenberger.*

Utricularia minor L. Wiesenmoore bei Oberrieden. *Wengenmayr.*

Oxyria didyma Campd. Trümmergestein zwischen Ochsenalpe und Schöneberg. *Schorer.*

Daphne striata Trattn. Vordere Heidach, Sulz etc., 860—880 m. *Schorer.*

Potamogeton fluitans L. In der Schmutter bei Batzenhofen. *Lutzenberger.*

Potamogeton lucens L. Weiher bei Oberrieden. *Wengenmayr.*

Nigritella angustifolia × Gymnadenia odoratissima (= N. Heufleri Kerner). Rothspitze. *Schorer.*

Herminium Monorchis R. Br. Wertachauen bei Pfersee. *Wiedemann.*

Chamaeorchis alpina Rich. Daumen und Glasfeldkopf. *Schorer.*

Listera cordata R. Br. Eisenbreche, Taufersalpe, Sulz etc. *Schorer*; am Grünten bei c. 1200 m. *Wengenmayr.*

Corallorrhiza innata R. Br. Berggündlethal, Willersalpe, Sulz etc. *Schorer;* bei Kempten *Wengenmayr.*

Tulipa silvestris L. Hecken bei Pfersee. *Lutzenberger*

Hemerocallis flava L. In den Lechauen unterhalb Lechhausen. *Henle.*

Tofieldia calyculata Whlb. var. ramosa Hoppe. Am Daumen. *Wengenmayr.*

Gagea lutea Schult. Willersalpe, 1440 m. und auf Wiesen bei Hinterstein, 860 m. *Schorer.*

Juncus triglumis L. Wildsee, 1801 m. etc. *Schorer.*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Eriophorum alpinum L. Im Haspelmoor. *Euringer* und *Henle.*

Carex nigra All. Am Daumen, Koblat. *Schorer.*

Carex capitata L. und Carex Buxbaumii Whlb. Wiesenmoore bei Oberrieden. *Wengenmayr.*

Avena caryophyllea Web. Sandige Waldränder bei Luisensruhe. *Lutzenberger.*

Equisetum hiemale L. var. viride Milde. Heide vor dem Siebentischwalde. *Weinhart.*

Equisetum Telmateja Ehrh. var. serotinum A. Br. Sumpfige Wiese am Krebs-Fall bei Oberstaufen. *Weinhart.*

Equisetum ramosum Schleich (= E. ramosissimum Desf.) Trockene Gräben bei Westheim. *Weinhart.*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 29

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Nachträge zur Flora von Schwaben und Neuburg, insbesondere neue Fundorte in der Umgegend von Augsburg 307-310