

# Nachträge

zur

## Flora von Schwaben und Neuburg,

insbesondere

neue Fundorte in der Umgegend von Augsburg.

---

*Helleborus viridis* L. Auf Wiesen um Untrasried bei Obergünzburg. Lehrer *Wengenmayr* in Oberrieden bei Mindelheim.

*Helianthemum Fumana* Mill. Heide vor dem Siebentischwalde. *Weinhart*.

*Viola stagnina* Kit. Am Stiebsberg bei Oberstaufen. *Weinhart*.

*Viola calcarata* L. Falken-Eck bei Hinterstein. *Schorer*.

*Spergularia rubra* Presl. (= *Lepigonum rubrum* Wahlb.) Strassenränder bei Luisensruhe und auf Lehmboden am Ziegelstadel bei Stadtbergen. *Lutzenberger*.

*Hypericum pulchrum* L. Waldweg zwischen Diebelthal und Bannacker. *Lutzenberger*.

*Potentilla collina* Wiebel. Sonnige Raine bei Friedberg. *Lutzenberger*.

*Potentilla minima* Haller fil. Daumen und Nebelhorn. *Wengenmayr*.

*Rosa alpina* L. var. *lagenaria* Vill., am Pöllatfall bei Neuschwanstein, bei Hindelang etc.; var. *laevis* Seringe, Ge-

büsch am Ufer der Weissach bei Oberstaufen und am Schwansee bei Hohenschwangau, dann am Stuiben bei Immenstadt; var. *curtidens* Chr. und var. *aculeata* Seringe, zwischen Schattwald und Oberjoch bei Hindelang; var. *pyrenaica* Gouan und var. *globosa* Seringe, in Gebüsch um Faulenbach bei Füssen; var. *parvifolia* Favrat, am Steineberg bei Immenstadt. *Weinhart*.

*Rosa tomentosa* Sm. var. *scabriuscula* Baker. Hecke am Wege von Bad Oberdorf zum Wasserfall. *Weinhart*.

*Rosa gallica* L. Ackerraine bei Friedberg. *Lutzenberger*.  
*Alchemilla pubescens* M. B. Eckwiesen bei Hinterstein, 900 m. *Schorer*.

*Peucedanum Chabraei* Rechb. Gräben und Raine bei Stadtbergen und Pfersee. *Lutzenberger*.

*Myrrhis odorata* Scop. An einem Gartenzaune auf dem Schlossberge bei Oberstaufen. (qu. sp.?) *Weinhart*.

*Viscum album* L. Auf einem Apfelbaume in Oberzell bei Friedberg. *Lutzenberger*.

*Aster parviflorus* Jacq. In den Wertachauen bei der Schiessstätte. *Henle*.

*Achillea Millefolium* L. var. *alpestris* W. u. Gr. (= *Ach. magna* Haenke.) Am Schnee-Eck, 2200 m. *Schorer*.

*Matricaria discoidea* DC. (= *Chrysanthemum suaveolens* Aschers.) An Wegen bei Alt-Offingen. Stabsveterinär *Kränzle*.

*Senecio cordatus* × *Jacobaea* (= *S. Reisachii* Grembli) Oberjoch bei Hindelang. *Schorer*.

*Cirsium palustre* × *oleraceum* Naeg. (= *C. hybridum* Koch.) Feuchte Waldränder im Diebelthal. *Lutzenberger*.

*Cardus crispus* L. Unter der Eisenbahnbrücke bei Oberhausen. *Lutzenberger*.

*Saussurea alpina* L. Schnee-Eck, 2200 m. und Kugelhorn, 2148 m. *Schorer*.

*Saussurea discolor* DC. (Neu für Bayern.) Am Kirchedach, 1480 m., Aelpeleskopf und Glasfeldkopf. *Schorer*.

*Lactuca Scariola* L. Am hohlen Stein bei Unter-Medlingen. *Wengenmayr*.

*Azalea procumbens* L. Kugelhorn, Kirchdach, Lahner, Wildsee etc. *Schorer*.

*Erica carnea* L. An der Iller zwischen Kempten und Kottern. *Wengenmayr*.

*Orobanche lucorum* A. Br. Auf *Medicago falcata* in der Friedberger-Au. *Lutzenberger*.

*Orobanche minor* Sutt. Auf Papilionaceen in den Lechauen. *Lutzenberger*.

*Utricularia minor* L. Wiesenmoore bei Oberrieden. *Wengenmayr*.

*Oxyria didyma* Campd. Trümmergestein zwischen Ochsenalpe und Schöneberg. *Schorer*.

*Daphne striata* Trattn. Vordere Heidach, Sulz etc., 860—880 m. *Schorer*.

*Potamogeton fluitans* L. In der Schmutter bei Batzenhofen. *Lutzenberger*.

*Potamogeton lucens* L. Weiher bei Oberrieden. *Wengenmayr*.

*Nigritella angustifolia* × *Gymnadenia odoratissima* (= *N. Heufleri* Kerner). Rothspitze. *Schorer*.

*Herminium Monorchis* R. Br. Wertachauen bei Pfersee. *Wiedemann*.

*Chamaeorchis alpina* Rich. Daumen und Glasfeldkopf. *Schorer*.

*Listera cordata* R. Br. Eisenbreche, Taufersalpe, Sulz etc. *Schorer*; am Grünten bei c. 1200 m. *Wengenmayr*.

*Corallorrhiza innata* R. Br. Berggündlethal, Willersalpe, Sulz etc. *Schorer*; bei Kempten *Wengenmayr*.

*Tulipa silvestris* L. Hecken bei Pfersee. *Lutzenberger*

*Hemerocallis flava* L. In den Lechauen unterhalb Lechhausen. *Henle*.

*Tofieldia calyculata* Whlb. var. *ramosa* Hoppe. Am Daumen. *Wengenmayr*.

*Gagea lutea* Schult. Willersalpe, 1440 m. und auf Wiesen bei Hinterstein, 860 m. *Schorer*.

*Juncus triglumis* L. Wildsee, 1801 m. etc. *Schorer*.

*Eriophorum alpinum* L. Im Haspelmoor. *Euringer*  
und *Henle*.

*Carex nigra* All. Am Daumen, Koblat. *Schorer*.


*Carex capitata* L. und *Carex Buxbaumii* Whlb. Wiesen-  
moore bei Oberrieden. *Wengenmayr*.

*Avena caryophylla* Web. Sandige Waldränder bei  
Luisensruhe. *Lutzenberger*.

*Equisetum hiemale* L. var. *viride* Milde. Heide vor  
dem Siebentischwalde. *Weinhart*.

*Equisetum Telmateja* Ehrh. var. *serotinum* A. Br.  
Sumpfige Wiese am Krebs-Fall bei Oberstaufen. *Weinhart*.

*Equisetum ramosum* Schleich (= *E. ramosissimum*  
Desf.) Trockene Gräben bei Westheim. *Weinhart*.







# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Nachträge zur Flora von Schwaben und Neuburg, insbesondere neue Fundorte in der Umgegend von Augsburg 307-310](#)