

Versuch einer Zusammenstellung
der
südbayerischen Hymenopteren.

Von

J. Jemiller.

I.

Tenthredinidae, Ichneumonidae.



Wenn ich es im Folgenden unternehme, die mir bekannten Hymenopteren Südbayerns *) aufzuzählen, so ist der Hauptbeweggrund zur Veröffentlichung dieses anfänglich nur für den eigenen Gebrauch angelegten Verzeichnisses der vollständige Mangel an einer ähnlichen Arbeit, der andere Grund aber, durch Bekanntmachung der reichen Fauna des Gebietes den bei uns leider noch äusserst spärlich vorhandenen Hymenopterenfreunden einen Dienst zu erweisen und vielleicht neue Adepten anzuwerben.

Die Literatur, die mir bei Abfassung meiner Arbeit zu Gebote stand, ist eine sehr spärliche. Zwar beschreibt schon Schrank eine grosse Anzahl von Hymenopteren aus unserm Gebiet, allein seine Beschreibungen sind längst veraltet und zum guten Theil nicht mehr zu deuten. Von den ausserdem in Betracht kommenden Werken hat uns nur Herrich-Schäffer eine einigermassen erschöpfende Aufzählung der seinerzeit bekannten Hymenopteren seines Gebietes gegeben; leider erwähnt er nebenbei eine ganze Anzahl von Arten, (besonders bei den Bienen) deren Beschreibung nie erschienen ist. Die anderen faunistischen Arbeiten enthalten mit verschwindenden Ausnahmen nur ganz gemeine oder überall vorkommende Arten.

Ausser dieser Literatur standen mir die Ergebnisse meiner Exkursionen in die nähere und fernere Umgebung von München und in die bayerischen Voralpen zu Gebote, sowie die Ausbente, welche mir die an hymenopterologischen Seltenheiten so reiche Umgebung des Marktes Trostberg ($2\frac{1}{2}$ Stunden nördlich vom Chiemsee) während der Sommermonate der Jahre 1887—1893 lieferte.

Meine Arbeit wäre aber eine sehr mangelhafte geblieben, wenn mir nicht durch die Güte des Herrn Adjunkten Dr. Kriechbaum er an der hiesigen zoologischen Staatssammlung die Aufzeichnungen über seine langjährigen Sammelergebnisse aus der Umgebung von München, dann Tegernsee, Rosenheim und an-

*) Ich verstehe hier unter Südbayern den südlich der Donau gelegenen Theil des rechtsrheinischen Bayern und ziehe hiezu noch die nächste Umgebung der unmittelbar am linken Donauufer gelegenen Orte.

dern Orten in den Voralpen zur Verfügung gestanden wären. Herrn Zahlmeister a. D. Bayer verdanke ich die Mittheilung seiner Sammelergebnisse in der Nähe von Siegsdorf. Unser rühriger Kustos, Herr J. Munk, hat sich auf meine Anregung hin in letzter Zeit sehr eifrig mit dem Fange der Hymenopteren beschäftigt und meine Arbeit durch Mittheilung seiner Augsburger Funde, sowie einer Anzahl gezogener Schlupfwespen wesentlich gefördert.

Herr Universitätsprofessor Dr. Hertwig, Konservator der zoologischen Staatssammlung, hat mir in liberalster Weise die Benützung derselben gestattet, Hr. Dr. Kriechbaumer mich bei der Bestimmung schwieriger Species aller Gattungen auf's bereitwilligste unterstützt, wie auch Hr. Dr. R. v. Stein in Chodau durch die Bestimmung einer Anzahl zweifelhafter Blattwespen, vorzüglich *Nematus*-Arten. Allen diesen Herren sei auch an dieser Stelle mein herzlichster Dank ausgesprochen.

Vorliegende Arbeit wird in drei aufeinanderfolgenden Jahresberichten erscheinen, und zwar im diesjährigen die Blattwespen und Ichneumoniden, im nächsten die Bienen, Wespen und Ameisen und im darauffolgenden die Braconiden, Chalcididen und Cynipiden.

München, im October 1893.

J. Jemiller.

Benützte Werke:

Schrank, F. P., Verzeichniss beobachteter Insekten im Fürstenthum Berchtesgaden.

Schrank, F. P., *Fauna Boica*.

Ehrhart, Balt. v., Catalog der um Memmingen beobachteten Insekten, in „Gottl. v. Ehrhart, phys.-med. Topographie von Memmingen.“

Gistl, Delectus hymenopterorum a me circa Monachium collectorum und Delectus hymenopterorum a me circa Passariam et Vilsocuriam collectorum in „Vacuna“ Bd. II.

Herrich-Schäffer, Fauna Ratisbonensis und Nomenclator entomologicus.

Mai, Dillingens Raubwespen, im XVI. Berichte des naturw. Vereins zu Augsburg.

Abkürzungen.

A = Augsburg, Hschw = Hohenschwangau, R = Regensburg, Rsh = Rosenheim, Sdf = Siegsdorf, Teg = Tegernsee, Tr = Trostberg.

Tenthredinidae.

Cimbex Ol.

connata Schr. — *M.* *Teg.* *R*; selten, Juli—August.
femorata L. — nebst var. *silvarum* F. — *A.* *M.* *R*.
lutea L. — Verbreitet, doch nirgends häufig. Juni.

Trichiosoma Leach.

betuleti Kl. — { Verbreitet, im Mai.
lucorum L. — { Verbreitet, im Mai.
sorbi Htg. — *Teg.*
vitellinae L. — *M.* *Teg.* *Tr.*

Clavellaria Leach.

amerinae L. — Verbreitet, im Mai.

Abia Leach.

aurulenta Sichel. (*fulgens* Zadd.) — *M.* *A.* *Teg.* *Kreut*; selten.
fasciata L. — Verbreitet; *Tr.* nicht selten, doch nur ♀. Mai—August.
nigricornis Leach. — *A.* *M.* *Teg.* *R*; sehr selten.
nitens L. — { Ueberall nicht selten.
sericea L. — { Mai—Juli.

Amasis Leach.

laeta F. — *M.* *Tr.* *P.* *R*; selten; Mai—Juni.
obscura F. — *R.* nicht selten.

Arge Schr. (*Hylotoma* Ltr.)

aenescens Frst. (*confusa* Dietr.) — *M.*
atrata Forst. — Ueberall nicht selten; Mai—Juli.
berberidis Schr. — Dessgleichen.

- ciliaris* L. — *M.* *Tr.* *Rsh.* *P.* *Ingolstadt.*
coeruleipennis Retz. — Gemein vom Mai—August.
cyanella Kl. — *M.* *Tr.* *Rsh.* *P.* *R.*
cyanocrocea Forst. — Verbreitet.
dimidiata Fall. — *R.* selten.
enodis L. — Verbreitet.
fuscipes Fall. — *A.* *M.* *R.*; einzeln.
melanochroa Gmel. — Ueberall nicht selten. Mai—Juli.
metallica Kl. — *M.* einmal.
pagana Pz. — Häufig.
rosae Deg. — Verbreitet. Mai—Juli.
segmentaria Pz. — *R.*
ustulata L. — Ueberall nicht selten.

Schizocera Ltr.

- furcata* Vill. — Zerstreut; *A.* *M.* *R.*
geminata Gmel. — *R.*
melanura Kl. — *M.* *R.*
tarda Kl. — *Tr.* vier ♀ Ende Mai geschöpft.

Lophyrus Ltr.

- frutetorum* F. — *A.* *M.* *P.* *R.* nicht selten. Juli—August.
hercyniae Htg. — *M.*
laricis Jur. — Verbreitet.
nemorum F. — *M.* *R.* sehr selten.
pallidus Kl. — *A.* *M.* *R.* nicht selten.
pallipes Fall. — *M.* *R.*
pini L. — Verbreitet.
politus Kl. — *R.*
polytomus Htg. — *A.* *M.* *Tr.* *Teg.* Die Larve im August auf Föhren.
rufus Kl. — *M.* *R.*
similis Htg. — *M.* *Teg.*
socius Kl. — *Tr.* einmal; *R.* selten.
variegatus Htg. — Verbreitet.
virens Kl. — *A.* *M.* *P.* *R.*

Monoctenus Htg.

- juniperi* L. — *M.* *Teg.* *P.* *R.*; Ueberall selten.

Cladius Ill.

difformis *Pz.* — *A. R.* nicht selten.

pectinicornis *Fourc.* — *A. M. Tr. Miesbach. R.*

Trichiocampus Htg.

eradiatus *Htg.* — *M.*

rufipes *Lep.* — *R.* selten.

viminalis *Fall.* — *M. R.* selten.

Priophorus Ltr.

brullei *Dlb.* — *M. Tr.*

pudi *L.* — Verbreitet; April—Mai.

tener *Zadd.* — *M. Tr.*

Cryptocampus Htg.

angustus *Htg.* — *M. Tr. R.* selten.

helveticus *Zadd.* — *M.* Wohl neu für Deutschland.

pentandrae *Retz.* — Verbreitet, April—Mai.

saliceti *Fall.* — *M. Tr. R.*

Camponiscus Newm. (*Leptopus* *Htg.*)

luridiventris *Fall.* — *M. Tr. R.* selten.

Hemichroa Steph.

alni *L.* — *M. R.* sehr selten.

rufa *Pz.* — Dessgleichen.

Dineura Dlb.

despecta *Htg.* — *M. Tr.*

geeri *Kl.* (*virididorsata* *André*) — *A.* einmal.

opaca *F.* (*verna* *Kl.*) — *M. R.* sehr selten; *Tr.* die ♀ im Mai nicht selten.

parvula *Kl.* — *M. R.* selten.

stilata *Kl.* — *A.* und *Tr.* einmal.

testaceipes *Thms.* — *Tr.* einmal.

Nematus Jur.

abdominalis *Pz.* — Verbreitet, Mai—Juni.

albipennis *Htg.* — *M. R.* nicht selten.

- ambiguus* Fall. — *A. M. Tr.*
anomalopterus Frst. — *M.*
appendiculatus Htg. — *M. Tr.; R. gemein.*
aurantiacus Htg. — *R. nicht gemein.*
bilineatus Kl. — *M. Tr. R.*
brachyotus Frst. — *M.*
brevis Htg. — *R. selten.*
brischkei Zadd. — *M.*
brunnicornis Zadd. — *M.*
canaliculatus Htg. — *R.*
capreae Pz. Ueberall nicht selten. Mai—Juni.
chrysogaster Htg. — *M.*
coerulocarpus Htg. — Verbreitet, schon im April.
compressicornis F. — *M. Tr.*
conjugatus Dlb. — *M.*
consobrinus Vollh. — *M.*
crassicornis Htg. — Verbreitet.
einigersbergensis Htg. — *M.*
ephippiger Htg. (*flavicomus* Tbn.) — *M. Tr. Aschau. R.*
erichsoni Htg. — *Tr. einmal.*
fallax Lep. — Verbreitet, April—Mai.
flaviventris Htg. — *M.*
fulvipes Fall. — *M. Tr. R.*
histrio Lep. — Verbreitet, doch nicht häufig; April—Mai.
hortensis Htg. — *Tr.*
humeralis Zett. — *M.*
hypoxanthus Frst. — *Tr. einmal.*
jemilleri Stein.* — Die Typen (1 ♂ 3 ♀) von *Tr.*
imperfectus Zadd. — *M. Tr. selten.*
insignis Htg. — *M.*
ischnocerus Thms. — *Tr. mehrere Male.*
latipes Villt. — *M. Tr.*
leucogaster Htg. (*punctulatus* Dlb.) — *A. M. Tr. R. nicht selten.*
leucopodus Htg. — *Tr. R.*
leucostictus Htg. — *M; Tr. sehr häufig im Mai.*
longispinis Krchb. —
lucidus Pz. — Verbreitet und nicht selten; Mai—Juni.

*) Die Beschreibung dieser neuen Art wird demnächst in der „Wiener entom. Zeitung“ erscheinen.

- luteus* *Pz.* — Dessgleichen.
melanaspis *Htg.* — *M.* *Tr.*
melanocephalus *Htg.* — *M.*
melanosternus *Lep.* — *R.* selten.
miliaris *Pz.* — *A.* *M.*; *R.* gemein. — Ein ♀ mit 3 Cubitalzellen.
miniatus *Htg.* — *M.* *Tr.* *Rsh.*; Mai—Juni.
mollis *Htg.* — Verbreitet; Mai—Juni.
myosotidis *F.* — Häufig, Mai—Juli.
nigratus *Retz.* — *R.*
nigriceps *Htg.* (*bistriatus* *Thms.*) *Tr.* öfters.
obductus *Htg.* — *M.*
pallescens *Htg.* — *Tr.* *R.*
pallipes *Fall.* — *M.*
parvilibris *Thms.* — *M.*
pavidus *Lep.* — *M.* *Teg.*
pini *Retz.* (*abietum* *Htg.*) — *Tr.* ein ♀.
politus *Zadd.* — *Tr.*
prasinus *Htg.* — *M.*
puncticeps *Thms.* — *M.* *Tr.*
punctifrons *Thms.* — *Tr.* Neu für Deutschland.
quercus *Htg.* — *M.* *Tr.* selten.
ribesii *Scop.* — *M.* *Rsh.* *R.*
ruficornis *Ol.* — *Tr.* einmal.
rumicis *Fall.* — *M.*
salicis *L.* — *M.* *R.*
saxeseni *Htg.* — Verbreitet, Mai—Juni.
scutellatus *Htg.* — Ueberall verbreitet; *Tr.* im Mai gemein auf Fichten.
septentrionalis *L.* — *A.* *M.* *R.* Larve im August auf Birken.
smaragdinus *Stein* (*chlorogaster* *Zadd.*) — *M.* *R.* *Tr.*
spiraeae *Zadd.* — *M.*
subbifidus *Thms.* — *M.*
thalictri *Krghb.* — *M.*
tischbeini *André.* — *M.* *Tr.*
truncatus *Htg.* — *M.*
vagus *Zadd.* — *M.*
vallismierii *Htg.* — *M.* *Tr.* nicht selten. April—Mai.
varus *Vill.* — Verbreitet, doch nirgends häufig. Juli—August
velatus *Zadd.* — *M.*

- vesicator* *Bremi.* — **M.** *Tr.*
viminalis *L.* — **A.** *M.* *Tr.* nicht selten.
virescens *Htg.* — **R.** gemein.
vittatus *Lep.* — **Tr.** mehrmals.
xanthocerus *Htg.* — **M.** *Tr.*
wahlbergi *Thms.* — **Tr.** zweimal.

Phyllotoma Fall.

- ochropoda* *Kl.* — **M.** ein ♀.
vagans *Fall.* — **M.** *Tr.* **R.** Ueberall selten, im Mai.

Kaliosysphinga Tbn.

- dohrni* *Tbn.* — **M.** *Rsh.*
pumila *Kl.* — **R.** selten.

Emphytus Kl.

- basalis* *Kl.* — **M**; **R.** selten.
calceatus *Kl.* — Dessgleichen.
carpini *Htg.* — **Tr.** *Teg.*
cereus *Kl.* — **R.** selten.
cinctus *L.* — Verbreitet, Mai—August.
cingillum *Kl.* — **R.** selten, *P.*
coxalis *Kl.* — **M.**
didymus *Kl.* — **M.** *Tr*; **R.** gemein.
filiformis *Kl.* — **M**; **R.** selten.
grossulariae *Kl.* — Verbreitet, Mai—Juli.
melanarius *Kl.* — **M.** *Tr.* **R.**
rufocinctus *Retz.* — Verbreitet.
succinctus *Kl.* — **R.** selten.
tener *Fall.* — **M.** *Tr*; **R.** nicht selten.
tibialis *Pz.* — Ueberall nicht selten.
togatus *F.* — **Tr.** **R.**
truncatus *Kl.* — Aschau, Tölz.
viennensis *Schr.* — **M.** *Teg.* **R.** sehr selten.

Dolerus Jur.

- acneus* *Htg.* — Verbreitet; April—Mai.
anthracinus *Kl.* — Gemein. März—Mai.
anticus *Kl.* — **M.** *Tr.* **R**; überall selten, Juni—August.
coracinus *Kl.* — Häufig, März—April.

corruscans Knw. — Tr.

dubius Kl. — M. R.

var. *timidus* Kl. — R.

fissus Htg. — A. M. Teg. Rsh; R. selten.

gessneri André. — M.

gonager F. — Häufig; Mai—Juli.

haematodes Schr. — Nicht selten.

lateritius Kl. — Verbreitet, aber nicht häufig; März—Mai.

niger L. — Ueberall nicht selten.

palmatus Kl. — M. Rsh. P; R. gemein.

palustris Kl. — A. M. Tr. Spitzing; R. selten.

picipes Kl. — P; R. nicht selten.

pratensis L. — Verbreitet.

pratorum Fall. — R. nicht gemein.

sanguinicollis Kl. — Tr. einmal; P.

tremulus Kl. (*triplicatus* Kl.) — M. Tr. Teg.

tristis F. — R. sehr selten.

vestigialis Kl. — Nirgends selten, April—Juni.

Athalia Leach.

annulata F. — M; R. nicht selten.

glabriocollis Thms. — A. Reichenhall, Aschau.

lugens Kl. — M. R. P.

rosae L. — Gemein. Mai—August.

spinarum F. — Desgleichen.

Selandria Kl.

aperta Htg. (*cinereipes* Kl.) — Verbreitet.

flavens Kl. — A. einmal.

morio F. — Ueberall häufig, meistens in der Aberration mit nur 3 Cubitalzellen; Mai—Juli.

serva F. — Verbreitet, Mai—August.

sixii Vollh. — M.

stramineipes Kl. — M. Tr. Teg. P. R; überall selten.

Blennocampa Htg.

albipes L. — Ueberall nicht selten vom April—Mai.

alternipes Kl. — M. Tr. P. R.

assimilis Fall. — Tr. P; R. selten.

aterrima Kl. — M. Teg; R. nicht selten.

- bipunctata* Kl. — R. selten.
cinereipes Htg. — M. Rsh. Teg.
croceiventris Kl. — M; Tr. und R. nicht selten.
elongatula Kl. — R. selten. ,
ephippium Pz. — Gemein; Mai—August.
fuliginosa Schr. — Nicht selten.
fuscipennis Fall. — Verbreitet..
gagatina Kl. — R. nicht selten.
lineolata Kl. — R. selten.
luridiventris Kl. — R. nicht selten.
micans Kl. — R.
monticola Htg. — M. Rsh. Tr.
nigrita F. — Im Mai nicht selten.
plana Kl. — R. nicht selten.
pusilla Kl. — Tr; R. selten.
ruficeruris Brullé. — Tr. öfters.
semicincta Htg. — R. selten.
tenuicornis Kl. — M. R. selten.

Eriocampa Htg.

- aethiops* F. (*soror* Vollh., *nitida* Tbn.) — M. P.
annulipes Kl. — M. Rsh; R. selten.
cinxia Kl. — Rsh; R. selten.
limacina Retz. (*adumbrata* Kl.) — Tr.; R. gemein.
ovata L. — Verbreitet und an manchen Orten häufig; Mai—
August.
umbratica Kl. — M. ein ♀.
varipes Kl. — M. Tr. nicht selten.

Hoplocampa Htg.

- brevis* Kl. — M; R. selten.
ferruginea Pz. — A. M. R.
plagiata Kl. — M.
rutilicornis Kl. — M; R. selten.

Poecilosoma Dlb.

- candidatum* Fall. — R. selten.
carbonarium Kno. — Tr. öfters.
excisum Thms. — M.

- guttatum* Fall. — Verbreitet, April—Juni.
immersum Kl. — *M.* ein ♂.
longicornis Thms. — *M.* Tr. nicht selten. .
luteolum Kl. — *M.* Tr. selten, *R.* gemein. .
pulveratum Retz. — Verbreitet, aber nicht häufig; April—Mai.

TAXONUS HTG.

- agrorum* Fall. — Verbreitet, Mai—Juni.
equiseti Fall. — *A*; *R.* nicht selten.
glabratus Fall. — *A. M.* Moosburg; *R.* nicht selten.
sticticus Kl. — *R.* selten.

PACHYPROTASIS HTG.

- antennata* Kl. — Verbreitet, aber nicht häufig.
nigronotata Krchb. — *M*; *Tr.* die Männchen in manchen Jahren, gegen Ende Mai, nicht selten um Haselgesträuch schwärzend, die Weibchen viel seltener.
rapae L. — Gemein, Mai—Juli.
simulans Kl. — *R.* selten; *P.*
variegata Kl. — Verbreitet, aber nicht häufig. Mai—Juli.

MACROPHYA DLB.

- albicincta* Schr. — Gemein, Mai—Juni.
blanda F. — *A. M.* Tr. selten, *R.* gemein.
carinthiaca Kl. — Kreut; *R.* selten.
chrysura Kl. — *R.* sehr selten; *P.*
cognata Mocs. — *M.* Teg. Kreut, Hochfeln bei Traunstein, ver einzelt. Neu für Deutschland.
crassula Kl. — *A*; *R.* selten, *Kreut*.
duodecimpunctata L. — Gemein, Mai—Juli.
haematopus Pz. — *A. M*; *R.* selten, *P.*
laticarpus Krchb. — Die Type von Ebersberg.
militaris Kl. — *Tr.* im Mai und Juni häufig, aber nur ♀. *R.* sehr selten, *P.*
neglecta Kl. — Überall nicht selten.
punctum-album L. — Gemein. Mai—Juli.
quadrimaculata F. — Häufig.
ribis Schr. — Verbreitet.

rufipes L. — *M*; *R.* selten.
rustica L. — Gemein, Mai—Juli.
sturmi Kl. — *M*. *Tr.* *Teg.*
teutona Pz. — *M*; *R.* selten.

Allantus Sur.

arcuatus Forst. — Häufig, Mai—August.
fasciatus Scop. (*zonula* Kl.) — Verbreitet, *R.* sehr gemein, Mai—Juli.
flavipes Fourer. — *M*; *R.* sehr selten.
köhleri Kl. — *A.* *M.* *Rsh.* *Teg.* *Aschau.*
marginellus F. — Verbreitet.
rossii Pz. — *A.* *M.* *Tr.* selten.
 var. *segmentarius* Pz. — *M*; *R.* selten.
schaefferi Kl. — Verbreitet.
scrophulariae L. — Dessgleichen.
vespa Retz. (*tricinctus* F.) — ebenfalls.
vienensis Schr. — *A.* *M.* *Tr.*
zona Kl. — *R.* sehr selten.

Sciapteryx Steph.

consobrina Kl. — *M.* *Teg.*
costalis F. — *M.* *Tr.* *Teg.* *Rsh.* schon im März und April. Nicht selten.

Strongylogaster Dlb.

cingulatus F. — *M*; *R.* selten.
delicatulus Fall. — *Tr.* und *Teg.* sehr selten.
geniculatus Thms. — *M.*

Perineura Htg. (*Synairema* Htg.)

rubi Pz. — *A.* *M.* *Tölz.*

Rhogogastera Knw.

insignis Kl. — *M.*
lateralis F. — Häufig, Mai—Juni.
picta Kl. — Nicht selten.
punctulata Kl. — Verbreitet, aber nicht häufig. Mai—Juni.

solitaria Schr. — Nirgends selten.

viridis L. — Häufig den ganzen Sommer.

Tenthredopsis Costa.

coqueberti Kl. — M.

cordata Fourer. — Häufig, variiert sehr.

lactiflua Kl. — M; R. selten.

nassata L. — Nirgends selten. Mai—Juli.

ornata Lep. — M. Tr. Teg.

scutellaris Kl. — Gemein, Mai—Juli.

sordida Kl. — Nicht selten.

stigma F. (*histrio* Kl.) — M; R nicht selten.

tesselata Kl. — Verbreitet.

Tenthredo L.

albicornis F. — Verbreitet.

atra L. und var. *dispar* Kl. — Gemein, Mai—Juli.

balteata Kl. — Teg.

bicincta L. — Gemein.

colon Kl. — M. Tr. Teg nicht selten, R. selten.

coryli Kl. — Verbreitet und nicht selten.

fagi Pz. — Nicht häufig.

flava Scop — Häufig, Mai—Juli.

limbata Kl. — Hochfeln bei Traunstein und Kreut je ein ♀.

Neu für Deutschland.

livida L. — Gemein. Mai—August.

maculata Fourer. — A. M; Tr. nicht selten; P.

mandibularis F. — Verbreitet.

mesomelaena L. — Ebenso.

moniliata Kl. — Verbreitet, aber nicht häufig.

olivacea Kl. — M. Teg. Aschau, Hohenschwangau, R. sehr selten.

pallicornis F. (? *vespiformis* Schr.) — Tr. nicht selten im Mai und Juni, R. einmal.

procera Kl. — M. Tr. Teg. Rsh. Überall selten.

rufipes Kl. — Tölz.

rufiventris F. (*conspicua* Kl.) — Verbreitet, aber nicht häufig. Mai—Juli.

trabeata Kl. — Teg.

velox F. — Spitzingsee, Teg; R. selten.

Pinicola Bréb.

coniferarum Htg. — Tr. mehrere ♀ Mitte Mai von Fichten geklopft.

dahli Htg. — Tr. Ein ♀ mit den vorigen. Neu für Deutschland.

julii Bréb. — Tr. und R. je einmal.

Tarpa F.

cephalotes F. — R. selten; Gern, Berchtesgaden.

flavicornis Kl. — R. selten.

plagiocephala F. — R. selten.

spissicornis Kl. — Verbreitet.

Lyda F.

alternans Costa. — M.

arbustorum F. — Burghausen, Ingolstadt, R

arvensis Pz. — Verbreitet, April—Juli.

aurantiaca Gir. — M. Wohl neu für Deutschland.

betulae L. — A. M. Tr. Teg; überall einzeln. Mai—Juni.

campestris L. — M. R.

cingulata Ltr. (*balteata* Fall.) — M. Rsh.

depressa Schr. — Verbreitet; Tr. in manchen Jahren Ende Mai auf Erlen gemein.

erythrocephala L. — A. R; vereinzelt.

erythrogaster Htg. — M. ein ♀.

falleni Dlm. — M. Tr. R.

fausta Kl. — Tr. ein ♀.

flaviceps Retz. — M. ein ♀.

flaviventris Retz. — M; R. sehr selten.

fulvipennis Zadd. — M.

hartigi Bremi. — 2 ♀ und 1 ♂ von Tr. Neu für Deutschland.

hortorum Kl. — M. Tr. Teg. P.

hypotrophica Htg. — Tr. Teg. R.

inanita Vill. — Verbreitet.

laricis Gir. — Teg.

mandibularis Tbg. — M.

marginata Lep. — M. R.

nemoralis L. — *A. M.* Burghausen, *R.* nicht selten.

pallipes Fall. — *R.*

stellata Christ. — Verbreitet.

stramineipes Htg. — *A. Tr.* *R.*

sylvatica L. — Verbreitet, *R.* gemein.

Cephus Ltr.

filiformis Evers. — *M.*

haemorrhoidalis Gm. — *M.*

infuscatus André. — *M.*

nigrinus Thms. — *M.*

phthisicus F. (*pallipes* Kl.) — *M. Tr. R.* Überall selten.

pygmaeus L. — Gemein, Mai—Juni.

troglodyta F. — *M.*

Phylloecus Newm.

fumipennis Evers. — *M; Tr.* in manchen Jahren im Mai und Juni nicht selten.

satyrus Pz. — *R.* selten, *P.*

xanthostoma Evers. — *M.* Tölz.

Sirex L.

augur Kl. — *A. M;* *R.* selten.

fantoma F. — *A. M;* *R.* selten.

gigas L. — Verbreitet und an manchen Orten häufig; Juni—September.

juvencus L. nebst var. *melanocerus* Thms. — Verbreitet und nicht selten. Juni—August.

spectrum L. — Nicht selten.

Xiphydria Ltr.

camelus L. — Verbreitet, doch ziemlich selten. Mai—August.

Oryssus F.

abientinus Scop. — *M.*

Summe der bisher aus Südbayern bekannten Blattwespen: 381.

Ichneumonidae.

1. Ichneumonides.

Chasmodes W.

lugens Gr. — *M. P.*

motatorius F. — *A. M. R.*

paludicola W. — *R.*

Exephanes W.

hilaris Gr. — *M. Teg. R.*

occupator Gr. — *M; A.* ein ♀.

Ichneumon W.

Sectio 1. Tischbein.

alboguttatus Gr. (*multicinctus* Gr). — Verbreitet, *Tr.* häufig; Mai—August.

biguttulus Krchb. — *Tr.* öfters; *Teg.*

bilineatus Gr. — *A. M. Tr. Teg.*

bohemani Hgr. — Ein ♀ von *Hschw.*

castaniventris Gr. — Verbreitet; Juni—August.

centummaculatus Christ. — Ein ♀ von *Ottobeuren*.

comitator L. — Verbreitet und nicht selten, Mai—October.

coqueberti W. — *M. Tr. Rsh. Teg. Hschw.*

cyaniventris W. — *M. Rsh.*

derasus Gr. — *M. einmal.*

falsificus W. — *M. Hschw.*

ferreus Gr. — Nicht selten, verbreitet.

fuscipes Gm. — *M. Tr. Teg.; R. nicht selten.*

leucocerus Gr. — Verbreitet, an manchen Orten häufig; wurde gezogen aus *Acronycta megacephala* und *Scoliopterix libatrix*.

leucolomius Gr. — *R.*

lineator Gr. — Sehr verbreitet; Juni—September.

var *restaurator* Gr. — *M. Hschw.*

microstictus Gr. — *M. Teg. einzeln, R. sehr selten.*

multicolor Gm. — *R.*

migrifarsis Krchb. — Die Type von *M.*

opulentus Tbg. (*gerstaeckeri* Krchb., *guttatus* Tbn.) — Ein ♀ von *A.*, aus *Agrotis punica*.

pisorius L. — *M. Teg. Hschw;* *R.* selten.

quadrimaculatus Gr. — *R.*

rubens Fonse. — Ein ♂ von Teg.

rufinus Gr. — *M.* ein ♀ der var. 1 *W.* — *R.*

serenus Gr. — *Tr. Teg. Tölz,* *R.*

similatorius F. — *A. M.*

sinister W. — *Tr.* einmal, *M. Rsh. Teg. Peissenberg.*

sugillatorius L. — *M;* *Tr.* nicht selten; *R.* sehr selten, *Rsh. P.* — Mai—Juni.

Sectio 2. Tbn.

culpator Schr. — *M. Tr. Rsh. Gern und Steingaden.*

discriminator W. — *M. Tr. Teg. Peissenberg.* — Wurde öfters aus *Vanessa urticae* erzogen.

pistorius Gr. — Verbreitet aber nicht häufig. Mai—August.

puerulus Krchb. — Die Type von *Teg.* aus *Numeria pulveraria.*

scutellator Gr. — Verbreitet, *R.* gemein.

trilineatus Gr. — *A. M;* *R.* gemein. — var. *umbraculosus Gr.* — *M. R.*

Sectio 3. Tbn.

gemellus Gr. — *M. Teg. R.*

Sectio 4. Tbn.

albicollis W. — *M. Tr.*

analis Gr. — *M. Tr. Rsh. R.*

aries Krcb. — *M. Tey.*

balteatus W. — *M. Rsh.*

bucculentus W. — Verbreitet.

caedator Gr. — *R.* nicht selten.

caloscelis W. — Verbreitet.

cerebrosus W. — *M. Tölz.*

cerinthius Gr. — *R.*

cessator Müll. — Verbreitet, an manchen Orten häufig; Mai — August. Aus *Vanessa cardui* erzogen.

computatorius Müll. — Nicht selten.

confusorius Gr. — Gemein. Mai—August.

crassigena Krcb. — Die Type von *M.*

croccipes W. — *Teg.* ein ♂.

emancipatus W. — *M. Tr. Teg. Rsh. Peissenberg.*

- eumerus* W. — *M.* *Rsh.*
excultus Hgr. — *Teg.* ein ♂.
exilicornis W. — *M.*
fabricii Schr. — *Oberbayern.*
firmipes W. — Ein ♀ von *Tr.*
fulvicornis Gr. — *Rsh.* ein ♀.
gracilentus W. — Nicht selten, verbreitet.
gracilicornis Gr. — Ebenso, aus *Coenonympha iphis* erzogen.
grossorius F. — Verbreitet, aber nicht häufig. Aus *Catocala nupta*.
horridator Zgl. — *M.* *Teg.*
immisericors Tbn. — *M.* einmal.
indiscretus W. — *M.*
inquinatus W. — *M.* *Teg.* *Tr.* *Hschw.*
insidiosus W. — Verbreitet; *A.* aus *Lycaena coridon* erzogen.
intermixtus Tbn. — *St. Quirin* bei *Miesbach*, einmal.
languidus W. — *Teg.* ein ♀.
latrator F. — Verbreitet, *R.* gemein.
luctatorius L. (*extensorius* L. *ex parte*) — Überall nicht selten.
 Mai—Juli
luteipes W. — *Tcg.* *Kreut.*
manicatus Hgr. — Ein ♂ vom *Wallberg* bei *Teg.*
medialis W. — *M.* und *Teg.* je ein ♂.
melanocerus W. — *M.*
memorator W. — *M.*
molitorius L. — Nicht selten. Mai—September.
mordax Krchb. — *M.*
multiannulatus Gr. — *M.* *Tr.* *Teg.* *Rsh.*
multipictus Gr. — *R.*
nunki Krchb. — Die Type von *A.*
novemalbatus Krchb. — *M.* *Bernau* am *Chiemsee*.
obsessor Tbn. — *M.* *Tr.* *Teg.* *R*; aus *Spilosoma fuliginosa*.
perfidus Tbn. — Ein ♂ von *Tr.*
paegniarius Hgr. — *Kreut.*
proletarius W. — *M.* *Rsh.* *Teg.*
pulvinatus Krchb. — Die Type von *Teg.*
punctus Gr. — Verbreitet, aber nicht häufig. April—September.
quadrialbatus Gr. — *A.* *M.* *R.*
quaesitorius L. — *M*; *R.* selten.
raptorius L. — Verbreitet, April—Juli.

sarcitorius L. — Überall nicht selten.

sexcinctus Gr. — *M. Rsh.*

stigmatorius Zett. — Ein ♂ der var. ♀ *Hgr.* von *Tr.*

stramentarius W. — *M. Teg. R.*

suspiciosus W. — *A. M. Teg. Tr.* nicht selten; aus *Hibernia defoliaria* erzogen.

terminatorius Gr. — Verbreitet, Mai—September.

trialbatus Krchb. — *Wallberg.*

tuberculipes W. — Ein ♀ von *M.*

vivacior Tbn. — *Teg.* ein ♀.

xanthorius Forst. — *A. M. R.*

Sectio 5. Tbn.

bimacularius Pz. — *M. Rsh.*

faunus Gr. — *Rsh.* einmal.

gravipes W. — Die Type vom *Wendelstein*, ferner *Teg. Spitzingsee.*

saturatorius L. — Verbreitet; aus *Hypena rostralis* erzogen.

Sectio 6. Tbn.

annulator F. — Verbreitet, *R.* gemein; Juni—September.

corruscator L. — *M.*

dissimilis Gr. — *Tr.* einmal, *Teg. Kreut.*

fabricator Gr. — Gemein, vom Mai an.

luteiventris Gr. — Verbreitet.

nigritarius Gr. — Gemein, Mai—August.

pallifrons Gr. — *M. Rsh. R.*

sicarius Gr. — Häufig, Mai—September.

stenocarus Thms. — Ein ♀ von *Tr.* — Neu für Deutschland.

varipes Gr. — *M. Tr.* selten.

Sectio 7. Tbn.

alpicola Krchb. — *Teg.*

castaneus Gr. — *M. Tr. Teg. Moosburg.*

cornicula W. — *M. Teg.*

defraudator Knoch. — Verbreitet.

humilis W. — *A.* aus der Puppe von *Ortholitha plumbaria*; *Teg.*

lacteator Gr. — *M.*

nivatus Gr. — *M.* einmal.

oscillator W. — *M. Tr. Hschw. Rsh. R.* — var. *Trentepohli* *M.*

pictus Gr. — *M.* *Tr.* nicht selten, Juni—August.
praestigiator W. — *M.* zwei ♀.

Sectio 8. Tbn.

- albicinctus* Gr. — *M.* *Teg.* *Rsh.* *R.* *Tr.*
albinus Gr. — *Sdf.*
albosignatus Gr. (*digrammus* W.) — Verbreitet.
anator F. — Ebenso.
bilunulatus Gr. — *R.*
callicerus Gr. — *M.* *Hschw.* *Rsh.* *R.*
chionomus W. — *M.* zweimal.
deceptor Scop. — *M.* *Rsh.* *Tr.* *R.*
derivator W. — *M.* *Tr.* selten.
derogator W. — *R.*
disparis Poda. (*flavatorius* F.) — *A;* *M.* und *Tr.* aus *Psilura monacha* öfters gezogen; *R.* selten; *Ingolstadt.*
dumeticola Gr. — *M.* *Tr.* *Sdf.*
lepidus Gr. — *M.* *Tr.* *Rsh.* *R.*
leucomelas Gm. — *M.* *Rsh.* *Tölz,* *R.*
mesopyrrhus Krchb. — Die Type von *Tr.*
monostagon Gr. — *Tr.* ein ♂ der var. 2 *W.* — *Teg.* *Aschau,* *Füssen.*
pachymerus Htg. — *M.* einmal.
perscrutator W. — *M.*
ridibundus Gr. — *M.* ein ♀; *R.*
rivalis Tbn. — *Tr.* einmal.
sedulus Gr. — *M.* *Rsh.* *R.*
semirufus Gr. — *R.*
sexalbatus Gr. — *R.*
sexarmillatus Krchb. — *Tr.* zwei ♀.
spectabilis Hgr. — *M.* ein ♂.
tergenus Gr. — *M.* *R.*
vacillatorius Gr. — *R.*
vulpecula Krchb. — Die Type von *M.*

Sectio 9. Tbn.

- albilarvatus* Gr. — Verbreitet, *Tr.* häufig. Mai—Juni.
altercator W. — *M.* *Teg.*
apricus Gr. — *M.* *Tr.* sehr selten.
citrinops W. — *M;* *Tr.* nicht selten, *Teg.*

discrepator W. — *M.* *Tr.* *Sdf.* *Tölz.*

erythraeus Gr. — *M.* *R.*

foersteri W. — *M.* *Tr.* nicht selten; *Teg.* Mai—Juli.

jemilleri Krchb. — Die Type von *Tr.*

lanceolatus Krchb. — Die Type von *M.*

lanius Gr. — Verbreitet, Mai—Juni.

leucocrepis W. — *Neureuth.*

ochropis Gm. — *A.* *M.* *Aschan*; *Tr.* nicht selten; *R.*

ruficeps Gr. — *M.* *Rsh.*

rufifrons W. — Verbreitet und nicht selten; Mai—Juli.

subcylindricus Gr. — *R.*

tenebrosus W. (δ = *personatus* Gr.) — *M.* *Tr.* *Teg.*

Hoplismenus Gr.

infaustus W. — *Rsh.*

lamprolabus W. — *M.* Mai—August.

luteus Gr. — *A.* *M.* *Rsh*; *R.* selten. Aus *Rhodocera rhamni*.

perniciosus Gr. — Verbreitet und nicht selten. Juni—September.

pica W. — *A.* *M.* *Tr.* *Aschau*. Aus *Argynnis paphia* erzogen.

terrificus W. — *M.* *Tr.* *Teg*; Mai—August. Aus *Vanessa urticae*.

Limerodes Boie.

arctiventris Boie. — *M.* *Tr.* selten.

Amblyteles W.

a. *Microsticti* W.

alternator Tbn. — *Teg.* ein δ .

amatorius Müll. — Verbreitet; April—Juli.

ammonius Gr. — *A.* öfters aus *Gortyna ochracea* gezogen; *R.* nicht gemein.

ater W. — *Teg.* ein Φ .

atratorius F. — *R.*

binotatus Krchb. — *M.* mehrere Φ , *Tr.* einmal. Mai—October.

conspurcatus Gr. — *M.* *R.*

crispatorius L. — *M.* *Rsh.* *R.*

culpatorius L. — Verbreitet, Mai—August.

equitatorius Pz. — *A.* *R.*

fasciatorius F. — Nicht selten, verbreitet. Juni—September.

glaucatorius F. — Verbreitet, doch nirgends häufig, Juni—September; aus *Amphyipyra tragopogonis*.

- goedarti* Gr. — R.
indocilis W. — M. Teg.
infractorius Pz. — Verbreitet, April—August.
johansoni Hgr. — A. und M. je ein ♀.
latebricola W. — M. ein ♀.
monitorius Gr. — Grafrath; R. sehr selten.
negatorius F. — Verbreitet und nicht selten, Mai—September.
nonagriae Hgr. (*celsiae* Tbn.) — A. in mehreren Exemplaren
 (♂ ♂) aus *Gortyna ochracea* gezogen!
occisorius F. — M. A; R. sehr selten.
oratorius F. — Nicht selten: M. Tr. Teg. Rsh; April—September.
quadripunctarius Müll. — M. Teg. R.
palliatorius Gr. — Verbreitet, April—August.
pallidicornis Gr. — R
pictus Schr. — Verbreitet, R. gemein. Mai—October.
pseudonymus W. — M. Tr. Rsh.
septemguttatus Gr. — M. nicht selten.
subsericans Gr. — Überall nicht selten, Mai—September.
trifasciatus Gr. — R.
uniguttatus Gr. — M. nicht selten; R.

b. *Macrosticti* W.

- adsentator* Tbn. — M. ein ♂.
camelinus W. — Sehr verbreitet. Juni—August. Wurde gezogen
aus den Puppen von: *Vanessa atalanta*, *prorsa*, *cardui*,
antiopa, *urticae* und *io*.
castigator F. — Ebenso verbreitet. Aus *Mamestra oleracea*.
chalybeatus Gr. — Je ein ♂ aus Tr. und Reichenhall.
divisorius Gr. — Verbreitet, R. gemein. — Mai—August.
fossorius Müll. — Dessgleichen.
funereus Fourc. — M. Tr. R. Rsh.
fusorius L. — A. M. Tr. R. P.
haereticus W. — Verbreitet, Mai—August. Aus *Vanessa urticae*.
homocerus W. — Teg. einmal.
inspector W. — A. M. Rsh. Teg.
laminatorius F. — M; R. nicht selten. Aus *Deilephila euphorbiae*
 und *elpenor*.
melanocastanus Gr. — R.
messorius Gr. — M. R. Teg.

nitens Christ. — Verbreitet aber selten.

repentinus Gr. — *A. M. Aschau, P.*

rubroater Ratz. — *M. Tr.*

sputator F. — Verbreitet und häufig Juni—August. Ein Exemplar aus *A.* hat im linken Flügel ein schwarzes, im rechten ein gelbes Flügelmal.

strigatorius Gr. — Verbreitet, aber nicht häufig. Mai—August.

unilineatus Gr. — *R.* aus *Nonagria geminipuncta* erzogen.

Diphyus Krehb.

tricolor Krehb. — *Teg; Tr.* mehrere Male im Juni.

Catadelphus W.

arrogator F. — *R.* selten, *Moosburg*.

Hybophorus Tbn.

aulicus Gr. — *M. Teg.*

Trogus Gr.

exaltatorius Pz. — *M. Aschau;* aus *Smerinthus ocellata*, *Deilephila elpenor* und *Sphinx ligustri*.

tutorius F. — Verbreitet, Mai—August. Aus *Smerinthus ocellata* und *Deilephila euphorbiae* gezogen.

Psilomastax Tbn.

lapidator F. — Verbreitet; wurde öfters aus *Papilio machaon* gezogen.

pictus Krehb. — *M.* und *Tr.* je einmal aus *Apatura iris*.

Hepiopelmus W.

leucostigma Gr. — Verbreitet. — *v. melanogaster Gr.* — *R.* — *v. quadriguttatus Krehb.* — Kreut.

variegatorius Pz. — *M. R.*

Heresiarches W.

eudoxius W. — Ein ♀ dieser seltenen Schlupfwespe am 3. Juli 1893 in *Tr.* gefangen.

Anisobas W.

cingulatorius Gr. — *M. T;* *R.* gemein.

hostilis Gr. — Verbreitet, doch selten.

platystylus Thms. — A. mehrere Exemplare aus *Ortholitha plumaria* erhalten.

Neotypus Först.

lapidator F. — A. M. Teg. Tölz. R.

melanocephalus Gm. — M. R.

Hypomecus W.

quadriannulatus Gr (albitarsis W.) — M. Hschw. Teg. Rsh.

Wurde aus *Cidaria berberata* erzogen.

Probolus W.

alticola Gr. — Verbreitet, aus *Spilosoma fuliginosa*.

concinnus W. — Tr. Rsh.

Eurylabus W.

dirus W. — M. Teg. R. Aus *Bombyx lanestris*.

intrepidus W. — M.

larvatus Christ. — Teg. öfters aus *Harpyia vinula* erzogen.

torvus W. — A. aus *Hadena scolopacina*, Tr. Teg. Mai—Juni.

tristis Gr. — M. Sdf. R.

Platylabus W.

albinus Gr. — Verbreitet, Tr. häufig. Mai—October.

auriculatus Krchb. — M. Sdf.

cothurnatus Gr. — M. Sdf.

daemon W. — A. Tr.

decipiens W. — M. Tr. Sdf.

dimidiatus Gr. — Verbreitet, aber selten.

dolorosus Gr. — M. Teg. Rsh. Moosburg; aus *Phaesile psittacaria*.

iridipennis Gr. — R.; Sdf. aus *Thecla quercus*.

leucogrammus W. — M. Teg. Sdf.

nigricollis W. — Aschau ein ♀.

nigrocyaneus Gr. — Teg. ein ♂.

orbitalis Gr. — Überall nicht selten; Mai—August.

pedatorius F. — Gemein, Mai—October. Aus *Corythea juniperaria* und *Cidaria berberata*.

rufiventris W. — Ein ♀ aus Tr.

rufus Gr. — *M.* *Tr.* *Hschw.* *Sdf.* *Teg.*; aus *Cidaria trifasciata*.
tenuicornis Gr. — *Tr.* ein ♀, *R.*
variegatus W. — *M.* ein ♂ im Juli, *Teg.* ein ♂ im Juni gefangen.

Apaeleticus W.

bellicosus W. — *M.* ein ♀.
brevicornis Krchb. — Die Type von *Kreut.*
flammeolus W. — *R.*

Gnathoxys W.

marginellus W. — *M.* selten.

Herpestomus W.

brunnicornis Gr. — *M.* *Tr.*; *R.* nicht selten; aus *Hypomeneuta* (?)
variabilis.
facialis Gr. — *M.* *Sdf.* *R.*
phaeocerus W. — *M.* ein ♀.

Colpognathus W.

celerator Gr. — Verbreitet, an manchen Orten gemein. Mai—September.

Dicoelotus W.

pumilus Gr. — *Peissenberg* ein ♀; *R.*

Centeterus W.

confector Gr. — *M.* *Rsh.* *R.*
opprimator Gr. — Ans der *Valepp*; dürfte auch in Bayern vorkommen.

Phaeogenes W.

acutus Gr. — *M.* *R.*
callopus W. — *M.* *Tr.* *Moosburg.*
cephalotes W. — *Teg.* ein ♀.
eximius W. — *M.* zwei ♀.
flavidens W. — *M.* einmal.
fulvitarsis W. — *A.* einmal, *Tr.* öfters.
fuscoicornis W. — *A.* *M.* *Tr.* *Teg.* nicht selten.
homochlorus W. — *Teg.*
impiger W. — *Tr.* öfters.

infimus W. — M. selten.

ischiomelinus Gr. — Teg.

lascivus W. — M. Tr. Teg.

melanogonus Gr. — Verbreitet, R. gemein.

mysticus W. — M.

nigridens W. — M. Tölz.

ophthalmicus W. — Häufig. Mai—Juli.

rusticatus W. — M.

scutellaris W. — Tr. drei ♀.

semivulpinus Gr. — Nicht selten, R. gemein. Mai—Juli.

spiniger Gr. (*bacilliger* Krchb) — M; Tr. mehrmals, R; Juni—Juli.

stimulator Gr. — M. Rsh.

trepidus W. — M. Tr. Warngau.

versutus W. — Teg. ein ♂.

Notosemus Frst. (*Ischnogaster* Krchb.)

albibucca Krchb. — M; Tr. zweimal.

Diadromus W.

candidatus W. — M.

collaris Gr. — R.

imbellis W. (*subtilicornis* Gr.) — R. gemein.

quadriguttatus W. — Teg. R.

troglodytes Gr. — Tr. Rsh. Sdf. R.

Oiorhinus W.

pallipalpis W. — Tr. einmal.

Aethocerus W.

discolor W. — M.

Misetus W.

oculatus W. — M. ein ♂.

Hemichneumon W.

elongatus Rtz. (*subdolus* W.) — M. selten.

Oronotus W.

binotatus Gr. (*coarctatus* W.) — Rsh.

Ischnus Gr.

debilis Gr. — *M.* aus *Pterophorus cosmодactylus* gezogen.

fulvipes Krchb. — *Teg.* Peissenberg.

pulex Gr. — *R.*

truncator Gr. — *R.*

thoracicus Gr. — *R.* Moosburg.

Alomya Pz.

ovator F. — Überall nicht selten, *Tr.* häufig auf Umbelliferen.

Mai—Juli.

Summe der bisher in Südbayern beobachteten *Ichneumonides*: 320.

2. Cryptides.

Megaplectes Frst. (*Jocryptus Thms.*)

monticola Gr. — *A.* mehrmals, Hschw.

Osprynchotus Spin. (*Linoceras Tbg.*)

macrobatus Gr. — Verbreitet, doch nirgends häufig, Mai—Juli.

Cryptus Thms.

albatorius Gr. — *M.* *Tr.* *Teg.* *R.*

alutaceus Tschek. — *Tr.* ein ♀.

apparitorius Gr. — *R.*

atrides Gr. — *R.*

attentorius Pz. — *Tölz*, *R.*

cyanator Gr. — Verbreitet, doch nicht häufig, Mai—Juli.

dianae Gr. — *M.* *Teg.* *Tr.* *R.*

divisorius Krchb. — *M.* *Teg.*

infumatus Thms. — *Tr.* *Teg.*

italicus Gr. — *Tr.* nicht selten im Mai und Juni; *R.*

minator Gr. — *Tr.* *R.*

moschator Gr. — *M.* *R.*

murorum Tschek. — *Kreut.*

obscurus Gr. — Verbreitet.

quadriguttatus Gr. — *R.*

spinosus Gr. — *R.*

spiralis Gr. — *A. M. R.*

sponsor Gr. — *M. Teg. Rsh. Aschau, R.*

tursoleucus Gr. — *M. Teg. R.*

tuberculatus Gr. — *M. Teg.*

viduatorius Gr. — Verbreitet, Mai—August.

vittatorius Jur. (*sexannulatus* Gr.) — *Rsh.*

Sobas Frst. (*Trichocryptus Thms.*)

cinctorius Gr. — *R.*

Macrocyptus Thms.

lancifer Gr. (*Echthrus.*) — *Teg.*

Brachycyphus Thms.

erythrocerus Thms. — *Tr. einmal.*

Idiolipsa Frst. (*Liocryptus Thms.*)

analis Gr. — Häufig. Mai—August.

Trychosia Frst. (*Goniocryptus Thms.*)

ambigua Tschek. — *Tr. mehrmals.*

ingrata Tschek. — *M. Aschau, Rsh. Tölz.*

neglecta Tschek. — *M. Tr. Teg.*

pauper Tschek. — *M.*

plebeja Tschek. — *M. Tr. Hochfelli, Rsh. Teg. Die ♂ häufig. Mai—Juli.*

rustica Tschek. — *M.*

tristatrix Tschek. — *M.*

Caenoecryptus Thms.

bimaculatus Gr. — *M. Sdf.*

rufiventris Gr. — *M.*

Habroecryptus Thms.

alternator Gr. — *M. Rsh. R.*

assertorius F. — Häufig, Mai—August.

brachyurus Gr. — *M. Teg. Sdf. R.*

remex Tschek. — *M. Rsh. Teg. Rothe Wand.*

rubricator Pz. (*minutorius* F.) — *M. R.*

Pyenocryptus Thms.

peregrinator L. — Verbreitet, und an manchen Orten häufig.
Mai—August.

Spilocryptus Thms.

adustus Gr. — R.
aterrimus Gr. — M. R.
cimbicis Tschek. — Tr. zwei ♀.
dispar Thms. — Verbreitet.
fumipennis Gr. — Tr. Aschau, R.
grossus Gr. — M. R.
incubitor Ström. — R.
mansuetor Tschek. — Teg.
migrator Gr. — Nirgends selten, Mai—Juni.
nubeculatus Gr. — R.
ornatus Gr. — R.
tibialis Thms. — M. Teg. Hschw.
tricolor Gr. — M. R.
zygaenarum Thms. — M. Tr. Tölz.

Hoplocryptus Thms.

buccatus Tschek — Tr. Kreut, Neureuth.
confector Gr. — M. Tr. R.
fugitivus Gr. — Verbreitet.
helophilus Tschek. — Tr. Peissenberg.
insectator Tschek. — M.
melanocephalus Gr. — M.

Aritranis Frst. (*Hygrocryptus* Thms.)

carnifex Gr. — Rsh. R. selten.
praedator Rossi. — Rsh.

Nematopodius Gr.

formosus Gr. — M. und Tr. öfters, Juli—August.

Mesostenus Gr.

albinotatus Gr. — M. R.
funebris Gr. — M. Tr. sehr selten.

gladiator Scop. — Verbreitet und nicht besonders selten. Juni—September.

grammicus Gr. — Tr. Rsh. je einmal.

ligator Gr. — Tr. Teg. R.

notatus Gr. — M. einmal.

obnoxius Gr. — M. Sdf.

pygostolus Gr. — Verbreitet, Juni—September.

transfuga Gr. — Ebenso.

Chaerettyymma Frst. (*Cratocryptus* Thms.)

anatoria Gr. — Verbreitet. Mai—September.

femoralis Thms. — Taubenberg.

furcatrix Gr. — M. R.

parvula Gr. — Starnberg.

ruficoxis Thms. — M. Tr.

sternocera Thms. — Kreut.

Calocryptus Thms.

congruens Gr. — Verbreitet, an manchen Orten häufig. Juni—September.

Mesocryptus Thms. (*Brachycentrus* Tbg.)

brachycentrus Gr. (*pimplarius* Tbg.) — M. Tr. Rsh. Teg. Moosburg, überall selten.

Coelocryptus Thms.

rufinus Gr. — M; Tr. nicht sehr selten.

Plectocryptus Thms.

digitatus Gm. — Tr. Teg. R.

leucopsis Gr. — R.

tarsatus Bridg. — Rsh. Teg.

Stenocryptus Thms.

nigriventris Thms. — Teg. Rsh.

oviventris Gr. -- R.

Mecocryptus Thms.

caliginosus Gr. — M. Teg. Rsh.

Microcryptus Thms.

- abdominator* Thms. — *M. Tr.*
alutaceus Thms. — *Tr. einmal.*
amoenus Krchb. — *Tr. öfters.*
areolaris Thms. — *M. Tr.*
aries Thms. — *M. Tr.*
arridens Gr. — *M. Teg. Moosburg.*
arrogans Gr. — Überall verbreitet, die ♂ oft gemein.
basizonus Gr. — *M. Hschw.*
brachypterus Gr. — *M. Tr. Teg. Sdf*; die ♀ selten.
clavatus Krchb. — *Rsh.* (Type).
contractus Gr. — *M. R.*
crassicornis Krchb. — *M. Tr. Kreut.*
crelatus Gr. — *M. Tr. Rsh.*
cruentus Krchb. — Die Type von *Rsh.*
curtulus Krchb. — *M. Tr. Teg.*
curvus Gr. — *M. Tr. Beuerberg, R.*
erythrinus Gr. — *R.*
femoralis Thms. — *M. Tr.*
gracilicornis Krchb. — *Tr. Setzberg.*
graminicola Gr. — Verbreitet, Mai—September.
gravipes Gr. — *R.*
halensis Tbg. — *Rsh. ein ♀. Tr.*
hostilis Gr. — *Teg. R.*
jemilleri Krchb. — 3 ♂ und 1 ♀ von *Tr.*
improbus Gr. — *M. Tr. R.*
labralis Gr. — *Teg.*
lacteator Gr. — Verbreitet.
leucopygus Krchb. — Die Type von *M.*
leucostictus Gr. — *M. R. Tr.*
micropterus Gr. — Verbreitet, die ♂ häufig.
nigrocinctus Gr. — Verbreitet, April—October; *Tr.* die ♂ häufig.
perspicillator Gr. — Die ♂ gemein, die ♀ sehr selten; Mai—Juli.
poeциlops Krchb. — Die Type von *M.*
probus Tbg. — *M. Rsh.*
puncticollis Thms. — *Rsh.* Wohl neu für Deutschland.
punctulatus Krchb. — Die Type von *Kreut.*
seniculus Krchb. — *M. Tr.*
septentrionalis Thms. — *M.* Neu für Deutschland.

sericans Gr. — *R.*

sperator Gr. — *Rsh. R.*

spinolae Gr. — *Teg.*

terminatus Gr. — *M. Rsh. Teg.*

triannulatus Gr. — *R.*

tricinctus Gr. — *Tr. Rsh.*

zonatus Krchb. — Die beiden Typen von *Tr.*

Stylocryptus Thms.

analis Thms. — *Tr.* Neu für Deutschland.

brevis Gr. — Verbreitet, Juni—September.

cnemargus Gr. — *Tr. Rsh. R.*

erythrogaster Gr. — *Teg. Tr.*

minutulus Thms. — *Rsh.*

plagiator Gr. — Verbreitet, Mai—September.

profligator Gr. — Dessgleichen.

senilis Gr. — *Tr.*

vagabundus Gr. — *M. Tr. R.*

varipes Gr. — *R.*

Acanthocryptus Thms.

flagitator Gr. — *M. Rsh.*

nigrita Gr. — *Rsh.*

quadrispinus Gr. — *A. M. Teg. Rsh. R.*

Phygadeuon Gr.

ambiguus Gr. — *R.*

assimilis Gr. — *R.*

atropos Krchb. — *M. Teg.*

biguttatus Gr. — *R.*

bilineatus Gr. — *R.*

bitinctus Gr. — *M. Teg. Aschan, Tr. R.*

cephalotes Gr. — Verbreitet und nicht selten, Juni—September.

clotho Krchb. — *M. Teg.*

diaphanus Gr. — *M.*

dumetorum Gr. — *R.*

flavimanus Gr. — *M. Tr. R.*

forticornis Krchb. — *M. Teg.*

fumator Gr. — Verbreitet und nicht selten, Juni—October.

- geniculatus* Krchb. -- *M.* Rsh. Hschw.
hercynicus Gr. — *M.* Tr. Teg.
lachesis Krchb. — *Tr.* Teg.
leucostigmus Gr. — *Tr.* Aschan.
nitidus Gr. — *M.*
ovatus Gr. — *Tr.* Moosburg. *R.*
pimplarius Thms. — *M.* Tr. Teg. *Sdf.*
procerus Gr. — *R.*
pullator Gr. — *R.*
pumilio Gr. — *R.*
rufulus Gr. — *R.*
sectator Gr. — *R.*
semiorbitatus Gr. — *Teg.*
semipolitus Tbg. — *Tr.* *Sdf.* *Rsh.*
subtilis Gr. — *R.*
teneriventris Gr. — *R.*
variabilis Gr. — Verbreitet, manchmal häufig; Mai—October.

Leptoeryptus Thms.

- aereus* Gr. — *Tr.* *R.*
albomarginatus Krchb. — *M.* *Rsh.*
bellulus Krchb. — Die Type von *M.*
claviger Tbg. — *M.* *Tr.* *Rsh.* *Sdf.*
geniculosus Thms. — *M.*
heteropus Thms. — *Tr.* nicht selten; *Teg.*
pellucidator Gr. — *Tr.* *Teg.*
rubens Krchb. — Die Type von *Teg.*
ruficaudatus Bridg. — *M.* *Tr.* *Teg.* *Rsh.*

Brachycyrtus Krchb.

- ornatus* Krchb. -- *M.*

Hemiteles Gr.

- aestivalis* Gr. — *M.* *R.*
areator Gr. — *R.* nicht selten.
bicolorinus Gr. — Überall nicht selten, *R.* gemein.
castaneus Tbg. — *M.*
cingulator Gr. — Verbreitet, *R.* selten.
coriarius Tbg. — *M.*
crassicornis Gr. — *R.*

- decipiens* Gr. — *Aschau.* R.
dissimilis Gr. — R.
floricolator Gr. — Verbreitet, Mai—September.
fragilis Gr. — R.
fulvipes Gr. — R. *Teg.* Aus *Mierogaster spurius* erzogen.
imbecillus Gr. — *Tr.*; R. ganz gemein.
inimicus Gr. — R.
limbatus Gr. — *Teg.* R.
luteiventris Gr. — R.
maculipennis Gr. — R. selten.
melanopygus Gr. — R.
meridionalis Gr. — R.
micator Gr. — R. *Teg.*
monozonius Gr. — R.
necator Gr. — R.
oxyphymus Gr. — Verbreitet.
picipes Gr. — *M.* R.
pulchellus Gr. — Nirgends selten.
rufocinctus Gr. — R.
scrupulosus[?] Gr. — R.
similis Gr. — R. *Teg.*
tenerrimus Gr. — R.
tenuicornis Gr. — *Teg.* Moosburg.
tristator Gr. — *M.* R.
vicus Gr. — Verbreitet.

Orthopelma Tbg.

luteolator Gr. — Verbreitet, nicht selten.

Agriotypus Walk.

armatus Walk. — *M.* selten, *Tr.* einmal.

Theroscopus Frst.

cingulatus Frst. — *Teg.*

Pezomachus Gr.*)

agilis Frst. — *Sdf.*; R. gemein.

bicolor Gr. — *Sdf.* R. selten.

*) Von dieser schwierigen Gattung dürfte noch manche Art nachzu-tragen sein.

corruptor *Frst.* — *Tr.* *Sdf.*

cursitans *Gr.* — *Sdf.* *R.* nicht selten.

fasciatus *Gr.* — Verbreitet, Mai—September.

festinans *Gr.* — *R.* selten.

formicarius *Gr.* — Selten.

furax *Frst.* — *Sdf.*

hortensis *Gr.* — *R.* selten.

instabilis *Frst.* — Überall nicht selten, April—October.

notabilis *Frst.* — *Sdf.*

pedicularius *F.* — *Teg.* *Sdf;* *R.* selten.

rufulus *Frst.* — *Sdf.*

rusticus *Frst.* — *Tr.* *Sdf.*

vagans *Gr.* — *R.* gemein.

vulpinus *Gr.* — *R.* nicht gemein.

Atractodes Gr. (*Exolytus* *Frst.*)

laevigatus *Gr.* — Gemein.

tenebricosus *Gr.* — *R.*

Stilpnus Gr.

blandus *Gr.* — *M.*

deplanatus *Gr.* — *Sdf.*

gagates *Gr.* — *M.* *Tr.* *Teg;* *R.* selten.

Summe der bisher in Südbayern beobachteten *Cryptides*: 243.

Pimplides.

Coleocentrus Gr.

caligatus *Gr.* — Kreut ein ♀.

excitator *Poda.* — Verbreitet, *Tr.* häufig; Mai—Juli.

Acoenites Gr.

dubitator *Pz.* — *M.* *R.* *Starnberg.*

fulvicornis *Gr.* — *M.* *Tr.* *R.* selten.

rufipes *Gr.* — *Teg.* *Starnberg,* *R.*

saltans *Gr.* — *R.*

terebrator *Scop.* (*arator Rossi*) — Verbreitet, doch nicht häufig.
Juli—September.

Rhyssa Gr.

amoena Gr. — *A. M. Tr. Teg.* Aschau, überall selten; Juni—September.

approximator F. — *M. Tr. Teg.* Miesbach, Tölz, ebenfalls selten; Mai—Juli.

lineolata Krchb. — *Teg.*

persuasoria L. — Überall nicht selten; Mai—September.

Thalessa Gr.

curvipes Gr. — *R.*

leucographa Gr. — *A. M. Teg.* Tölz. Überall selten.

obliterata Gr. — *Teg.*

perlata Christ. — *R.*

superba Schr. — *R.*

Ephialtes Gr.

abbreviatus Thms. — *M. Tr. Teg.* Neuulm.

arundinis Krchb. — Die Type von *M*; ein ♀ aus *A.*

brevicornis Tschech. — *M. Teg.* Tölz.

carbonarius Christ. — Häufig. Mai—October.

cephalotes Hgr. — *Kreut.*

dux Tschech. — *Teg.* Tölz.

extensor Pz. — *M. Tr. Teg. Rsh. Sdf;* aus *Thecla quercus* erzogen.

glabratus Ratz. — *M.*

gnathaulax Thms. — *Sdf.*

haemorrhoidalis Tschech. — *M.* aus *Tortrix viridana* und *buoliana*.

inanis Schr. — *R.*

luteipes Thms. — *M. Tr. Teg.*

manifestator Gr. — Verbreitet und nicht selten; Mai—September.

mesocentrus Gr. — Dessgleichen.

planifrons Thms. — *M. Tr. Teg.* Tölz.

tenuiventris Hgr. — *M. Sdf.* Tölz.

tuberculatus Fourc. — Überall nicht selten; Mai—October.

Actrogaster Krchb.

semisculptus Krchb. — *Schäflarn.*

Perithous Gr.

albicinctus Gr. — *M. Moosburg.*

divinator Rossi. — *Hschw.* *R.*

mediator F. — Verbreitet, nicht selten; Mai—September.
varius Gr. — *M. Teg. Sdf. Aschau.*

Theronia Hgr.

atalantae Poda. (flavicans F.) — Verbreitet, Mai—September.
Wurde erzogen aus: *Vanessa urticae*, *Abraxas grossulariata*,
Porthesia chrysorrhoea und *similis*, *Bombyx neustria* und
Aeronycta euphoriae.

Pimpla F.

alternans Gr. — *M. Tr. Teg. R.* Aus *Hypomeneuta evonymella*.
angens Gr. — *M. Tr. R. Sdf. Teg. Rsh.*

arundinator F. — *M. R.*

brassicariae Poda. — Verbreitet, Mai—September. Wurde ge-
zogen aus: *Aporia crataegi*, *Vanessa urticae*, *Bombyx neustria*,
Botys verticalis.

brevicornis Gr. — Verbreitet, Juni—September.

calobata Gr. — *Rsh. R.*

capulifera Krchb. — *M. Hschw.*

curticauda Krchb. — *M; Tr.* öfters im Mai und Juni. Das noch
unbeschriebene ♂ von ebendaher.

detrita Hgr. — *M. Tr. Teg. Rsh. Moosburg* nicht selten.

didyma Gr. — *Tr. Hschw. Moosburg, R.*

diluta Rtz. — *M. Tr. Tölz. Sdf.*

examinator F. — Überall gemein, Mai—September. Wirthe:
Vanessa urticae, *Zygaea peucedani*, *Spilosoma fuliginosa*,
Fumea intermediella, *Hypomeneuta padella* und *evonymella*.

holmgreni Schmk. — *M. Tr. Teg.*

illecebrator Rossi. — *R.*

inquisitor Scop. — Häufig; aus *Melitaea maturna* und *Gracilaria*
falconipenella erzogen.

instigator F. — Überall gemein. Wirthe: *Vanessa urticae*, *Pieris*
brassicae, *Bombyx chrysorrhoea*, *Aeronycta megacephala*,
Abraxas grossulariata und *Boarmia angularia*.

laevifrons Thms. — *Beuerberg.*

laevis Gr. — *R.*

maculator F. — Verbreitet, Mai—Juli.

mandibularis Gr. — *M. Tr. Teg. R.*

oculatoria F. — *M. Tr. R.* Aus Spinneneiern erzogen.

- ornata* Gr. — *M.* *R.* *Sdf.*
ovivora Boie. — *M.*
pictipes Gr. — *M.* *Rsh.*
robator F. — *M.* *Rsh.*
rufata Gm. — Verbreitet, Mai—Juli.
ruficollis Gr. — Ein ♀ von *Tr.*
sagax Htg. — *Sdf.*
spuria Gr. — *Teg.* *R.*
stenostigma Thms. — *Tr.* einmal.
turionellae L. — Häufig, Mai—September.
variabilis Hgr. — *M.*
vesicaria Ratz. — *A. M.* *Teg.* *Miesbach, Sdf.* Schmarotzt bei *Nematus*
vesicator, *gallarum*, *vallisnieri* und *Cryptocampus pentandrae*.

Aphanorhoptrum Frst.

- abdominale* Gr. — *M.* *Tr.* *Teg.* *Rsh*; nicht selten, Juni—August.

Polysphincta Gr.

- boops* Tschek. — *M.* *Tr.* *Moosburg, Sdf.*
carbonator Gr. — Verbreitet, aber nirgends häufig. Mai—Juli.
multicolor Gr. — *M.* *Tr.* *R.*
pallipes Hgr. — *Tr.* *Teg.* *Sdf.*
percontatoria Gr. — *R.*
rufipes Gr. — *R.*
tuberosa Gr. — Verbreitet, selten.
varipes Gr. — *M.* *Sdf.* *R.*

Clistopyga Gr.

- incitator* F. — *M.* *Sdf.* *Teg.* *R.* Überall selten.

Glypta Gr.

- bifoveolata* Gr. — *M.* *Teg.* *Rsh.* *R.*
ceratites Gr. — Verbreitet und nicht selten, Mai—September.
Aus *Tortrix gentianana*.
cicatricosa Ratz. — *M;* *Sdf.* aus *Fumea sepium*.
evanescens Ratz. — Verbreitet, aus *Penthina sauciana* erzogen.
exophthalmus Krchb. — Die Type von *Teg.*
flavolineata Gr. — Verbreitet, Juli—October.
fronticornis Gr. — Verbreitet, aber selten.

- haesitator* Gr. — *Tr.* nicht selten; *R.*
heterocera Thms. — *M.*
incisa Gr. — *A.* *R.*
mensurator F. — Überall nicht selten, Juni—August.
nigriventris Thms. — *Tr.* nicht selten.
pictipes Tbg. — *Sdf.*
resinanae Htg. — *M.* aus *Tortrix resinana*.
rostrata Hgr. — Wessen.
scalaris Gr. — *R.*
striata Gr. — *R.*
tenuicornis Thms. — *M.*
teres Gr. — *M.* *Tr.* *R.*
vulnerator Gr. — Verbreitet.
xanthognatha Thms. — *M.*

Schizopyga Gr.

- atra* Krchb. — *M.* *Tr.* *Teg.* *Rsh.* Moosburg.
circulator Pz. (*analisis* Gr.) — *M.* *R.*
minuta Gr. — *R.*
podagrifica Gr. — *R.*
tricingulata Gr. *R.*

Lampronota Hal.

- caligata* Gr. — Verbreitet und nirgends selten, Juni—September.
marginator Schdte. — *{* Verbreitet.
nigra Gr. — *{* Verbreitet.

Lissonota Gr.

- basalis* Br. — *M.* *Teg.*
bellator Gr. — Häufig, Mai—August.
bicornis Gr. — *M.* *Teg.* *R.*
bistrigata Hgr. — *Sdf.*
caligata Gr. — *M.* *Teg.* *Rsh.* *R.*
commixta Hgr. — *M.* *Teg.* *Sdf.*
culiciformis Gr. — *M.* *Tr.* Hochfeln, *R.*
cylindrator Vill. — Gemein. Juni—August.
deversor Gr. — *M.* *Tr.* *Sdf.*
dubia Hgr. — *M.* *Hschw.* *Tr.* häufig im Mai um Fichten schwärzend.

- fracta* Tbg. — Verbreitet.
hortorum Gr. — R.
lateralis Gr. — Teg.
leptogaster Hgr. — M. Tr. Sdf.
maculatoria F. — R.
parallela Gr. — M. R.
perspicillator Gr. — R.
petiolaris Gr. — R.
ruficornis Gr. — R.
segmentator F. — Verbreitet und nicht selten, Mai—August.
sulfurifera Gr. — Dessgleichen.
verberans Gr. — Überall nicht selten.
versicolor Hgr. — M.

Heterolabis Krchb.

- crassula* Krchb. — M.
decimator Gr. — M. R.
marginata Krchb. — M.
petiolata Krchb. — Teg.

Meniscus Schdte.

- agnatus* Gr. — M. Peissenberg.
catenator Pz. — M. Tr. Sdf.
impressor Gr. — Tr. Sdf. R.
murinus Gr. — Verbreitet, Tr. häufig, April—Juni.
setosus Fourcr. — M. R.
tomentosus Gr. — R.

Phytodictus Gr.

- coryphaeus* Gr. — Verbreitet, aber selten, Mai—September.
rufipes Hgr. — Rsh.
segmentator Gr. — Verbreitet, aus *Gracilaria rufipenella*.

Cryptoplimala Tbg.

- blanda* Gr. — R.
calceolata Gr. — M.
errabunda Gr. — M. Tr. R.
microtamia Gr. — R.

Taschenbergia Schmk.

modesta Gr. (*Mesoleptus*) — M. Tr. April und Mai.

Xorides Gr.

albitarsus Gr. — Verbreitet, Mai—August.

collaris Gr. — Dessimilaren.

erosus Tschek. — Starnberg.

nitens Gr. — M. R.

Xylonomus Gr.

ater Gr. — Verbreitet und nirgends selten. Juni—September.

brachylabis Krchb. — M. Sdf. Starnberg, Kreut.

caligatus Gr. — Lenggries.

filiformis Gr. — M. Rsh. R.

irrigator F. — Verbreitet. Mai—September.

pilicornis Gr. — Dessimilaren.

praeicatorius F. — Ebenso.

rufipes Gr. — M. Tr.

Echthrus Gr.

reluctator L. — Verbreitet, aber nirgends häufig. Mai—Juni.

Ischnoceros Gr.

filicornis Krchb. (*rusticus* Gr. e. p.) — M. Tr. Teg. Aschau.
Mai—August.

seticornis Krchb. (*rusticus* Gr. e. p.) — M. Rsh.

Odontomerus Gr.

geniculatus Krchb. — M. Tr. Teg. Tölz.

pinorum Thms. — Verbreitet, Mai—August.

punctulatus Thms. — M. Teg.

quercinus Thms. — Tr. Teg.

Poemenia Hgr.

brachyura Hgr. — Hschw. Heilbrunn, Teg.

notata Hgr. — A. M. Tr. Moosburg.

tipularia Hgr. — Verbreitet, einzeln. Juni—September.

Summe der bisher in Südbayern beobachteten *Pimplides*: 174.

Ophionides.

Hellwigia Gr.

obscura Gr. — *Teg.*

Ophion F.

bombycivorus Gr. — *Tr*; *Sdf.* aus *Stauropus fagi*.

combustus Gr. — *Sdf.* aus *Catocala nupta*.

costatus Ratz. — *M.* *Tr.* *Hschw.* *Aschau.* Aus *Cucullia verbascoi* und *Catocala nupta*.

curvinervis Krchb. — *M.*

luteus L. — Gemein, Mai—Juli.

marginatus Jur. — *R.* aus *Scopelosoma satellitia*.

merdarius Gr. — *M.* *Tr.* *Moosburg*, *R.*

obscurus F. — *M.* *Sdf.* *R.*

parvulus Krchb. — *M.* Die Typen aus *Plastenis retusa*.

pteridis Krchb. — *M.* Die Type aus *Eriopus purpureofasciata*; *Sdf.*

ramidulus L. — Verbreitet, aus *Trachea piuperda* erzogen.

scutellaris Thms. — *Sdf.* — Neu für Deutschland.

undulatus Gr. — *M.* *Tr.* *R.* aus *Bombyx lanestris*.

ventricosus Gr. — *M.* *Tr.* *R.*

Trachynotus Gr.

foliator F. — *Sdf;* *R.* gemein.

Schizolomma W.

amictum F. — Verbreitet und nicht selten. Aus *Callimorpha dominula*, *Harpyia bifida* und *Hylophila prasinana*.

Exochilum W.

circumflexum L. — Überall nicht selten. Juni--September.

Heteropelma W.

calcator W. — *M.* *Tr.* *Teg.* Aus *Corythea variaria*.

Anomalon Gr.

bellicosum W. — *M.* *Tr.* *Sdf.*

declarvatum Gr. — *M.* *Tr.* *Sdf.* *R.* A. Aus *Satyrus dryas*.

fibulator Gr. — *Tr. R.*

flavifrons Gr. (*cerinops* Gr.) — *M. Tr. R.* Aus *Taeniocampa gracilis*.

latro Schr. — *R.*

pallidum Gr. — *R.*

perspicillator Gr. — *R.*

prococrum Gr. — *Tr. R.*

ruficorne Gr. — Verbreitet, Juni—Juli, aus *Hylophila prasinana*.

xanthopus Schr. — *M. Tr. Teg. R.*

Agrypon Frst.

brachypterum Frst. — *M. Tr. Sdf.*

canaliculatum Ratz. — *Sdf.* aus *Rhodocera rhamni*.

clandestinum Gr. — *M. Tr.*

cognatum Frst. — *M.*

elegantulum Frst. — *Tr.* öfters.

slaveolatum Frst. — Verbreitet. Wurde gezogen aus *Plastenis retusa*, *Angerona prunaria* und *Biston stratarius*.

furtivum Gr. — *M.*

melanomerum Frst. — *Tr.* einmal.

rubricatum Frst. — *M. Tr. Sdf.*

serpentinum Frst. — *Sdf.* aus *Thyatira batis*.

tenuicorne Gr. — Verbreitet, aus *Drepana lacertinaria*.

varitarsum W. — *M. Tr.*

Trichomma W.

enecator Rossi. — *R.*

Opheltes Hgr.

glaucopterus L. — Verbreitet, Juni—August.

Paniceus Gr.

cephalotes Hgr. — Verbreitet, wurde öfters aus *Harpyia vinula* gezogen.

cristatus Thms. — *M. Tr; Sdf.* aus *Sarrothripa undulana*.

dilatatus Thms. — *Sdf.*

gracilipes Thms. — *Tr.* zwei ♀.

latungula Thms. — *Tr. Sdf.*

melanurus Thms. (*testaceus* Gr. e. p.) — *A. Tr. Sdf.*

ocellaris Thms. (*testaceus* Gr. e. p.) — Verbreitet, aus *Amphipyra pyramidea* und *Harpyia furcula*.

opaculus Thms. — *M.*

thomsoni Brauns. — *A.* aus *Cidaria luctuata*.

virgatus Fourc. — Verbreitet; aus *Cymatophora duplaris* erzogen.

Absyrtus Hgr.

luteus Hgr. — Verbreitet, nirgends selten; Juni—September.

Cidaphus Frst.

alarius Gr. (*Mesochorus*) — *Tr.* *Teg.*; *Sdf.* aus *Mamestra persicariae*.

Campoplex Gr.

alticola Gr. — *Rsh.* *Teg.*

anxius Frst. — *Tr.* *Teg.*

auritus Krchb. — *M.*

blandus Frst. (*Forsseli Frst.*) — Verbreitet, aus *Macaria liturata*.

bucculentus Hgr. — Nicht selten, Mai—September.

cantator De Geer. — Verbreitet, aber nicht häufig; Juni—September.

carinifrons Hgr. — *M.* *Teg.*

confusus Frst. — *Rsh.* *Teg.*

culturator Gr. — *Tr.* *Teg.* *R.*

facialis Hgr. — *Tr.* einmal.

falcator Thunbg. — Verbreitet, *A.* aus *Phigalia pedaria*.

heterocerus Frst. — *A.* aus *Chesia rufata*.

lacunosus Krchb. — *Teg.* aus *Rumia luteolata*.

lapponicus Hgr. — *M.*

lateralis Krchb. — *Hschw* *Tr.* zwei ♀.

leptogaster Hgr. — *M.* *Teg.* *Tr.*; *Sdf.* aus *Odontopera bidentaria* und *MacroGLOSSA bombyliformis*.

limiventris Krchb. — *Teg.* aus *Cucullia scrophulariae*.

monozonus Frst. — *M.* *Tr.*

nitidulator Hgr. — *M.* *Tr.* *Sdf.*

notabilis Frst. — *M.* *Spitzing*.

obliteratus Hgr. — *M.* *Tr.* *Teg.* Aus *Acronycta leporina*.

oxyacanthae Boie. — *Tr.* *Teg.*

prominulus Frst. — *Teg.* *Rsh.*

- pugillator* Gr. — Überall häufig; aus *Fidonia roraria*.
punctus Krehb. — Die Type von *M.*
rugulosus Frst. — *M.* einmal.
sobolicida Frst. — *M.* einmal.
stragifex Frst. — Verbreitet, Mai—Juli.
subacqualis Frst. — Ebenso.
subcinctus Frst. — *Rsh.*
tenuis Frst. — *M.* einmal.
terebrator Frst. — Verbreitet, April—September.
viduus Gr. — *Hschw.* Teg.
xenocamptus Frst. — *M.* Tr. *Rsh.*
zonellus Frst. — Teg.

Charops Hgr.

- decipiens* Gr. — *R.*

Cymodusa Hgr.

- cruenta* Gr. — *M.* *R.*
leucocera Hgr. — *M.*

Sagaritis Hgr.

- agilis* Hgr. — *M.*
annulata Gr. — Teg. aus *Plusia gamma*.
brachycera Thms. — *M.*
declinator Gr. — Verbreitet, Juni—September.
erythropus Thms. — *M.*
femoralis Gr. — *M.* Sdf. Aus *Plusia gamma*.
latrator Gr. — *M.* *Rsh.* *R.*
macrura Thms. — *M.*
varians Thms. — *M.* Sdf. Tr. *A.* aus *Euplexia lucipara*.
zonata Gr. — Teg.

Casinaria Hgr.

- alpina* Thms. — *M.* — Neu für Deutschland.
claviventris Hgr. — *M.*
dubia Tschek. — *M.* Tr.
ischnogaster Thms. — *M.*
mesozosta Gr. — *M.* Tr. Lenggries.
morianella Hgr. — *M.*

nigripes Gr. — Verbreitet, aus *Acronycta auricoma* gezogen.

orbitalis Gr. — Rsh. R.

rufimana Gr. — R.

senicula Gr. — R.

stygia Tschek. — M. nicht selten, Teg.

tenuiventris Gr. — M. Tr. Teg. Aus *Pieris rapae*.

Omorga Thms.

borealis Zett. — M. aus *Cochlophanes helix*.

difformis Gmb. — Tr. Rsh. R.

ensator Gr. — M. Sdf. R.

faunus Gr. — M.

mutabilis Hgr. — M. Tr. Aschau. Aus *Penthina gentianana* und

Cochylis ambiguella.

rothi Hgr. — Rsh.

tumidula Gr. — R.

Limneria Hgr.

albida Gm. — Verbreitet und nicht selten. Mai—August.

coleophorarum Ratz. — M. aus *Coleophora currucipenella*.

geniculata Gr. — Verbreitet, aus *Cidaria hastata* und *Tortrix rigana*.

juniperina Thms. — M. Neu für Deutschland.

kriechbaumeri Bridg. — Teg.

nigritarsa Gr. — M.

planiscapus Thms. — M. Neu für Deutschland.

vivida Hgr. — M. aus *Lycaena argus* und *Thecla betulae*.

xanthostoma Gr. — Rsh.

Nemeritis Hgr.

cremastoides Hgr. — M. aus *Gracilaria syringella*.

cubiceps Thms. — M. — Neu für Deutschland.

macrocentra Gr. — M. R.

raphidia Krchb. — Die Type von M.

Phobocampa Thms.

altilollis Thms. — M. aus *Hypsipetes elutaria*. Neu für Deutschland.

crassiuscula Gr. — Sdf. Teg. R.

bicingulata Gr. — Verbreitet, aus *Cosmia trapezina*.
unicincta Gr. — Tr. Teg. Aus *Vanessa urticae*.

Spndastica Thms.

petiolaris Thms. — M.

Ephora Thms.

fusipes Hgr. — Peissenberg.

viennensis Gr. — M.

Callidora Thms.

annellata Thms. — M. Teg. Neu für Deutschland.

Nepiera Thms.

concinna Hgr. — M.

Tranosema Thms.

arenicola Thms. — M.

Olesicampa Thms.

albiplica Thms. — M. A.

auctor Gr. — M. Rsh.

cavigena Thms. — M.

fomorella Thms. — M.

fulcrans Thms. — M.

fulviventris Gr. — M. Tr. R. Nicht selten.

longipes Müll. — M. R.

nigroplica Thms. — M.

paganus Hgr. — M.

punctitarsis Thms. — M.

radiella Thms. — M. Rsh.

retusa Thms. — M.

Meloboris Hgr.

crassicornis Gr. — M. Rsh. R.

hydropota Hgr. — M.

Angitia Hgr.

anura Thms. — M.

armillata Gr. — M. Teg. R. Aus *Hypomeneuta evonymella*, *padella*,
malinella und *cognatella*.

cerophaga Gr. — *Teg.* *R.* Aus *Cidaria bilineata*.

chrysosticta Gr. — Verbreitet und nicht selten. Aus *Haliodinea raesella*.

combinata Hgr. — *M.*

crataegellae Thms. — Die Type von *Teg.* aus *Scythropia crataegella*.

exareolata Ratz. — *M.* *Teg.*

fenestralis Hgr. — *M.*

lateralis Gr. — *M.*

maculata Gr. — *R.*

majalis Gr. — *R.*

monospila Thms. — *M.* aus *Nannodia hermanella*. — Neu für Deutschland.

nana Gr. — *R.*

rufipes Gr. — Nicht selten, Mai—September.

sordipes Thms. — *M.*

subbuccata Thms. — *M.*

tibialis Gr. — *R.*

vestigialis Ratz. — *M.*

virginalis Gr. — *Teg.* *R.*

Anilasta Thms.

albicus Thms. — *M.* aus *Thecla betulae*.

boops Thms. — *Rsh.*

braccata Gm. — *R.*

carbonaria Ratz. — *Sdf.*

coxator Thms. — *M.* *Rsh.*

dolosa Gr. — *R.*

ebenina Gr. — Verbreitet und nicht selten. Wurde erzogen aus *Pieris brassicae* und *rapae*, sowie *Rhodocera rhamni*.

fulvicoxa Thms. — *M.*

leucomera Thms. — *Rsh.*

notata Gr. — *M.* *Tr.* *R.*

orbator Gr. — *R.*

perfida Gr. — *M.* *Hschw.*

rapax Gr. — *M.* *R.*

ruficincta Gr. — *M.* *R.*

ruficrus Thms. — *Rsh.*

varicoxa Thms. — *Teg.*

Holocremna Thms.

- argentata* Gr. — *Teg.*
buccata Thms. — *M.*
canaliculata Gr. — *M.* aus *Nematus appendiculatus*.
cothurnata Hgr. — *M.* *Teg.* Aus *Lophyrus similis* und *socius*.
errabunda Gr. — *M.*
pubescens Ratz. — *M.*
sordidella Hgr. — *Rsh.* *Sdf.*
spircae Thms. — Die Type von *M.*, aus *Nematus spircae*.

Tropistes Gr.

- rufipes* Krchb*). — Je ein ♀ von *Teg.* und *Tr.*

Nepiesta Thms.

- anomala* Gr. (*aberrans* Gr.) — *M.* *R.*
marginella Thms. — *M.* *Tr.* *Rsh.*

Pyracmon Hgr.

- melanurus* Hgr. — *M.* *Tr.* *Teg.* nicht selten, Juni—August.
obscuripes Hgr. — *M.* *Tr.* *Rsh.*
xoridiformis Hgr. — *M.*

Canidia Hgr.

- corvina* Thms. — *M.*
immolatrix Gr. — *M.*
quinqueangularis Ratz. — *M.*
umbrata Br. — *M.*

Cremastus Gr.

- bellicosus* Gr. — *M.* *R.*
confluens Gr. — *R.*
geminus Gr. — *R.*
infirmus Gr. — *M.* *R.*
interruptor Gr. — Verbreitet, nicht selten.
pungens Gr. — *R.*
spectator Gr. — *M.* *R.*
subnasutus Thms. — *M.*

*) Die Beschreibung dieser neuen Art wird demnächst in den „Entom. Nachrichten“ erscheinen.

Pristomerus Curt.

orbitalis Hgr. — M.

vulnerator Gr. — M. R.

Pachymerus Gr.

calcitrator Gr. — Verbreitet, nicht selten; R. gemein.

Porizon Gr.

angustipennis Hgr. — M.

exhaustor F. (*hostilis* Gr.) — Verbreitet, Mai—Juli.

filicornis Thms. — M. Teg.

gravipes Gr. — Rsh.

harpurus Schr. — M. Peissenberg, R.

Thersilochus Hgr.

caudatus Hgr. — M.

decrescens Thms. — M.

jocator F. — Verbreitet.

jucundus Hgr. — M.

microcephalus Gr. — M.

proboscidalis Thms. — M.

truncorum Hgr. — M.

Mesochorus Gr.*)

dorsalis Hgr. — M. Sdf.

scutellatus Gr. — R.

splendidulus Gr. — M; R. gemein.

strenuus Hgr. — Tr. Sdf. aus *Drepana falcataria* erzogen.

testaceus Gr. — R. selten.

thoracicus Gr. — M. Tr; R. nicht gemein.

vitticollis Hgr. — Moosburg.

Banchus F.

compressus F. — Gern, Berchtesgaden, R.

falcator F. — Verbreitet und mitunter häufig. Mai—August.

hastator F. — Tr. einjädl.

monileatus Gr. — Teg. Sdf. aus *Panolis piniperda*, R.

*) Von dieser Gattung dürften noch viele Arten nachzutragen sein.

pictus Gr. — *Rsh.* *Teg.* *R.*
volutatorius L. — *M.* einmal.

Leptobatus Gr.

degener Gr. — *M.* *R.*
rufipes Gm. — *Tr.* öfters, *R.*

Xenoschesis Frst.

fulvipes Gr. — *Tr.* einmal, *Tölz*, *R.* einmal.

Exetastes Gr.

brunnipes Gr. — *M.*
cinctipes Retz. (*clavator* F.) — *M.*
crassus Gr. — *M.* *Teg.* Aus *Cucullia scrophulariae*.
fornicator F. — Verbreitet und häufig. Mai—August.
geniculosis Hgr. — *Tr.* ein ♂.
gracilicornis Gr. — *A.* aus *Mamestra dissimilis*.
guttatorius Gr. — Verbreitet und nicht selten. Juni—September.
illusor Gr. — *M.* *Tr.* *Teg.* *R.* Aus *Euchelia jacobaeae* erzogen.
inquisitor Gr. — *R.*
laevigator Vill. — *M.* *Teg.* *R.*
nigripes Gr. — *M.* *Teg.* *R.*
robustus Gr. — *M.* *R.*
tarsator F. — *M.* *Teg.* *Sdf.* *R.*

Erigloea Frst.

fulvicornis Krehb. — *Tr.* *Teg.*
gagathina Krehb. — *Tr.* *Teg.*
politula Krehb. — *Tr.* öfters, *Teg.* *M.*

Eryma Frst.

stygium Krehb. — *M.* *Tr.*

Scolobates Gr.

auriculatus F. (*crassitarsus* Gr.) — Verbreitet, *R.* nicht selten.
hylotomae Krehb. — Die Type von *Teg.* aus *Hylotoma berberidis*.
A. ein ♀ aus derselben Blattwespe erzogen.
italicus Gr. — *R.* (Ob hieher gehörig?)

Summe der bisher in Südbayern beobachteten *Ophionides*: 271.

Tryphonides.

Mesoleptus Gr.

- cingulatus* Gr. — Verbreitet und nicht selten. Mai—Juli.
facialis Gr. — *M. Tr. Sdf. Tölz.*
fugax Gr. — *M. Tr. Rsh.*
insignis Krehb. — *Spitzing.*
larvatus Krehb. — *Peissenberg, Tölz.*
melanocephalus Gr. — *M. Tr. Teg. Sdf.*
neglectus Hgr. — *M; Tr.* nicht selten.
ruficornis Gr. — Verbreitet und stellenweise häufig; Mai—August.
stali Hgr. — Nicht selten.
testaceus F. — *R.*
typhae Fourc. — Gemein. Mai—Juli.
vulneratus Zett. — *M. Tr.*
xanthostigma Gr. — *M. Tr. Miesbach.*

Catoglyptus Frst.

- antilope* Gr. — *M. Tr. Teg.*
crassipes Hgr. — *M.*
fortipes Gr. — Überall nicht selten. Mai—Juli.
fuscicornis Gm. — Verbreitet und nicht selten. Mai—Juli.
montanus Gr. — *M. Teg.*
ullrichi Tschek. — *M.*

Pseudocryptus Krehb.

- grisescens* Gr. — *A. M. Teg. Spitzing, R.*

Euryproctus Hgr.

- albipes* Hgr. — *M. Teg. Sdf.*
annulatus Gr. — *M. Hschw. Moosburg.*
assimilis Hgr. — *Tr.* einmal.
atomator Gr. — *Rsh. Teg.*
chrysostomus Gr. — *R.*
defectivus Gr. — *R.*
leptocerus Gr. — *M. Teg.*

- mundus* Gr. — Tr. im Mai nicht selten. Teg. Miesbach. R.
nemoralis Fourc. — Überall verbreitet, Mai—September.
notatus Gr. — R.
regenerator F. — M.
rufoniger Gr. — M. Tölz. R.
varicornis Gr. — R.

Notopygus Hgr.

- analis* Hgr. — Tr.
nigricornis Krchb. — M. Tr.
rufinus Gr. — M. Tr.

Ctenopelma Hgr.

- affine* Hgr. — Kreut.
luciferum Gr. — R. einmal.
pulchrum Krchb. (*Holmgrenia*) — M; Tr. nicht sehr selten.
punctum Gr. (*mesoxanthum* Gr.) — M. Tr. R. Aus *Trichiosoma betuleti* erzogen.
ruficorne Hgr. — Tr. Tölz.
ventrator Gr. — R.
xanthostigma Hgr. — Um Tr. in manchen Jahren nicht selten.

Prionopoda Hgr.

- stictica* F. — M. Tr. R.
xanthopsana Gr. — M. Tr. R.

Perilissus Frst.

- buccinator* Hgr. — Tr. nicht selten.
erythrocephalus Gr. — Tr. Sdf. Starnberg; Mai—Juni.
filicornis Gr. — Verbreitet, Mai—Juli.
herrichi Krchb. — M.
oblongopunctatus Htg. — M. aus *Lophyrus rufus* gezogen.
orbitalis Gr. (*buceulentus* Gr.) — M. Tölz; Tr. häufig, Mai—Juli.
pallidus Gr. — M. Tr. Teg. R.
seminiger Gr. — M. R.
sericeus Gr. — Tölz.
subcinctus Hgr. — Tr. einmal.
vernalis Gr. — Tr.

Callidiotes Thms.

coxator Gr. — Verbreitet. Mai—Juli. Beide Geschlechter variiren mit schwarzen Hüften.

Oxytorus Thms.

armatus Thms. — Rsh. Teg.

Oedemopsis Tschek.

scabriculus Gr. — Tr. ein ♀; M.

Mesoleius Hgr.

adpropinquator Gr. — M. R.

albipes Gr. — M.

armillatorius Gr. — Verbreitet und nicht selten. Mai—Juli.

aulicus Gr. — Verbreitet, aus *Trichiocampus viminalis* gezogen.

caligatus Gr. — Rsh. R.

colon Gr. — R.

dives Hgr. — Sdf.

dorsalis Gr. — Teg.

erythrocerus Gr. — M. Tr. Teg. R.

flavopictus Gr. — R.

formosus Gr. — R.

guttiger Hgr. — M.

haematodes Gr. — M. Rsh. Teg. Sdf.

hamulus Gr. — Tr. öfters.

inquietus Frst. — M.

insolens Gr. — Verbreitet.

longipes Gr. — Teg.

lophyrorum Htg. — M.

marginatus Br. — A. aus *Lophyrus pini*.

melancholicus Gr. — R.

melanoleucus Gr. — M. R.

multicolor Gr. — Überall nicht selten. Mai—August.

niger Gr. — M.

nigricollis Gr. — M. Tr. Teg. Rsh.

opticus Gr. — M. Teg. Aus *Nematus pavidus* erzogen.

pubescens Hgr. — M. Tr.

rufilabris Zett. — M. Teg.

rufus Gr. — A. Tr. Teg. Sdf. Aus *Trichiosoma betuleti* erzogen.

- semiealyatus* Gr. — *M.* Teg. Rsh. *R.*
sorbi Ratz. — *M.* Tr. aus *Trichiosoma betuleti*.
spectabilis Hgr. — *M.* Tr.
sternoxanthus Gr. — *Rsh.* *R.*
tenellus Hgr. — *M.*
transiens Ratz. — *M.* aus *Lophyrus virens*.
variegatus Jur. (*sanguinicollis* Gr.) — Verbreitet; Mai—September.
A. aus *Nematus miliaris*.
virgulorum Gr. — *R.*
waltoni Curt. — *Teg.* *Tölz*.

Trematopygus Hgr.

- erythropalpus* Gr. — Verbreitet, Mai—Juni.
nigricornis Hgr. — *M.*
procurator Gr. — *M.* Teg. Rsh. *R.*
vellicans Gr. — *M.* Teg. Rsh. *Spitzing*.

Tryphon Hgr.

- auricularis* Thms. — *M.* *Rsh.*
bicornutus Hgr. — *Tölz*.
braccatus Gr. — *R.*
brachyacanthus Gm. — *M.* Teg; *R.* gemein.
brunniventris Gr. — *M.* Tr. *R.*
compuncator Gr. — *Rsh.* *R.*
consobrinus Hgr. — Überall nicht selten, Mai—September.
elongator F. — Gemein; Mai—September.
ephippium Hgr. — Verbreitet.
erythrogaster Thms. — *M.* *Tr.*
impressus Gr. — *R.*
incestus Hgr. — Nirgends selten.
nigripes Hgr. — *M.* *Tr.*
pleuralis Thms. — *M.*
rutilator L. — Gemein; Mai—August.
signator Gr. — *M.* *Tr.*
trochanteratus Hgr. — Verbreitet und nicht selten, Mai—Juli.
vulgaris Hgr. — *M.* *Tr.* *Teg.* *Tölz*.

Dyspetes Frst.

- praerogator* Gr. — Überall nicht selten. Mai—September.

Otoblastus Thms.

luteomarginatus Gr. — Tr. öfters; R.

Adelognathus Hgr.

brevicornis Hgr. — Tr. einmal.

dorsalis Gr. — R.

nigrifrons Hgr. — M.

pallipes Gr. — R.

Plectiscus Gr.

albipalpus Gr. — R.

collaris Gr. — R.

impurator Gr. — R.

zonatus Gr. — R.

Megastylus Schdte.

cruentator Schdte. — Tr. zwei ♂, ein ♀.

Euceros Gr.

egregius Hgr. — M. Teg.

pruinosus Gr. (*crassicornis* Gr.) — M. Tr. Sdf.

superbus Krchb. — M. aus *Callimorpha dominula*.

Monoblastus Hgr.

chrysopus Gr. — M. Tr. Teg. Peissenberg.

extirpatorius Gr. — M. R.

neustriæ Ratz. — M.

Polyblastus Hgr.

carbonarius Gr. — M. Tr. Teg.

cothurnatus Gr. — M. R. A. aus *Cabera pusaria*.

grammicus Hgr. — M. ein ♀.

marginatus Hgr. — Starnberg.

mutabilis Hgr. — Tr. Tölz.

pinguis Gr. — M.

praedator Hgr. — Rsh.

pratensis Gr. — M. R.

- propinquus* Gr. — R.
pumilus Hgr. — Teg.
rivalis Hgr. — Teg.
sphaerocephalus Gr. — M.
stenocentrus Hgr. — M.
subtilis Thms. — M. Teg.
varitarsus Gr. — Verbreitet, Mai—September.
vestustus Hgr. — Teg.
westringi Hgr. — Tr. einmal.

Erromenus Hgr.

- arenicola* Thms. — Ein ♂ vom Peissenberg.
brunnicans Gr. — M. Tr. Rsh. R.
frenator Gr. — Teg. Rsh. Hschw. R.
punctulatus Hgr. — M. Tr. Teg.

Delotomus Hgr.

- alacer* Gr. — M. Rsh.
cephalotes Gr. — Teg. R.
insidiator Hgr. — Tr.
laticeps Gr. — M..
lucidulus Gr. — Verbreitet.
parvulus Thms. — Tr.
ridibundus Gr. — M; Tr. nicht selten, R.

Cteniscus Curt.

- adspersus* Htg. — M. aus *Lophyrus rufus*.
apiarius Gr. — Rsh.
colorator Zett. — M.
extirpatorius Gr. — R.
gibbulus Hgr. — Tr. einmal.
gnathoxanthus Gr. — M Teg. R.
ictericus Gr. — R.
lituratorius L. — M. aus *Nematus conjugatus* und *Hemichroa rufa* erzogen.
marginatorius F. — Verbreitet, aus *Lophyrus rufus* gezogen.
nigrifrons Thms. — Ein ♀ von Rsh.
oriolus Htg. — M.
pictus Gr. — M. Tr. Teg. Moosburg.

rufilabris Hgr. — Heilbrunn, ein ♂.

sexcinctus Gr. — Tr. Hschw. Moosburg, R. Aus *Cladius difformis*.
succinctus Gr. — Verbreitet, Mai—Juli.

Exyston Schdte.

cinctulus Gr. — M. Tr.

sponsorius Gr. — M. R.

Colpotrochia Hgr.

elegantula Schr. — Verbreitet, Tr. häufig; Mai—September.

Exochus Gr.

coronatus Gr. — Teg.; R. nicht selten.

curvator Gr. — Tr. R.

femoralis Gr. — Verbreitet, Juli—August.

gravipes Gr. — Dessgleichen.

gravis Gr. — Tr. Teg. R.

mansuctor Gr. — Tr. Teg.; R. nicht selten.

mitratus Gr. — R. selten.

podagricus Gr. — M. R.

tardigradus Gr. — R. nicht gemein.

Trachyderma Gr.

scabra Gr. — R.

Chorinaens Hgr.

cristator Gr. — Tr.; R. selten.

Hyperacmus Gr.

crassicornis Gr. — Tr. einmal.

Periope Curt.

auscultator Curt. — Neureut.

Orthocentrus Gr.

fulvipes Gr. — R.

merulu Gr. — R.

Bassus Gr.

- abdominator Bridg.* — *M.* ein ♂.
albicoxa Thms. — *A.* *Tr.* *Sdf.* *Rsh.*
albosignatus Gr. — Nirgends selten, Juni—Juli.
biguttatus Gr. — *M.* *Teg.* *Rsh.* *R.*
bimaculatus Hgr. — *M.*
bizonarius Gr. — *R.*
cinctus Gr. — *M.* *Teg.* *R.*
cingulatus Hgr. — *M.*
compressus Desv. (ibaloides Krchb.) — *Tr.* *Rsh.*
deplanatus Gr. — Verbreitet, Mai—Juli.
dimidiatus Schr. — *Tr.* zweimal.
elegans Gr. — *R.*
exultans Gr. — Nirgends selten. April—Juni.
festivus F. — Ebenso, Mai—October.
fissorius Gr. — *M.* *Tr.* *Rsh.* *R.*
flavolineatus Gr. — *Rsh.* *Sdf.*
holmgreni Bridg. — *Starnberg* einmal.
insignis Gr. — *M.* *Tr.* *R.*
laetatorius F. — Überall nicht selten, Mai—August.
lateralis Gr. — *M.* *Tr.* *R.*
megaspis Thms. — *Rsh.*
melanaspis Thms. — Die Type von *Rsh.*
nemoralis Hgr. — Nirgends selten, April—Juni.
pallipes Gr. — *M.* *Rsh.*
pectoratorius Gr. — Überall nicht selten, aus *Cidaria berberata*.
pictus Gr. — *M.* *R.*
pumilus Hgr. — *Tr.*
rufipes Gr. — *M.* *Sdf.*
scutellaris Bridg. — *M.* ein Stück.
strigator F. — *M.*
sulcator Gr. — *M.* *Tr.* *R.*
sundevalli Hgr. — *Rsh.*

Metopius Pz.

- anxius W.* — *A.* aus *Agrotis punicea*; *Sdf.*
dissectorius Pz. — Verbreitet und nicht selten: Wurde gezogen
 aus: *Rumia crataegata*, *Eugonia alniaria*, *Ennomos syringaria*,
Amphidasya betularius und *Biston hirtarius*.

fuscipennis W. — *Tr. Sdf.*

leiopygus Frst. — *Rsh.*

migratorius Gr. — *A. M. Teg. P. R.*

Sphinetus Kl.

serotinus Kl. — *Schleissheim*, September; *R.*

Crypturus Gr.

argiolus Rossi. — *R.* sehr selten.

Summe der bisher in Südbayern beobachteten *Tryphonides*: 235.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Jemiller J.

Artikel/Article: [Versuch einer Zusammenstellung der südbayerischen Hymenopteren 95-156](#)