

Nachträge

zur

Flora von Augsburg.

(Neue, von H. Lutzenberger aufgefundene Standorte.)

Batrachium fluitans Wimm. Quellbach bei der Gögginger Wertachbrücke.

Turritis glabra L. Waldrand bei Wiffertshausen.

Viola pratensis M. u. K. Am Fusse des Höhenzugs zwischen Miedring und Bergen.

Malva moschata L. An einem Rain zwischen Scherneck und Rehling.

Geranium Phaeum L. Schlucht bei Wellenburg. (In den Museumsgarten verpflanzt.)

Vicia dumetorum L. Waldrand bei Strassberg.

Aster Amellus L. Auf der Heide zwischen Kissing und Ottmaring, und am Lechrain bei Hallenberg.

Inula hirta L. An einem Rain von Königsbrunn gegen Neuhaus.

Lactuca Scariola L. An der Mauer am Roten Thore.

Chondrilla juncea L. Auf einem Acker bei Lichtenberg.

Hieraceum glaucum All. Am Ufer der Ilsungquelle.

Centunculus minimus L. Auf nassen Stellen in der Forstanlage Windach gegen Wellenburg.

Orobanche Galii Duby. (*O. caryophyllacea* Sm.) Wertachauen bei Pfersee.

Marrubium vulgare L. An einem Raine bei Sand a. d. Ach.

Allium oleraceum L. Waldsaum zwischen Lichtenberg und Haltenberg.

Atriplex portulacoides Wallr. Lechdamenstrasse bei dem neuen Schlacht- und Viehhof.

Carex pulicaris L. Moorgrund bei Meringerzell.

Carex pilulifera L. Im Hailachwald zwischen Kissing und Bachern.

Augsburg, August 1902.

Max Weinhart.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Weinhart Max

Artikel/Article: [Nachträge zur Flora von Augsburg 155-156](#)