

Baur-Löweneckschule in Oberhausen ein Paar. Fräulein O. Heckl sah im Südteil von Neusäß in großen Obstgärten ein Paar, das sicher dort genistet hat, und konnte auch in anderen Ortsteilen die Art rufen hören. Herr Dr. Oblinger wies zwei weitere Paare in Westheim—Lohwald nach.

Herr V. Sandler beobachtete ein Paar vom Herbst 1959 ab am Westrand von Leipheim. Herr A. Lacher teilt mit, daß Lauingen seit etwa 6 Jahren von Türkentauben bewohnt wird. Heute finden sich hier im Stadtgebiet 6—8 Paare. Frau Furchtner entdeckte ein Paar in Lindau im Park der Villa Holdereggen. Herr A. Schmid sah in der Feldflur von Altisheim eine Taube am 28. 4. 60 und ein Paar am 26. 5. 60. In Ulm, etwas jenseits der bayerischen Grenze, hat sich der Bestand an Türkentauben beträchtlich vermehrt. Hier hielt sich am 29. 11. 60 allein am Hühnerfutterplatz des Grundstücks Zinglerstraße 76 ein Schwarm von etwa 40 Türkentauben auf.

Ich wäre allen, die Türkentauben an anderen Stellen des Augsburgers Stadtgebiets und im Regierungsbezirk Schwaben feststellen, zu Dank verpflichtet, wenn sie mir ihre Beobachtungen übermitteln würden.

## Die Großschmetterlinge Augsburgs und seiner Umgebung *Ein Nachtrag zu dem Verzeichnis von Otto Käser*

Von Franz Martin

Seit dem Erscheinen des Verzeichnisses der Großschmetterlinge Augsburgs und seiner Umgebung von Käser im 6. Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg von 1954 konnte von den Mitgliedern der entomologischen Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben, hauptsächlich durch die Herren Rudolf Müller, Käser, Sauter und Wiehler beim Lichtfang, eine Anzahl weiterer Arten in dem Sammelgebiet mit etwa 30 km Radius um Augsburg festgestellt werden.

Bei der Bestimmung so mancher Art wurden wir wieder von den Herren der Zoologischen Staatssammlung in München, insbesondere von Herrn Wolfsberger, in liebenswürdiger Weise unterstützt. Ihnen sei hiefür bestens gedankt.

Für eine Anzahl der im Verzeichnis von Käser bereits aufgeführten Arten wurden inzwischen neue Fundplätze, sowie die seinerzeit nicht angegebene Futterpflanze der Raupe ausfindig gemacht. Diese Ergänzung des Verzeichnisses von 1954 muß jedoch einem späteren Zeitpunkt vorbehalten bleiben.

Dem Nachtrag liegt, wie auch dem Verzeichnis von 1954, der Katalog von Staudinger und Rebel zu Grunde.

Für die Hauptsammelplätze bzw. Fundorte innerhalb des obengenannten Sammelgebietes werden nachstehende Abkürzungen gewählt:

Augsburg innerhalb des bebauten Stadtgebietes				A St;
Anhauser Tal	AT;	Horgau	Ho;	Streitheimer Forst StF;
Friedberg	FDB;	Kissingener Heide	KH;	Thierhaupten Th;
Haunstetter Wald	HW;	Siebenbrunn	Sb;	Welden Wn;
Haspelmoor	HM;	Siebentischwald	S;	Wellenburg W;

## Die weiterhin angewandten Abkürzungen bedeuten:

V	Vorkommen (Fundort)	Ab	Abart
G	Generation	E	Ei
Fl	Flugzeit	R	Raupe
Fu	Futterpflanze der Raupe	P	Puppe
Üb	Überwinterungsstadium	F	Falter

Soweit in dem nachfolgenden Verzeichnis der für Augsburg und Umgebung seit 1954 weiterhin festgestellten Arten keine Angaben enthalten sind, kann wegen bisher zu geringer Beobachtung noch keine gültige Aussage gemacht werden.

*Drepanidae**Drepana* Schrk.

*cultraria* F. V: StF; G: 2; Fl: V. u. VIII.;  
Fu: Buche; ÜB: P;

*Notodontidae**Drymonia* Hb.

*trimaculata* Esp. V: FDB am Licht;  
Fl: V./VI.;

*Notodonta* O.

*phoebe* Sieb. V: FDB am Licht;  
Fl: V./VII.;  
*tritophus* Esp. V: FDB am Licht; Fl: VI.

*Lophopteryx* Stph.

*cuculla* Esp. V: FDB am Licht;  
Fl: IV.—VII.;

*Noctuidae**Agrotis* O.

*orbana* Hufn. V: FDB am Licht; Fl: VII.  
*comes* Hb. V: FDB am Licht; Fl: VIII.;  
*rubi* View. V: A St; Fl: ? u. IX.;  
*multangula* Hb. V: FDB am Licht;  
Fl: V./VI.;  
*putris* L. V: FDB, HM; Fl: ? u. VII.;  
*praecox* L. V: am Licht; Fl: VII.;

*Pachnobia* Gn.

*rubricosa* F. V: FDB am Licht; Fl: IV.;  
*leucographa* Hb. V: FDB am Licht;  
Fl: ? - VI.;

*Mamestra* Hb.

*albicolon* Hb. V: FDB am Licht; Fl: VI.;  
*glauca* Hb. V: HM selten; G: 1;  
Fl: V./VI.; Fu: Vacc. myrtillus; ÜB: P.;

*Dianthoecia* B.

*filigrama* Esp.

*var. xanthocyanea* Hb. V: FDB am  
Licht; Fl: V.—VII.;

*Miana* Stph.

*ophiogramma* Esp. V: FDB am Licht;  
Fl: VII.;

*Hadena* Schrk.

*adusta* Esp. V: FDB am Licht;  
Fl: ? - VII.;  
*gemma* Tr. V: Lützelburg am Licht;  
Fl: VIII.;  
*sublustris* Esp. V: HM nicht häufig;  
G: 1; Fl: V.—VII.; Fu: Gräser  
*scolopacina* Esp. V: FDB am Licht;  
Fl: V - ?;  
*basilinea* F. V: HM, Sb nicht häufig;  
G: 1; Fl: VI.-VII.; Fu: Gräser; ÜB: R.;  
*gemina* Hb. V: Überall in d. Umgeb.;  
G: 1; Fl: V.-VI.; Fu: Gräser; ÜB: R.;

*Brachioycha* Hb.

*sphinx* Hufn. V: HM selten; G: 1; Fl: X.;

*Helotropha* Ld.

*leucostigma* Hb. V: Sb; Fl: VIII.;

*Hydroecia* Gn.

*micacea* Esp. V: FDB am Licht;  
Fl: ? - IX.;  
*petasitis* Dbld. V: FDB; Fl: IX.;

*Gortyna* Hb.

*ochracea* Hb. V: FDB am Licht;  
Fl: VIII./IX.;

*Leucania* Hb.

*straminea* Tr. V: Sb am Licht; Fl: VIII.;  
*vitellina* Hb. V: Sb am Licht; Fl: VIII.;

*Caradrina* Hb.

*ambigua* F. V: HM, A St; G: 2;  
Fl: VI! u. VIII.; Fu: Niedere Pflanzen;  
ÜB: R.;

*Amphipyra* O.

perflua F. V: FDB an Köder;  
Fl: VII.-VIII.;

*Toeniocampa* Gn.

pulverulenta Esp. V: FDB, HM nicht häufig; G: 1; Fl: III./IV.; Fu: Traubenkirsche;  
opima Hb. V: FDB am Licht; Fl: III.;

*Plastensis* B.

subtusa F. V: FDB; Fl: VI.-VIII.;  
Fu: Pappel;

*Orthosia* O.

nitida F. V: FDB am Licht; Fl: VIII.;

*Calocampa* Sph.

solidaginis Hb. V: FDB am Licht;  
Fl: VIII.;

*Xylomyges* Gn.

conspicillaris L. V: FDB am Licht;  
Fl: III.;

*Heliothis* O.

peltigera Schiff. V: FDB am Licht;  
Fl: V.;

*Abrostola* O.

asclepiadis Schiff. V: FDB, Sb am Licht; Fl: VII.-VIII.;

*Catocala* Schr.

promissa Esp. V: FDB am Licht;  
Fl: VIII.;

*Taxocampa* Gn.

viciae Hb. V: FDB am Licht; Fl: V.;

*Hypena* Schr.

obesalis Tr. V: FDB am Licht; Fl: V.;

*Geometridae*

*Acidalia* Tr.

herbariata F. V: A St; Fl: VI.;  
humiliata Hufn. V: Th; Fl: VI.;

*Ephyra* Dup.

pupillaria Hb. V: FDB am Licht;  
Fl: IX.;

*Lobophora* Curt.

sexalisata Hb. (sexalata Retz.);  
V: FDB am Licht; Fl: V.-VII.;

*Lygris* Hb.

associata Bkh. V: FDB am Licht;  
Fl: VI.;

*Larentia* Tr.

firmata Hb. V: FDB am Licht, W;  
Fl: VIII.-IX.;

didymata L. V: FDB am Licht; Fl: VII.;

pomoeriaria Ev. V: FDB, Oberschönfeld; Fl: VII.;

designata Rott. V: FDB am Licht;  
Fl: V.;

fluviata Hb. V: FDB am Licht; Fl: X.;

vittata Bkh. V: FDB am Licht; Fl: VII.;

obliterata Hufn. V: S; Fl: VII.;

capitata HS. V: FDB, Th.; Fl: V.-VII.;

rubidata F. V: W; Fl: VII.;

*Asthena* Hb.

anseraria HS. V: Sb; Fl: VII.;

*Tephroclystia* Hb.

indigata Hb. V: FDB am Licht; Fl: V.;

abietaria Goeze. V: FDB am Licht;  
Fl: VII.;

togata Hb. (abjectaria Goeze);  
V: Westl. Wälder; G: 1; Fl: V.-VI.;

venosota F. V: FDB am Licht;  
Fl: V.-VII.;

assimilata Gn. V: FDB am Licht, Th;  
Fl: VI.-VII.;

albipunctata Hw. V: FDB am Licht;  
Fl: V.;

selinata HS. V: FDB am Licht; Fl: V.;

succenturiata L. V: FDB und KH am Licht; Fl: VII.-VIII.;

plubeolata Hw. V: FDB am Licht;  
Fl: VII.;

immundata Z. V: FDB am Licht;  
Fl: V.-VI.;

*Arctiidae*

*Deiopeta* Sph.

pulchella L. ab. semisignata Spul.  
V: FDB am Licht; Fl: V.;

*Sesiidae*

*Sesia* F.

vespiformis L. V: W; Fl: VII.; Fu:  
Eichenstöcken;

formicaeformis Esp. V: Th; Fl: VII.;

Fu: an Weidenstämmen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: [64](#)

Autor(en)/Author(s): Martin Franz

Artikel/Article: [Die Großschmetterlinge Augsburgs und seiner Umgebung. Ein Nachtrag zu dem Verzeichnis von Otto Käser 46-48](#)