

Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung

(2. Fortsetzung)

Von Rudolf Müller

Die Nummern vor jeder Art entsprechen jenen im „Sammlungs-Verzeichnis“ von A. Koch, 2. Auflage, Berlin 1908. Es wurden die neuen Namen aus dem Buch „Die Schmetterlinge Mitteleuropas“ von Dr. W. Forster und Dr. Th. A. Wohlfahrt verwendet, mit Ausnahme der Eulen und Spanner.

In der folgenden Aufstellung bedeutet V = Vorkommen, Fl = Flugzeit, R = Raupe, Aberr. = Aberration, ssp = Subspecies, Var = Variation.

Sammlungsverzeichnis der Großschmetterlinge um Neuburg/Donau III.

- Hesperiidae*
- 271 *Carterocephalus palaemon* Pall.
Fl: Ende April–Mai und Mitte Juli bis August. V: überall häufig.
- 273 *Adopaea lineola* O.
Fl: Ende Juni–August. V: lokal verbreitet.
- 274 *Adopaea silvester* Poda. (= *thummas* Hufn.).
Fl: ab Ende Juni. V: häufig.
- 275 *Thymelicus actaeon* Rott.
Fl: Juli. V: lokal auf den Jurahängen, einzeln.
- 276 *Hesperia comma* L.
Fl: Juli–August. V: überall häufig.
- 277 *Ochlodes venata* Brem. (= *sylvanus* Esp.)
Fl: Mai–Juni, und Ende Juli bis August. V: überall häufig.
- 280 *Carcharodes alceae* Esp.
Fl: im Juli und August. V: vereinzelt an Kalkhängen.
- 284 *Pyrgus carthami* Hbn.
Fl: Juni. V: verbreitet, nicht häufig.
- 291 *Pyrgus alveus* Hbn.
Fl: im Juli. V: lokal an den Hängen, einzeln.
- 296 *Pyrgus malvae* L.
Fl: ab Mitte April–Mai, dann im Juni–Juli. V: häufig. Var: *taras* Bergstr. seltener.
- 297 *Erynnis tages* L.
Fl: Mitte April–Mai, und wieder Mitte Juli–August. V: überall häufig.
- Sphingidae*
- 299 *Acherontia atropos* L.
Fl: Ende Juni und Anfang Oktober, Falter am Licht. Jedoch die Mehrzahl durch Puppen im September erhalten, die meist nach 14 Tagen schlüpften. Der Falter selbst ist schwer zu bekommen.
- 302 *Laothöe populi* L. (*Smerinthus populi* L., *Amorpha* Kirby).
Fl: ab Mitte Mai–Juni. V: häufig.
- 303 *Smerinthus ocellata* L.
Fl: Ende Mai–Juni. V: häufig.
- 304 *Mimas tiliae* L.
Fl: ab Mitte Mai–Juni. V: häufig.
- 306 *Sphinx ligustri* L.
Fl: Mitte Mai–Juni. V: überall häufig.
- 307 *Herse (Protoparce) convolvuli* L.
Fl: Ende Mai und August–September. V: nicht selten.
- 308 *Hyloicus pinastri* L.
Fl: Ende Mai–Juni und August bis September. V: häufig. 2. Gen. seltener.
- 312 *Celerio (Deilephila) galii* Rott.
Fl: Juni–Juli. V: vereinzelt, jedoch nicht selten.

- 314 *Celerio (Deilephila) euphorbiae* L.
Fl: Mai—Juni. V: lokal häufig.
- 316 *Celerio (Deilephila) lineata* F. ssp.
livornica Esp.
Fl: Ende Mai—Juni und August bis
September. V: vereinzelt.
- 320 *Deilephila (Pergesa Wkr.) elpenor* L.
Fl: Mai—Juni. V: überall im Gebiet.
- 321 *Deilephila (Pergesa Wkr.) porcel-
lus* L.
Fl: Mai—Juni und wieder im August.
V: überall.
- 322 *Proserpinus (Pterogon B.) proser-
pina* Pall.
Fl: Mitte Mai—Juni. V: vereinzelt
- 324 *Macroglossum stellatarum* L.
Fl: Juli und September—Oktober.
V: häufig. (Selten als Überwinterer.)
- 326 *Hemaris fuciformis* L.
Fl: ab Mitte Mai—Juni. V: häufig
am Donauufer.
- 327 *Hemaris lityus* L. (*scabiosae* Z.).
Fl: ab Mitte April—Mai und Ende
Juli—August. V: lokal seltener west-
lich Neuburg.
- Notodontidae* (Wenn nichts weiter ange-
geben, alle Arten am Licht gefangen)
- 330 *Harpyia (Cerura auct.) bicuspid* Bkh.
Fl: ab Mitte Mai. V: selten. R: auf
Birke.
- 331 *Harpyia furcula* Cl.
Fl: Ende Mai—Juni. V: häufig. R: auf
Saalweide und Zitterpappel.
- 332 *Harpyia hermelina* Goeze.
(*bifida* Hbn.)
Fl: Ende März—Mai und im Juli. V:
häufig. R: auf Pappelarten.
- 334 *Cerura (Dicranura) erminea* Esp.
Fl: Ende Mai—Juni. V: selten.
(Mitternachtsflieger).
- 335 *Cerura vinula* L.
Fl: anfangs Mai. V: häufig. R: auf
Weiden und Pappelarten.
- 336 *Stauropus fagi* L.
Fl: Mai—Juni und Juli. V: häufig in
Buchenwäldern, in Bergheim einzeln.
- 338 *Hybocampa (Hoplitis) milhauseri* F.
Fl: Mitte Mai. V: vereinzelt. R: auf
Eichen und Buchen.
- 339 *Gluphisia crenata* Esp.
Fl: Mitte Juni—Juli. V: selten. R: in
den Kronen alter Pappeln.
- 341 *Drymonia guerna* F.
Fl: Juni. V: selten. R: auf Eichen-
büschen.
- 342 *Drymonia trimacula* Esp.
Fl: Ende Mai—Juni. V: nicht häufig.
- 343 *Drymonia ruficornis* Hufn.
(*chaonia* Hbn.)
Fl: Mitte Mai—Juni. V: häufig.
R: auf Eichen.
- 344 *Pheosia tremula* Cl.
Fl: Mai—Juni und Mitte Juli—August.
V: häufig.
- 345 *Pheosia gnoma* F. (*dictaeoides* Esp.)
Fl: Ende April—Juni und Juli—Septem-
ber. V: lokal häufig. (Falter fliegt
erst um Mitternacht ans Licht). R:
auf Birke.
- 346 *Notodonta ziczac* L.
Fl: Ende April—Juni und Mitte Juli—
September. V: häufig.
- 347 *Notodonta dromedarius* L.
Fl: Mai—Juni und Juli—September.
V: häufig.
- 348 *Notodonta phoebe* Sieb. (*tritophus*
Schiff.)
Fl: Mai—Juni und Ende Juli—August.
V: häufig.
- 350 *Notodonta terva* Hbn.
(*tritophus* Esp.)
Fl: Anfangs Mai—Juni. V: selten.
R: an Pappeln.
- 351 *Peridea anceps* Goeze (*trepida* Esp.).
Fl: Mai—Juni. V: häufig. R: auf
Eichen, Buchen, seltener auf Birke.
- 353 *Leucodonta bicoloria* Schiff.
Fl: Mitte Mai bis Juli. V: lokal nicht
selten. (Die Falter sind bei Dunkel-
heit nach Gewitterregen an den un-
teren Zweigen u. Ästen abzuleuch-
ten. R: in den Wipfeln der Birke.

- 356 *Odontosia carmelita* Esp.
Fl: Ende April-Mai. V: selten. R: in den Wipfeln warmstehender Birken.
- 358 *Lophopteryx camelina* L.
Fl: Mai-Juli. V: häufig. Var: f. *gialfina* Hbn. vereinzelt.
- 359 *Lophoteryx cuculla* Esp.
Fl: Mai-Juli. V: lokal, selten westlich Neuburg. R: auf Feldahorn.
- 361 *Pterostoma palpina* L.
Fl: ab Mitte Mai-Juni und Juli-September. V: häufig.
- 362 *Ptilophora plumigera* Esp.
Fl: Erst nach Frost, etwa Ende Oktober-Dezember. V: vereinzelt.
- 363 *Phalera bucephala* L.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig. R: gesellig auf Ulme, Hasel, Birke, Pappel.
- 366 *Clostera (Pygaera) anastomosis* L.
Fl: Mai und wieder ab Juli. V: selten. R: auf Zitterpappel.
- 367 *Clostera (Pygaera) curtula* L.
Fl: April-Mai und Juli-August. V: häufig.
- 368 *Clostera (Pygaera) anachoreta* F.
Fl: Ende April und Mitte Juli. V: seltener. R: auf Pappel und Weide.
- 369 *Clostera (Pygaera) pigra* Hufn.
Fl: Ende April-Juni und Juli-August. V: häufig.
- Lymantriidae*
- 377 *Orgyia gonostigma* F.
Fl: Ende Juni-Juli. V: lokal selten, westl. Neuburg (Donau).
- 378 *Orgyia recens* Hbn. (*antigua* L.)
Fl: Mitte Mai-Juni und August-September. V: häufig.
- 383 *Dasychira selenitica* Esp.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: häufig in den Auen.
- 385 *Dasychira fascelina* L.
Fl: Ende Juni-August. V: häufig.
- 386 *Dasychira abietis* Schiff.
Fl: Anfangs Juli. V: lokal, westlich Neuburg in Altlichtenbeständen.
- (Scheint nur völlig lokal im Gebiet zu sein, da der Falter sehr selten gefunden wird.)
- 387 *Dasychira pudibunda* L.
Fl: Anfangs Mai-Juni. V: häufig. R: Buche und andere Laubbäume.
- 388 *Euproctis chrysochora* L.
Fl: Juli-August. V: häufig. R: besonders auf Obstbäume, Eiche (polyphag).
- 389 *Porthesia similis* Fuessl.
Fl: Mitte Juni-August. V: lokal häufig.
- 391 *Arctornis L-nigrum* Muell.
Fl: Ende Juni-Juli. V: lokal in Buchenwäldern, mit Jungwuchs.
- 392 *Leucoma (Stilpnotia) salicis* L.
Fl: Ende Juni-August. V: häufig.
- 393 *Lymantria dispar* L.
Fl: Mitte Juli-August. V: lokal selten.
- 394 *Lymantria monacha* L.
Fl: Mitte Juli-September. V: In manchen Jahren häufiger. Var: f. *eremita* O., und f. *nigra* Frr. nicht selten unter der Stammform.
- Lasiocampidae*
- 402 *Malacosoma neustria* L.
Fl: Mitte Juli-August. V: häufig.
- 403 *Malacosoma castrensis* L.
Fl: Mitte Juli. V: sehr lokal, selten, westl. Neuburg. R: auf Wolfsmilch.
- 406 *Trichiura crataegi* L.
Fl: Ende August-September. V: lokal in den Auwäldern u. Wiesen.
- 408 *Poecilocampa populi* L.
Fl: Oktober-November. V: häufig, jedoch erst nach stärkeren Frösten.
- 410 *Eriogaster catax* L.
Fl: Ende September-Oktober. V: westl. Neuburg/D. selten. R: auf Weißdorn.
- 411 *Eriogaster lanestris* L.
Fl: Mitte März-April. V: häufiger im Auwald. R: auf Schlehe.
- 414 *Lasiocampa guercus* L.
Fl: Ende Juni-August. V: nicht häufig.

- 415 *Pachygastria (Lasiocampa) trifolii* Schiff.
Fl: Ende Juni-September. V: häufig, auf Auwaldwiesen.
- 417 *Macrotylatia rubi* L.
Fl: Mai-Juli. V: häufig, besonders im Auwald. (Im Gegensatz zu den anderen Spinnerarten, flogen mir von dieser Art mehr Weibchen ans Licht als Männchen. Dabei ist interessant, daß die Tiere zum Leuchtuch laufen. Sie fliegen meist auf 3–4 m zum Lichtschein und laufen dann im Gras näher. (♂ fliegen früher).
- 419 *Philudoria (Cosmotriche) potatoria* L.
Fl: Mitte Juli. V: häufig im Auwald.
- 420 *Cosmotriche (Selenephera) lunigera* Esp.
Fl: Ende Juli-August. V: vereinzelt, Var: f. *lobulina* Esp. häufiger.
R: auf Fichten und Weißtannen.
- 422 *Epicnaptera tremulifolia* Hbn.
Fl: Anfangs Mai-Juni. V: vereinzelt.
- 424 *Gastropacha quercifolia* L.
Fl: Ende Juni-August. V: häufig.
- 425 *Gastropacha populifolia* Esp.
Fl: Juni-Juli. V: sehr selten.
- 426 *Odonestis pruni* L.
Fl: Ende Juni-Juli. V: häufig.
- 427 *Dendrolimus pini* L.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: vereinzelt, in manchen Jahren häufiger.

Endromididae

- 431 *Endromis versicolora* L.
Fl: März-April. V: häufig in Jungbirkenpflanzungen.

Lemoniidae

- 435 *Lemonia dumi* L.
Fl: Mitte Oktober. V: selten.

Saturnidae

- 440 *Eudia pavonia* L.
Fl: Mitte März-Mai. V: häufig an Waldrandbuschzonen.

Syssphingidae (Aglia)

- 441 *Aglia tau* L.
Fl: Ende März-Mai. V: häufig in den Buchenwäldern westl. Neuburg/D. (Sobald die Sonne den Waldboden erwärmt, etwa um halb 9 Uhr, suchen die Männchen nach den Weibchen).

Drepanidae

- 442 *Drepana falcataria* L.
Fl: Ende April-Mai und im Juli-August. V: häufig.
- 444 *Drepana harpagula* Esp.
Fl: Anfangs Mai und Mitte Juli. V: lokal selten. R: Erle, Eiche.
- 445 *Drepana lacertinaria* L.
Fl: Ende Mai-Juni u. Ende Juli-Aug. V: In Birkenparzellen häufig.
- 446 *Drepana binaria* Hufn.
Fl: Mitte bis Ende Mai. Die kleinere Sommerform gen. aest. *aestivaria* Lempke von Juli-August. V: häufig im Buchenwald. R: auch auf Eiche und Erle.
- 447 *Drepana cultraria* F.
Fl: Ende April-Mai. Die dunklere Sommergeneration, gen. aest. *aestiva* Speyer. Ende Juli-September. V: häufig lokal im Altbuchenbestand.
- 448 *Cilix glaucata* Scop.
Fl: Mai-Juni = Frühjahrsform, gen. vern. *obscurata* Lempke. 2. Gen. fliegt ab Juli-August. V: häufig. R: auf Schlehen an geschützten Stellen.

Thyrididae

- 449 *Thyris fenestrella* Scop.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: nicht selten, jedoch lokal an warmen trockenen Hängen westl. Neuburg/D., an Waldrändern mit Clematis-Bewuchs. Die Falter fliegen im Sonnenschein!

Noctuidae

- 451 *Panthea coenobita* Esp.
Fl: Ende Mai-Juni. V: In Fichtenwäldern verbreitet nicht selten.

- 453 *Diphtera alpium* Gb.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: häufig im Eichenwald.
- 454 *Demas coryli* L.
Fl: Mitte April-Juni, und wieder im August. V: lokal häufig.
- 455 *Acronycta leporina* L.
Fl: Juni-Juli. V: teils häufig im Auwald.
- 456 *Acronycta aceris* L.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig im Mischwald.
- 457 *Acronycta megacephala* L.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig.
- 458 *Acronycta alni* L.
Fl: Juni-Juli. V: lokal, westl. Neuburg/D.
- 459 *Acronycta strigosa* F.
Fl: Ende Mai-Juni. V: An sonnigen Hängen mit Schlehen vereinzelt.
- 461 *Acronycta tridens* Schiff.
Fl: Ende Mai-Juni. V: vereinzelt.
- 462 *Acronycta psi* L.
Fl: Mitte Mai-Juni, und Ende Juli-August. V: häufig.
- 463 *Acronycta cuspis* Hb.
Fl: Ende Mai-Juli. V: lokal selten bei Sehensand.
- 464 *Acronycta menyanthidis* View.
Fl: Juni-August. V: lokal selten nördl. Neuburg (Moorbewohner).
- 465 *Acronycta auricoma* F.
Fl: Mai-Juni und Ende Juli-August. V: häufig.
- 466 *Acronycta euphorbiae* F.
Fl: Mai und Juli. V: nicht häufig bei Riedensheim.
- 468 *Acronycta rumicis* L.
Fl: Ende April-Mai und Juni-Juli. V: häufig.
- 469 *Craniophora ligustri* F.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig.
- 476 *Arsilonche albovenosa* Goeze.
Fl: (April-Mai und August). Ein Belegstück am 12. 7. 46 in Bergheim am Licht gefangen. V: selten.
- 477 *Agrotis strigula* Tr.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: In Heidekrautbiotopen häufig.
- 480 *Agrotis signum* F.
Fl: Ende Juni-Juli. V: lokal selten westlich Neuburg/D.
- 482 *Agrotis janthina* Esp.
Fl: Ende Juni-Aug. V: lokal häufig.
- 483 *Agrotis linogrisea* Schiff.
Fl: Juni-Juli. V: vereinzelt am Licht.
- 484 *Agrotis fimbria* L.
Fl: Mitte Juli-August. V: häufig (sehr variabel).
- 488 *Agrotis punicea* Hb.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: Im ganzen Gebiet doch immer nur einzeln.
- 489 *Agrotis augur* F.
Fl: Juli. V: häufig.
- 496 *Agrotis pronuba* L.
Fl: Juni-Juli, einzeln aber auch im August. V: häufig in vielen Variationen.
- 497 *Agrotis orbona* Hufn.
Fl: Mitte Juli. V: im Auwald selten.
- 498 *Agrotis comes* Hb.
Fl: Mitte Juli-August. V: vereinzelt nicht häufig.
- 505 *Agrotis triangulum* Hufn.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: häufig.
- 506 *Agrotis baja* F.
Fl: Juli-September. V: häufig.
- 514 *Agrotis c-nigrum* L.
Fl: Ende Mai-Juni und Ende August-Oktober. V: häufig.
- 515 *Agrotis ditrapezium* Bkh.
Fl: Juni-Juli. V: vereinzelt lokal.
- 517 *Agrotis stigmatica* Hb.
Fl: August. V: nicht häufig.
- 518 *Agrotis xanthographa* Schiff.
Fl: Mitte August-September. V: häufig im Auengebiet.
- 520 *Agrotis umbrosa* Hb.
Fl: August-September. V: lokal häufig, auf Sandboden im Auwald.
- 521 *Agrotis rubi* View.
Fl: Ende Mai-Juli und Ende August-September. V: verbreitet.

- 524 *Agrotis brunnea* F.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: weit verbreitet in feuchtwaren Mischwäldern.
- 525 *Agrotis primulae* Esp.
Fl: Mai-Juni. V: lokal häufig (westlich Neuburg/D.).
- 531 *Agrotis multangula* Hb.
Fl: Ende Juni-September. V: nördl. Neuburg/D., teils häufig.
- 537 *Agrotis plecta* L.
Fl: Ende Mai-Juni und Mitte Juli-August. V: häufig.
- 568 *Agrotis forcipula* Hb.
Fl: Ende Juni-Juli. V: nordwestlich Neuburg selten.
- 578 *Agrotis putris* L.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: häufig (je nach Höhenlage schon im Mai).
- 579 *Agrotis cinerea* Hb.
Fl: Juni-Juli. V: vereinzelt selten.
- 580 *Agrotis exclamationis* L.
Fl: Juni-Juli und August-September. V: häufig.
- 588 *Agrotis nigricans* L.
Fl: Mitte Juli-Aug. V: lokal häufig.
- 593 *Agrotis tritici* L.
Fl: Mitte Juli-August. V: vereinzelt.
- 599 *Agrotis obelisca* Hb.
Fl: Ende Juli-August. V: südwestlich Neuburg/D. selten.
- 602 *Agrotis corticea* Hb.
Fl: Juni-Juli. V: Im Auwald häufig.
- 603 *Agrotis ypsilon* Rott.
Fl: Mitte August-Sept. V: häufig.
- 604 *Agrotis segetum* Schiff.
Fl: Mitte Juni-Juli u. Mitte August-September. V: häufig.
- 606 *Agrotis saucia* Hb.
Fl: Juni-Juli = ? Einwanderer aus dem Süden, im September am Licht gefangen. V: selten.
- 616 *Agrotis praecox* L.
Fl: Juli-August. V: nicht selten.
- 617 *Agrotis prasina* F.
Fl: Juni-Juli. V: häufig im Mischwald.
- 618 *Agrotis occulta* L.
Fl: Ende Juni-Juli. V: verbreitet im Mischwald.
- 619 *Pachnobia rubricosa* F.
Fl: Mitte März-Mitte April. V: lokal häufig (Weidekätzchen u. am Licht).
- 620 *Pachnobia leucographa* Schiff.
Fl: Anfangs April. V: lokal häufig (an Weidekätzchen nur an wenigen Tagen zu fangen).
- 625 *Charaeas graminis* L.
Fl: Mitte Juli-August. V: häufig.
- 626 *Epineuronia popularis* F.
Fl: Ende August-Sept. V: häufig.
- 627 *Epineuronia cespitis* F.
Fl: Ende August-September. V: verbreitet nicht selten.
- 628 *Mamestra leucophaea* View.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: nicht häufig.
- 630 *Mamestra advena* F.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: nördlich Neuburg/D. vereinzelt.
- 631 *Mamestra tinctoria* Brahm.
Fl: Anfangs Juni-Juli. V: nördlich Neuburg/D., verbreitet lokal.
- 632 *Mamestra nebulosa* Hufn.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig im Auwald.
- 633 *Mamestra brassicae* L.
Fl: Ende Mai-Juni und Juli-Sept. V: häufig.
- 634 *Mamestra persicariae* L.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig.
- 637 *Mamestra oleracea* L.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig.
- 638 *Mamestra aliena* Hb.
Fl: Juni. V: lokal westl. Neuburg/D.
- 639 *Mamestra genistae* Bkh.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: häufig, in manchen Jahren seltener.
- 640 *Mamestra dissimilis* Kn.
Fl: Mai-Juni und August-September. V: vereinzelt.
- 641 *Mamestra thalassina* Rott.
Fl: Mitte Mai-Juni. V: in manchen Jahren häufig.

- 642 *Mamestra contigua* Vill.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig.
- 643 *Mamestra pisi* L.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig.
- 646 *Mamestra trifolii* Rott.
Fl: Ende Mai-Juni und Mitte Juli-September. V: häufig.
- 650 *Mamestra glauca* Hb.
Fl: Ende Mai-Juni. V: lokal selten westlich Neuburg/D.
- 653 *Mamestra dentina* Esp.
Fl: Mitte Mai-Juni, einzeln im Aug. V: häufig.
- 659 *Mamestra reticulata* Vill.
Fl: Ende Mai-Juli. V: vereinzelt.
- 666 *Mamestra chrysozona* Bkh.
Fl: Ende Mai-Juni. V: häufig.
- 667 *Mamestra serena* F.
Fl: Anfangs Mai-Juni und einzeln im August. V: häufig.
- 677 *Dianthoecia filigramma* Esp. Var: *xanthocyanea* Hb.
Fl: Ende Mai-Juni. V: vereinzelt selten.
- 681 *Dianthoecia albimacula* Bkh.
Fl: Ende Mai-Juni. V: nicht häufig.
- 682 *Dianthoecia nana* Rott.
Fl: Juni-Juli. V: häufig.
- 683 *Dianthoecia compta* F.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig.
- 684 *Dianthoecia capsincola* Hb.
Fl: Ende Mai-Juni. V: nicht häufig.
- 686 *Dianthoecia cucubali* Füssl.
Fl: Ende Mai-Juni und Ende Juli-August. V: häufig.
- 687 *Dianthoecia carpophaga* Bkh.
Fl: Ende Mai-Juni. V: nicht häufig. (Ist der Mai kalt, so verlängert sich die Flugzeit bis in den Juli hinein 23. 7. 61).
- 692 *Bombycia viminalis* F.
Fl: Juli. V: westl. Neuburg/D. selten.
- 693 *Miana ophiogramma* Esp.
Fl: Ende Juni-Juli. V: nicht selten.
- 695 *Miana strigilis* Cl.
Fl: Ende Mai-Juli. V: häufig. Var: *var. aethiops* Hw.
- 696 *Miana latruncula* Hb.
Fl: Juni-Juli. V: nicht häufig. Var: *var. praeduncula* Hb. selten.
- 697 *Miana bicoloria* Vill.
Fl: Juli-August. V: vereinzelt jedoch nicht selten.
- 703 *Bryophila raptricula* Hb.
Fl: Juli-August. V: vereinzelt nicht selten.
- 711 *Bryophila perla* F.
Fl: Juli-August. V: vereinzelt.
- 712 *Diloba coeruleocephala* L.
Fl: September-Oktober. V: häufig.
- 717 *Apamea testacea* Hb.
Fl: Ende Juli-September. V: lokal an sonnigen sandigen Hängen.
- 722 *Celaena matura* Hufn.
Fl: Mitte Juli-August. V: vereinzelt selten.
- 733 *Hadena porphyrea* Esp.
Fl: Ende August-Oktober. V: weit verbreitet.
- 739 *Hadena adusta* Esp.
Fl: Mitte Mai-Juli. V: selten.
- 747 *Hadena sordita* Bkh.
Fl: Mitte Mai-Juli. V: häufig, an warmen trockenen Hängen.
- 749 *Hadena gemmea* Tr.
Fl: August-September. V: einzeln.
- 753 *Hadena monoglypha* Hufn.
Fl: Juni-Juli. V: häufig. Variiert sehr.
- 755 *Hadena lateritia* Hufn.
Fl: Juli. V: selten.
- 757 *Hadena lithoxylea* F.
Fl: Ende Juni-Aug. V: lokal häufig.
- 758 *Hadena sublustris* Esp.
Fl: Juni-Juli. V: häufig.
- 760 *Hadena rurea* F.
Fl: Juni-Juli. V: lokal häufig.
- 762 *Hadena scolopacina* Esp.
Fl: Juli-August. V: vereinzelt, nicht überall.
- 763 *Hadena basilinea* F.
Fl: Ende Mai-Juni. V: lokal warme trockene Hänge.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1962

Band/Volume: [66](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Rudolf

Artikel/Article: [Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung 16-22](#)