

Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung

(3. Fortsetzung)

Von Rudolf Müller

Die Nummern vor jeder Art entsprechen jenen im „Sammlungs-Verzeichnis“ von A. Koch, 2. Auflage, Berlin 1908. Es wurden die neuen Namen aus dem Buch „Die Schmetterlinge Mitteleuropas“ von Dr. W. Forster und Dr. Th. A. Wohlfahrt verwendet, mit Ausnahme der Eulen und Spanner.

In der folgenden Aufstellung bedeutet V = Vorkommen, Fl = Flugzeit, R = Raupe, Aberr. = Aberration, ssp = Subspecies, Var = Variation.

Sammlungsverzeichnis der Großschmetterlinge um Neuburg/Donau IV.

- | | |
|--|---|
| <p>764 <i>Hadena gemina</i> Hb.
Fl: Juni. V: selten im Mischwald westlich Neuburg/D.</p> <p>765 <i>Hadena unanimis</i> Tr.
Fl: Juni. V: lokal nicht selten.</p> <p>767 <i>Hadena secalis</i> L.
Fl: Ende Juni-Juli. V: häufig in reicher Variationsbreite.</p> <p>789 <i>Ammoconia caecimacula</i> F.
Fl: September. V: einzeln.</p> <p>803 <i>Polia chi</i> L.
Fl: Ende August-September. V: nicht häufig.</p> <p>805 <i>Brachionycha nubeculosa</i> Esp.
Fl: März-April. V: vereinzelt an Ulmenstämmen.</p> <p>806 <i>Brachionycha sphinx</i> Hufn.
Fl: Ende September-November. V: häufig.</p> <p>808 <i>Miselia oxyacanthae</i> L.
Fl: September-Oktober. V: weit verbreitet.</p> <p>810 <i>Dichonia aprilina</i> L.
Fl: Mitte August-Okt. V: häufig.</p> <p>819 <i>Dipterygia scabriuscula</i> B.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: vereinzelt bei Bittenbrunn.</p> <p>821 <i>Rhizogramma detersa</i> Esp.
Fl: Juli-August. V: häufig. (Durch die Vernichtung der Berberitzen wird diese Art in unserm Gebiet sehr an Zahl abnehmen).</p> | <p>823 <i>Chloantha polyodon</i> Cl.
Fl: Ende Mai-Juli. V: lokal nicht selten.</p> <p>827 <i>Polyphaenis sericata</i> Esp.
Fl: Ende Juni-Juli. V: vereinzelt.</p> <p>830 <i>Trachea atriplicis</i> L.
Fl: Juni-Juli. V: häufig.</p> <p>834 <i>Euplexia lucipara</i> L.
Fl: Ende Mai-Juni und August. V: häufig.</p> <p>836 <i>Brotolomia meticulosa</i> L.
Fl: Ende April, Mai und ab Mitte August-Oktober. V: häufig.</p> <p>837 <i>Mania maura</i> L.
Fl: Ende Juli-August. V: Im ganzen Auengebiet verbreitet. Sitzt gerne an dunklen Orten knapp über dem Wasser (Fähre, Brücken).</p> <p>838 <i>Naenia typica</i> L.
Fl: Mitte Juni-Juli. V: vereinzelt, nicht häufig.</p> <p>840 <i>Helotropa leucostigma</i> Hb.
Fl: Ende Juli-August. V: lokal selten (R: auf Wasserschwertlilie).</p> <p>841 <i>Hydroecia nictitans</i> Bkh.
Fl: Mitte August-September. V: weit verbreitet, nicht selten.</p> <p>841 a <i>Hydroecia lucens</i> Frr.
Fl: Mitte Juni-Ende August. V: häufig im Moorgebiet.</p> <p>842 <i>Hydroecia micacea</i> Esp.
Fl: August-September. V: weit verbreitet, doch immer einzeln.</p> |
|--|---|

- 848 *Gortyna ochracea* Hb.
Fl: Ende August–Oktober. V: breitet, nicht häufig.
- 849 *Nonagria nexa* Hb.
Fl: Ende August–September. V: lokal in feuchten Auwaldsenken, einzeln.
- 852 *Nonagria typhae* Thnb.
Fl: August–Oktober. V: lokal, im Rohrkolbenbiotop häufig.
- 853 *Nonagria geminipuncta* Hatchett.
Fl: August. V: nicht häufig bei Riedensheim im Schilfgürtel.
- 868 *Tabinostola Hellmanni* Ev.
Fl: Mitte Juli–August. V: überall im ganzen Gebiet vereinzelt.
- 869 *Tapinostola fulva* Hb.
Fl: Ende August–September. V: lokal selten an feuchten Biotopen.
- 873 *Luceria virens* L.
Fl: Ende Juli–September. V: häufig,
- 874 *Calamia lutosa* Hb.
Fl: Ende August–Oktober. V: einzelt im ganzen Gebiet.
- 876 *Leucania impudens* Hb.
Fl: Mitte Juni–Juli. V: häufig im Auwald (Lohwiesen).
- 877 *Leucania impura* Hb.
Fl: Ende Juni–Juli. V: häufig auf feuchten Auwaldwiesen.
- 878 *Leucania pallens* L.
Fl: Ende Mai–Juni und Juli–September. V: häufig im Auwald.
- 879 *Leucania obsoleta* Hb.
Fl: Mai–Juni. V: vereinzelt, selten.
- 880 *Leucania straminea* Tr.
Fl: Juli–August. V: lokal häufiger.
- 890 *Leucania comma* L., var. *turbida* Hb.
Fl: Ende Mai–Juni u. Ende August–September. V: lokal verbreitet.
- 893 *Leucania L-album* Hb.
Fl: Juni und Ende August–September. V: lokal nicht selten.
- 902 *Leucania conigera* F.
Fl: Mitte Juni–Juli. V: verbreitet nicht selten.
- 903 *Leucania albipuncta* F.
Fl: Mitte Juni–August. V: zelt in den Auen.
- 904 *Leucania lithargyria* Esp.
Fl: Mitte Juni–August. V: häufig.
- 906 *Leucania turca* L.
Fl: Mitte Juni–Juli. V: häufig im Mischwald.
- 907 *Mythimna imbecilla* F.
Fl: Juni–Juli. V: lokal nördlich Neuburg/D. Schuttermoor.
- 913 *Grammesia trigrammica* Hufn.
Fl: Im Jura schon Ende Mai, im Flachland Juni–Juli. V: häufig.
- 917 *Caradrina quadripunctata* F.
Fl: Mai–Juni–Juli. V: häufig besonders in Ortschaften.
- 930 *Caradrina respersa* Hb.
Fl: Ende Juni–Juli. V: nicht häufig.
- 932 *Caradrina morpheus* Hufn.
Fl: Mitte Juni–Juli. V: vereinzelt im Auwald.
- 933 *Caradrina alsines* Brahm.
Fl: Mitte Juni–Juli. V: häufig.
- 934 *Caradrina taraxaci* Hb. (*blanda* Schiff.)
Fl: Ende Juni–August. V: weit verbreitet, nicht selten.
- 935 *Caradrina ambigua* F.
Fl: Juli–August. V: lokal nicht selten
- 936 *Caradrina pulmonaris* Esp.
Fl: Ende Juni–Juli. V: westlich Neuburg/D. vereinzelt nicht häufig.
- 942 *Petilampa arcuosa* Hw.
Fl: Mitte Juni–Juli. V: lokal nicht selten.
- 944 *Rusina umbratica* Goeze. (*tenebrosa* Hb.)
Fl: Juni–Juli. V: häufig.
- 949 *Amphipyra tragopoginis* L.
Fl: Mitte Juli–August. V: häufig.
- 952 *Amphipyra perflua* F.
Fl: Ende August–September. V: nicht häufig, im Auwald (Ulmenbestände).

- 953 *Amphipyra pyramidea* L.
Fl: Ende Juli—Oktober. V: häufig
im Auwald.
- 959 *Taeniocampa gothica* L.
Fl: Ende März—April. V: häufig an
blühenden Weidenkätzchen.
- 960 *Taeniocampa miniosa* F.
Fl: Ende März—April. V: lokal nicht
häufig. R: auf Buscheichen, beson-
ders auf den Höhen.
- 961 *Taeniocampa pulverulenta* Esp.
Fl: Mitte März—April. V: häufig
lokal, an Weidenkätzchen.
- 962 *Taeniocampa populeti* Tr.
Fl: Ende März—April. V: lokal sel-
ten an Schwarzpappelkätzchen.
- 963 *Taeniocampa stabilis* View.
Fl: Mitte März—April. V: häufig an
Weidenkätzchen.
- 965 *Taeniocampa incerta* Hufn.
Fl: Mitte März—April. V: häufig an
Weidenkätzchen.
- 966 *Taeniocampa opima* Hufn.
Fl: Ende März—April. V: lokal ver-
einzelt.
- 967 *Taeniocampa gracilis* F.
Fl: Mitte März—Mai. V: häufig
lokal.
- 968 *Taeniocampa munda* Esp.
Fl: Mitte März—April. V: weit ver-
breitet, nicht selten.
- 969 *Panolis griseovariegata* Goeze.
Fl: März—Mai. V: in wechselnder
Häufigkeit. (Falter auch an Weide
und Schlehenblüten).
- 970 *Mesogona oxalina* Hb.
Fl: Ende August—September. V: Im
Augebiet lokal häufig.
- 976 *Calymnia pyralina* View.
Fl: Ende Juni—Juli. V: in manchen
Jahren häufiger.
- 977 *Calymnia affinis* L.
Fl: Mitte Juli—August. V: Westlich
Neuburg lokal selten.
- 979 *Calymnia trapezina* L.
Fl: Ende Juli—August. V: häufig.
- 980 *Cosmia paleacea* Esp.
Fl: Ende Juli—August. V: selten.
- 986 *Dyschoorista fissipuncta* Hw.
Fl: Ende Juni—Juli. V: häufig, be-
sonders an Kopfweiden.
- 987 *Plastenis retusa* L.
Fl: Ende Juni—September. V: lokal
häufig.
- 994 *Orthosia lota* Cl.
Fl: Ende August—September. V: ver-
breitet nicht selten.
- 995 *Orthosia macilenta* Hb.
Fl: Ende August—Oktober. V: lokal
vereinzelt.
- 996 *Orthosia circellaris* Hufn.
Fl: August—Oktober. V: häufig.
- 997 *Orthosia helvola* L.
Fl: Mitte September—Oktober.
V: Im Eichenwald häufig.
- 999 *Orthosia pistacina* F.
Fl: Ende September—Oktober.
V: häufig.
- 1006 *Orthosia litura* L.
Fl: Mitte September—Oktober.
V: häufig.
- 1009 *Xanthia citrigo* L.
Fl: September. V: Warme sonnige
Höhen mit Lindenbewuchs, einzeln.
- 1011 *Xanthia aurago* F.
Fl: September—Oktober. V: ein-
zeln, nicht häufig, westl. Neuburg.
- 1012 *Xanthia lutea* Ström.
Fl: Ende August—September.
V: Im Auengebiet häufig.
- 1013 *Xanthia fulvago* L.
Fl: Mitte August—September.
V: Im Auengebiet häufig.
- 1015 *Xanthia gilvago* Esp.
Fl: September. V: weit verbreitet,
nicht selten.
- 1016 *Xanthia ocellaris* Bkh.
Fl: Ende August—September.
V: lokal selten.
- 1017 *Hoporina croceago* F.
Fl: Mitte September—März.
V: lokal vereinzelt, auf warmen,
trockenen Hängen mit Eichenbusch-
gruppen westlich Neuburg.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1962

Band/Volume: [66](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Rudolf

Artikel/Article: [Die Großschmetterlinge von Neuburg/Donau und seiner Umgebung 45-47](#)