Ber. Naturwiss. Verein für Bielefeld u. Umgegend **45** (2005), S. 323-351

Von 1909 bis 2005 erschienene Artikel in den Berichten des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e.V. (Band 1 bis 45)

Zusammengestellt von Ulrike Letschert, Bielefeld

1909 erschien der erste Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins über das Jahr 1908. In den folgenden Jahren wurden die Vereinsberichte unregelmäßig herausgegeben und es wurden jeweils mehrere Jahre zusammengefasst. 1938 wurde der 10. Bericht gedruckt, der 11. Bericht erschien erst wieder 1950. Bis 1986 folgten die Bände etwa im Zweijahresrhythmus und seit 1988 (Band 29) erscheint der Vereinsbericht jährlich.
Die 45 Bände enthalten insgesamt 556 Beiträge, die nach folgenden Kategorien aufgeführt werden:

	Seite
Astronomie (Sternkunde)	324
Archäologie (Urgeschichte)	324
Klimatologie (Klimakunde)	324
Geologie (Erdgeschichte)	325
Kryptogamen (Sporenpflanzen: Algen, Pilze, Moose, Bärlappe, Schachtelhalme, Farne)	329
Floristische Geobotanik (Pflanzenverbreitung)	331
Soziologische Geobotanik (Vegetationskunde)	334
Malakologie (Weichtierkunde)	337
Entomologie (Insektenkunde)	337
Ornithologie (Vogelkunde)	341
Wirbeltiere (mehrere Gruppen)	345
Limnologie und Hydrogeologie (Gewässerkunde)	347
Landschaftsökologie und Naturschutz	348
Vereinsgeschichte und Biographien	349
Diversa	350

Astronomie (Sternkunde)

COBLENZ (1911): Astronomisches aus der talmudisch-hagadischen Literatur. Bd. 2, 52-57.
LASPEYRES (1928): Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und Wetterperioden. Bd. 5, 61-64.
MUMMENTHEY, K. (1909): Schriftstücke, betreffend die allmähliche Errichtung einer Volkssternwarte auf dem Kahlenberge bei Bielefeld. Bd. 1, 149-151.
PLATE, H. (1911): Himmelsbeobachtungen mit freiem Auge und den einfachsten Instrumenten. Bd. 2, 58-73.
- (1911): Untersuchungen über den Lichtwechsel des Veränderlichen a Cassiopeiae. Bd. 2, 86-107.
- (1914): Veränderliche Sterne. Bd. 3, 241-255.
- (1922): Zur Beobachtung der Sonnenfinsternis vom 17. April 1912. Bd. 4, 146-147.
- (1922): Untersuchungen über den Lichtwechsel des Veränderlichen a Cassiopeiae (Neue Folge). Bd. 4, 203-208.
POLLMANN, K. (1922): Beobachtungen während der Sonnenfinsternis am 17. April 1912. Bd. 4, 142-145.

Archäologie (Urgeschichte)

ADRIAN, W. (1933): Steinzeitliche Funde aus dem Naturschutzgebiet Kipshagen und ein Überblick über die steinzeitliche Besiedlung der Senne. Bd. 6, 31-44.
- (1954): Beiträge zur Steinzeitforschung in Ostwestfalen, Bd. 13, 9-94.
- (1956): Beiträge zur Steinzeitforschung in Ostwestfalen (Teil II). Bd. 14, 5-121.
JUNKERMANN, (1922): Die mesolithische Siedelung am Blömkeberg bei Bielefeld. Bd. 4, 11-16.
- (1922): Die mittelsteinzeitliche Siedelung bei Stapelage, Bd. 4, 249-252.
KREBS, A. (1922): Die ersten Germanen im Süden des Osning. Eine archäologische Skizze zur ersten germanischen Besiedlung des östlichen Münsterlandes. Bd. 4, 305-333.
- (1928): Besiedlung und Bevölkerung Westfalens zur späten Bronzezeit und frühesten Eisenzeit (etwa 1000-700 v. Chr. Geb.). Bd. 5, 252-264.
TEUDT, W. (1928): Externsteine, Irminsul, Oesterholz. Bd. 5, 265-280.
WÄCHTER, J. (1999): Zum Einfluss des prähistorischen Menschen auf die Ausbildung der Sennelandschaft – Modell einer Landschaftsentwicklung. Bd. 40, 171-237.

Klimatologie (Klimakunde)

BELLER, E. (1914): Frühlings-Einzug in Bielefeld. Bd. 3, 111-143.
- (1928): Phänologische Beobachtungen in Bielefeld 1901-1927. Bd. 5, 65-71.

FRANKEN, E. (1933): Das Klima der Senne. Eine vergleichende Betrachtung mit anderen norddeutschen Gebieten. Bd. 6, 17-29.
- (1986): Zum Kleinklima der Heide- und Torfmoos-Gesellschaften des Naturschutzgebietes Kipshagener Teiche. Bd. 28, 213-271.
FRÖHLICH, M. (1971): Die Niederschlagsverhältnisse im Ravensberger Hügelland und im Herforder Keuperbergland. Ein Beitrag zur regionalen Klimageographie Ostwestfalens. Bd. 20, 45-59.
- (1973): Klima und Witterung im Ravensberger Hügelland zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge. Bd. 21, 119-128.
LASPEYRES, H. (1922): Wettervorhersagen. Bd. 4, 299-304.
LIENENBECKER, H. (1988): Phänologische Beobachtungen im Raum Bielefeld von 1973-1985. Bd. 29, 177-186.
- (1990): Die phänologischen Beobachtungen Berhard Drostes im Raum Bielefeld, Bd. 31, 48-60.
PULS, C. (1928): Die Niederschlagsverhältnisse von Bielefeld. Bd. 5, 48-60.
- (1936): Die Niederschlagsverhältnisse von Bielefeld. Bd. 9, 1-10.
- (1950): Die Niederschlagsverhältnisse von Bielefeld III. Bd. 11, 119-126.
SCHLEGEL, W. (1981): Über die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse in der Senne. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 7-22.
SCHMIEDEBERG, W. (1914): Meteorologische Beobachtungen in Bielefeld. Bd. 3, 227-240.

Geologie (Erdgeschichte)

ADRIAN, W. & BÜCHNER, M. (1979): Eiszeitliche Geschiebe und andere Gesteine als Rohstoffe für paläolithische Artefakte im östlichen Westfalen. Teil 1: Quarzite und Sandsteine. Bd. 24, 5-76.
- (1981): Eiszeitliche Geschiebe und andere Gesteine als Rohstoffe für paläolithische Artefakte im östlichen Westfalen. Teil 2: Konkretionäre kieselige Gesteine. Bd. 25, 281-362.
- (1984): Eiszeitliche Geschiebe und andere Gesteine als Rohstoffe für paläolithische Artefakte im östlichen Westfalen. Teil 3 (Schluß): Nachträge, schichtförmige, kieselige, karbonatische und kristalline Gesteine. Sonderheft 4, 4-171.
ALTHOFF, W. (1914): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds. Bd. 3, 193-225.
- (1922): Über die Coronatenschichten-Aufschlüsse der Jahre 1913-1918 in Grube I im Tal von Bethel bei Bielefeld. Bd. 4, 3-10.
- (1922): Ein Beitrag zur Kenntnis des Oberen Muschelkalkes bei Bielefeld. Bd. 4, 17-27.
- (1922): Neue Aufschlüsse in der unteren Kreide bei Bielefeld. Bd. 4, 192-193.
- (1922): Saurierwirbel aus den Bielefelder Juraschichten. Bd. 4, 194.
- (1928): Übersicht über die Gliederung der mesozoischen Schichten bei Bielefeld. Bd. 5, 1-20.
- (1928): Zur Kenntnis der Stratigraphie der Garantienschichten in Bethel bei Bielefeld. Bd. 5, 21-32.

ALTHOFF, W. (1936): Die Grenzschichten zwischen Lias und Dogger bei Bielefeld. Bd. 9, 11-14.
- (1936): Zur Stratigraphie und Paläontologie des oberen Lias und unteren Doggers von Bethel bei Bielefeld. Bd. 9, 15-57.
- (1936): Neue Untersuchungen in den Subfurkatenschichten von Bielefeld nebst Bemerkungen über Trigonia (Clavotr.) clavellulata. Bd. 10, 21-45.
ALTHOFF, W. & SEITZ, O. (1934): Die Gliederung des Albium bei Bielefeld. Bd. 7, 5-26.
BERTRAM, Th. (1911): Zur Geschichte der Geologie Bielefelds. Bd. 2, 80.
BREITKREUTZ, H., DIEDRICH, R. & METZDORF, R. (1991): Fossilfunde aus der Schwarz-Bunten-Wechselfolge (Ob. Cenoman bis Unter Turon) des Ostwestfalendammes bei Bielefeld. Bd. 32, 37-48.
BREITKREUTZ, H. & METZDORF, R. (1991): Erstfund der Anfangswindung von *Eubostrychoceras saxonicum* (SCHLÜTER, 1875) aus dem Oberen Turonium von Halle/Westf. (Ammonoidea, Obere Kreide, NW-Deutschland). Bd. 32, 49-57.
BÜCHNER, M. (1967): Fossilerhaltung in rhätischen Bonebeds. Ein Vergleich zwischen württembergischen und ostwestfälischen Vorkommen. Bd. 18, 5-24.
- (1969): Rhät-Bonebed im Stadtgebiet von Bielefeld. Bd. 19, 37-54.
- (1971): Eine fossile Meeresassel (Isopoda, Malacostraca) aus den Parkinsonienschichten (Mittlerer Jura) von Bethel, Kreis Bielefeld. Bd. 20, 27-35.
- (1986): Geothermisch bedingte Veränderungen in Rhät- und Jura-Gesteinen des Unteren Weserberglandes als Folge des Vlothoer Glutflußmassivs. Bd. 28, 109-138.
- (1986): Kieselgeoden im Wiehengebirge als Rohstoff steinzeitlicher Artefakte ("Wiehengebirgs-Lydit"). Bd. 28, 139-171.
- (1997): Zur Fundgeschichte des Ichthyosaurier-Restes aus dem Dogger von Bielefeld. Bd. 38, 313-315.
BÜCHNER, M. & SERAPHIM, E. Th. (1973): Mineralneubildungen im saxonischen Bruchfaltengebirge des Unteren Weserberglandes. Bd. 21, 17-95.
- (1975): Mineralneubildungen im saxonischen Bruchfaltengebirge des Unteren Weserberglandes. Teil 2: Jura bis Tertiär und Altersfrage. Bd. 22, 59-146.
- (1977): Mineralneubildungen im saxonischen Bruchfaltengebirge des Unteren Weserberglandes - Teil 3 (Schluß): Nachträge zu den Lagerstätten und Kausalfrage. Bd. 23, 9-89.
BUSCHMEIER, J. (1978): Der Sedimentationsfächer des Kroll-Baches in Hövelhof. Sonderband I (Beiträge zur Ökologie der Senne), 25-32.
DEPPE, A. (1928): Aus der Erdgeschichte der Senne. Bd. 5, 33-35.
- (1933): Geologische Verhältnisse im Naturschutzgebiet Kipshagener Teiche. Bd. 6, 9-15.
- (1965): Ein Lias-Vorkommen im Mittleren Muschelkalk südöstlich von Bielefeld. Bd. 17, 5-7.
- (1965): Bemerkenswerte Fossilien aus Muschelkalk, Keuper, Jura u. Kreide von Bielefeld. Bd. 17, 8-16.
DIEDRICH, C. (2001): Ein Pectoralflossenrest von *Protosphyraena* sp. (Pachycormidae, Actinopterygii) aus dem Ober-Cenoman von Halle/Westf. (NW-Deutschland). Bd. 41, 31-44.

DIEDRICH, C. (2001): Der Großammoniten-Kolk im Naturkunde-Museum Bielefeld. Bd. 41, 45-67.

- (2003): Der steinzeitliche Fundplatz Künsebeck, Stadt Halle (Westf.), Kr. Gütersloh - ein Beitrag zur postglazialen Besiedlungsgeschichte des Teutoburger Waldes. Bd. 43, 7-87.

EBEL, R (1995): Über neue Aufschlüsse im Ober-Sinemurium (Lias beta, Unterer Jura) der Herforder Liasmulde (Nordflügel). Bd. 36, 15-48.

FRANKEN, A. (1952): Bodenstrukturen am Südhang des Teutoburger Waldes (Von der Eiszeit und dem vorgeschichtlichen Menschen in den Brackweder Bergen). Bd. 12, 7-29.

GLIEWE, F. (1962): Ein Fisch aus dem Lias von Gadderbaum bei Bielefeld. Bd. 16, 196.

HENKE, J.-H. (1990): Die Niederterrassenablagerungen der Werre in der Flur "Blutwiese", Löhne-Gohfeld (TK 25, 3718 Bad Oeynhausen, R 83 460, H 86 800) - Versuch einer Gliederung weichselkaltzeitlicher Sedimente anhand von Pollenanalysen und 14 C-Datierung. Bd. 31, 71-83.

HESEMANN, J. (1971): Über einen eiszeitlichen Sand- und Kieszug im Teutoburger Wald bei Halle (Westfalen). Bd. 20, 61-65.

HUNGERBÜHLER, A. & SACHS, S. (1996): Ein großer Ichthyosaurier aus dem Pliensbachium von Bielefeld. Bd 37, 15-52.

KAPLAN, U. (1991): Zur Stratigraphie der tiefen Oberkreide im Teutoburger Wald (NW-Deutschland). Teil 2: Turon und Coniac im Steinbruch des Kalkwerks Foerth, Halle/Westfalen. Bd. 32, 125-159.

- (1992): Die tiefe Oberkreide des Teutoburger Waldes. Teil 3: Das Turon zwischen Bielefeld-Senne und Augustdorf. Bd. 33, 191-208.

- (1994): Zur Stratigraphie und Korrelation des Soester Grünsandes, Ober-Turon, Westfalen. Bd. 35, 59-78.

- (1998): Zur Stratigraphie der tiefen Oberkreide im Teutoburger Wald (NW-Deutschland). Teil 4: Neue stratigraphische Ergebnisse zum Cenoman des Raumes Halle (Westfalen). Bd. 39, 43-69.

- (2005): Geologische Streifzüge durch die Ablagerungen der Kreidezeit im Raum Halle/Westf. Bd. 45, 5-46.

KAPLAN, U. & BEST, M. (1985): Zur Stratigraphie der tiefen Oberkreide im Teutoburger Wald (NW-Deutschland). Teil 1: Cenoman. Bd. 27, 81-103.

LANDWEHR, F. (1909): Die Ammonitenzonen des Südflügels der Herforder Liasmulde in der Gegend von Bielefeld. Bd. 1, 132-136.

- (1909): Die Gliederung des Diluviums und Alluviums in der Gegend von Bielefeld. Bd. 1, 142-144.

- (1909): Über einige neuere Aufschlüsse im Jura und in der Kreide des Bielefelder Tals. Bd. 1, 152-155.

METZDORF, R. (1992): Zur Fauna des Hyphantoceras-Event (Oberes Turonium) von Halle und Bielefeld (Westfalen, NW-Deutschland). Bd. 33, 271-331.

- (1993): Die innerartliche Variationsbreite von *Hyphantoceras reussianum* (d'ORBIGNY, 1850) aus dem Bereich des *Hyphantoceras*-Event (Oberes Turonium) von Halle/Westf. und dem Ostwestfalendamm (Bielefeld). Bd. 34, 177-215.

METZDORF, R. (1994): Ein Fisch (*Lepidotus elvensis* DE BLAINVILLE) aus dem Lias (epsilon) von Gadderbaum (Bethel) bei Bielefeld Bd. 35, 205-210.
PULS, C. (1911): Über einen geologischen Aufschluß im Johannistal bei Bielefeld. Bd. 2, 108-110.
- (1922): Gletschertöpfe bei Bielefeld. Bd. 4, 28-29.
SACHS, S. (1996): Dinosaurier-Funde aus Westfalen. Bd. 37, 237-253.
SACHS, S. & HUNGERBÜHLER, A. (1996): Ein Ichthyosaurier-Fund aus dem Dogger von Bielefeld. Bd. 37, 255-260.
SCHÖNFELD, J. (1985): Ein neu aufgeschlossenes Vorkommen von "Emscher-Mergel" (Coniac) in Bielefeld-Brackwede. Bd. 27, 355-368.
SCHUBERT, S. (2001): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2000. Bd. 41, 225-229.
- (2001): *Tragophylloceras loscombi* (SOWERBY); Mikrokonch-Erstfund aus dem Carixium (Unter-Pliensbachium) von Bielefeld-Altenhagen. Bd. 41, 231-255.
- (2002): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2001. Bd. 42, 365-369.
- (2003): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2002. Bd. 43, 89-92.
- (2004): Das Pliensbachium im Grenzbereich Unteres/Oberes Pliensbachium (Carixium/Domerium) von Pödinghausen in der Herforder Liasmulde. Bd. 44, 7-39.
- (2004): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2003. Bd. 44, 41-45.
- (2005): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds und seiner Umgebung im Jahre 2004. Bd. 45, 47-58.
SCHULT, N. (1991): Einige Bemerkungen über einen Aufschluß im Cenoman des Storkenberges bei Halle/Westf.. Bd. 32, 323-334.
SEITZ, O. (1934): Vorbemerkungen zu dem Aufsatz über die Gliederung des Albium bei Bielefeld. Bd. 7, 1-3.
SERAPHIM, E. Th. (1962): Über ein Karstareal im Cenoman-Pläner (kro1β) bei Wistinghausen. Bd. 16, 197-202.
- (1973): Das Pleistozänprofil der Kiesgrube Kater in Hiddesen bei Detmold (Ein prä-moränales Schotterkonglomerat mit Gletscherschliff). Bd. 21, 249-263.
- (1978): Erdgeschichte, Landschaftsformen und geomorphologische Gliederung der Senne. Sonderheft 1 (Beiträge zur Ökologie der Senne), 7-24.
- (1979): Der sog. Senne-Sander, eine Kame-Terrasse - Drenthestadiale Grundmoräne und post-moränale Schmelzwasser-Sedimente der Oberen Senne. Bd. 24, 319-344.
SIEVERTS-DORECK, H. (1979): Kronen- und Stielfunde von *Chladocrinus basaltiformis*, Familie Isocrinidae, aus der Herforder Liasmulde. Bd. 24, 345-381.
- (1981): Nachweis von *Balanocrinus subteroides*, Familie Isocrinidae, im Ober-Pliensbachium der Herforder Liasmulde. Bd. 25, 177-200.
- (1981): Ein Schlangenstern (*Palaeocoma* sp. ex. gr. *milleri* (PHILLIPS)) im Unter-Pliensbachium der Herforder Liasmulde. Bd. 25, 193-200.

SKUPIN, K. (1996): Allochthone Oberkreide-Vorkommen (Herpolithe) am Nord- und Ostrand der Senne zwischen Brackwede, Augustdorf und Schlangen. Bd. 37, 261-288.

SPIEKERKÖTTER, H. (1922): Über einen Aufschluß im Weißen Jura bei Kirchdornberg. Bd. 4, 136-141.

- (1928): Zur Kenntnis der Bielefelder krystallinen Geschiebe. Bd. 5, 36-47.

Kryptogamen (Sporenpflanzen)

(Algen, Pilze, Moose, Bärlappe, Schachtelhalme, Farne)

BODINUS, F. (1928): Konservierung von Pilzen für Ausstellungs- und Lehrzwecke. Bd. 5, 177-178.

BORGSTEDT, M. & GERHARDT, A. (1989): Untersuchungen zur Luftgüte im Stadtgebiet von Gütersloh anhand epiphytischer Flechten als Bioindikatoren. Bd. 30, 15-47.

BUDDE, H. (1933): Die Algen (außer Desmidiaceen) des Schutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, 153-156.

FRANKEN, A. (1933): Desmidiaceen und andre Zieralgen aus dem Gebiet der Kipshagener Teiche. Bd. 6, 67-152.

GERHARDT, A. & GRÖSSER-HELLRIEGEL, C. (1982): Untersuchungen zur epiphytischen Flechtenvegetation im Raume Bielefeld. Bd. 26, 161-206.

GERHARDT, A., KOCH, B. & POLLMANN, D.: Vergleichende ökologische Untersuchungen zur Pilzvegetation unterschiedlicher Waldgebiete der Senne. Bd. 29, 55-100.

GRUNDMANN, M., WÄCHTER, H.J., HÄRTEL, I. (1992): Die Moose der Bielefelder Fließgewässer, Teil 1: Verbreitung. Bd. 33, 93-133.

GÜNTHER, P., SONNEBORN, I. und W. & BRECKLE, S.-W. (1989): Untersuchungen zum Schwermetall- und Aluminiumgehalt Höherer Pilze im Bielefelder Raum. Bd. 30, 183-253.

HÄRTEL, I. (1994): Die Moosvegetation des Sennefriedhofs in Bielefeld Bd. 35, 25-54

KOPPE, F. (1933): Pilze, Flechten und Moose im Schutzgebiet Kipshagen. Bd. 6, 157-173.

- (1952): Nachträge zur Moosflora von Westfalen. Bd. 12, 61-95.

- (1956): Einige für Westfalen neue Laubmoose. Bd. 14, 122-127.

- (1965): Zweiter Nachtrag zur Moosflora von Westfalen. Bd. 17, 17-57.

- (1975): Dritter Nachtrag zur Moosflora von Westfalen. Bd. 22, 167 -198.

LEWEJOHANN, K. & LIENENBECKER, H. (1969): Ein Vorkommen des Pillenfarns (*Pilularia globulifera*) im Naturschutzgebiet Barrelpäule. Bd. 19, 121-123.

LIENENBECKER, H. (1981): Die Verbreitung der Farnpflanzen (Pteridophyta) in Ostwestfalen. Ergebnisse aus der Kartierungsarbeit der geobotanischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein Bielefeld. Bd. 25, 85-128.

LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1985): Gelegenheits-Epiphyten auf Kopfweiden im Kreis Gütersloh. Bd. 27, 173-178.

MASUCH, G. (1980): Epiphythische Rindenflechten der Senne als Bioindikatoren der Luftqualität. Sonderheft II (Beiträge zur Okologie der Senne), 75 - 94.

MÜLLER, S., PAULY, C. & GERHARDT, A. (1991): Zur Okologie der Makromyceten ausgewählter Waldbestände des Bestenberges bei Lämershagen (Bielefeld). Bd. 32, 217-255.

NAUSS, E. (1922): Ein Beitrag zur Laubmoosflora von Bielefeld und Umgegend. Bd. 4, 75-79.

ROLFING, H. (1922): Die bis jetzt festgestellten Pilzarten von Bielefeld und Umgegend. Bd. 4, 284-298.

SERAPHIM, E. Th. (1965): Zur Ökologie eines Bärlapp-Vorkommens im Ravensberger-Lößhügelland. Bd. 17, 58-66.

- (1967): Zur Verbreitung und Ökologie des Riesenschachtelhalms im Ravensberger und Lipper Land (*Equisetum maximum* Lam. = *Equisetum telmateja* Ehrh.). Bd. 18, 127-149

SONNEBORN, I. & W. (1981): Mehrjährige Beobachtungen der Pilzflora in den Waldgesellschaften des Ochsenberges in Bielefeld. Bd. 25, 201-224.

- (1990): Überarbeitete und erweiterte Pilzflora des Ochsenberges in Bielefeld. Aktueller Stand bis Dezember 1989. Bd. 31, 289-319.

WÄCHTER, H. J. (1994): Zur Ausbildung *Sphagnum*-reicher Quellfluren im Teutoburger Wald. Bd. 35, 351-398.

- (1996): Veränderungen der Moosflora des Naturschutzgebietes Kipshagener Teiche (Kreis Gütersloh) zwischen 1930 und 1995. Bd. 37, 289-303.

- (1996): Zur Verbreitung von *Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra in Ostwestfalen und angrenzenden niedersächsischen Gebieten. Bd. 37, 305-321.

- (2004): Moosflora der Senne (mit südlichem Teutoburger Wald). Teil 1: Allgemeiner Teil und Musci - Sphagnidae. Bd. 44, 47-67.

- (2005): Moosflora der Senne (mit südlichem Teutoburger Wald). Teil 2: Musci - Andreaeidae, Bryidae (Dicrananae). Bd. 45, 59-89.

WÄCHTER, H. J. & HÄRTEL, I. (1993): Zur Moosflora der Bielsteinschlucht im Teutoburger Wald (TK 4119.43) in den Jahren 1856, 1933 und 1992 (Beitrag zur Moosflora von Westfalen). Bd. 34, 357-365.

WAISER, H. (1978): Höhere Pilze ausgewählter Aufnahmeflächen der Senne und angrenzender Gebiete. Sonderband I (Beiträge zur Okologie der Senne), 69-95.

WYGASCH, J. (1983): Zur Wasserqualität und Algenflora der Lohme (Alme) am Ziegenberg in Paderborn. Bd. 26, 261-268.

- (1985): Kieselalgen des Salzfloragebietes im Süden von Salzkotten. Bd. 27, 369-403.

Floristische Geobotanik (Pflanzenverbreitung)

BARUCH, M. (1914): *Matricaria discoidea* DC. in der Umgebung von Paderborn. Bd. 3, 145.

BARUCH, M. (1922): Ergänzungen und Nachträge zur Flora von Paderborn. Bd. 4, 230-245.

- (1928): Nachträge und Ergänzungen zur Flora von Paderborn. Bd. 5, 122-128.

- (1928): Gelegenheits-Überpflanzen (Epiphyten) in der Flora von Paderborn. Bd. 5, 129-133.

BÖHME, E. (1975): Die Verbreitung einiger bemerkenswerter Pflanzenarten in Ostwestfalen. Ergebnisse aus der Kartierungsarbeit der geobotanischen Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld. Bd. 22, 5-57.

BRECKLE, S.-W. (1989): Die Bielefelder Baumliste - Bäume in der Stadt und ein Plädoyer für ein Arboretum. Bd. 30, 49-79.

DAHMS, W. (1914): Flora von Oelde in Westfalen. Bd. 3, 5-109.

- (1922): Nachtrag zur Flora von Oelde i. W. Bd. 4, 214-221.

- (1928): Die Brombeeren von Oelde i. W. und Umgebung (Stromberg-Beckumer Höhen). Bd. 5, 134-154.

FREDERKING, C. (1928): Bemerkenswerte Bäume im Kreise Halle. Bd. 5, 155-169.

GÖPPNER, A. & BARUCH, M. (1911): Flora von Dahl. Bd. 2, 23-51.

GOTTLIEB, H. (1933): Die höheren Pflanzen des Schutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, 175-188.

HAPPE, J. (1992): Verbreitung der Elsbeere (*Sorbus torminalis* C.) im Forstlichen Wuchsgebiet Weserbergland in Nordrhein-Westfalen. Bd. 33, 145-172.

- (2002): Die Eibe (*Taxus baccata* L.) am Ziegenberg bei Höxter. Bd. 42, 67-83.

HARTWIG, H (1928): Das Auftauchen des rosa Waldvögleins (*Cephalanthera rubra*) im Arbeitsgebiete des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend. Bd. 5, 170-173.

HORSTMANN, D. (2005): Zur Ausbreitung des Rankenden Lerchensporns (*Ceratocapnos claviculata* (L.) LIDEN) in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 45, 91-96.

KADE, T. (1911): Beobachtungen über die Lebensdauer des roten Fingerhutes (*Digitalis purpurea*). Bd. 2, 79.

- (1911): Die Botanischen Exkursionen (am 17. und 18. Mai 1910). Bd. 2, 116-117.

- (1914): Nachträge zur Flora von Bielefeld. Bd. 3, 144.

- (1922): Nachträge zur Flora von Bielefeld. Bd. 4, 259-261.

KADE, T. & RIECHEMEIER, W. (1911): Nachtrag und Ergänzungen zur Flora von Bielefeld. Bd. 2, 84-85.

KADE, T. & SARTORIUS, F. (1909): Verzeichnis der bei Bielefeld festgestellten Gefäßpflanzen mit Standortsangaben. Bd. 1, 27-120.

KIFFE, K. (2001): Die Hybriden der Gattung *Carex* (Cyperaceae) in Nordrhein-Westfalen - ein Zwischenbericht. Bd. 41, 291-300 (Festschrift Lienenbecker).

KOPPE, A. (1985): Die asiatische Kermesbeere (*Phytolacca acinosa* Roxb.) im Raum Herford. Bd. 27, 105-107.

KOPPE, F. (1959): Die Gefäßpflanzen von Bielefeld und Umgegend. Bd. 15, 5-190.
- (1969): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen. Bd. 19, 71-95.
KREFT, E. (1969): Untersuchungen zur Verbreitung und Ökologie des Weißen Waldvögleins (*Cephalanthera damasonium* Mill.) im Raum Bielefeld-Halle. Bd. 19, 97-120.
KULBROCK, P. & LIENENBECKER, H. (2001): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 1. Bd. 41, 69-176.
- (2002): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 2. Bd. 42, 85-235.
- (2003): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 3. Bd. 43, 93-194.
KULBROCK, P., LIENENBECKER, H. & KULBROCK, G. (2004): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 5. Bd. 44, 69-198.
- (2005): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 6. Bd. 45, 97-240.
KULBROCK, P. & QUIRINI, C. (2004): Zum Auftreten von *Elatine triandra* SCHKUHR und *Najas marina* L. im NSG „Rietberger Fischteiche. Bd. 44, 199-211.
LAUTERBACH, K.-E. (1991): Ein Vorkommen des Rankenden Erdrauchs in Bielefeld-Sennestadt. Bd. 32, 209-216.
LIENENBECKER, H. (1977): Über Veränderungen der Flora des Altkreises Halle/Westf. Bd. 23, 103-120.
- (1979): Die Verbreitung der Orchideen in Ostwestfalen (Ergebnisse aus der Kartierungsarbeit der geobotanischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein Bielefeld). Bd. 24, 191-256.
- (1979): Über den Stand der floristischen Kartierung in Ostwestfalen. Bd. 24, 257-260.
- (1981): Zur Ausbreitung des Salzschwadens (*Puccinellia distans* (L.) PARL.) an der B68 im Kreis Gütersloh. Bd. 25, 81-84.
- (1985): Nachträge und Ergänzungen zu den Verbreitungskarten der Orchideen und Farnpflanzen in Ostwestfalen. Bd. 27, 109-119.
- (1985): Stammzuwachs bemerkenswerter Bäume im Altkreis Halle/ Westf. Bd. 27, 121-124.
- (1988): Die Verbreitung ausgewählter Wildpflanzen im Stadtgebiet von Bielefeld, Bd. 29, 187-217.
- (1990): Fundorte bemerkenswerter Farn- und Blütenpflanzen aus dem Herbarium und den Exkursionstagebüchern von Wilhelm Kleinewächter (1904-1976). Bd. 31, 195-216.
- (1997): Florenelemente unterschiedlicher Florenregionen in Westfalen und deren ökologische Charakterisierung. Bd. 38, 89-120.
- (1997): Vorkommen und Vergesellschaftung des Purpur-Storchschnabels (*Geranium purpureum* Vill.) im Raum Bielefeld - Gütersloh. Bd. 38, 121-126.
- (1998): Die Kupfer-Felsenbirne - *Amelanchier lamarckii* SCHROEDER - seit 1864 als Neophyt in den nördlichen Bauerschaften Güterslohs (in memoriam Elisabeth Böhme 1924 - 1998). Bd. 39, 125-142.

LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1983): Fundorte bemerkenswerter Pflanzen aus dem Herbarium von Theobald Kade (1843-1927). Bd. 26, 207-228.

- (1985): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. Bd. 27, 125 - 171.

- (1985): Gelegenheits-Epiphyten auf Kopfweiden im Kreis Gütersloh. Bd. 27, 173-178.

- (1986): Fundorte bemerkenswerter Farn- und Blütenpflanzen aus dem Herbarium von Dr. Werner Hollborn (1910-1984). Bd. 28, 301-329.

- (1986): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 2. Folge. Bd. 28, 331-381.

- (1988): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 3. Folge. Bd. 29, 219-256.

- (1988): Die Verbreitung ausgewählter Getreideunkräuter (*Secalietea*) in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. Bd. 29, 257-351.

- (1989): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 4. Folge. Bd. 30, 291-345.

- (1990): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 5. Folge. Bd. 31, 217-262.

- (1994): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten - 6. Folge Bd. 35, 105-183.

- (1995): Das Herbarium der Geobotanischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein. Bd. 36, 153-164.

- (1996): Ausgewählte Daten aus einer Fundortkartei zu Zeichnungen von Farn- und Blütenpflanzen von Eva-Maria Wentz (1906-1995). Bd. 37, 152-172.

LIENENBECKER, H. & MÖLLER, E. (2005): Der Plan einer Flora von Herford - Das Herbarium des Herforder Chemikers Dr. Wilhelm Normann (1870-1939). Bd. 45, 241-278.

LIENENBECKER, H. & SONNEBORN, I. (1979): Adventivpflanzen in der Umgebung von Bielefeld. Bd. 24, 261-272.

LIENENBECKER, H. & WITTIG, R. (2003): Ein neues Vorkommen des Mauer-Hungerblümchens (*Draba muralis* L.) in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 43, 255-258.

LOOS, G. H. (1988): *Rubus fasciculatus* P. J. Müller in der Umgegend von Geseke. Bd. 29, 353-356.

- (2002): Neufunde von *Rubus*-Arten an Straßenrändern im Raum Gütersloh - Bielefeld - Herford. Bd. 42, 315-321.

MANEGOLD, F. J. (1979): Über das Vorkommen der Schlangenwurz (*Calla palustris* L.) im Gebiet der Senne. Bd. 24, 273-278.

MÜTTERLEIN, J. (2002): Der Gute Heinrich (*Chenopodium bonus-henri-cus* L.) im Stadtgebiet von Wünnenberg. Bd. 42, 323-330.

QUIRINI, C. (1995): *Parentucellia viscosa* - Eine Mittelmeerpflanze im Feuchtwiesenschutzgebiet. Bd. 36, 175-177.

- (1999): Flora und Pilze des Naturschutzgebietes „Rietberger Fischteiche". Bd. 40, 85-108.

RAABE, U. (1979): Die Verbreitung der Lerchenspornarten im Raum Halle/Westf. Bd. 24, 305-309.

RAABE, U. (1981): Salzpflanzen in der Umgebung von Bad Laer und Bad Rothenfelde. Bd. 25, 143-161.
- (2001): Programmfloren. Bd. 41, 301-312 (Festschrift Lienenbecker).
REHM, R. (1954): Von den Holzgewächsen der Anlagen und Anpflanzungen in der Umgegend von Bielefeld. Bd. 13, 95-304.
SAKAUTZKY, H. (†) (1994): Landschaft und Pflanzenwelt von Gütersloh und Umgebung Bd. 35, 341-350.
SCHERFOSE, V. (1993): Bestandsentwicklung und Vergesellschaftung der Schachblume (*Fritillaria meleagris* L.) im NSG Tiergarten (Erweiterung Schachblumenwiesen; Kreis Warendorf). Bd. 34, 263-272.
SCHUMACHER, A. (1959): Beitrag zur Brombeerflora Bielefelds. Bd. 15, 228-274.
SONNEBORN, I. & W. (1991): Wie ein unscheinbares Stückchen Wiese zum Naturdenkmal werden kann. Bd. 32, 335-339.
WAGNER, H.-G. (1999): Zu Verbreitung und Ökologie des Knotigen Laichkrautes *Potamogeton nodosus* POIRET im Oberwesertal. Bd. 40, 239-267.
WEBER, H. E (1977): Die ehemalige und jetzige Brombeerflora von Mennighüffen, Kreis Herford, Ausgangsgebiet der europäischen *Rubus*-Forschung durch K.E.A. Weihe (1779-1834). Bd. 23, 161-193.
- (2003): Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh - Teil 4 (*Rubus* L., sect. Rubus und sect. Corylifolii). Bd. 43, 195-254.
WENZEL, G. (1922): Beobachtungen über die Langlebigkeit von Pflanzensamen. Bd. 4, 246-248.
WITTIG, R. & LIENENBECKER, H. (2002): *Asplenium ceterach* L. und weitere Farne auf Bielefelder Bahnhöfen. Bd. 42, 371-382.
WOLFF, P. & RAABE, U. (1991): *Lemna turionifera* LANDOLT in Westfalen. Bd. 32, 381-385.
ZICKGRAF, A. (1914): Schreibweise und Aussprache der botanischen Namen. Bd. 3, 257-310.

Soziologische Geobotanik (Vegetationskunde)

ALBRECHT, J. & LETSCHERT, U. (1985): "Kalktriften Willebadessen" - ein schutzwürdiger Halbtrockenrasen im Oberen Weserbergland. Bd. 27, 27-42.
BÖHME, E. (1962): Wald- und Forstgesellschaften bodenfeuchter Standorte im Forstrevier Herzebrock, Kreis Wiedenbrück. Bd. 16, 5-34.
- (1969): Natürliche Waldgesellschaften zwischen den äußeren Stufenflächen der Beckumer Berge und der Emstalung. Bd. 19, 5-36.
BOMBECK, T. (1993): Vegetationskundliche Untersuchungen in schutzwürdigen Waldparzellen im Osten von Bielefeld. Bd. 34, 11-38.
BRINKMANN, H. (1978): Schützenswerte Pflanzen und Pflanzengesellschaften der Senne. Sonderband I (Beiträge zur Okologie der Senne), 33-68.
BÜLTMANN, B. (1989): Vegetationsverhältnisse des NSG "Theesen"/Bielefeld. Bd. 30, 81-86.
- (1991): Vegetationsverhältnisse des geplanten NSG Käseberg in Bielefeld/ Brackwede. Bd. 32, 59-76.

DAHMS, W. (1922): Ein bemerkenswerter Pflanzenverein. Bd. 4, 222-229.
GOTTLIEB, H. (1928): Von den Pflanzenvereinen der Senne. Bd. 5, 108-121.
HILLEBRAND, A. & BRECKLE, S.-W. (1989): Die Vegetationsverhältnisse des Sprungbachtals/Senne - Bestandsaufnahme, Entwicklungsmöglichkeiten, Pflegevorschläge. Bd. 30, 255-290.
HILLEBRAND, A. & RÜTHER, P. (1990): Vegetationsverhältnisse an den Fließgewässern der Stadt Halle/Westfalen - Bestandsaufnahme und Bewertung. Bd. 31, 85-128.
KOPPE, F. (1933): Die Vegetationsverhältnisse des Schutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, 45-65.
LIENENBECKER, H. (1971): Die Pflanzengesellschaften im Raum Bielefeld-Halle. Bd. 20, 67-170.
- (1980): Die Vegetation des Naturschutz-Projektes "Schluchten und Moore am oberen Furlbach". Sonderband II (Beiträge zur Okologie der Senne), 53-74.
- (1992): Verbreitung und Vergesellschaftung der Mauerpflanzen im Stadtgebiet von Bielefeld. Bd. 33, 247-269.
- (1998): Die Vegetationsverhältnisse des NSG „Hünenburg" in Bielefeld. Bd. 39, 143-151.
LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1981): Vegetation auf Bahnhöfen des Ost-Münsterlandes. Bd. 25, 129-141.
MANEGOLD, F. J. (1977): Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes "Langenbergteich" Kreis Paderborn. Bd. 23, 121-143.
- (1979): Der "Habichtssee", ein floristisch und pflanzensoziologisch interessantes Gebiet der Senne. Bd. 24, 279-304.
- (1981): Pflanzengesellschaften der Gewässer und Feuchtbiotope der Senne. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 52-154.
MASCHMANN, K. (1980): Die Kiefernforsten der Senne - Ökofaktoren und Typologie. Sonderband II (Beiträge zur Okologie der Senne), 35-52.
MENSENDIEK, H. & KULBROCK, P. (1985): Das Töpkerteich-Gebiet in Bielefeld. Ein naturnahes Sekundär-Biotop. Bd. 27, 321-354.
NOLTE H., FLEISCHER, A. & STOCKEY, A. (1993): Vegetation und Landschaftsökologie der Bachauen des Ravensberger Hügellandes (Teil III). Pflanzensoziologische Charakterisierung der Bachtäler des Johannisbachsystems. Bd. 34, 217-261.
QUIRINI, C. (1994): Vegetationskundliche Untersuchungen rings um die „Daudeshove" in Bielefeld-Stieghorst Bd. 35, 211-245.
REDSLOB, F. -E. (1969): Pflanzengesellschaften des Naturdenkmales "Kampeters Kolk" in Senne I, Landkreis Bielefeld. Bd. 19, 155-162.
- (1971): Der Enzian-Zwenkenrasen am Kriegerdenkmal von Lämershagen (Kreis Bielefeld). Bd. 20, 177-185.
REHM, R. (1956): Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes Kraalbusch und seiner näheren Umgebung. Bd. 14, 168-185.
- (1959): Die pflanzensoziologischen Verhältnisse des Naturschutzgebietes Barrelpäule. Bd. 15, 191-218.
- (1962): Die pflanzensoziologischen Verhältnisse des Naturschutzgebietes "Kipshagener Teiche" bei Stukenbrock. Bd. 16, 35-87.

RZEPKA, S. (1994): Vegetationskundliche und ökologische Untersuchungen in einem Waldgebiet bei Heepen (Bielefeld Ost) als Grundlage für Naturschutzmaßnahmen Bd. 35, 311-339.

SALETZKI, M. (1992): Die Vegetationsverhältnisse der Naturdenkmäler "Piepenbrink" und "Weckers Teich" (Kreis Paderborn). Bd. 33, 349-368.

- (2002): Zur Veränderung der Vegetation von "Kampeters Kolk" (Stadt Bielefeld) seit 1932. Bd. 42, 331-353.

SCHWIER, H. (1922): Beitrag zur Kenntnis der pflanzengeographischen Verhältnisse des nordwestlichen Lippischen Berglandes. Bd. 4, 152-191.

- (1928): Die Vorsteppe im östlichen Westfalen. Bd. 5, 81-107.

SEPPELER, D. (1993): Vegetationskundliche und ökologische Untersuchungen in Waldparzellen im Bielefelder Osten (Gut Eckendorf) als Grundlage für Biotopmaßnahmen. Bd. 34, 319-356.

SERAPHIM, E. Th. (1997): Heilgrund - Blomenkämpe - Piepersiek und andere schützenswerte Biotopkomplexe in der Kleinenberger Mulde am westlichen Rand des Eggegebirges. Bd. 38, 155-214.

SOMMER, W.-H. (1989): Die Waldgesellschaften im Bereich der geplanten A33 zwischen Steinhagen und Halle. Bd. 30, 377-390.

SONNEBORN, I. (1977): Vegetation einer aufgelassenen Ziegeleigrube in Bielefeld. Bd. 23, 149-159.

STOCKEY, A. & BRECKLE, S.-W. (1986): Auswertung von Untersuchungen zur Vegetation und Gewässergüte eines Wiesensieks. Bd. 28, 383-433.

- (1988): Untersuchungen zur bachbegleitenden Vegetation und deren kleinräumige Abhängigkeit von der Geomorphologie. Bd. 29, 399-424.

VAHLE, H.-Chr. (1980): Über Veränderungen der Vegetation des Bullerbach-Tales in Sennestadt zwischen 1967 und 1979. Sonderheft II (Beiträge zur Okologie der Senne), 95-100.

- (1999): Magerrasen im Ravensberger Lösshügelland? Bd. 40, 145-169.

WEBER, H. E. (2001): Zur Entwicklung und heutigen Situation der Flora und Vegetation im südwestlichen Niedersachsen mit angrenzendem Westfalen. Bd. 41, 273-289 (Festschrift Lienenbecker).

WENZEL, E. (1995): Ruderalgesellschaften im Bielefelder Stadtgebiet. Ergebnisse vergleichender Untersuchungen zu Artenkombination, Verbreitung und Vorkommen ausgewählter Ruderalgesellschaften. Bd. 36, 307-336.

WITTIG, R. & LIENENBECKER, H. (2003): Sandtrockenrasen auf Bahnhöfen in Ostwestfalen. Bd. 43, 259-284.

- (2004): Ruderalvegetation von Bahnhöfen im Raum Bielefeld/Gütersloh. Bd. 44, 213-243.

VOGELSANG, C. (2003): Zwei bodensaure Pfeifengraswiesen (*Junco-Molinietum caeruleae*) im Ravensberger Hügelland. Bd. 43, 285-294.

ZICKGRAF, A. (1909): Betrachtungen des Gebietes von Bielefeld nach pflanzengeographischen u. historischen Gesichtspunkten, Bd. 1, 5-26.

Malakologie (Weichtierkunde)

FAHNENBRUCK, M. & CARLMEYER, A. (1994): Eine seltene Monstrosität der Weinbergschnecke *Helix pomatia*. Bd. 35, 21-24.

FELDMANN, R. (2001): Eine regionale Arealgrenze der Quellschnecke *Bythinella dunkeri* im Bereich der Möhne-Ruhr-Linie. Bd. 41, 313-324 (Festschrift Lienenbecker).

HÄRTEL, H. (1997): Das Vorkommen der Gemeinen Heideschnecke (*Helicella itala* LINNAEUS 1758) im südlichen Kreis Paderborn. Bd. 38, 39-42.

KOBIALKA, H. & WALTER, B. (2003): Die Molluskenfauna des NSG "Rietberger Fischteiche" (Kreis Gütersloh). Bd. 43, 419-431.

LATSCH, M. & LAUTERBACH, K.-E. (1991): Ein Vorkommen der Gefleckten Heideschnecke bei Bielefeld. Bd. 32, 189-193.

LAUTERBACH, K.-E. (2001): Ungewöhnliche Vorkommen von Heideschnecken in der Senne. Bd. 41, 203-217.

LAUTERBACH, K.-E. & SIEBEN, S. (1990): Zwei bemerkenswerte Schneckenfunde aus der Umgebung von Bielefeld. Bd. 31, 163-168.

MÖLLER, E. (2001): Die Muscheln (Bivalvia) und Wasserschnecken (Gastropoda) des Kreises Herford - Eine kommentierte Artenliste. Bd. 41, 357-379 (Festschrift Lienenbecker).

PLESKER, M. (1989): Funde von Süßwassermuscheln in Bielefeld. Bd. 30, 373-376.

- (1990): Zur ehemaligen und heutigen Verbreitung von Süßwassermuscheln im Stadtgebiet von Bielefeld und der weiteren Umgebung. Bd. 31, 263-269.

SPÄH, H. (1981): Die Schneckenfauna eines Bach-Erlen-Eschenwaldes (Carici-remotae-Fraxinetum W. KOCH 26) der Senne. Sonderband III (Beiträge zur Okologie der Senne), 179-186.

Entomologie (Insektenkunde)

ANT, H. (1971): Fundpunkte von *Pterostichus*-Arten (Coleoptera, Carabidae) in Westfalen. Bd. 20, 23-26.

BARNER, K. (1922): Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes. Bd. 4, 266-283.

BARNER, K. & PEETZ, F. (1933): Über die Käferfauna des Naturschutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, 233- 249.

BECKMANN, K. (1933): Schmetterlinge (im Naturschutzgebiet Kipshagen. Anm. d. Red.). Bd. 6, 229-231.

BENDER, B. (1993): Libellenvielfalt an neu angelegten Gartenteichen. Beobachtungen über 8 Jahre. Bd. 34, 3-10.

BERNHARD, K.-G. (1986): Das Vorkommen von Wanzen und Zikaden in den trockenen Grassäumen im randlichen Sennegebiet bei Dreihausen/Paderborn. Bd. 28, 103-107.

BLECKMANN, C. & LIENENBECKER, H. (2005): Eine Kolonie des Ameisenlöwen (*Euroleon nostras*) in einer Wohnsiedlung in Steinhagen/Kreis Gütersloh. Bd. 45, 279-284.

BOIN, J. (1914): Die Großschmetterlinge von Bielefeld und Umgegend (I. Teil). Bd. 3, 161-185.

- (1922): Die Großschmetterlinge von Bielefeld und Umgegend (II. Teil). Bd. 4, 45-74.

- (1922): Von einigen selteneren Schmetterlingsarten der Bielefelder Fauna. Bd. 4, 84-87.

- (1922): Winke und Ratschläge für den Insektenfang. Bd. 4, 148-151.

BROZOWSKI, F. & SCHLEEF, J. (1994): Zur Heuschreckenfauna (Orthoptera: Saltatoria) im Stadtgebiet von Bielefeld. Bd. 35, 7-19.

DAHMS, W. (1928): Vorläufiges Verzeichnis der bei Oelde i. W. bis 1927 aufgefundenen Käfer. (Nach Fauna Germanica v. Edm. Reitter 1908). Bd. 5, 179-234.

DRESSEL, J. & BOCKWINKEL, G. (1990): Entwicklung eines konzeptionellen Naturschutzes am Beispiel des Beckendorfer Mühlenbachtales in Bielefeld. Teil 2: Bedingungen für das Überleben von Wirbellosen-Populationen in Grünlandbereichen. Bd. 31, 49-69.

GROSSKOPF, J. (1989): Die Zonierung der Carabidenfauna in Kalk-Magerrasen des Weserberglandes. Bd. 30, 151-181.

GRUNDMANN, B. (1991): Die Coleopterenfauna des Oppenweher Moores. Bd. 32, 77-123.

HANISCH, M. (1998): Die Heuschreckenfauna der Siektäler des Warmenausystems unter besonderer Berücksichtigung der Gehölzstrukturen. Bd. 39, 15-42.

JUNKERMANN, R. (1909): Über die Häufigkeit der Abänderung Doubledayaria des Birkenspanners *Amphidasis betularia*. Bd. 1, 156.

- (1911): Beobachtungen über den Anflug des Männchen des kleinen Nachtpfauenauges (*Saturnia pavonia*) an die weiblichen Falter. Bd. 2, 81-82.

KRIEGE, Th. (1914): Die Libellen Bielefelds. Bd. 3, 187-192.

LANDWEHR, F. (1909): Über das Vorkommen des Bärenspinners *Coscinia cribrum* bei Bielefeld. Bd. 1, 159-160.

- (1911): Das Vorkommen der grauschwarzen Heideeule (*Agrotis molothina* Dup) in der Senne bei Bielefeld. Bd. 2, 83.

LAUTERBACH, K.-E. (1990): Eine winteraktive *Tjederina gracilis* (SCHNEIDER) in Bielefeld und zum Problem der disjunkten Verbreitung der Art (Insecta - Planipennia - Chrysopidae). Bd. 31, 149-161.

- (1991): Zum Vorkommen von *Dromius angustus* BRULLE (Coleoptera, Carabidae) in Bielefeld. Bd. 32, 195-208.

- (1992): Zum Vorkommen von *Agrilus cyanescens* RATZEBURG (Coleoptera, Buprestidae) in Bielefeld-Sennestadt. Bd. 33, 241-246.

- (1993): Der Wespenbaum. Bd. 34, 163-169.

- (1993): Schwebfliegen (Diptera - Syrphidae) in Bielefeld und Umgegend. I. Die Gattung Didea. Bd. 34, 171-175.

- (1994): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend II (Diptera - Syrphidae) Bd. 35, 79-97.

LAUTERBACH, K.-E. (1994): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend III (Diptera - Syrphidae) Bd. 35, 99-104.
- (1995): Die Kleine Hornisse in Bielefeld und Umgegend (Hymenoptera - Vespidae). Bd. 36, 117-135.
- (1995): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend IV (Diptera - Syrphidae). Bd. 36, 137-152.
- (1996): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend V (Diptera - Syrphidae). Bd. 37, 87-113.
- (1996): Die Kleine Hornisse in Bielefeld und Umgegend II (Hymenoptera - Vespidae). Bd. 37, 115-125.
- (1996): Grabwespen (Hymenoptera - Sphecidae) in Bielefeld und Umgegend I: Sandwespen (Ammophilomorpha). Mit Anmerkungen zum Phylogenetischen System und Problemen der Phylogenetischen Systematik. Bd. 37, 127-152.
- (1997): Grabwespen in Bielefeld und Umgegend II: Alyssonini und Nyssonini (Hymenoptera - Sphecidae - Nyssoninae). Bd. 38, 59-75.
- (1997): Grabwespen in Bielefeld und Umgegend III: Gorytini (Hymenoptera - Sphecidae - Nyssoninae). Bd. 38, 77-87.
- (1998): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend VI: Cerioidini - Langhorn-Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae). Bd. 39, 71-80.
- (1998): Bemerkenswerte Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) aus dem durch Bebauungspläne gefährdeten Bereich „Württemberger Allee" in Bielefeld-Sennestadt. Bd. 39, 81-95.
- (1999): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend VII: Die Hundsnasen- oder Schnauzenschwebfliege *Blera fallax* (LINNAEUS, 1758) (Diptera – Syrphidae). Bd. 40, 5-11.
- (2001): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend VIII: Baumsaftschwebfliegen der Gattung *Brachyopa* MEIGEN, 1822 (Diptera - Syrphidae). Bd. 41, 177-201.
- (2002): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend IX: Baumsaftschwebfliegen der Gattung *Brachyopa* MEIGEN, 1822 - Teil 2 (Diptera - Syrphidae). Bd. 42, 237-247.
- (2003): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend X: Volucellini und Sericomyini (Diptera - Syrphidae). Bd. 43, 385-407.
- (2005): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend XI: Die Arten der *Cheilosia canicularis*-Gruppe. Bd. 45, 285-321.
MENSENDIEK, H. (1997): Freilandbeobachtungen an einer Population der Wespenspinne (*Argiope bruennichi* SCOPOLI) in Bielefeld. Bd. 38, 135-153.
MÖLLER, E. (1996): Die Libellen des Kreises Herford (Insecta: Odonata). Bd. 37, 179-204.
- (2001): Erste Nachweise des Schlammschwimmers *Hygrobia hermanni* (Insecta: Coleoptera) im Ravensberger Land. Bd. 41, 219-223.
PFEIFER, F. (2001): Untersuchungen zur Verbreitung und Populationsdynamik der Ibisfliege *Atherix ibis* (FABRICIUS, 1798) (Athericidae, Diptera) im Kreis Borken - ein Zwischenbericht. Bd. 41, 325-343 (Festschrift Lienenbecker).
POLLMANN, K. (1922): Beobachtungen über nützliche und besonders schädliche Insekten in den Jahren 1920 und 1921. Bd. 4, 30-44.

RADKE, C. (2004): Hügelbauende Waldameisen im Kreis Herford. Bd. 44, 245-253.

RATHJEN, H. (1996): Beitrag zur Kenntnis der Wildbienenfauna im Bielefelder Osning und seinem nördlichen Vorland (Hymenoptera, Apidae). Bd. 37, 205-227.

REHM, H. (1933): Die Arneisenfauna im Naturschutzgebiet Kipshagen. Bd. 6, 227-228.

RENNER, K. (1977): Bemerkenswerte Käferarten in einem Bielefelder Komposthaufen. Bd. 23, 145-147.

- (1979): Feuchtgebiete im östlichen Westfalen als Refugien seltener Käferarten. Bd. 24, 311-317.

- (1980): Faunistisch ökologische Untersuchungen der Käferfauna pflanzensoziologisch unterschiedlicher Biotope im Evessell-Bruch bei Bielefeld-Sennestadt. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 145-176.

- (1981): Die Käferfauna eines artenreichen Kleinbiotops im Teutoburger Wald bei Bielefeld. Bd. 25, 163-175.

RETZLAFF, H. (1967): Die bisher in Ostwestfalen-Lippe gefundenen Sackträger (Psychiden-) Arten der Unterfamilie Psychinae und einiger Neufunde der Gattungen Fumea, Bacotia und Solenobia. Bd. 18, 117-126.

- (1969): Zur Verbreitung und Ökologie der *Solenobia nickerlii* Hein. in Ostwestfalen-Lippe (*Lep., Psychidae*). Bd. 19, 163-170.

- (1973): Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht). Bd. 21, 129-248.

- (1975): Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht), II. Teil. Bd. 22, 199-344.

- (1981): Großschmetterlinge ausgewählter *Calluna*-Sandheiden und Bachtäler der. Senne. Sonderband III (Beiträge zur Okologie der Senne), 155-177.

ROBENZ, W. (1969): *Autographa gracilis* Lempke auf einem westfälischen Moor (Lep., Noctuidae). Bd. 19, 171-173.

- (1971): *Phytometra bractea* F. (Lep., Noct.). Vier Fundorte aus Westfalen. Bd. 20, 187-188.

SCHÄFER, H. (1969): Schillerfalter (*Apatura iris* L.) im Raume Barntrup, Kreis Lemgo. Bd. 19, 175-180.

SCHLEEF, J. (2002): Zur Libellenfauna der Rieselfelder Windel in Bielefeld-Senne. Bd. 42, 355-364.

SCHULZ, V. G. M. (1952): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 21: Wie finden sich die Männchen und Weibchen unserer Schmetterlinge? Bd. 12, 30-52.

- (1952): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 22: Protogynie bei einer *Acalla hastina* L.-Zucht. Bd. 12, 53-56.

- (1952): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 23: Aus der Lebensgeschichte des Holunderzünslers *Pyrausta sambucalis* Schiff (Beobachtungen, die mit den Angaben in der Literatur nicht übereinstimmen). Bd. 12, 57-60.

SCHULZ, V. G. M. (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 32: Merkwürdige Kokonformen bei *Saturnia pavonia* L., dem kleinen Nachtpfauenauge. Bd. 15, 219-221.
- (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 33: Uber die Raupe von *Bapta pictaria* Curtis. Bd. 15, 222-223.
- (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 34: Nachtrag zum Aufsatz: "Eine Großschmetterlingsfauna auf kleinstem Raum". Bd. 15, 223-225.
- (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 35: Das "Überliegen" der *Brephos parthenias* L.-Puppen. Bd. 15, 225-227.
- (1962): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 38: Schmetterlinge an der Blüte der Schneebeere. Bd. 16, 166-171.
- (1962): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 39: Die Tapetenmotte, *Trichophaga tapetzella* L. und Beobachtungen bei ihrer Aufzucht. Bd. 16, 172-179.
- (1962): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 40: Verzeichnis der von Rudolf Boldt in der Umgebung von Paderborn, in der Senne und im Teutoburger Wald aufgefundenen Großschmetterlingsraupen und -puppen. Bd. 16, 180-195.
- (1965): Insekten als Heilmittel. Kurioses aus vergangenen Jahrhunderten. Bd. 17, 222-225.
SCHULZE, W. (1993): Neuzeitliche Arealerweiterungen bei Eulenfaltern (Insecta, Lepidoptera: Noctuidae) in Mitteleuropa. Bd. 34, 273-317.
SPOTT, J. & BARTELS, S. (1997): Wasserläufer (*Gerris lacustris* (L.)) als Evolutionsmodell, sowie eine vorläufige Bestandsaufnahme der im Bielefelder Westen vorkommenden Gerriden (Insecta, Heteroptera, Gerridae). Bd. 38, 215-229.
STEINBORN, G. (1980): Die Libellen der Senne und ihr Lebensraum. Sonderband II (Beiträge zur Okologie der Senne), 133-144.
UFFELN, K. (1922): Beobachtungen und Anregungen zur Bekämpfung von Obstschädlingen durch Leimringe. Bd. 4, 253-258.
- (1928): Der Eichenwickler. Bd. 5, 235-239.
VENNE, C. & AHNFELDT, F. (2003): Neuansiedlung der Feldgrille (*Gryllus campestris*) in Bielefeld? Bd. 43, 407-417.
WEIGT, H.-J. (1969): Die drei *Amphipoea*-Arten im Sauerland und in Ostwestfalen (Lepidoptera, Noctuidae). Bd. 19, 181-187.
ZICKGRAF, A. (1909): Holzwespen in Neubauten Bielefelds.Bd. 1, 157-158.
- (1909): Ein "Bienenwolf". Bd. 1, 161.

Ornithologie (Vogelkunde)

BALDA, R. P. & CONRADS, K. (1990): Freilandbeobachtungen an Sibirischen Tannenhähern (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*) 1977/78 in Bielefeld. Bd. 31, 1-31.
BARTELS, M. (1914): Zur heimatlichen Vogelwelt (Seltene Gäste). Bd. 3, 148-150.

BARTELS, M.- (1914): Zum Vorkommen des Ortolans (*Emberiza hortulana* L.) und des Girlitz (*Serinus serinus* L.) bei Bielefeld. Bd. 3, 151-152.
BEHRENS, K. (1909): Aus der Vogelwelt. Bd. 1, 145-148.
- (1911): Aus der Vogelwelt. Bd. 2, 74-78.
- (1914): Aus dem Leben der Wasserralle. Bd. 3, 153-159.
- (1914): Merkwürdiger Vogelzug. Bd. 3, 160.
- (1922): Seltenerwerden einiger Vogelarten in der Umgebung von Bielefeld. Bd. 4, 209-213.
- (1928): Merkwürdigkeiten und Rätsel aus der heimischen Vogelwelt. Bd. 5, 240-246.
- (1928): Schmuck liebende Stare. Bd. 5, 247-248.
BEISENHERZ, W., HÄRTEL, H., ALBRECHT, J., BONGARDS, M., HUNGER, D., PFENNINGSCHMIDT, M. & WILM, P. (2003): Brutbestände von Wasservögeln an Stillgewässern in Bielefeld. Bd. 43, 351-366.
CONRADS, K. (1962): Die Vogelwelt des Johannisfriedhofs in Bielefeld. Bd. 16, 88-96.
- (1962): Zur Ausbreitung des Schwarzspechtes (*Dryocopus martius* (L.)) in Westfalen um die Jahrhundertwende. Bd. 16, 97-106.
- (1967): Die Spechte in Westfalen-Lippe (Beiträge zur Avifaunistik und Ökologie). Bd. 18, 25-115.
- (1969): Die Invasion des (Sibirischen) Tannenhähers, *Nucifraga caryocatactes* (*macrorhynchos* Brehm), 1968 in OstwestfalenLippe. Bd. 19, 55-70.
- (1977): Entwicklung einer Kombinationsstrophe des Buchfinken (*Fringila c. coelebs* L.) aus einer Grünlings-Imitation und arteigenen Elementen im Freiland. Bd. 23, 91-101.
- (1978): Vögel der trockenen Biotope der Senne. Sonderband I (Beiträge zur Okologie der Senne), 169-180.
- (1979): Über den Subsong zweier ♂ des Zwergschnäppers (*Ficedula parva*). Bd. 24, 77-91.
- (1979): Strophentypen des Buchfinken (*Fringilla c. coelebs* L.) auf einer Probefläche der Senne (Ostmünsterland). Bd. 24, 93-114.
- (1981): Die Verbreitung der Brutvögel in Ostwestfalen-Lippe 1976-1980. Bd. 25, 7-51.
- (1985): Imitationsleistungen einer Gartenrotschwanz-Population (*Phoenicurus phoenicurus*) in der Senne (Ostmünsterland). Bd. 27, 43-64.
- (1986): Chronik - insbesondere des Gesangsrepertoires - eines (x+8)jährigen Ortolan-♂ (*Emberiza hortulana*) aus der Senne (Ostmünsterland). Bd. 28, 173-189.
- (1986): Stabilität und Veränderungen eines Gesangsdialektes des Buchfinken (*Fringilla coelebs*) im Zeitraum von 1964/66 bis 1982/83 in Ostwestfalen. Bd. 28, 191-212.
- (1989): Der Ortolan (*Emberiza hortulana*) in der Senne (Ostmünsterland): Weiterer Rückgang 1977-1988. Bd. 30, 87-104.
CONRADS, K. & W. (1992): Der Mittelspecht (*Picoides medius*) im Beller Holz (Kreis Lippe). Bd. 33, 5-46.

CONRADS, K. & W. (1997): Ergänzende Beobachtungen am Mittelspecht (*Picoides medius*) im Beller Holz (Kreis Lippe) 1993-1997. Bd. 38, 21-37.

CONRADS, K. & BALDA, R. P. (1979): Uberwinterungschancen Sibirischer Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*) im Invasionsgebiet (Beobachtungen und Versuche während der Invasion 1977 in Bielefeld). Bd. 24, 115-137.

CONRADS, K. & HÄRTEL, H. (1998): Beobachtungen an Dickschnäbligen Tannenhähern (*Nucifraga c. caryocatactes*) in Bielefeld 1993/94. Bd. 39, 3-13.

CONRADS, K. & MENSENDIEK, H. (1973): Beobachtungen an Fichtenzapfenschmieden des Buntspechtes (*Dendrocopos major*) im NSG "Donoper Teich" bei Detmold. Bd. 21, 97-117.

CONRADS, K. & QUELLE, M. (1981): Erster Brutnachweis des Bienenfressers (*Merops apiaster*) 1978 in Westfalen. Bd. 25, 53-80.

- (1993): Winterbeobachtungen am Erlenzeisig (*Spinus spinus*) an einer Futterstelle in Bielefeld (Stadtbezirk Mitte). Bd. 34, 39-66.

CONRADS, K. & SIEBRASSE, R. (1971): Zwei Ringfunde lettischer Kohlmeisen (*Parus major* L.) in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 20, 37-40.

CONRADS, K. & TRETZEL, E. (1975): Weitere Fälle von Menschenpfiff-Imitationen bei Amseln (*Turdus m. merula* L.). Bd, 22, 147-165.

DELIUS, R. (1909): Beobachtungen über die Vogelfauna von Versmold. Bd. 1, 122-131.

EHRHARDT, J. (1980): Quantitative avifaunistische Bestandsaufnahme im oberen Furlbach-Tal. Sonderband II (Beiträge zur Okologie der Senne), 177-184.

FINKE C., HÄRTEL, H. & SCHNELL, K. (1989): Die Verbreitung der Brutvögel im Altkreis Büren 1986/87. Bd. 30, 105-150.

HÄRTEL, H. (1992): Zur Ausbreitung von Reiher- und Tafelente (*Aythya fuligula, A. ferina*) in Ostwestfalen-Lippe bis 1991. Bd. 33, 135-144.

- (1993): Veränderungen der Bielefelder Vogelwelt seit 1989. Bd. 34, 85-93.

- (2002): Die Singvögel in Bielefeld und seinem Umland. Bd. 42, 5-66.

HÄRTEL, H. & CONRADS, K. (1995): Die Invasion des Dickschnäbeligen Tannenhähers *Nucifraga caryocatactes caryocatactes* im Jahre 1993 nach Ostwestfalen-Lippe. Bd. 36, 57-73.

HADASCH, J. (1995): Frühsommerzug der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im Raum Herford (Ostwestfalen). Bd. 36, 49-54.

HASENCLEVER, H. (1992): Einige außergewöhnliche Brutplätze des Turmfalken (*Falco tinnunculus*) im Stadtgebiet von Bielefeld. Bd. 33, 173-182.

- (1992): Weitere Funde im Baltikum beringter Kohlmeisen (*Parus major* L.) in Ostwestfalen. Bd. 33, 183-189.

- (1994): Das „Ei im Ei" (Ovum in ovo) Bd. 35, 55-57.

HAUBOLD, S (1988): Beitrag zur Kenntnis der Haubenlerche (*Galerida cristata* L.) und ihrer Bestandsentwicklung in Ostwestfalen und in der Stadt Bielefeld. Bd. 29, 101-119.

HELBIG, A. & LASKE, V. (1986): Zehnjährige Planbeobachtungen des herbstlichen Vogelzuges in Ostwestfalen: Status, Zugzeiten und Häufigkeiten der einzelnen Arten. Bd. 28, 273-300.

HORSTKOTTE, E. (1962): Beiträge zum Brutverhalten des Braunkehlchens (*Saxicola rubra* L.). Bd. 16, 107-165.
- (1965): Untersuchungen zur Brutbiologie und Ethologie der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos* BREHM). Bd. 17, 67-145.
- (1985): Zweitbrut des Feldschwirls (*Locustella naevia*) in Ostwestfalen. Bd. 27, 65-79.
KRIESTEN, B. (1979): Ornithologische Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an den Rietberger Fischteichen. Bd. 24, 139-190.
- (1993): Der Brutvogelbestand der Stadt Löhne.Eine Bestandsanalyse des Brutvogelbestandes mittels einer Rasterkartierung. Bd. 34, 143-162.
KUHLMANN, H. (1935): Die Vogelwelt des Ravensberger Landes und der Senne (Beiträge zu einer Avifauna). Bd. 8, 1-65.
- (1950): Die Vogelwelt des Ravensberger Landes und der Senne (Beiträge zu einer Avifauna). Bd. 11, 19-118.
LAKMANN, G. (1988): Zur Avifauna des Naturschutzgebietes "Rabbruch" (Salzkotten, Kr. Paderborn). Bd. 29, 121-175.
LIENENBECKER, H. (1990): Vergleichende Untersuchungen zur Bestandsdichte von Mehl- und Rauchschwalben im Raum Halle/Westfalen. Bd. 31, 169-177.
LOSKE, K.-H. (1985): Vogelsiedlungdichten im Raum Bielefeld-West - Ein vogelkundlicher Planungsbeitrag. Bd. 27, 179-269.
MÖBIUS, G. (1965) (Mit einem Beitrag v. H. Sakautzky): Die Vogelwelt der Rietberger Fischteiche. Bd. 17, 146—221.
MÖBIUS, G. (†), bearbeitet von J. ALBRECHT (1998): Lokalavifauna von Gütersloh und Umgebung: Brutvögel. Bd. 39, 153-196.
NESENHÖNER, H. (1956): Beobachtungen, besonders brutbiologischer Art, am Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Bd. 14, 128-167.
NOLTE, M. (1969): Die Siedlungsdichte und Siedlungsweise des Mäusebussards (*Buteo buteo*) im Ravensberger Land. Bd. 19, 125-153.
NOTTMEYER-LINDEN, K. (1988): Eine avifaunistische Bestandserfassung in zwei Bielefelder Bachtälern - ein Vergleich und der Versuch einer ökologischen Bewertung. Bd. 29, 357-398.
PEITZMEIER, J. (1938): Die Misteldrossel im oberen Emsgebiet. Bd. 10, 3-20.
PÜCHEL-WIELING, F. (1999): Daten zum Mittelspecht (*Picoides medius*) im Kreis Lippe 1996 und 1999. Bd. 40, 13-42.
PÜCHEL-WIELING, F. & WALTER, B. (2003): Verbreitung und Bestand des Steinkauzes (*Athene noctua*) im Kreis Gütersloh und der Stadt Bielefeld. Bd. 43, 367-383.
QUELLE, M. & CONRADS, K. (1991): Maße und weitere Kennzeichen beringter Ortolan-♂ (*Emberiza hortulana*) aus der Senne (Ostmünsterland). Bd. 32, 257-262.
SCHIEKE, R. (1986): Die Avifauna des Werretales zwischen Herford und Löhne. Bd. 28, 5-41.
SCHLEEF, J., PÜCHEL-WIELING, F. & WALTER, B. (1999): Zur Avifauna der Rieselfelder Windel in Bielefeld-Senne. Bd. 40, 127-144.
SCHMIDT, C. (1986): Zweijährige avifaunistische Bestandsaufnahme im Werretal zwischen Herford und Bad Salzuflen (1982-1983). Bd. 28, 43-101.

WALTER, B. & PÜCHEL-WIELING, F. (2001): Erster Brutnachweis des Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyanecula*) für den Kreis Gütersloh. Bd. 41, 257-264.

WEIMANN, R. (1978): Vögel der Feuchtgebiete der Senne. Sonderband I (Beiträge zur Okologie der Senne), 181-194.

- (1981): Die Vogelwelt der Naturschutzgebiete Ramselbruch-Ost und Ramselbruch-West und ihrer schützenswerten Umgebung. Sonderband III (Beiträge zur Okologie der Senne), 215-230.

WOLF, H. (1981): Die Senne als Lebensraum für Greifvögel (Falconiformes) und Eulen (Strigiformes). Sonderband III (Beiträge zur Okologie der Senne), 187-213.

Wirbeltiere (mehrere Gruppen)

BEISENHERZ, W. (1996): Langzeit-Entwicklung von Groppenbeständen nach Wiederansiedlung im Johannisbach und Hasbach in Bielefeld, Ostwestfalen. Bd 37, 3-14.

BENDER, B. (1994): Erste Tendenzen zur Körperlänge der adulten Erdkröten (*Bufo bufo*) in Bielefeld. Bd. 35, 3-6.

- (1995): Zur Amphibienwanderung im Frühjahr 1995 an der Waterboerstraße, Bielefeld. Bd. 36, 3-13.

- (1997): Größenunterschiede bei adulten Erdkröten verschiedener Populationen in Bielefeld. Bd. 38, 5-19.

BOIN, J. (1914): Vorkommen der Knoblauchkröte, *Pelobates fuscus* Laur. in der Senne. Bd. 3, 146-147.

FELDMANN, R. (1971): Die Hohlsteinhöhle bei Kohlstädt als Fledermaus-Winterquartier. Bd. 20, 41-44.

FELDMANN, R., STEINBORN, O. (1978): Die Amphibien und Reptilien der Senne. Sonderband I, (Beiträge zur Okologie der Senne), 155-168.

FRANKEN, A. (1922): Über die Helligkeitsvergleichung des Hundes. Ein Beitrag zum Intelligenzproblem des Tieres. Bd. 4, 88-135.

HÄRTEL, H. (1997): Zum Vorkommen des Maulwurfs (*Talpa europaea*) im Bielefelder Stadtgebiet. Bd. 38, 43-47.

HÄRTEL, H. & PLESKER, M. (1997): Reptilienvorkommen in Bielefeld. Bd. 38, 49-57.

HADASCH, J. (1995): Ein aktueller Nachweis der Ringelnatter (*Natrix natrix*) für den Kreis Herford. Bd. 36, 55-56.

HOFFMANN, A. & ELBERTZ, M. (1993): Fischereiökologische Untersuchungen im Rahmen von landschaftsökologischen Gutachten. Analysemöglichkeiten, Schutzziele und Entwicklungsmaßnahmen am Beispiel des Biotopmanagementplanes "Johannisbachtal" (Bielefeld). Bd. 34, 95-114.

KEIMER, H. (1980): Das jagdbare Wild der Senne: Geschichte, Bestand, Hege, ökologische Bedeutung. Sonderband II (Beiträge zur Okologie der Senne), 185-196.

KRIEGE, Th. (1911): Die zoologischen Exkursionen (am 17. und 18. Mai 1910). Bd. 2, 117-121.

- (1922): Beitrag zur Wirbeltierfauna Bielefelds und seiner Umgebung. Bd. 4, 262-265.

KUHLMANN, H. (1928): Beiträge zur heimatlichen Wirbeltierfauna. Bd. 5, 249-251.

- (1933): Säugetiere und Vögel (im Naturschutzgebiet Kipshagen; Anm. d. Red). Bd. 6, 251-256.

LANGE, A. (1991): Untersuchung zur Laichwanderung einer Erdkrötenpopulation (*Bufo bufo* L.) bei Heinsen, Landkreis Holzminden. Bd. 32, 161-187.

LINDENSCHMIDT, M. & VIERHAUS, H. (2001): Bestandsveränderungen überwinternder Fledermäuse im Permer Stollen, Kreis Steinfurt. Bd. 41, 345-356 (Festschrift Lienenbecker).

LÜTTMANN, J. (1985): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Amphibien im Raum Bielefeld-West (Auswertung von Amphibienbestandsaufnahmen als Beitrag zur Landschaftsplanung). Bd. 27, 271-320.

le ROI, O. (1909): Notizen zur Wirbeltierfauna von Bielefeld. Bd. 1, 137-141.

MEINIG, H. & BAASNER, S. (1997): Zur Verbreitung und Ökologie der Kleinwühlmaus (*Microtus subterraneus*) in der Umgebung Bielefelds. Bd. 38, 127-134.

MEINIG, H., BAASNER, S. & HÄRTEL, H. (1994): Die Säugetiere (*Insectivora, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora*) Bielefelds nördlich des Teutoburger Waldes Bd. 35, 185-204.

- (1995): Zur Verbreitung der jagdbaren Säugetierarten (Lagomorpha, Carnivora, Artiodactyla) Bielefelds. Bd. 36, 165-174.

MEINIG, H. & RATHJEN, H. (1996): Die Mauereidechse (*Podarcis muralis*), eine neue Reptilienart in Bielefeld - kein Grund zum Feiern. Bd. 37, 173-177.

PALM, S. & STÖWER, B. (1992): Daten zum Bestand des Igels (*Erinaceus europaeus*) in einem Gebiet im Nordwesten von Bielefeld. Bd. 33, 333-347.

PLESKER, M. & GLATFELD, M. (1998): Amphibienvorkommen in Bielefeld. Bd. 39, 197-217.

PÜCHEL-WIELING, F. & WALTER, B. (1999): Der Laubfrosch (*Hyla arborea* L.) im Kreis Gütersloh – Bestandserfassung und Artenschutzmaßnahmen 1996-1999. Bd. 40, 43-55.

RÖMER, U. & VENNE, W. (1995): Erster Nachweis des Bachneunauges *Lampetra planeri* (BLOCH, 1784) (Petromyzontidae) auf dem Gebiet der Stadt Bielefeld. Bd. 36, 235-245.

- (1996): Ein Bestand des Zwergwelses *Ictalurus nebulosus* (LE SUEUR, 1890) (Teleostei: Ameiuridae) im Haustenbach (Kreis Paderborn/Ostwestfalen. Bd. 37, 229-236.

STEINBORN, O. (1978): Die Kleinsäuger der Senne - ihre Verbreitung und ökologische Situation. Sonderband I (Beiträge zur Okologie der Senne), 195-215.

WALTER, B., NOLKEMPER, D. & MEINIG, H. (1997): Zum Vorkommen des Siebenschläfers (*Myoxus glis*) im Kreis Gütersloh. Bd. 38, 287-292.

Limnologie und Hydrogeologie (Gewässerkunde)

BAUER, H. J. & WYRWICH, D. (1981): Grundwasserreservoir Senne. Sonderband III (Beiträge zur Okologie der Senne), 23-49.

BECKER, A. & RÜTHER-LÜLFSMANN, P. (1991): Verfahren zur Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern des Bielefelder Osning und des Ravensberger Hügellandes. Bd. 32, 1-36.

BRECKLE, S. W. (1988): Untersuchungen zur Nitratbelastung des Grundwassers in der Senne (im Süden Bielefelds). Bd. 29, 1-22.

ELBERTZ, M. & MANNESMANN, R. (1988): Qualitative und quantitative Verteilungsmuster von human- und veterinärmedizinisch interessanten Parasiten in Abwassersystemen. Eine Untersuchung im Raum Bielefeld. Bd. 29, 23-54.

FRANKEN, W. (1933): Die beschalten Wurzelfüßler (*Rhizopoda testacea*) der Kipshagener Teiche. Bd. 6, 189-226.

HAUBOLD, S. (1978): Die Sennegewässer als Lebensraum für Fische. Sonderband I (Beiträge zur Okologie der Senne), 141-153.

HOFFMANN, A. & DRESSEL, J. (1990): Fischfauna des Beckendorfer Mühlenbaches (Bielefeld) - Analyse, fischereibiologische Bewertung und Entwicklungsziele. Bd. 31, 129-147.

KEIMER, H. (1981): Maßnahmen zum Schutze der Wasserwirtschaft und zur Beseitigung und Verhinderung von Landschaftsschäden im Truppenübungsplatz Senne. Sonderband III (Beiträge zur Okologie der Senne), 231-238.

LENZ, H. & RUSTIGE, K. H. (1998): Einflüsse von Aufstauungen auf die Makrozönose eines urbanen Fließgewässers. Eine Untersuchung am Weser-Lutter-System (Ostwestfalen). Bd. 39, 97-124.

MANNESMANN, R. & ELBERTZ, M. (1989): Fließgewässer als Transportsysteme von Helminthenstadien - eine Untersuchung im Raum Bielefeld. Bd. 30, 347-371.

RUSTIGE, K.-H. (1991): Eine Bestimmungshilfe für die epizoischen Ciliaten der einheimischen Gammariden. Bd. 32, 263-290.

- (1995): Auswirkungen von Salzbelastungen auf die Ciliatenbesiedlung in Fließgewässern. Bd. 36, 247-274.

- (1998): Ciliaten- und Makrozoenbesiedlung bei unterschiedlicher saprobieller Belastung im Johannisbach und in der Aa (Ostwestfalen). Bd. 39, 219-239.

RUSTIGE, K. H. & FRIEDRICH, C. (1994): Zur Träger- und trägertopographischen Spezifität der epizoischen Ciliaten auf *Asellus aquaticus*. Mit Bestimmungsschlüssel Bd. 35, 269-310.

RUSTIGE, K.-H. & MANNESMANN, R. (1991): Die Verbreitung der epizoischen Ciliaten von *Gammarus pulex* L. im Johannisbach-System des Ravensberger Hügellandes (Ostwestfalen). Bd. 32, 291-321.

- (1999): Auswirkungen von Salzbelastungen auf die Mikro- und Makrozoenfauna in Fließgewässern. Bd. 40, 109-126.

SPÄH, H. (1979): Ökologische Untersuchungen an organisch belasteten Bächen im Stadtbereich von Bielefeld. Bd. 24, 383-410.

SPÄH, H. (1980): Ökologische Untersuchung der Makroinvertebraten-Fauna der Sennebäche zwischen Stukenbrock und Bad Lippspringe. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 101-132.

SPÄH, H. & BEISENHERZ, W. (1981): Beiträge zur Fischfauna der Fließgewässer des Bielefelder Stadtgebietes I (Johannisbachgewässersystem). Bd. 25, 225-264.

- (1983): Beiträge zur Fischfauna der Fließgewässer des Bielefelder Stadtgebietes II. Bd. 26, 229-260.

SPÄH, H. & GERHARDT, A. (1979): Limnologische und saprobiologische Untersuchungen der Else und einiger ihrer Nebenbäche. Bd. 24, 411-456.

SPÄH, H. & MÖLLER, E. (1981): Limnologische Untersuchungen des Oetternbaches im Bereich des "Hardisser Moores" zwischen Hardissen und Lieme (Krs. Lippe). Bd. 25, 265-279.

VOGT, A. (1998): Quellen im Kreis Herford - Erfassung und Schutzmaßnahmen. Das Quellschutz-Projekt der Biologischen Station Ravensberg. Bd. 39, 241-268.

WÄCHTER, H. J. (1992): Quellenverhältnisse und Quellschädigung im Mittleren Teutoburger Wald (Kreisfreie Stadt Bielefeld, Westfalen). Bd. 33, 369-402.

- (1995): Zur Naturgeschichte der Lutterquellen im Bielefelder Paß (Teutoburger Wald). Bd. 36, 275-305.

WYGASCH, J. (1978): Mikroorganismen ausgewählter Gewässer der Senne. Sonderband I (Beiträge zur Okologic der Senne), 97-140.

Landschaftsökologie und Naturschutz

ALTHAUS, D., AHNFELDT, F. & QUIRINI, C. (2001): Das Schafbeweidungsprojekt Bielefeld. Fünf Jahre Naturschutzarbeit. Bd. 41, 5-30.

BOCKWINKEL, G., DRESSEL, J. & ELBERTZ, M. (1990): Entwicklung eines konzeptionellen Naturschutzes am Beispiel des Beckendorfer Mühlenbachtales in Bielefeld. Teil 1: Bedeutung und Auswertung der Kulturgeschichte einer Landschaft. Bd. 31, 33-48.

FLEISCHER, A., NOLTE, H., UNTRIESER, A., STOCKEY, A., BRECKLE, S.-W. (1992): Vegetation und Landschaftsökologie der Bachauen des Ravensberger Hügellandes (Teil II). Landschaftsökologische Kartierung und Auswertung historischer Karten des Fließgewässersystems Johannisbach als Planungsgrundlage. Bd. 33, 47-91.

KNOTHE, B. (1993): Das Bielefelder Ackerrandstreifenprogramm. Bd. 34, 115-142.

KOCH, H.-W. & WEDECK, H. (1996): Über ökologische Unterschiede zwischen den Mastfußflächen einer Hochspannungsleitung und angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Standorten bei Hövelhof im Raum Paderborn. Bd 37, 53-85.

LANGWIESCHE, F. (1928): Naturschutz (Liste geschützter Pflanzen und Tiere). Bd. 5, 72-80.

LIENENBECKER, H. & MÖLLER, E. (2002): Das Hücker Moor bei Spenge (Kreis Herford/NRW). Zur Naturgeschichte eines ehemaligen Torfstichgebietes. Bd. 42, 249-313.
-. (2003): Zur rezenten Pflanzen- und Tierwelt des Dobergs bei Bünde, einer ehemaligen Mergelgrube (Kreis Herford, NRW). Bd. 43, 295-349.
MERTENS, H. (1980): Die Böden der Senne, ihre Nutzung und ihre Bedeutung für die Besiedlung der Landschaft. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 9-34.
QUIRINI, C. (1999): Die „Ochsenheide" in Bielefeld zwischen Naherholung und Naturschutz. Bd. 40, 57-83.
ROHLFS, K. (1978): Landschaftsschutz und Landschaftspflege in der Senne - Rückblick und Ausblick. Sonderband I (Beiträge zur Okologie der Senne), 217-237.
RÜTHER, P. & SCHROEDER, C. (1994): Die Senne - eine Landschaftseinheit als kulturgeschichtliches Erbe. Bd. 35, 247-268.
SERAPHIM, E. Th. (1980): Grundlagen und Erwartungen eines ökologisch begründeten Naturschutzes in der Senne. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), 197-211.
- (1981): Vorschläge zur Ausweisung ökologisch wertvoller Biotopkomplexe der Senne als Naturschutzgebiete. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), 239-320.
STOCKEY, A. (1991): Vegetation und Landschaftsökologie der Bachauen des Ravensberger Hügellandes (Teil 1). Grundsätzliche Uberlegungen zur Orientierung landschaftsökologischer Untersuchungen. Bd. 32, 341-355.
TORNEDE, D. & HARRACH, T. (1997): Naturschutz auf dem Truppenübungsplatz Senne. Eine Synopse divergierender Entwicklungskonzepte. Bd. 38, 231-248.
WÄCHTER, H. J. (1997): Zur Berücksichtigung des sozio-ökonomischen Systems bei der Planung von Großschutzgebieten in der Senne. Bd. 38, 249-286.
ZIEMBA, M. (1997): Ehemalige Tonabgrabungen im Ravensberger Hügelland: erhaltenswerte Sekundärbiotope mit hohem ökologischen Wert - ein weiteres Beispiel. Bd. 38, 293-312.

Vereinsgeschichte und Biographien

ANGERMANN, H. (1971): Zur Geschichte des Bielefelder Naturkunde-Museums. Bd. 20, 5-22.
BÜCHNER, M. (1977): Alfred Branzka (1895-1975), Bd. 23, 196-197.
CONRADS, K. (1973): Gerhard Tiedemann (1939-1972). Bd. 21, 269-270.
- (1985): Rolf Dircksen (1907-1983). Bd. 27, 406.
- (1988): Klaus Immelmann (1935-1987). Bd. 28, III-IV.
FINKE, P. (1982): Die Geschichte des "Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e.V.". Bd. 26, 11-159.
- (1985): Natur, Wissenschaft, Verein. Zum Selbstverständnis eines Naturwissenschaftlichen Vereins in der Gegenwart (Festvortrag zum 75jährigen Bestehen des NV). Bd. 27, 9-25.

GOTTLIEB, H. (1934): Heinrich Rolfing (1872-1932). Bd. 7, XI-XII.
KOPPE, F. (1950): Dr. med. Heinrich Wichern (1878-1940). Bd. 11, 12-13.
- (1950): Wilhelm Althoff (1880-1947). Bd. 11, 14-18.
- (1956): Hans Schwier (1881-1955). Bd. 14, 186-190.
- (1959): Siegfried Junkermann (1872-1944). Bd. 15, 280-282.
- (1959): Professor Dr. Cäsar Puls (1870-1957). Bd. 15, 283-285.
- (1962): Heinz Kuhlmann (1886-1961). Bd. 16, 209-214.
- (1965): Richard Rehm (1900-1963), Bd. 17, 234-237.
- (1965): August Franken (1882-1963), Bd. 17, 238-243.
- (1965): Dr. Viktor G. M. Schultz (1891-1963), Bd. 17, 244-252.
- (1965): Karl Behrmann (1897-1964). Bd. 17, 253-255.
- (1967): Adolf Deppe (1889-1965). Bd. 18, 151-154.
- (1967): Bernhard Droste (1897-1965). Bd. 18, 155-157.
- (1973): Heinrich Gottlieb (1880-1971). Bd. 21, 265—267.
KUHLMANN, H. (1934): Karl Behrens (1860-1931). Bd. 7, IX-X.
LIENENBECKER, H. (2001). Bibliographie. Bd. 41, 393-400 (Festschrift Lienenbecker).
REDSLOB, F.-E. (1971): Jugendarbeit des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e. V. in den Jahren 1968-1970. Bd. 20, 171-175.
TEGTMEYER, M. (1973): Georg Möbius (1899-1972). Bd. 21, 271-275.
WICHERN, H. (1928): Alfred Zickgraf (1874-1924). Bd. 5, XXIII-XXV.
- (1928): Theobald Kade (1843-1927). Bd. 5, XXVI-XXVIII.
WOHLERS, A. (1981): Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld und Umgegend - Zeitschriftenverzeichnis. Bd. 25, 363-487.
ZICKGRAF, A. (1911): Bericht über die gemeinsame Tagung des Naturhistorischen Vereins der preußisch. Rheinlande und Westfalens und der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover in Bielefeld vom 16.-19.5.1910. Bd. 2, 111-121.
- (1911): Dr. Landwehr (1866-1911). Bd. 2, XIII-XV.
- (1914): Veröffentlichungen von Dr. Landwehr. Bd. 3, XI-XVII.

Diversa

BLUME, R. (1989): Chemische Grundlagenarbeit im Naturwissenschaftlichen Verein. Gedanken anläßlich der Gründung einer neuen Arbeitsgemeinschaft. Bd. 30, 1-13.
BODINUS, F. (1928): Über ein Tee-Ersatzmittel. Bd. 5, 174-176.
BONGARDS, H. (1991): Europa 1992 - Naturschutz und Politik. Bd. 32, 357-380.
FINKE, P. (1993): Naturerfahrung. Bedingungen der Reparatur unserer natürlichen und kulturellen Ökosysteme. Bd. 34, 67-84.
HAUBOLD, S. (1995): Aufbruch zur Natur. Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung des Naturverständnisses in den letzten zwei Jahrhunderten und deren Bedeutung für Gesellschaft und Politik. Bd. 36, 75-115.
HÖLZER, V. (1911): Auf zum Iguazu! Ein Weihnachtsausflug in den brasilianischen Urwald. Bd. 2, 1-22.

KOPPE, F. (1954): Über die erste Untersuchung der Hohlsteinhöhle bei Kohlstädt. Bd. 13, 305-308.

KRIEGE, Th. (1922): Die Hohlstein-Höhle im Teutoburger Walde. Bd. 4, 195-202.

LAUTERBACH, K.-E. (1992): Phylogenetische Systematik. Bedeutung, Leistung, Anspruch. Bd. 33, 209-240.

SCHLEEF, M. (1990): Zur Anlage einer Genbank: Einbringung von Maus-Genen in Bakterien für molekulargenetische Untersuchungen. Bd. 31, 271-288

SONNEBORN et al. (1992): Exkursionsbericht der Gardasee - Reise des Naturwissenschaftlichen Vereins vom 6.-16.5.1991. Bd. 33, 403-424.

WICHERN, H. (1928): Über das Vorkommen erblicher Nervenkrankheiten in einer Ravensberger Familie. Bd. 5, 281-289.

ZICKGRAF, A. (1922): Spielplan des Naturtheaters. Ein Beobachtungskalender für Naturfreunde und solche, die es werden wollen. Bd. 4, 335-398.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umgegend

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: 45

Autor(en)/Author(s): Letschert Ulrike

Artikel/Article: Von 1909 bis 2005 erschienene Artikel in den Berichten des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e.V. (Band 1 bis 45) 323-351