

5. *A. badium* Er. Von **Heyden** bei Frankfurt, von mir bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln gesammelt. Bei Giefsen (**Laubenheimer**).

6. *A. varians* Beck. Bei Ober-Lais in Mehrzahl unter einem morschen Balken von Eichenholz aufgefunden.

7. *A. nigrinum* Sturm. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von **Heyden** bei Frankfurt, von mir bei Seligenstadt gefunden.

8. *A. marginatum* Sturm. Durchs ganze Gebiet nicht sehr selten.

Clambidae.

Clambus. Fischer.

1. *C. pubescens* Redtenb. Von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg aufgefunden.

2. *C. minutus* Sturm. Bei Ober-Lais einzeln gesammelt.

3. *C. punctulum* Beck. Im ganzen Gebiet, nicht sehr selten.

Comazus. Fairmaire.

1. *C. dubius* Marsh. Von Dr. **Bose** in Mehrzahl bei Ortenberg aufgefunden.

(Fortsetzung folgt.)

II.

Beiträge zur Kenntniß der Kryptogamenflora des Großherzogthums Hessen und der angrenzenden Gebiete.

Unter vorstehendem Titel hoffen wir in jedem unserer Berichte die neuen Beobachtungen über die Kryptogamenflora des Vereinsgebietes zusammenstellen zu können. An die früheren Mittheilungen, welche uns in den Werken von **Dillenius**, der Wetterauer Flora, den Floren von **Becker**, **Genth**, **Schnittspahn**, dem Verzeichnisse **Bayrhofer's**, den Verzeichnissen in den Berichten unserer Gesellschaft und denen der Wetterauer Gesellschaft, endlich dem Verzeichnisse **Uloth's** in der Flora vom Jahr 1861 vorliegen, sollen sich nun hier anreihen: 1) Fundorte neu aufgefunderer Arten und neue Fundorte früher schon beobachteter Arten; 2) etwaige Berichtigungen früherer Angaben; 3) Bestätigungen zweifelhafter Beobachtungen oder schon vor langer Zeit angegebenen Fundorte; 4) kritische Bemerkungen über einzelne Arten, Localformen etc. und Fundorte. — Da man von vornherein kein Urtheil haben kann über die engere oder weitere Verbreitung der Arten, ist es selbst bei häufiger vorkommenden

erwünscht, wenn speciellere Fundorte mitgetheilt werden, und wir würden es sehr gerne sehen, wenn die einzelnen Beiträge aus engbegrenzten Florengebieten allmählig zu vollständigen engsten Localfloren sich ausdehnen. — Mit großem Danke würden wir es anerkennen, wenn uns von allen beobachteten Arten und Formen Exemplare mitgetheilt würden, damit diese als authentische Belege in unserem Universitätsherbarium niedergelegt werden können.

I.

Verzeichniss der von mir in der Umgebung von Laubach gefundenen Pilze nebst Fundort *).

Vom Herrn Grafen Friedrich zu Solms-Laubach.

Uredo Caricis. Häufig bei Laubach. *U. segetum*. Ebenfalls. *U. receptaculorum*. Auf *Tragopogon pratensis*. Wiesen bei Laubach. *U. occulta*. Einmal auf *Secale Cereale* im Laubacher Feld gefunden. *U. Phytiumatum*. Wiesen bei Laubach. *U. muricella*. Auf *Pimpinella magna* im Laubacher Schloßgarten. *U. suaveolens*. Auf *Cirsium arvense* überall bei Laubach. *U. flosculosorum* auf verschiedenen *Compositen* bei Laubach. *U. Rumicum*. Auf Wiesen auf *Rumex Acetosa*. *U. Violarum*. Auf *Viola canina* und *silvestris* in Wäldern. *U. Lini*. Auf *Linum cathart.* beim Jägerhaus bei Laubach. *U. Capraearum*. Auf *Salix Capraea* und *cinerea* häufig. *U. gyrosa*. Auf *Rubus Idaeus* häufig. *U. populina*. Häufig auf *Pop. tremula*. *U. Potentillarum*. Gemein bei Laubach. *U. Alchemillae*. Hier und da in Wäldern. *U. Campanularum*. Häufig. *U. Rhinanthacearum*. Die Form auf *Euphrasia* beim Jägerhaus. *U. Caryophyllacearum*. Auf *Cerastium semidecandrum* beim Jägerhaus. *U. Rosae*. Ueberall auf Rosenblättern. *U. Fragariae*. Auf *Fragaria vesca*. Steinbach bei Laubach; Wickstädter Wald bei Assenheim. *U. Rubigo vera*. Gemein. *U. candida*. Auf *Capsella Bursa pastoris* und auf *Scorzonera hispanica*.

Aecidium Compositarum. Auf *Lampsana*, *Prenanthes muralis* und *Taraxacum* bei Laubach häufig. *A. Urticae*. Auf *Urtica dioica* bei Laubach. *A. Violae*. Häufig auf *Viola silvestris* und *canina* bei Laubach. *A. leucospermum*. Auf *Anemone nemorosa*. Einförste bei Laubach; Feldheimer Wald. *A. Ranunculacearum*. Auf *Ranunculus Ficaria* und *repens*, sowie auf *Aquilegia vulgaris* beim Jägerhaus. *A. Falcariae*. Auf *Pimpinella magna* im Schloßgarten zu Laubach. *A. Leguminosarum*. Auf rothem Klee im Laubacher Schloßgarten. *A. elongatum*. Auf *Rhamnus Frangula*. Sehr gemein. *A. cornutum*. Auf Ebereschenblättern, gemein.

Puccinia Graminis. Sehr gemein auf Gräsern und Getreidearten. *P. Polygonorum*. Auf *Polygonum Bistorta*. Wiesen bei Laubach. *P. Aegopodii*. Auf Blättern von *Aegopodium Podagraria* beim Jägerhaus und im

*) Die Namen nach Rabenhorst's Kryptog.-Flora Deutschlands.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Kryptogamenflora des Grossherzogthums Hessen und der angrenzenden](#)

Gebiete 61-62