

## IV.

Beiträge zur Kenntnifs der Kryptogamenflora des  
Großherzogthums Hessen und der angrenzenden Gebiete.

Vgl. zehnten Bericht, S. 61 u. ff.

## V.

## Pilze,

beobachtet vom Herrn Grafen **Friedrich zu Solms-Laubach**.

Das folgende Verzeichnifs bildet die Fortsetzung des im letzten Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde gedruckten Verzeichnisses der von mir in dem Vereinsgebiet und hauptsächlich in der Laubacher Gegend gefundenen Pilze. Ich weifs, dafs dasselbe auf keinerlei Vollständigkeit Anspruch machen kann, da es in der Natur der Sache liegt, dafs die ungeheure Mannigfaltigkeit der Pilzvegetation einer Gegend nicht in einem kurzen Zeitraume gründlich durchforscht werden kann. Andernthails aber bietet das Feld so große Schwierigkeiten dar, dafs die Bestimmung oft auf die größten Hindernisse stößt. Zweifelhafte Sachen führe ich nicht gerne auf, und wenn andererseits manche selbst häufige Arten noch nicht aufgezählt sind, so ist dies eben ein Fehler, den ich in späteren Fortsetzungen dieses Verzeichnisses zu verbessern gedenke, da ich die Absicht habe, periodisch wiederkehrend meine Erfahrungen immer wieder mitzutheilen.

Wo bei den Pilzen kein Autor angegeben ist, sind die Benennungen jedesmal aus **Rabenhorst's** deutscher Kryptogamenflora entnommen.

*Uredo appendiculata* Pers. Auf Bohnenblättern. Schloßgarten bei Laubach. Sept. Auf *Ervum Lens*. Bei Laubach.

*U. muricella* Wallr. Auf Blättern von *Anthriscus silvestris*. Bei Laubach. Sept.

*U. Polygonorum* DC. Auf *Polygonum*-Blättern auf Aeckern bei Laubach. Sept.

*Accidium Cichoracearum*. Auf *Tragopogon* in den Obbornhofer Wiesen. Mai.

*A. Euphorbiae* Pers. Auf *Euphorbia Cyparissias*. Bei Lisberg, Ortenberg. Mai. Die Mutterpflanze wächst bei Laubach nicht.

*A. Valerianacearum* DC. Auf *Valeriana dioica*. Auf der obersten Heegbrücke bei Laubach.

*Puccinia arundinacea* Hedw. fil. Auf *Phragmites communis*. Bei Laubach. Sept.

*P. Bardanae* Corda. Auf Blättern von *Lappu major*. Schloßgarten in Laubach. Sept.

*P. Discoidearum* Link. Im Wickstätter Wald bei Assenheim auf *Pyrethrum corymbosum*. Juli.

*Podisoma fuscum* Dub. Auf *Juniperus Sabina*. Im Gederner Schloßgarten. Mai.

*P. Juniperi communis* Fr. Auf *Juniperus communis*. Im Giesfer Wald. April.

*Depazea hederaecola* Fries. Auf Blättern von *Hedera Helix*. Schloßgarten in Laubach.

*Hysterium pulicare*. Auf alter Birnbaumrinde bei Laubach.

*H. Rubi*. Auf dürren Aesten von *Rubus fruticosus*. Bei Einartshausen im Walde. Oct.

*Rhytisma acerinum* Fries. Auf lebenden Ahornblättern überall bei Laubach. Sept.

*Polystigma rubrum* DC. Auf Blättern von *Prunus domestica* und *spinosa* um Laubach häufig. Sept.

*P. typhinum* DC. An Grashalmen auf Wiesen bei Laubach. Juli.

*Sphaeria Aquila* Fries. Auf abgestorbenen Aesten. Oberwald. Thiergarten bei Laubach. Sept.

*S. cohaerens* Pers. An Buchenzweigen und Strünken in den Laubacher Waldungen. Dec.

*S. concentrica* Bolt. An dürren Buchenprügeln. Am Bürgelweg bei Laubach. Oct.

*S. deusta* Hoffm. Am Grunde alter morscher Stämme sehr häufig in den Laubacher Waldungen.

*S. Doliolum* Pers. An *Angelica*-Stengeln im Oberwald. Sept.

*S. Graminis* Pers. An Grasblättern um Laubach häufig. Besonders im Wald. Herbst.

*S. Granatum*. (*Cosmospora coccinea* Rbh. Fg. eur.) Auf alten *Polyporen*. Laubacher Waldungen. Herbst.

*S. hispida* Tode. Auf dürrem Holz. Kirchberg bei Laubach. Sept.

*S. Laburni* Pers. Auf *Cytisus Laburnum*. Ortenberger Schloßgarten. Laubacher Schloßgarten.

*S. maura* Fries. (*S. milliaria*. Fr. u. Kze.) An Hainbuchenholz im Braunfelser Saupark.

*S. nummularia* DC. Auf Buchenzweigen. Kirchberg bei Laubach. Auerberg bei Schotten. Oct. An mehreren anderen Orten.

*S. scabrosa*. Am Wurzelende abgestorbener junger Buchen aus der Rinde hervorbrechend. Ramsberg, Thiergarten u. a. O. Laubach.

*S. spermoides* Hoffm. Auf altem Buchenholz. Thiergarten bei Laubach. Sept.

*S. Stigma*. Eine der gemeinsten *Sphaerien* bei Laubach, gewöhnlich auf Buchenholz, aber auch auf Eichen und Birkenzweigen von mir gefunden.

*S. verruciformis* Ehrh. An dürren Schlehdornen. An der Helle bei Laubach.

*Hypoxylon carpophilum* Link. Auf Buchenperikarprien im Kirchberg bei Laubach. Sept.

*H. vulgare* Link. An Bäumen und faulem Holz in den Laubacher Waldungen gemein.

*Sclerotium Pustula* DC. Auf altem dürrem Eichenlaub. Auerberg bei Schotten.

*Reticularia flavo-fusca* Fries. An einer Buche an der Zwillingseife bei Laubach. Aug.

*Licea sulfurea* Wallr. An abgestorbener Rinde von *Robinia*. Laubacher Schloßgarten. Dec.

*Scleroderma verrucosum* Pers. Im Buchwald. Kirchberg bei Laubach. Sept. Distrikt Lingelbach bei Gonterskirchen.

*S. vulgare* Fries. Im Buchenwald. Kirchberg bei Laubach. Auch auf Triften bei Laubach. Sept.

*Lycoperdon caelatum* Bull. Am Rothen Stahl bei Laubach. In Kiefernwald. Herbst.

*L. gemmatum* Batsch. *formae hirtum* Fries et *perlatum* Fries. In Wäldern bei Laubach. Sept.

*L. pistillare* Fries in *litt. nov. sp.* 1862. Auf Graswegen im Brühl bei Laubach. Sept.

*L. pyriforme* Schaef. *form. tessellatum* Pers. Wurzel einer Eberesche an der Chaussée von Laubach nach Schotten. Herbst.

*Bovista plumbea* Pers. Triften bei Laubach. Herbst.

*Geaster fornicatus* Fries. In einem kleinen isolirten sterilen Fichtenwäldchen auf dem Ramsberg bei Laubach. Sept. 1862.

*Phallus impudicus* Linn. Im Buchenwald hin und wieder einzeln. Juli bis Sept. Massenhaft im Steinkopf bei Altenhain.

*Calocera viscosa*. Auf Fichtenstrünken im Oberwald. An Fichten bei Laubach. Sept.

*Clavaria abietina* Pers. In Fichtenwäldungen bei Laubach. Eulengraben, Buchwald u. s. w. Oct.

*C. byssiseda* Pers. Zwischen abgefallenen Zweigen, Bucheckern, Laub u. s. w. Im Thiergarten bei Laubach. Sept.

*C. cristata* Pers. Kirchberg bei Laubach. Oct.

*C. fistulosa* *fl. dan.* Im Buchenwald. Heinzeberg bei Laubach. Oct.

*C. pistillaris* Linn. Wintersberg bei Laubach. Thiergarten. Im Buchenwald. Sept.

*C. stricta* Pers. Im Schloßgarten in Laubach. In Bosquets. Sept.

*Geoglossum viride* Pers. An nackten Stellen im Buchenwald bei Laubach hin und wieder. Meist mit *Leotia lubrica*. Juli, Aug.

*Spathulea flavida* Fries. Im Buchenwald. Revier Ruppertsburg. Im Fichtenwald. Steinkopf bei Altenhain. Juli.

*Cenangium pulveraceum*. An abgestorbenen Schlehenzweigen. Bei Gonterskirchen.

*Tympanis Patella*. Auf dürren Umbelliferenstengeln bei Laubach.

*Solenia ochracea* Hoffm. An Buchenholz. In den Laubacher Waldungen hin und wieder. Herbst.

*Ascobolus furfuraceus* Pers. Auf Kuhmist im Oberwald. Sept.

*Peziza aeruginosa* Pers. Auf Buchenholz. Das *Mycelium* sehr häufig, doch selten Becher hervorbringend!

*P. albo-violascens*. Auf dünnen Zweigen, z. B. von *Ampelopsis hederaea* in Laubach. Frühjahr.

*P. ulutacea* Pers. In verschiedenen Formen an Waldwegen bei Laubach.

*P. aurantia* Oeder. Im Wald auf Kohlplätzen und Wegen gemein. Juli.

*P. caesia* Pers. An Bohlen einer Brunnenkammer bei Laubach. Oct.

*P. cerina* Pers. An Buchenästen bei Einartshausen. Oct.

*P. citrina* Batsch. Auf faulem Holz in den Laubacher Waldungen gemein. Herbst.

*P. coccinea* Jacq. An Zweigen in dem Distrikt Lingelbach bei Laubach. März.

*P. disciformis* Fr. Einmal am Judenrain bei Laubach. März 1863.

*P. flammea* Alb. u. Schw. An Schlehendornen bei Gonterskirchen.

*P. fructigena* Bull. Auf Zweigen in den Laubacher Waldungen gemein. Herbst. — Eine kleinere Form auf Haselnüssen und Eicheln bei Laubach.

*P. resinosa*. Auf Fichtenharz. Am Elsterberg bei Ruppertsburg. Herbst.

*P. rufo-olivacea*. Auf dünnen Zweigen von *Rubus*, *Crataegus* u. s. w. Ruppertsburg, Laubach. Frühjahr.

*P. serotina*. Auf Rinde einer alten Linde. Laubacher Schloßgarten.

*P. xanthomela* Pers. In einem Fichtenwald am Eulengraben bei Laubach. Oct. 1862. In wenigen Exemplaren.

*Leotia lubrica* Pers. An nackten Stellen im Buchenwalde hin und wieder bei Laubach. Meist in Gesellschaft von *Geoglossum viride*. Juli, August.

*Helvella crispa*. Im Buchenwald. Thiergarten bei Laubach. Aug.

*Thelephora calcea* Pers. *d. sambucina* Wallr. An alten Stämmen von *Sambucus nigra* das ganze Jahr. Schloßgarten in Laubach.

*T. caryophyllea* Pers. In einem dünnen Fichtenbestand. Auf Wegen. Merkbach bei Laubach. Juli.

*T. mesenterica* Pers. syn. An alten Baumstrünken im Kirchberg, Strickberg, Lingelbach bei Laubach. Sept.

*T. purpurea* Schumach. Häufig bei Laubach z. B. im Schloßgarten. Sept.

*T. sanguinolenta* Alb. u. Schw. An kranken Stämmen. Oberwald. Sept. An *Corylus Avellana* im Laub. Schloßgarten. Oct.

*Craterellus cornucopioides* Pers. Ueberall. Buchenwald. Juli. Aug.

*C. sinuosus* Fries. Im Buchenwald. Hubberg bei Ruppertsburg. Ramsberg, Thiergarten bei Laubach. Juli. Aug.

*Grundinia crustosa*. Im Oberwald. Sept.

*Radulum tomentosum* (*Hydnum farinaceum?*). Auf dünnen *Juniperus*-zweigen bei Gonterskirchen.

*Irpez deformis* Fries. An abgefallenen Eichenzweigen. Im Saupark bei Braunfels. Aug.

*Sistostrema confluens* Pers. In Fichtenbeständen im Distrikte Buchwald bei Laubach. Oct. Ramsberg bei Laubach. Kiefernwald. Nov.

*Hydnum Auriscalpium* Linn. Kiefernwald bei Otterbach. Sept.

*H. diversidens?* Fries. An Kirschbäumen im Arnsburger Garten. Das von mir als *Hericum Caput Medusae* im vorigen Bericht gegebene ist nach Fries *Hydnum Erinaceus* Bull.

*Fistulina hepatica* Fries. Im Eselskopf bei Laubach. Juli 1862. Kirchberg. Sept. 1862.

*Merulius Corium* Fries. Im Kirchberg bei Laubach. Sept.

*M. fugax* Fries. An Buchenzweigen. Bei Rainrod. Nov. Bei Laubach. Jan.

*M. lacrymans* Schumach. Zerstörte im Juli 1862 den unteren Stock eines Hauses in Laubach und entwickelte Fructificationen.

*M. tremellosus* Schrad. Auf faulenden feuchtliegenden Bohlen beim Oberlseener Hof. Juli. An ähnlichen Orten bei Laubach. Oct.

*Daedalea quercina* Pers. Am Gaulskopf bei Laubach. Oct.

*Trametes suaveolens* Fries epicr. An alten Weiden bei Berstadt. Oct.

*Polyporus betulinus* Fries. An Birken bei Laubach. Ramsberg.

*P. ciliatus*. Nur einmal in Menge im März 1863 auf dünnen Reisern im Roth bei Gonterskirchen gefunden.

*P. cristatus* Pers. Im Buchenwald. Revier Ruppertsburg. Juli.

*P. frondosus* Fries. An einer alten Eiche an der Forstwiese bei Laubach. Sept.

*P. fumosus*. Bei Laubach überall häufig. Herbst.

*P. hispidus* Fr. An Buchen. Wintersberg bei Laubach. Sept.

*P. marginatus* Pers. An einem alten Kirschbaum im Laubacher Schloßgarten. Oct.

*P. molluscus* Fr. An faulem Gartengeländer von Fichtenholz. Bei Laubach. Oct.

*P. perennis* Fries. Auf Kohlplätzen in der Steinbach bei Laubach.

*P. versicolor* Linn. An Buchen in den Laubacher Waldungen in allen Formen überall gemein das ganze Jahr hindurch.

*Boletus radicans* Pers. Im Oberwald. Sept.

*Lenzites sepiaria* Fries. An einem Steg von Kiefernholz. Schloßgarten Laubach. Sept.

*Schizophyllum commune* Fries. An einem Haselnufsstrauch im Laubacher Schloßgarten. An einer Hainbuche im Saupark bei Braunfels. Herbst.

*Cantharellus cinereus* Fries. Buchenwald. Ramsberg, Thiergarten bei Laubach. Juli.

*C. crispus* Pers. An Kirschenästen. Laubacher Schloßgarten. Oct.

*C. retirugus*. Auf Moos und zwar stets *Grimmia apocarpa*. Steinbach bei Laubach, Heinzeberg, Ringelsberg. März.

*Gomphidius glutinosus* Fries. Kiefernwald bei Otterbach. Gaulskopf bei Laubach und an mehr Orten. Sept.

*Agaricus aeruginosus* Curt. Ueberall im Walde bei Laubach. Sept. bis November.

*A. alliaceus* Jacq. In den Laubacher Waldungen nicht selten. Z. B. Kirchberg. Im Oberwald. Sept.

*A. androsaceus* Linn. Sehr häufig auf Abfällen von Nadelholzbäumen bei Laubach. Herbst.

*A. clypeolarius* Bull. In den Laubacher Waldungen hin und wieder. November.

*A. corrugis* Pers. Auf Rasen an der hohen Strafe bei Einartshausen. Oct.

*A. crocatus* Schrad. Im Kirchberg bei Laubach. Sept.

*A. decipiens* Pers. Im Oberwald auf Erde. Sept. In den Laubacher Waldungen.

*A. disseminatus* Pers. Auf Pappelstrünken. Schloßgarten in Laubach den ganzen Sommer und Herbst über.

*A. epipterygius* Scop. Auf Wegen im Wald bei Einartshausen. Nov.

*A. fascicularis* Huds. Ueberall bei Laubach in den Wäldern. Im Juli 1862 im Hessenbrücker Braunkohlenbergwerk in den untersten Tiefen an Grubenholz von mir gefunden.

*A. fimetarius* Linn. Auf faulendem Stroh. Laubacher Schloßgarten. Sommer.

*A. galericulatus* Scopol. In den Laubacher Waldungen und überall. September.

*A. geophyllus* Bull. In allen Farben häufig in den Laubacher Waldungen. Sept.

*A. gibbus* Pers. Thiergarten bei Laubach. Buchenwald. Sept. Unter Fichten im Distrikt Buchwald bei Laubach.

*A. granulatus* Batsch. b) *Carcharias* Pers. c) *amianthinus* Scopol. Auf Triften und in den Nadelwäldern bei Laubach. Nov.

*A. insititius* Fries. Auf abgefallenen Buchenzweigen. Kochberg bei Laubach. Sept. Oct.

*A. laccatus* Scopol. a) *violaceus*. b) *farinaceus*. In beiden Formen häufig in den Laubacher Waldungen. Sept.

*A. lacrymabundus* Bull. Im Thiergarten bei Laubach. Sept. An mehreren anderen Orten. Bis Nov.

*A. melleus* Vahl in Fl. dan. An Bäumen bei Laubach. Bei Ulrichstein. Herbst.

*A. metachrous* Fr. Kiefernwald bei Nonnenrod. Oct.

*A. miniatus* Fries. b) *turundus* Fries. Triften am Geiselstein. Sept.

*A. mucidus* Schrad. Kirchberg bei Laubach. Sept. Bei Einartshausen, bei Otterbach. Oct.

*A. nebularis* Batsch. Ramsberg bei Laubach. Sept.

*A. Oreades* Bolt. Auf Triften. An der alten Ziegelhütte bei Laubach. Sept.

*Agaricus peronatus* Bolt. In den Laubacher Waldungen nicht selten. September.

*A. plicatilis* Curt. Verschiedene Orte an Waldwegen bei Laubach. Sept. Auf Gartenerde im Schloßgarten. Oct.

*A. polygrammus* Bull. Am Ramsberg u. a. a. O. Bei Laubach. Nov.

*A. porreus* Fries. Im Distrikt Thiergarten bei Laubach. Buchenwald. Sept.

*A. pratensis* Pers. Triften im Vogelsberg. Sept. Wiesen um Laubach. Oct.

*A. purus* Pers. Im Oberwald. Sept. In den Laubacher Waldungen gemein.

*A. pyxidatus* Bull. An Wegrändern. Bei Nonnenrod. Im Imsenhau bei Laubach. Oct.

*A. rimosus* Bull. Im Oberwald. Sept.

*A. Rotula* Scopol. Waldungen bei Laubach nicht selten. An Bäumen im Schloßgarten.

*A. rutilans* Schaeff. In einem Kieferbestand bei Otterbach. Sept. Ramsberg bei Laubach. Nov.

*A. sanguineus* Wulf. Im Oberwald. Sept.

*A. scorodonius* Fries. In den Laubacher Waldungen. Sept.

*A. semiglobatus* Batsch. Triften im Vogelsberg. Sept.

*A. spadiceo-griseus* Schaeff. Auf Erde im Buchenwald. Kohlplätze u. s. w. Kirchberg bei Laubach. Sept.

*A. squarrosus* Müller. An alten kranken Buchen. Kirchberg bei Laubach. Sept.

*A. stypticus* Bull. In den Laubacher Waldungen auf faulem Holz sehr gemein. Das ganze Jahr hindurch.

*A. tener* Schaeff. Kirchberg bei Laubach. Auf Erde im Laubacher Schloßgarten. Sept.

*A. terreus* Schaeff. Ramsberg bei Laubach. Sept.

*A. tremulus*. An einem Graben am Waldrand. Beim Flensunger Hof. Oct. Bei Ruppertsburg.

*A. variabilis* Pers. An dürren Salweidenzweigen in den Birken bei Laubach. An Buchenzweigen im Thiergarten bei Laubach. Juli. Sept. Hölzchen bei Ruppertsburg. Nov.

*A. vaginatus* Bull. In den Waldungen bei Laubach gemein. Sept.

*A. vellereus* Fries. In den Laubacher Waldungen. Oct.

---

Anm. *Uredo Sempervivi* habe ich hier noch nicht gefunden, ich habe aber aus Schlesien einige davon befallene Pflanzen von *Sempervivum soboliferum* mitgebracht, die hier angewachsen sind, und auf denen der Pilz reichlich fortvegetirt.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Solms-Laubach Friedrich

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Kryptogamenflora des Grossherzogthums Hessen und der angrenzenden Gebiete - Pilze 75-81](#)