

I.

Die Käfer im Großherzogthum Hessen und seiner nächsten Umgebung.

Von Herrn Pfarrer **W. Scriba** in Ober-Lais bei Nidda.

(Fortsetzung.)

Bruchidae.

Bruchus. Schön herr.

1. *B. dispar* Germ. Nach **v. Heyden** im Odenwald von **Wider** einmal gefunden.
2. *B. marginellus* Fabr. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt (auf *Astragalus*), von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gesammelt.
3. *B. Cisti* Fabr. Bei Seligenstadt (**Scriba**), Offenbach und Mom-
bach (**v. Heyden**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**) einzeln.
4. *B. olivaceus* Germ. Bei Seligenstadt und in Rheinhessen (Harx-
heim) einzeln von mir gefunden.
5. *B. Pisi* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.
6. *B. rufimanus* Schh. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von
v. Heyden bei Ems einmal aufgefunden.
7. *B. sertatus* Illig. Einmal von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg
gefangen.
8. *B. seminarius* Linn. Ueberall gemein. Von **v. Heyden** auf
verschiedenen Pflanzen, als *Vicia pisiformis*, *angustifolia*, *Lathyrus*, *Orobis*
vernus, beobachtet.
9. *B. luteicornis* Illig. Im Süden des Gebietes, bei Seligenstadt,
in der Bergstrasse, Aschaffenburg, Frankfurt, Soden, jedoch nicht häufig,
vorkommend. *B. nubilus* Schh. welcher mit Recht von **Bach** für das Männ-
chen dieser Art erklärt wird, findet sich an gleichen Orten.
10. *B. Loti* Payk. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Falkenstein
von **v. Heyden**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.

11. *B. pubescens* Germ. Bei Frankfurt von **v. Heyden** auf *Spartium*, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** aufgefunden.

12. *B. ater* Mrsh. Im ganzen Gebiete nicht selten. Herr **v. Heyden** hat das Käferchen auf *Spartium*, *Epilobium*, *Euphorbia* und *Asclepias vincetoxicum* beobachtet.

Spermophagus. Steven.

1. *S. Cardui* Schh. Bei Seligenstadt einzeln von mir, bei Budenheim, Rüdesheim, Mombach und Frankfurt von **v. Heyden** nicht selten gefunden.

Urodon. Schönherr.

1. *U. rufipes* Fabr. Bei Crumstadt und in Rheinhessen an wilder *Reseda* häufig von mir, bei Offenbach und Flörsheim von **v. Heyden** gesammelt.

2. *U. pygmaeus* Schh. Ein Exemplar bei Ems gefunden befindet sich in der Sammlung von Herrn **v. Heyden**.

3. *U. suturalis* Fabr. In Rheinhessen, wie *U. rufipes*, aber weniger häufig. Bei Flörsheim von **v. Heyden**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gefunden.

Curculionidae.

Brachytarsus. Schönherr.

1. *B. scabrosus* Fabr. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

2. *B. varius* Fabr. Wie der Vorige, häufiger. Die Larven leben unter dem Schild der *Coccus*-Weibchen und fressen diese ganz aus (**v. Heyden**).

Tropideres. Schönherr.

1. *T. albirostris* Hbst. Bei Seligenstadt einzeln von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** gesammelt.

2. *T. sepicola* Hbst. Bei Seligenstadt und Ober-Lais öfters gefunden. Herr **v. Heyden** hat den Käfer aus Eichenholz gezogen.

3. *T. niveirostris* Fabr. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt, Soden und Giessen (Schmitter-Hof) von **v. Heyden** auf Linden, Buchen und Weiden gefunden.

4. *T. cinctus* Payk. Bei Frankfurt einmal von **v. Heyden** I, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** mehrfach gefunden.

Platyrrhinus. Clairville.

1. *P. latirostris* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten an alten Buchen.

Anthribus. Geoffroy.

1. *A. albinus* Linn. Bei Seligenstadt und Ranstadt von mir, bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Frankfurt von **v. Heyden** gesammelt. Nicht häufig, auf Eichen und Hainbuchen.

Choragus. Kirby.

1. *C. Sheppardi* Kirby. Ein Exemplar bei Ober-Lais.

Apoderus. Olivier.

1. *A. Coryli* Linn. Im ganzen Gebiet häufig. Die Varietät *morio Bonelli* wurde einmal von Dr. Haag bei Frankfurt gefunden.
2. *A. intermedius* Hellw. In der Sammlung des Herrn v. Heyden befinden sich bei Speyer (von Linz) gefundene Stücke.

Attelabus. Linné.

1. *A. curculionoides* Linn. Ueberall im Gebiete häufig auf jungen Eichentrieben.

Rhynchites. Herbst.

1. *R. auratus* Scop. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.
2. *R. Bacchus* Linn. Wie der Vorige, im Süden des Gebietes nicht selten.
3. *R. coeruleocephalus* Schall. Bei Offenbach und Frankfurt von v. Heyden auf Birken, bei Aschaffenburg von Dr. Doebner gesammelt.
4. *R. aequatus* Linn. Ueberall häufig.
5. *R. cupreus* Linn. Bei Seligenstadt, Frankfurt und Aschaffenburg einzeln.
6. *R. aeneovirens* Mrsh. Im ganzen Gebiete nicht selten. Die Varietät *Fragariae* Schb. wurde von v. Heyden bei Frankfurt, Enkheim und Nauheim, die Varietät *longirostris* Bach bei Falkenstein und Nauheim einzeln gesammelt.
7. *R. Alliariae* Payk. Bei Ober-Lais einzeln von mir, bei Rüdesheim einmal von v. Heyden gefunden.
8. *R. conicus* Illig. Bei Seligenstadt und in der Bergstrafse (Alsbach) von mir, bei Aschaffenburg von Dr. Doebner, bei Frankfurt und Soden von v. Heyden auf Schlehen und Birnbaum gesammelt.
9. *R. pauxillus* Germ. Im ganzen Gebiete nicht selten.
10. *R. germanicus* Hbst. Wie der Vorige.
11. *R. nanus* Payk. Ueberall häufig auf Weiden und Birken.
12. *R. betuleti* Fabr. Der unter dem Namen Rebstichler bekannte und den Weinbergen oft schädliche Käfer ist überall im Gebiete verbreitet.
13. *R. Populi* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.
14. *R. sericeus* Hbst. Bei Falkenstein und Soden von v. Heyden, bei Ortenberg von Dr. Bose, bei Ober-Lais von mir einzeln auf Eichen gefunden.
15. *R. pubescens* Hbst. Im ganzen Gebiete auf Eichen vorkommend.
16. *R. ophthalmicus* Steph. In der Bergstrafse und bei Ober-Lais einzeln von mir, bei Aschaffenburg von Dr. Doebner, im Taunus von v. Heyden an jungen Eichentrieben gesammelt. Selten.
17. *R. megacephalus* Germ. Bei Aschaffenburg von Oechsner aufgefunden.
18. *R. Betulae* Linn. Ueberall gemein.

Rhinomacer. Fabricius.

1. *R. attelaboides* Fabr. Im ganzen Gebiete, zuweilen nicht selten.

Diodyrhynchus. Schönherr.

1. *D. austriacus* Schb. Wie der Vorige.

Nemonyx. Redtenbacher.

1. *N. lepturoides* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Frankfurt von **v. Heyden** auf wildem Rittersporn einzeln gefunden.

Apion. Herbst.

1. *A. Pomonae* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.
2. *A. Craccae* Linn. Wie das Vorige.
3. *A. cerdo* Gerstäcker. Von **v. Heyden** bei Offenbach und Frankfurt (einmal in Mehrzahl), von mir ein Exemplar bei Ober-Lais aufgefunden.
4. *A. subulatum* Kirby. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt ein Exemplar von **v. Heyden** gefunden.
5. *A. opeticum* Bach. Bei Frankfurt zwei Stücke von **v. Heyden**.
6. *A. ochropus* Schh. Bei Ober-Lais in Mehrzahl gesammelt. Herr **v. Heyden** hat das Käferchen aus *Vicia cracca* gezogen.
7. *A. confluens* Kirby. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.
8. *A. stolidum* Germ. Bei Seligenstadt einmal von mir, bei Frankfurt und Ems einzeln von **v. Heyden** gefunden.
9. *A. vicinum* Kirby. Bei Offenbach und Frankfurt (**v. Heyden**), bei Seligenstadt (**Scriba**); nicht häufig.
10. *A. atomarium* Kirby. Im ganzen Gebiete nicht selten auf Heidekraut.
11. *A. parvulum* Muls. et R. Drei Exemplare von **v. Heyden** I bei Frankfurt aufgefunden.
12. *A. hookeri* Kirby. Bei Seligenstadt (**Scriba**), Frankfurt und Soden (**v. Heyden**) und Friedberg (**Fuhr**) beobachtet.
13. *A. Sahlbergii* Schh. Einmal von **v. Heyden** I bei Soden aufgefunden.
14. *A. penetrans* Germ. Ein Stück von mir bei Umstadt, eines von Dr. **Stern** bei Frankfurt gefunden.
15. *A. tenue* Kirby. Im ganzen Gebiete verbreitet, nicht häufig.
16. *A. pubescens* Kirby. Allenthalben nicht selten.
17. *A. aeneum* Fabr. Ueberall häufig auf Malven.
18. *A. radiolus* Kirby. Wie das Vorige.
19. *A. Onopordi* Kirby. Wie das Vorige, auf Disteln und Malven.
20. *A. carduorum* Kirby. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ober-Lais einzeln von mir gesammelt.
21. *A. Caultei* Wencker. Von **v. Heyden** I einmal bei Flörsheim gefunden.
22. *A. laevigatum* Kirby. Bei Frankfurt von **v. Heyden** I gefunden.

23. *A. brevirostre* Hbst. Bei Seligenstadt von mir, bei Offenbach und Frankfurt von **v. Heyden** gesammelt.

24. *A. pallipes* Kirby. Bei Frankfurt, Falkenstein, Ems auf *Mercurialis perennis* von **v. Heyden** beobachtet.

25. *A. flavimanum* Schh. Drei Exemplare dieser seltenen Art wurden von **v. Heyden** bei Frankfurt gefunden.

26. *A. fuscirostre* Fabr. Im ganzen Gebiete verbreitet. Von **v. Heyden** auf *Spartium* beobachtet.

27. *A. difficile* Hbst. Ueberall häufig auf Heidekraut.

28. *A. Genistae* Kirby. Bei Aschaffenburg (**Oechsner**), Frankfurt, Mombach, Ems (**v. Heyden**). Nicht selten auf *Genista*.

29. *A. rufirostre* Fabr. Im ganzen Gebiete. Herr **v. Heyden** hat den Käfer auf *Malva rotundifolia* beobachtet.

30. *A. flavofemoratum* Hbst. Durchs ganze Gebiet verbreitet, an manchen Orten, z. B. Ober-Lais, nicht selten. Nach **v. Heyden**'s Beobachtungen minirt die Larve die Blätter von *Medicago sativa*.

31. *A. Malvae* Fabr. Bei Babenhausen von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt und Ems von **v. Heyden** auf *Malva rotundifolia* gesammelt.

32. *A. vernale* Fabr. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt und Ems, von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg aufgefunden.

33. *A. Viciae* Payk. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

34. *A. dissimile* Germ. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden** einzeln gesammelt.

35. *A. varipes* Germ. Ueberall im Gebiete nicht selten.

36. *A. Fagi* Linn. Allenthalben gemein.

37. *A. Ononidis* Gyll. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir, bei Frankfurt einmal von **v. Heyden** gefunden.

38. *A. gracilipes* Dietr. Einmal bei Ober-Lais in Mehrzahl auf Klee von mir gesammelt.

39. *A. flavipes* Fabr. Ueberall häufig.

40. *A. Trifolii* Linn. Wie das Vorige.

41. *A. assimile* Kirby. Ebenso.

42. *A. nigritarse* Kirby. Desgleichen.

43. *A. miniatum* Schh. Bei Aschaffenburg nicht selten von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden** II an Ampfer gesammelt.

44. *A. haematodes* Kirby. Im ganzen Gebiete nicht selten.

45. *A. rubens* Walton. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Offenbach, Frankfurt und im Taunus von **v. Heyden** gefunden. Selten.

46. *A. sanguineum* De Geer. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden** nicht selten aufgefunden.

47. *A. cruentatum* Walton. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir gesammelt.

48. *A. Gyllenhalii* Kirby. Bei Seligenstadt und Ober-Lais gefunden.

49. *A. elongatum* Germ. Von **v. Heyden** bei Frankfurt einzeln gesammelt.

50. *A. seniculus* Kirby. Ueberall häufig.

51. *A. columbinum* Germ. Bei Seligenstadt und Frankfurt einzelne Exemplare.

52. *A. simile* Kirby. Bei Frankfurt und Cronthal von **v. Heyden** aufgefunden. Selten.

53. *A. ebeninum* Kirby Seligenstadt (**Scriba**), Aschaffenburg (**Doebner**), Frankfurt und Falkenstein (**v. Heyden**), sehr einzeln.

54. *A. platalca* Germ. Von **v. Heyden** bei Frankfurt einmal.

55. *A. Ononis* Kirby. Bei Seligenstadt und Ober-Lais sehr selten von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** gefunden.

56. *A. Ervi* Kirby. Ueberall im Gebiete nicht selten.

57. *A. Loti* Kirby. Wie das Vorige.

58. *A. validirostre* Seh. Im ganzen Gebiete, jedoch nicht häufig.

59. *A. filirostre* Kirby. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gesammelt.

60. *A. Meliloti* Kirby. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Offenbach, Frankfurt und Soden von **v. Heyden** aufgefunden.

61. *A. virens* Hbst. Ueberall gemein.

62. *A. punctigerum* Germ. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** und bei Ober-Lais von mir nicht selten gefunden.

63. *A. Spencei* Kirby. Bekannte Fundorte im Gebiete sind : Darmstadt (Dr. **Nebel**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**), Frankfurt und Königstein (**v. Heyden**), Seligenstadt und Ober-Lais (**Scriba**).

64. *A. sulcifrons* Hbst. Bei Griesheim ein Exemplar von **v. Heyden**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden.

65. *A. aethiops* Hbst. Im ganzen Gebiet verbreitet, nicht häufig.

66. *A. livescerum* Sch. Bei Seligenstadt und in Rheinhessen von mir, bei Frankfurt und Rüdesheim von **v. Heyden**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** einzeln gesammelt.

67. *A. Astragali* Payk. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt und Griesheim häufig auf *Astragalus* gefunden.

68. *A. elegantulum* Payk. Einmal bei Seligenstadt von mir und einmal bei Bingen von **v. Heyden** aufgefunden.

69. *A. vorax* Herbst. Bei Darmstadt, Seligenstadt und im Taunus beobachtet.

70. *A. pavidum* Germ. Im ganzen Gebiete vorkommend; von **v. Heyden** auf *Coronilla varia* gefunden.

71. *A. Pisi* Fabr. Durchs ganze Gebiet, im Süden häufiger.

72. *A. Sorbi* Hbst. Bei Ober-Lais nicht selten. Bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr**, bei Frankfurt einzeln von **v. Heyden** gesammelt.

73. *A. striatum* Mrsh. Im ganzen Gebiete nicht selten.

74. *A. immune* Kirby. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt aufgefunden.

75. *A. humile* Germ. Ueberall häufig.

76. *A. Sedi* Germ. Von **v. Heyden** im Taunus und bei Rüdesheim auf verschiedenen *Sedum*-Arten gefunden.

77. *A. simum* Germ. Im Süden des Gebietes an verschiedenen Orten beobachtet.

78. *A. minimum* Hbst. Ueberall häufig, besonders auf Saalweiden.

79. *A. violaceum* Kirby. Im ganzen Gebiete häufig.

80. *A. aterrimum* Linn. Wie das Vorige.

81. *A. affine* Kirby. Einmal von **v. Heyden** bei Frankfurt auf *Spartium* gefunden.

Ramphus. Clairville.

1. *R. flavicornis* Clairv. Durchs ganze Gebiet vorkommend. Nach **v. Heyden's** Beobachtungen minirt die Larve in Kirschen, Birnen, Schlehen und Birkenblättern.

Cneorhinus. Schönherr.

1. *C. geminatus* Fabr. Im Süden des Gebietes, besonders in Sandgegenden, häufig. In Bingen soll nach **Wagner's** Beobachtungen der Käfer einmal dem Weinstock schädlich geworden sein. Auch bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.

Strophosomus. Billberg.

1. *St. Coryli* Fabr. Ueberall gemein.

2. *St. obesus* Mrsb. Im Süden des Gebietes häufiger, als im Norden desselben.

3. *St. retusus* Mrsb. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt häufig und den jungen Eichen schädlich.

4. *St. faber* Hbst. Im ganzen Gebiete häufig.

5. *St. limbatus* Fabr. Bei Gleisweiler in der Pfalz einige Stücke von **v. Heyden** gefunden.

6. *St. squamulatus* Hbst. Allenthalben im Gebiet nicht selten.

Sciaphilus. Schönherr.

1. *S. muricatus* Fabr. Durchs ganze Gebiet häufig.

Brachyderes. Schönherr.

1. *B. incanus* Linn. Im Süden des Gebietes sehr häufig; im Norden ist mir kein Fundort bekannt.

Eusomus. Germar.

1. *E. ovulum* Ill. Im Süden des Gebietes häufig, im Norden desselben selten.

Tanymecus. Germar.

1. *T. palliatus* Fabr. Ueberall gemein.

Sitones. Schön herr.

Die Arten dieser Gattung sind nach Angabe Herrn v. Heyden's aufgenommen und geordnet, dessen *Sitones*-Arten sämtlich von Allard untersucht worden sind.

1. *S. griseus* Fabr. Bei Frankfurt und Mombach von v. Heyden (an *Spartium*), bei Aschaffenburg von Dr. Doebner, bei Ober-Lais von mir einzeln gefunden.

2. *S. longicollis* Schh. Einmal bei Frankfurt (v. Heyden I).

3. *S. flavescens* Mrsh. Im ganzen Gebiete häufig.

4. *S. suturalis* Schh. Drei Exemplare bei Frankfurt von v. Heyden aufgefunden.

5. *S. sulcifrons* Thunbg = *Medicaginis* Redt. sowie die Var. *argutulus* Schh. Im ganzen Gebiete häufig.

6. *S. tibialis* Herbst und Var. *ambiguus* Schh. Wie der Vorige.

7. *S. crinitus* Oliv. Wie der Vorige.

8. *S. regensteiniensis* Hbst. Durchs ganze Gebiet verbreitet, zuweilen nicht selten.

9. *S. puncticollis* Steph. Bei Frankfurt einzeln von v. Heyden gesammelt.

10. *S. lineatus* Linn. Ueberall gemein.

11. *S. discoideus* Schh. Bei Seligenstadt und im Odenwald selten.

12. *S. hispidulus* Fbr. Im ganzen Gebiete häufig.

13. *S. tibellus* Schh. Einige Stücke bei Seligenstadt.

14. *S. humeralis* Steph. Ueberall häufig.

15. *S. inops* Schh. Bei Darmstadt (Dr. Nebel), Frankfurt (v. Heyden) selten.

Scytropus. Schön herr.

1. *S. mustela* Hbst. Im ganzen Gebiete, manchmal an jungen Kieferntrieben nicht selten.

Chlorophanus. Dalman.

1. *C. viridis* Linn. Bei Seligenstadt häufig am Mainufer, an Weiden.

2. *C. pollinosus* Fabr. Ein Exemplar bei Crumstadt gefunden.

3. *C. salicicola* Germ. Von v. Heyden bei Mombach an Weiden gesammelt.

4. *C. graminicola* Schh. Bei Mainz von Dr. Zitz gefunden.

Polydrosus. Germar.

1. *P. undatus* Fabr. Ueberall häufig, besonders auf Eichen und Birken.

2. *P. flavipes* De Geer. Im ganzen Gebiete nicht selten.

3. *P. pterygomalis* Schh. Wie der Vorige, auf Eichen.

4. *P. cervinus* Linn. Ueberall häufig, besonders an Saalweiden.

5. *P. chrysomela* Oliv. Im ganzen Gebiete, selten.
6. *P. confluens* Steph. Bei Frankfurt und Mombach von **v. Heyden**, von mir bei Ober-Lais in Mehrzahl gesammelt.
7. *P. sparsus* Schh. Von Stud. **Weis** bei Darmstadt in der Fasanerie einmal in Mehrzahl von Eichen geklopft; bei Frankfurt von **v. Heyden** zwei Stück aufgefunden.
8. *P. sericeus* Schall. Ueberall gemein.
9. *P. micans* Fabr. Wie der Vorige, besonders auf Hainbuchen.

Metallites. Schön herr.

1. *M. mollis* Germ. Im ganzen Gebiete nicht selten an jungen Kieferntrieben.
2. *M. atomarius* Oliv. Wie der Vorige.
3. *M. marginatus* Steph. Ueberall gemein.

Cleonus. Schön herr.

1. *C. marmoratus* Fabr. Im ganzen Gebiet, im Süden desselben häufiger.
2. *C. turbatus* Schh. Wie der Vorige, besonders in Sandgegenden.
3. *C. ophthalmicus* Rossi. Ueberall nicht selten.
4. *C. obliquus* Fbr. Einige Stücke bei Seligenstadt.
5. *C. trisulcatus* Hbst. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Seligenstadt und Nidda einzeln von mir aufgefunden.
6. *C. roridus* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** und mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** gesammelt. Selten.
7. *C. grammicus* Panz. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden** II bei Jugenheim und Mombach gefunden.
8. *C. cinereus* Schrnk. Bei Seligenstsd, im Odenwald, bei Frankfurt und Aschaffenburg vorkommend.
9. *C. alternans* Oliv. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.
10. *C. sulcirostris* Linn. Ueberall häufig, auf Disteln.
11. *C. albidus* Fabr. Im Süden des Gebietes an manchen Orten nicht selten.
12. *C. segnis* Germ. Von **v. Heyden** bei Frankfurt gefunden.

Alophus. Schön herr.

1. *A. triguttatus* Fabr. Ueberall häufig.
2. *A. nictitans* Schh. Ein von Herrn **Harer** bei Frankfurt gefundenes Exemplar in der Sammlung des Herrn **v. Heyden**.

Liophloeus. Ger mar.

1. *L. nubilis* Fabr. Durchs ganze Gebiet gemein.

Barynotus. Ger mar.

1. *B. obscurus* Fabr. Ueberall häufig.
2. *B. moereus* Fabr. Ein bei Marburg gefundenes Stück in meiner Sammlung.

Tropiphorus. Schön herr.

1. *T. mercurialis* Fabr. Bei Umstadt von mir, auf dem Feldberg (Taunus) zweimal von **v. Heyden** II, bei Giefßen von **Laubenheimer**, auf der Rhön von Dr. **Doebner** aufgefunden. Ueberall nur sehr einzeln.

Lepyrus. Ger mar.

1. *L. colon* Fabr. Bei Seligenstadt, Frankfurt, Aschaffenburg häufig. Von **v. Heyden** auch bei Ems gefunden.

2. *L. binotatus* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.

Tanysphyrus. Ger mar.

1. *T. Lemnae* Fabr. Bei Seligenstadt nicht selten im Schlamme; bei Frankfurt und Ems von **v. Heyden** I gesammelt.

Hylobius. Schön herr.

1. *H. Abietis* Linn. Ueberall gemein.

2. *H. fatuus* Rossi. Bei Seligenstadt und im Odenwald einzeln von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt und Enkheim (im Torfmoor nicht selten) von **v. Heyden**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gesammelt.

Molytes. Schön herr.

1. *M. coronatus* Latr. Ueberall häufig. Die Vogelsberger Exemplare sind kleiner und auf den Flügeldecken ungefleckt.

2. *M. germanus* Linn. Einige Stücke bei Dietzenbach gefunden.

Liosomus. Kirby.

1. *L. ovatulus* Clairv. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg aufgefunden.

Plinthus. Ger mar.

1. *P. caliginosus* Fabr. Im Süden des Gebietes weniger selten, als im Norden.

Phytonomus. Schön herr.

1. *P. punctatus* Fabr. Ueberall häufig.

2. *P. fasciculatus* Hbst. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt aufgefunden.

3. *P. intermedius* Schh. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg.

4. *P. tessellatus* Schh. Ein Stück bei Seligenstadt gefunden.

5. *P. elongatus* Payk. Im ganzen Gebiete nicht selten.

6. *P. suturalis* Redt. Ein Exemplar bei Darmstadt von Stud. **Weis** aufgefunden.

7. *P. Rumicis* Linn. Durchs ganze Gebiet, nicht häufig.

8. *P. Pollux* Fabr. Bei Seligenstadt einzeln.

9. *P. suspiciosus* Hbst. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

10. *P. Viciae* Schh. Wie der Vorige.

11. *P. Plantaginis* De Geer. Ueberall im Gebiete nicht selten.

12. *P. murinus* Fabr. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir aufgefunden.

13. *P. variabilis* Hbst. Im ganzen Gebiete häufig.

14. *P. Polygoni* Fabr. Wie der Vorige.

15. *P. Kunzei* Germ. Ich besitze ein bei Marburg gefangenes Exemplar.

16. *P. meles* Fabr. Durchs ganze Gebiet verbreitet, aber selten.

17. *P. posticus* Schh. In der Bergstrafse (Alsbach) und bei Ober-Lais einzeln von mir aufgefunden.

18. *P. plagiatu*s Redt. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Ober-Lais von mir in Mehrzahl gesammelt.

19. *P. nigrirostris* Fabr. Ueberall häufig.

Limobius. Schön herr.

1. *L. dissimilis* Hbst. Bei Seligenstadt einige Stücke.

Gronops. Schön herr.

1. *G. lunatus* Fabr. Einmal bei Seligenstadt von mir, einigemal bei Frankfurt von **v. Heyden** aufgefunden.

Phyllobius. Schön herr.

1. *P. calcaratus* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.

2. *P. alnei* Fabr. Wie der Vorige. Bei Frankfurt von **v. Heyden** an *Urtica* im Juni sehr häufig beobachtet.

3. *P. pineti* Redt. Ein Exemplar bei Marburg gefunden, in meiner Sammlung befindlich.

4. *P. argentatus* Linn. Ueberall gemein.

5. *P. maculicornis* Germ. Von **v. Heyden** bei Königstein und Falkenstein im Taunus je einmal.

6. *P. oblongus* Linn. Allenthalben sehr gemein.

7. *P. sinuatus* Fabr. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von mir bei Seligenstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt (auf *Potentilla*) gefunden.

8. *P. Pyri* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

9. *P. Betulae* Fabr. Wie der Vorige, weniger häufig.

10. *P. Pomonae* Oliv. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, in der Bergstafse und bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.

11. *P. uniformis* Marsh. Ueberall häufig.

Trachyphloeus. Germ ar.

1. *T. scaber* Linn. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt, Königstein und Nauheim von **v. Heyden** nicht selten gefunden.

2. *T. scabriculus* Linn. (♂ *erinaceus* Redt.) Im ganzen Gebiete nicht selten.

3. *T. squamosus* Schh. Einmal im Taunus von **v. Heyden** aufgefunden.

4. *T. squamulatus* Oliv. Bei Seligenstadt einzeln von mir, bei Offenbach, Frankfurt und Bingen von **v. Heyden** gesammelt.

5. *T. aristatus* Gyll. Einige Stücke bei Seligenstadt.

6. *T. digitalis* Schh. Bei Harxheim in Rheinessen einmal in Mehrzahl gefunden.

Omius. G e r m a r.

1. *O. rotundatus* Fabr. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten, z. B. bei Harxheim in Rheinessen, nicht selten.

2. *O. hirsutulus* Fabr. Ueberall im Gebiete, aber nicht häufig.

3. *O. pruinosis* Schh. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von Dr. **M. Schmidt** einmal bei Frankfurt aufgefunden.

4. *O. brunnipes* Oliv. Im ganzen Gebiete nicht selten.

5. *O. senex* Schh. Ein Exemplar bei Seligenstadt.

6. *O. concinnus* Schh. Bei Frankfurt nicht selten von **v. Heyden**, bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir gesammelt.

7. *O. forticornis* Schh. Bei Seligenstadt selten, bei Ober-Lais und Ortenberg nicht selten.

Peritelus. G e r m a r.

1. *P. griseus* Oliv. Im Süden des Gebietes häufig, im Norden desselben ist mir kein Fundort bekannt.

Otiorhynchus. G e r m a r.

1. *O. scabripennis* Schh. Auf dem Rochusberg bei Bingen von **v. Heyden** I ein Stück aufgefunden.

2. *O. niger* Fabr. Von Dr. **Doebner** auf der Rhön gefunden und auch wohl auf dem Vogelsberg vorkommend.

3. *O. raucus* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.

4. *O. hirticornis* Hbst. Bei Alsbach in der Bergstrasse von mir in Mehrzahl, bei Soden von **v. Heyden** gefunden.

5. *O. porcatus* Hbst. Ueberall häufig.

6. *O. uncinatus* Germ. Bei Ortenberg von Dr. **Bose** einige Stücke aufgefunden.

7. *O. picipes* Fabr. Allenthalben gemein. Die Var. *Cheorolati* Schh. hat Herr **v. Heyden** I einigemal bei Lorsch gefunden.

8. *O. sulcatus* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden** I und **Stern** einzeln gesammelt.

9. *O. Ligustici* Linn. Ueberall sehr häufig.

10. *O. ovatus* Linn. Wie der Vorige.

Lixus. F a b r i c i u s.

1. *L. paraplecticus* Linn. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Frankfurt von **v. Heyden** auf Wasserpflanzen gesammelt.

2. *L. Ascanii* Linn. Im Süden des Gebietes, an manchen Orten, bei Darmstadt, Frankfurt, Mombach nicht selten.

3. *L. Myagri* Oliv. Bei Hanau von Dr. **Hille**, bei Giefsen von **Laubenheimer**, bei Ems von **v. Heyden** gefunden.

4. *L. angustatus* Fabr. Bei Darmstadt und Seligenstadt einzeln auf Disteln.

5. *L. lateralis* Panz. Einmal von **v. Heyden I** bei Gleisweiler in der Pfalz gefunden.

6. *L. subtilis* Schh. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und **Advocat Heyer** in Mehrzahl auf Menthen gesammelt.

7. *L. filiformis* Fabr. Bei Seligenstadt, Aschaffenburg, Frankfurt, Mombach nicht selten auf Disteln.

8. *L. bicolor* Oliv. Von **v. Heyden I** einzeln bei Mombach gefunden.

9. *L. Bardanae* Fabr. Bei Frankfurt und auf der Höhe bei Bieber von **v. Heyden** gesammelt.

Larinus. G e r m a r.

1. *L. flavescens* Dej. Ein Exemplar wurde von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg aufgefunden.

2. *L. sturnus* Schall. Im Süden des Gebietes (bei Darmstadt, Seligenstadt, Frankfurt, Mombach) nicht selten an Disteln.

3. *L. Jaceae* Fabr. Einmal von Senator **v. Heyden** bei Hofheim gefunden.

4. *L. planus* Fabr. Im ganzen Gebiete.

5. *L. obtusus* Schh. Bei Seligenstadt auf Disteln, selten.

6. *L. Carlinae* Oliv. Im ganzen Gebiete nicht selten.

7. *L. senilis* Fabr. Bei Soden von **v. Heyden** sehr einzeln aufgefunden.

Rhinocyllus. G e r m a r.

1. *R. latirostris* Matr. Im ganzen Gebiet nicht selten auf Disteln.

2. *R. Olivieri* Schh. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt nicht selten.

Pissodes. G e r m a r.

1. *P. Pini* Linn. Im ganzen Gebiete verbreitet.

2. *P. notatus* Fabr. Ueberall häufig.

3. *R. strobili* Redt. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir bei Seligenstadt aufgefunden.

4. *R. piniphilus* Hbst. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**.

Magdalinus. S c h ö n h e r r.

1. *M. violaceus* Linn. Einige Stücke bei Seligenstadt.

2. *M. frontalis* Gyll. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt häufig und den jungen Fichtenpflanzungen schädlich.

3. *M. duplicatus* Germ. Im ganzen Gebiete nicht selten.

4. *M. phlegmaticus* Germ. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden** einzeln auf Kiefern gesammelt.

5. *M. nitidus* Gyll. Bei Seligenstadt, Aschaffenburg, Frankfurt, Ober-Lais, überall einzeln.
6. *M. linearis* Gyll. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt einmal von v. **Heyden** I aufgefunden.
7. *M. Cerasi* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.
8. *M. memnonius* Falderm. Im Odenwald von **Wider**, bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** einzeln gefunden.
9. *M. asphaltinus* Germ. Nach v. **Heyden** von **Wider** im Odenwald aufgefunden.
10. *M. aterrimus* Fabr. Bei Seligenstadt einzeln, bei Frankfurt und in Rheinhessen (Mombach, Harxheim) sehr häufig an Rüstern.
11. *M. carbonarius* Linn. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, bei Frankfurt einmal von Senator v. **Heyden** aufgefunden.
12. *M. rufus* Germ. Von v. **Heyden** I bei Eberstadt und Mombach auf Kiefern sehr einzeln gesammelt.
13. *M. barbicornis* Latr. Im ganzen Gebiete, einzeln.
14. *M. Pruni* Linn. Ueberall häufig.
15. *M. flavicornis* Schh. Bei Seligenstadt, Frankfurt, Soden, Ober-Lais einzeln gefunden.
16. *M. nitidipennis* Schh. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von v. **Heyden** und Dr. **M. Schmidt** sehr einzeln aufgefunden.

Eriirhinus. Schön herr.

1. *E. Scirpi* Fabr. Bei Ortenberg von Dr. **Bose** gefunden.
2. *E. acridulus* Linn. Ueberall häufig.
3. *E. pillumnus* Schh. Bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Giefsen von **Laubenheimer** gesammelt.
4. *E. infirmus* Hbst. Von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg aufgefunden.
5. *E. Festucae* Hbst. Bei Seligenstadt nicht selten, bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gefunden.
6. *E. Nereis* Payk. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Grebenhain im Vogelsberg von mir aufgefunden.
7. *E. vorax* Fabr. Im Süden des Gebietes weniger selten als im Norden.
8. *E. macropus* Redt. Bei Darmstadt von Advocat **Hoyer**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gesammelt.
9. *E. tremulae* Payk. Bei Seligenstadt und Aschaffenburg einzeln auf Espen.
10. *E. variegatus* Schh. Ein Stück bei Seligenstadt.
11. *E. costirostris* Schh. Im ganzen Gebiet häufig.
12. *E. affinis* Payk. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg einzeln gesammelt.

13. *E. agnathus* Schh. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir aufgefunden. Sehr selten.

14. *E. majalis* Payk. Bei Seligenstadt einzeln.

15. *E. pectoralis* Panz. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gesammelt.

16. *E. villosulus* Schh. Einige Stücke bei Seligenstadt.

17. *E. tortrix* Linn. Mehrmals bei Seligenstadt gefunden.

18. *E. filirostris* Schh. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt von mir einzeln aufgefunden.

19. *E. dorsalis* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Ober-Lais von mir gefunden.

Grypidius. Schön herr.

1. *G. Equiseti* Fabr. Ueberall nicht selten.

2. *G. brunnirostris* Fabr. Wie der Vorige, seltener.

Hydronomus. Schön herr.

1. *H. Alismatis* Mrsh. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Frankfurt von v. **Heyden** I, bei Giefßen von **Laubenheimer** einzeln aufgefunden.

Elleschus. Schön herr.

1. *E. scanicus* Payk. Bei Seligenstadt (**Scriba**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**), Frankfurt (v. **Heyden**), überall sehr einzeln.

2. *E. bipunctatus* Linn. Im ganzen Gebiete häufig auf Saalweiden.

Lignyodes. Schön herr.

1. *L. enucleator* Panz. Bei Frankfurt von Dr. **M. Schmidt**, bei Rödelsheim von **Twardowski** häufig von blühenden Eschen geklopft.

Bradybatus. Germar.

1. *B. Kellneri* Back. Bei Darmstadt ein Stück von Stud. **Wels**.

Brachonyx. Schön herr.

1. *B. indigena* Hbst. Ueberall nicht selten auf Kiefern.

Anthonomus. Germar.

1. *A. Ulmi* De Geer. Einmal bei Seligenstadt von mir, zweimal bei Frankfurt von v. **Heyden** gefunden.

2. *A. cinctus* Redt. Bei Umstadt einigemal von mir, im Taunus einigemal von v. **Heyden** II auf *Sorbus aucuparia* gesammelt.

3. *A. pomorum* Linn. Ueberall gemein.

4. *A. pubescens* Payk. Bei Frankfurt von v. **Heyden**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** aufgefunden.

5. *A. varians* Payk. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von v. **Heyden**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden.

6. *A. Rubi* Hrbst. Im ganzen Gebiet nicht selten.

7. *A. druparum* Linn. Wie der Vorige, noch häufiger.

Coryssomerus. Schön herr.

1. *C. capucinus* Beck. Bei Seligenstadt, im Odenwald und in Rheinhessen einzeln von mir gesammelt, bei Frankfurt von v. Heyden I und Stud. Böttger.

Balaninus. Ger n i a r.

1. *B. elephas* Schh. Von Klgfr. bei Darmstadt, bei Frankfurt von v. Heyden (aus Eicheln gezogen) gesammelt. Selten.
2. *B. glandium* Mrsh. Im ganzen Gebiet nicht selten.
3. *B. nucum* Linn. Wie der Vorige; in Eicheln und Haselnüssen.
4. *B. turbatus* Schh. Wie der Vorige, in Eicheln nicht selten.
5. *B. villosus* Hbst. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten, z. B. Seligenstadt, Mainkur, Soden nicht selten. Die Larve wurde von v. Heyden in frischen Gallen von *Cynips* auf Eichen beobachtet.
6. *B. rubidus* Schh. Bei Aschaffenburg von Dr. Doebner aufgefunden.
7. *B. cruz* Fabr. Im ganzen Gebiete, im Süden weniger selten, als im Norden. An Weiden.
8. *B. Brassicae* Fabr. Ueberall nicht selten.
9. *B. pyrrhoceras* Mrsh. Wie der Vorige.

Amalus. Schön herr.

1. *A. scortillum* Hbst. Im ganzen Gebiet verbreitet.
2. *A. floralis* Payk. Ueberall im Gebiet häufig.
3. *A. terminatus* Hbst. Bei Seligenstadt und Frankfurt einzeln.
4. *A. nigrinus* Marsh. Von mir bei Seligenstadt, von v. Heyden bei Frankfurt, von Dr. Doebner bei Aschaffenburg aufgefunden.

Tychius. Ger m a r.

1. *T. quinquepunctatus* Linn. Ueberall häufig.
2. *T. venustus* Fabr. Bei Friedberg von Hauptmann Fuhr gesammelt.
3. *T. Schneideri* Herbst. Einige Stücke bei Ober-Lais aufgefunden.
4. *T. tomentosus* Hbst. Im ganzen Gebiete häufig.
5. *T. junceus* Reiche. Bei Zwingenberg in der Bergstrafse in Mehrzahl von mir gesammelt.
6. *T. Meliloti* Steph. Bei Ober-Lais nicht selten.
7. *T. cuprifer* Panz. Bei Aschaffenburg von Dr. Doebner gefunden.
8. *T. picirostris* Fabr. Ueberall häufig.

Smicronyx. Schön herr.

1. *S. politus* Schb. Ein Exemplar bei Ober-Lais.
2. *S. cicur*. Reich. Im ganzen Gebiete, gerade nicht selten.

Sibynes. Schön herr.

1. *S. canus* Hbst. Bei Seligenstadt und in Rheinhessen von mir, bei Frankfurt von v. Heyden, bei Aschaffenburg von Dr. Doebner einzeln gesammelt.

2. *S. Viscariae* Linn. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden** gefunden.
3. *S. fugax* Germ. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt vorkommend.
4. *S. vittatus* Germ. Ein Exemplar bei Seligenstadt gefunden.
5. *S. Potentillae* Germ. Bei Ober-Lais einigemal.
6. *S. phaleratus* Schh. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt aufgefunden.
7. *S. primitus* Hbst. Im ganzen Gebiete, selten.

Acalyptus. Schön herr.

1. *A. Carpini* Hbst. Bei Seligenstadt einigemal.
2. *A. rufipennis*. Auf blühenden Saalweiden bei Ober-Lais in Mehrzahl gefunden.

Litodactylus. Redtenbacher.

1. *L. leucogaster* Marsh. Ich besitze in meiner Sammlung bei Marburg gefundene Exemplare.

Phytobius. Schön herr.

1. *P. notula* Schh. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Aschaffenburg von **Oechsner** einzeln aufgefunden.
2. *P. denticollis* Schh. Von **v. Heyden** bei Frankfurt zwei Stück gefunden.
3. *P. quadrinodosus* Gyll. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, bei Seligenstadt am Mainufer von mir in Mehrzahl gesammelt.
4. *P. Comari* Hbst. Bei Seligenstadt einzeln vorkommend.
5. *P. quadrilobatus* Fabr. Im ganzen Gebiet nicht selten.
6. *P. canaliculatus* Schh. Einige Stücke habe ich in Rheinhessen aufgefunden.
7. *P. quadricornis* Gyll. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gesammelt.

Anoplus. Schön herr.

1. *A. plantaris* Naetzen. Bei Seligenstadt, selten.
2. *A. Roboris* Suffr. bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Ober-Lais von mir einzeln gefunden.

Orchestes. Illiger.

1. *O. Quercus* Linn. Ueberall sehr häufig auf Eichen.
2. *O. scutellaris* Fabr. Bei Seligenstadt einzeln vorkommend.
3. *O. rufus* Oliv. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden.
4. *O. Alni* Linn. In der Bergstrasse bei Alsbach einigemal von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** nicht selten auf Ulmen aufgefunden.
5. *O. Ilicis* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.
6. *O. pubescens* Stev. Ein Stück bei Seligenstadt.
7. *O. Fagi* Linn. Ueberall gemein.
8. *O. pratensis* Germ. Bei Seligenstadt einzeln.
9. *O. jota* Fabr. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt gesammelt.

10. *O. Lonicerae* Fabr. Von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg aufgefunden.
11. *O. Populi* Fabr. Bei Darmstadt und Seligenstadt nicht selten.
12. *O. signifer* Creutz. Im ganzen Gebiet nicht selten.
13. *O. erythropus* Germ. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Enkheim einzeln gefunden.
14. *O. Salicis* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.
15. *O. decoratus* Germ. Von **Klghfr.** im Modauthal gefunden.
16. *O. stigma* Germ. Durchs ganze Gebiet nicht selten.
17. *O. saliceti* Fabr. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden.

Styphlus. Schön herr.

1. *S. setiger* Germ. Einige Stücke bei Seligenstadt unter Waldreben (*Clematis Vitalba*) von mir, einmal von **v. Heyden I** bei Soden aufgefunden.

Trachodes. Schön herr.

1. *T. hispidus* Linn. Einige Stücke bei Seligenstadt unter faulenden, auf der Erde liegenden Buchenästen.

Baridius. Schön herr.

1. *B. Artemisiae* Hbst. Bei Seligenstadt einzeln.
2. *B. picinus* Grm. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Ortenberg von Dr. **Bose**, in Rheinhessen von mir gefunden.
3. *B. cuprirostris* Fbr. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg gesammelt.
4. *B. violaceus* Schh. Einige Stücke bei Harxheim in Rheinhessen von mir aufgefunden.
5. *B. chloris* Fabr. Im ganzen Gebiet nicht selten.
6. *B. coerulescens* Scop. Wie der Vorige, seltener.
7. *B. chlorizans* Germ. In der Sammlung von Dr. **Doebner** befindet sich ein bei Darmstadt gefundenes Exemplar.
8. *B. Lepidii* Germ. Im ganzen Gebiet verbreitet.
9. *B. Abrotani* Germ. Einigemal in Rheinhessen gefunden.
10. *B. T-album* Linn. Ueberall häufig an Schilf.

Cryptorhynchus. Illiger.

1. *C. Lapathi* Linn. Im ganzen Gebiet, manchmal häufig an Weiden vorkommend.

Camptorhinus. Schön herr.

1. *C. statua* Rossi. Von **v. Heyden I** bei Soden im Winterschlaf gesellig unter der Rinde von Eichen und zahmen Castanien aufgefunden; von Dr. **Doebner** einzeln bei Aschaffenburg, von mir einigemal bei Oberlais an alten Eichen gefunden.

Gasterocercus. Laporte.

1. *G. depressirostris* Fabr. **Reifsig** und **Klghfr.** fanden diesen seltenen Käfer einzeln bei Darmstadt im Holzhofo.

Coeliodes. Schön herr.

1. *C. Quercus* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.
2. *C. ruber* Marsh. Bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.
3. *C. rubicundus* Payk. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, von Dr. **Bose** bei Ortenberg aufgefunden.
4. *C. Epilobii* Payk. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ober-Lais von mir nicht selten gefunden.
5. *C. guttula* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.
6. *C. fuliginosus* Mrsh. Bei Seligenstadt und Frankfurt nicht selten.
7. *C. subrufus* Hbst. Im ganzen Gebiet vorkommend.
8. *C. quadrimaculatus* Linn. Ueberall häufig.
9. *C. Lamii* Hbst. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, im Taunus von **v. Heyden** gesammelt.
10. *C. Geranii* Payk. Bei Seligenstadt von mir einzeln, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** auf *Geranium pratense* häufig gefunden.
11. *C. exiguus* Oliv. Ein bei Marburg gefundenes Exemplar in meiner Sammlung.
12. *C. trifasciatus* Bach. Einige Stücke bei Ober-Lais aufgefunden.

Mononychus. Schön herr.

1. *M. Pseudacori* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** aufgefunden.

Acalles. Schön herr.

1. *A. hypocrita* Schh. Ein Exemplar wurde bei Ems von **v. Heyden** I unter *Rubus*-Gesträuch gefunden.
2. *A. Abstersus* Schh. Bei Aschaffenburg von **Oechsner**, im Taunus von **v. Heyden** I einmal aufgefunden.
3. *A. plinioides* Marsh. Ein Stück von **v. Heyden** I bei Frankfurt, eines bei Giessen von **Laubenheimer** gefunden.
4. *A. turbatus* Schh. Bei Seligenstadt ein Exemplar.

Scelopterus. Schön herr.

1. *S. globulus* Hbst. Bei Seligenstadt und Frankfurt einzeln.

Orobitis. Ger mar.

1. *O. cyaneus* Linn. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

Ceuthorhynchus. Schön herr.

1. *C. macula-alba* Hbst. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** einzeln gesammelt.
2. *C. suturalis* Fabr. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais von mir aufgefunden. Selten.
3. *C. arator* Schh. Einige Stücke bei Seligenstadt.

4. *C. syrites* Germ. Von **v. Heyden** bei Frankfurt einmal.
5. *C. assimilis* Payk. Ueberall gemein und den Koblpflanzungen schädlich.
6. *C. Erysimi* Fabr. Im ganzen Gebiet häufig.
7. *C. contractus* Mrsh. Wie der Vorige.
8. *C. atratulus* Gyll. Wie der Vorige.
9. *C. austerus* Schh. Bei Darmstadt ein Stück von Stud. **Weis** aufgefunden.
10. *C. setosus* Schh. Bei Aschaffenburg (Dr. **Doebner**), Frankfurt (**v. Heyden**), Ober-Lais (**Scriba**) vorkommend.
11. *C. Cochleariae* Gyll. Wie der Vorige.
12. *C. pumilio* Gyll. Bei Frankfurt von **v. Heyden** gefunden.
13. *C. posthumus* Germ. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir gesammelt.
14. *C. pulvinatus* Gyll. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, von mir bei Seligenstadt und Ober-Lais aufgefunden.
15. *C. constrictus* Marsh. Bei Frankfurt und im Taunus von **v. Heyden** gefunden.
16. *C. Achilleae* Schh. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.
17. *C. nanus* Schh. Im ganzen Gebiet nicht selten.
18. *C. Ericae* Gyll. Ueberall gemein auf Haidekraut.
19. *C. Echii* Fabr. Im ganzen Gebiet auf *Echium* nicht selten.
20. *C. viduatus* Gyll. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir gesammelt. Ein ♀ dieser Art habe ich einmal mit einem ♂ von *Ceuthorhynchus chrysanthemi* Schh. in *copula* gefunden.
21. *C. Raphani* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden** gefunden.
22. *C. Borraginiis* Fabr. Bei Darmstadt und Ober-Lais einzeln.
23. *C. abbreviatulus* Schh. Bei Frankfurt von **v. Heyden** aufgefunden.
24. *C. crucifer* Oliv. Im Odenwald und bei Frankfurt von **v. Heyden** auf *Cynoglossum* gefunden.
25. *C. Euphorbiae* Brisout. Bei Frankfurt einmal von **v. Heyden**.
26. *C. litura* Fabr. Bei Frankfurt vorkommend.
27. *C. trimaculatus* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden** auf Disteln, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gesammelt.
28. *C. versicolor* Brisout. Einmal bei Frankfurt von **v. Heyden** gefunden.
29. *C. asperifoliarum* Gyll. Im ganzen Gebiet häufig.
30. *C. campestris* Schh. Wie der Vorige.
31. *C. molitor* Schh. Von **v. Heyden** bei Frankfurt aufgefunden.
32. *C. Chrysanthemi* Schh. Allenthalben im Gebiet nicht selten.
33. *C. rugulosus* Hbst. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir gefunden.
34. *C. melanostictus* Marsh. Bei Seligenstadt und Frankfurt einzeln vorkommend.

35. *C. quadridens* Panz. Im ganzen Gebiet nicht selten, besonders an Epheu.
36. *C. marginatus* Payk. Durchs ganze Gebiet, gerade nicht selten.
37. *C. punctiger* Schh. Wie der Vorige, seltener.
38. *C. quercicola* Fabr. Bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gefunden.
39. *C. denticulatus* Schrnk. Bei Darmstadt einzeln von Dr. **Nebel** gesammelt.
40. *C. biguttatus* Schh. Bei Seligenstadt öfters gekötschert.
41. *C. rusticus* Schh. Von **v. Heyden** bei Frankfurt einmal gefunden.
42. *C. pollinarius* Forst. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Gießen von **Laubenheimer** aufgefunden.
43. *C. angulosus* Schh. Einmal bei Frankfurt von **v. Heyden**.
44. *C. obsoletus* Schh. Einigemal bei Seligenstadt.
45. *C. picitarsis* Schh. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt vorkommend
46. *C. sulcicollis* Gyll. Ueberall im Gebiet häufig.
47. *C. Rapae* Gyll. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, in Rheinhessen von mir einzeln gefunden.
48. *C. Napi* Schh. Im ganzen Gebiet, gerade nicht selten.
49. *C. aeneicollis* Germ. Bei Nauheim einigemal von **v. Heyden** auf *Lepidium graminifolium* aufgefunden.
50. *C. obscurecyaneus* Schh. Bei Seligenstadt sehr einzeln.
51. *C. ignitus* Germ. Wie der Vorige.
52. *C. cyanipennis* Germ. Im ganzen Gebiet, nicht häufig.
53. *C. tarsalis* Schh. Bei Darmstadt vorkommend.
54. *C. chalybaeus* Germ. Im ganzen Gebiet nicht selten.
55. *C. hirtulus* Germ. Wie der Vorige.
56. *C. troglodytes* Fabr. Ueberall häufig.
57. *C. pubicollis* Schh. Von **v. Heyden** bei Frankfurt aufgefunden.
58. *C. signatus* Schh. Bei Frankfurt von **v. Heyden** zweimal, bei Seligenstadt und Ober-Lais in Mehrzahl von mir gesammelt.
59. *C. interstinctus* Schh. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir bei Alsbach in der Bergstrafse einige Exemplare gefunden.

Rhinoncus. Schön herr.

1. *R. topiarius* Germ. Bei Heidelberg von Senator **v. Heyden** einmal gefunden.
2. *R. Castor* Fabr. Bei Frankfurt und Seligenstadt nicht selten.
3. *R. bruchoides* Hbst. Im ganzen Gebiet, im Süden desselben häufiger.
4. *R. inconspiculus* Hbst. Bei Seligenstadt einzeln von mir, bei Salzhausen von **v. Heyden I** aufgefunden.
5. *R. pericarpus* Fabr. Ueberall im Gebiet häufig.
6. *R. subfasciatus* Gyll. Durchs ganze Gebiet verbreitet, aber nicht häufig.
7. *R. albicinctus* Schh. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** gesammelt.

Poophagus. Schön herr.

1. *P. Sisymbrii* Fabr. Bei Gießen von **Laubenheimer** gefunden.

Tapinotus. Schön herr.

1. *T. sellatus* Fabr. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Gießen von **Laubenheimer** einzeln gesammelt.

Bagous. Germar.

1. *B. subcarinatus* Schh. Nach **v. Heyden** nicht selten bei Frankfurt.
2. *B. frit* Hbst. Bei Seligenstadt und Frankfurt einzeln.
3. *B. lutulosus* Gyll. Einige Stücke bei Seligenstadt gefunden.
4. *B. tempestivus* Hbst. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.
5. *B. convexicollis* Schh. Ein Stück bei Ober-Lais gefunden.
6. *B. lutulentus* Gyll. Bei Darmstadt (Dr. **Nebel**), Seligenstadt und Ober-Lais (**Scriba**) beobachtet.
7. *B. puncticollis* Schh. Von Dr. **Nebel** ein Stück bei Darmstadt aufgefunden.

Lyprus. Schön herr.

1. *L. cylindrus* Payk. Bei Frankfurt von **v. Heyden I**, bei Ober-Lais von mir ein Exemplar aufgefunden.

Cionus. Clairville.

1. *C. Scrophulariae* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.
2. *C. Verbasci* Fabr. Wie der Vorige, noch weniger selten.
3. *C. Olivieri* Rosenh. Bei Babenhausen auf Wollblumen von mir in Mehrzahl gefunden.
4. *C. Thapsus* Fabr. Ueberall häufig.
5. *C. hortulanus* Mrsh. Wie der Vorige.
6. *C. olens* Fabr. Von **Klghfr.** bei Darmstadt (Täubcheshöhle) auf Wollblumen gesammelt.
7. *C. Blattariae* Fbr. Im ganzen Gebiet häufig.
8. *C. pulchellus* Hbst. Wie der Vorige, aber nicht häufig.
9. *C. Solani* Fabr. Bei Seligenstadt einzeln.
10. *C. Frazini* De Geer. Bei Darmstadt von **Klghfr.** gefunden.

Gymnetron. Schön herr.

1. *G. villosulus* Schh. Bei Seligenstadt nicht selten.
2. *G. Veronicae* Germ. Im ganzen Gebiet häufig.
3. *G. Beccabungae* Linn. Bei Seligenstadt in Mehrzahl gefunden.
4. *G. labilis* Hbst. Einzeln bei Seligenstadt.
5. *G. melanarius* Germ. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einige Stücke von mir gefunden.
6. *G. stimulosus* Germ. Mehrmals bei Seligenstadt.

7. *G. teter* Fabr. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Hanau von Dr. **Hille** einzeln gesammelt.

8. *G. asellus* Grav. Bei Darmstadt von Stud. **Weis** in Mehrzahl gefunden.

9. *G. Antirrhini* Germ. Bei Seligenstadt nicht selten.

10. *G. noctis* Hbst. Einige Stücke bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden.

11. *G. collinus* Gyll. Bei Seligenstadt einige Mal.

12. *G. pilosus* Schb. Nach Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg vorkommend.

13. *G. thapsicola* Germ. Bei Seligenstadt an *Verbascum* in Mehrzahl von mir gefunden.

14. *G. spilotus* Germ. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gesammelt.

15. *G. Linariae* Panz. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, in Rheinhessen von mir nicht selten an Leinkraut gefunden.

16. *G. graminis* Schb. Bei Seligenstadt einzeln.

17. *G. plantarum* Schb. Wie der Vorige.

18. *G. Campanulae* Linn. Ueberall häufig.

19. *G. micros* Germ. Von v. **Heyden** bei Frankfurt einmal auf *Erica* gefunden.

Mecinus. Germar.

1. *M. pyraster* Hbst. Im Süden des Gebietes an manchen Orten nicht selten, im Norden ist mir ein Fundort nicht bekannt.

Nanophyes. Schönherr.

1. *N. Lythri* Fabr. Ueberall im Gebiet nicht selten.

2. *N. globulus* Germ. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir aufgefunden.

Sphenophorus. Schönherr.

1. *S. abbreviatus* Fabr. Im Süden des Gebietes nicht selten.

Sitophilus. Schönherr.

1. *S. granarius* Linn. Ueberall gemein.

2. *S. Oryzae* Linn. Durch den Reis überall hin verbreitet und bei Seligenstadt von mir auch unter Baumrinden gefunden; doch scheint dem Käfer zu seiner Fortentwicklung unser Klima zu rauh (vgl. Stettiner entomol. Zeitung 1857, S. 377).

Cossonus. Schönherr.

1. *C. linearis* Linn. Durchs ganze Gebiet nicht selten.

2. *C. ferrugineus* Clairv. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** einzeln gesammelt.

3. *C. cylindricus* Sahlbg. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt einzeln, bei Ober-Lais in Mehrzahl von mir in einem faulen Nufsbaume aufgefunden.

Rhyncolus. Creutzer.

1. *R. chloropus* Fabr. Nach Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg vorkommend.
2. *R. porcatus* Germ. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir gesammelt.
3. *R. truncorum* Germ. Im ganzen Gebiet nicht selten.
4. *R. cylindrirostris* Oliv. Wie der Vorige, noch häufiger.
5. *R. reflexus* Oliv. Ein Stück bei Seligenstadt von mir, eines bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** aufgefunden.
6. *R. punctatulus* Schh. Im ganzen Gebiet vorkommend, aber nicht häufig.

Dryophthorus. Schönherr.

1. *D. lymexylon* Fabr. Bei Frankfurt von v. **Heyden**, bei Ober-Lais von mir aufgefunden. Der Käfer lebt in faulem Holze und findet sich zuweilen in großer Menge beisammen; so fand ich ihn einmal in einem faulen Eichenstumpf zu Tausenden.

Xylophagi.

Hylastes. Erichson.

1. *H. ater* Payk. Im ganzen Gebiete häufig.
2. *H. cunicularius* Er. Bei Seligenstadt einzeln, bei Ober-Lais nicht selten. Von Dr. **Doebner** auch im Spessart beobachtet.
3. *H. attenuatus* Er. Bei Seligenstadt einzeln von mir, im Spessart von Dr. **Doebner** häufig gesammelt.
4. *H. angustatus* Hbst. Bei Darmstadt (Dr. **Nebel**), bei Seligenstadt (**Scriba**), im Spessart (Dr. **Doebner**) vorkommend.
5. *H. opacus* Er. Im Spessart häufig von Dr. **Doebner**, bei Ober-Lais ein Stück von mir aufgefunden.
6. *H. decumanus* Er. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt gefunden.
7. *H. palliatus* Gyll. Ueberall häufig.
8. *H. trifolii* Müll. Bei Darmstadt, Babenhausen, Mainz vorkommend.
9. *H. crenatulus* Duft. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir ein Stück bei Seligenstadt aufgefunden.

Hylurgus. Latreille.

1. *H. ligniperda* Fabr. Bei Seligenstadt und Aschaffenburg nicht häufig.
2. *H. piniperda* Linn. Ueberall gemein.
3. *H. minor* Hartig. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gesammelt.
4. *H. Hederae* Schmitt. Von Superintendent Dr. **Schmitt** bei Mainz, von v. **Heyden** bei Frankfurt, von mir in der Bergstrasse (Alsbacher Schloß) an Epheu gefunden.

Dendroctonus. Erichson.

1. *D. micans* Kug. Von Dr. **Steitz** in Frankfurt ein Stück auf dem Feldberg, von mir im Vogelsberg (Ober-Seemen, Grebenhain) aufgefunden.

2. *D. minimus* Fabr. Von **Klghfr.** häufig aus Kiefernzweigen erzogen, welche in der Tanne bei Darmstadt gesammelt waren.

Phloeophthorus. Wollaston.

1. *P. tarsalis* Forst. Bei Offenbach, Frankfurt, Aschaffenburg, Stockstadt am Main häufig an *Spartium*.

Hylesinus. Fabricius.

1. *H. crenatus* Fabr. Von **v. Heyden** I und II bei Frankfurt an Eschen nicht selten gefunden.

2. *H. Frazini* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gesammelt.

Polygraphus. Erichson.

1. *P. pubescens* Er. Im Schönen Busch bei Aschaffenburg einmal an Fichten in ungeheurer Zahl und zerstörend auftretend.

Scolytus. Geoffroy.

1. *S. Ratzenburgii* Janson. Von **Klghfr.** bei Darmstadt gesammelt, von **v. Heyden** sehr häufig aus Birkenholz bei Frankfurt erzogen.

2. *S. pygmaeus* Hbst. Einige Stück bei Ober-Lais gefunden.

3. *S. intricatus* Rtz. Bei Ober-Lais in Mehrzahl unter der Rinde von Eichenästen aufgefunden.

4. *S. multistriatus* Marsh. Einzeln von mir bei Ober-Lais gesammelt.

5. *S. Pruni* Ratzb. Ueberall gemein, besonders an Apfelholz.

6. *S. rugulosus* Ratzb. Wie der Vorige, an Zwetschen- und Pflaumenbäumen.

7. *S. Carpini* Er. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gefunden.

Xyloterus. Erichson.

1. *X. domesticus* Linn. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** in Mehrzahl an vom Main angeschwemmtem Holze gesammelt.

2. *X. lineatus* Oliv. Im ganzen Gebiete nicht selten.

Crypturgus. Erichson.

1. *C. pusillus* Gyll. Allenthalben häufig unter Kiefernrinde.

Cryphalus. Erichson.

1. *C. Tiliae* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gefunden.

2. *C. Fagi* Nordl. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von mir nicht selten bei Ober-Lais unter der Rinde dünner Buchenäste gesammelt.

3. *C. Piceae* Ratzb. Nach **Klghfr.** bei Darmstadt vorkommend.

4. *C. Abietis* Ratzb. Bei Ober-Lais häufig an warmen Sommerabenden umherschwärmend.

Bostrychus. Fabricius.

1. *B. typographus* Linn. Nach **Oechsner** bei Aschaffenburg vorkommend.

2. *B. stenographus* Duft. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt gefunden.

3. *B. Laricis* Fabr. Ueberall gemein unter der Rinde geschlagener Kiefern. Die Var. *suturalis* Gyll wurde von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von mir bei Ober-Lais beobachtet und gehören dazu solche Exemplare, welche aus Mangel an Nahrung sich nicht kräftig entwickeln konnten.

4. *B. bispinus* Ratzb. Ueberall, wo die Waldrebe (*Clematis vitalba*) sich findet, gemein.

5. *B. micrographus* Gyll. Bei Seligenstadt einzeln.

6. *B. curvidens* Grm. Von **Klghfr.** bei Darmstadt gesammelt.

7. *B. chalcographus* Linn. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** aufgefunden.

8. *B. bidens* Fabr. Im Spessart von Dr. **Doebner** gesammelt.

9. *B. autographus* Rtzb. Bei Darmstadt von **Klghfr.** gefunden.

10. *B. villosus* Fbr. Im ganzen Gebiete, manchmal in großer Zahl in alten Eichen.

11. *B. bicolor* Hbst. Im ganzen Gebiet nicht selten.

12. *B. dispar* Fabr. Wie der Vorige.

13. *B. monographus* Fbr. Wie der Vorige, häufiger.

14. *B. dryographus* Er. Bei Aschaffenburg und Seligenstadt einzeln, bei Ober-Lais nicht selten in Kirschbäumen.

15. *B. Saxesenii* Ratzb. Ueberall im Gebiet nicht selten.

Platypus. Herbst.

1. *P. cylindrus* Fabr. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt und Soden von **v. Heyden II** aufgefunden.

Cerambycidae.

Spondylis. Fabricius.

1. *S. buprestoides* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten.

Ergates. Serville.

1. *E. faber* Linn. Bei Babenhausen von mir, bei Aschaffenburg von **Oechsner** einzeln gefunden. Im Odenwald, z. B. bei Beerfelden, ist der Käfig häufig.

Aegosoma. Serville.

1. *A. scabricorne* Fabr. Bei Babenhausen habe ich den Käfer in Mehrzahl an alten Buchen gefunden; auch bei Frankfurt von **v. Heyden**

in Buchen beobachtet. Von Dr. **Doebner** wurde er bei Aschaffenburg in der Italienischen Pappel angetroffen und daraus erzogen. (Vgl. Berliner entomolog. Zeitschrift von 1862, S. 64 ff.)

Prionus. Geoffroy.

1. *P. coriarius* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

Cerambyx. Linné.

1. *C. heros* Fabr. Durchs ganze Gebiet häufig.
2. *C. cerdo* Linn. Wie der Vorige.

Purpuricenus. Serville.

1. *P. Koehleri* Linn. In Rheinhessen nicht selten; auch in der Bergstraße, bei Zwingenberg, Weinheim beobachtet.

Aromia. Serville.

1. *A. moschata* Linn. Ueberall an alten Weiden nicht selten.

Callidium. Fabricius.

1. *C. femoratum* Linn. Bei Seligenstadt einigemal von mir, bei Aschaffenburg einmal von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt einmal von **v. Heyden II** aufgefunden.

2. *C. violaceum* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.

3. *C. dilatatum* Payk. Ein Stück bei Gedern von Dr. **Bose** gefunden.

4. *C. sanguineum* Linn. Bei Darmstadt nicht selten, bei Seligenstadt einzeln vorkommend.

5. *C. Alni* Linn. Bei Darmstadt von Advocat **Hoyer** in Mehrzahl, bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Frankfurt von **v. Heyden I** gesammelt.

6. *C. rufipes* Fabr. Bei Seligenstadt (**Scriba**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**), Frankfurt (**v. Heyden I**) vorkommend. Selten.

7. *C. variabile* Linn. Ueberall häufig.

Hylotrupes. Serville.

1. *H. bajulus* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

Tetropium. Kirby.

1. *T. luridum* Linn. Im Taunus von **v. Heyden II**, bei Kirschberg von **v. Heyden I**, bei Ober-Lais von mir in Mehrzahl unter der Rinde gefällter Lärchen gesammelt.

2. *T. fuscum* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden I**, bei Aschaffenburg und im Spessart von Dr. **Doebner** gefunden.

Nothorhina. Redtenbacher.

1. *N. muricata* Schh. Von dieser Seltenheit hat Oberförster **Haberkorn** zu Ortenberg ein Exemplar im Holzhof zu Darmstadt und Gremmers ein Exemplar im Frankfurter Wald aufgefunden.

Aseum. Eschscholtz.

1. *A. striatum* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.

Criocephalus. Mulsant.

1. *C. rusticus* Linn. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von Dr. **Bose** bei Ortenberg einzeln gesammelt.

Hesperophanes. Mulsant.

1. *H. pallidus* Oliv. Im Holzhohe zu Darmstadt wurde der Käfer in früheren Jahren mehrfach von **Klghfr.** und **Reifsig** gesammelt. Ich habe ein Stück bei Babenhausen und eines bei Seligenstadt gefunden.

Clytus. Fabricius.

1. *C. detritus* Linn. Im Süden des Gebietes weniger selten als im Norden.
2. *C. arcuatus* Linn. Allenthalben nicht selten.
3. *C. tropicus* Panz. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** sehr einzeln gefunden. Herr **v. Heyden** hat ihn nicht selten aus altem Holz erzogen.
4. *C. arietis* Linn. Im Süden des Gebietes häufig auf Blüten, im Norden einzelner.
5. *C. antilope* Illig. Ein Exemplar habe ich bei Ortenberg an einer alten Weide gefunden.
6. *C. Verbasci* Linn. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten nicht selten, auf Blüten.
7. *C. massiliensis* Linn. Bei Auerbach von **v. Heyden I**, auf dem Kühkopf bei Erfelden von Advocat **Heyer** in Mehrzahl gesammelt.
8. *C. plebejus* Fabr. Bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Frankfurt und Bergen von **v. Heyden** einzeln gefunden.
9. *C. mysticus* Linn. Im ganzen Gebiet, gerade nicht häufig.

Cartallum. Serville.

1. *C. ebulinum* Linn. Von General **Klghfr.** bei Butzbach aufgefunden.

Obrium. Latreille.

1. *O. cantharinum* Linn. Bei Frankfurt von **v. Heyden** sehr einzeln erzogen, bei Ortenberg ein Stück von Dr. **Bose**, bei Hirzenhain eines von mir gefunden.
2. *O. brunneum* Fabr. Im ganzen Gebiet vorkommend; bei Oberlals auf blühenden Fichten nicht selten.

Anisarthron. Redtenbacher.

1. *A. barbipes* Charp. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** und Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **Gremmers**, bei Bockenheim von Dr. **M. Schmidt**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** und bei Ortenberg von Dr. **Bose**, überall nur sehr einzeln, aufgefunden.

Gracilia. Serville.

1. *G. pygmaea* Fabr. In ganzen Gebiete, manchmal in großer Anzahl an alten Reifen und Weidenkörben.

Stenopterus. Olivier.

1. *S. rufus* Linn. Bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Steinbockenheim in Rheinhessen von mir gefunden.

Callimus. Mulsant.

1. *C. cyaneus* Fabr. Von **v. Heyden** nicht selten aus Waldholz erzogen.

Dorcadion. Dalman.

1. *D. fuliginator* Linn. In Rheinhessen häufig, bei Frankfurt, Wiesbaden, Flörsheim auch von **v. Heyden** gefunden.

2. *D. atrum* Illig. Ein von Graf **Jenison** bei Heidelberg gefundenes Stück befindet sich in der Sammlung **v. Heyden's**.

Lamia. Fabricius.

1. *L. textor* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

Monochammus. Latreille.

1. *M. galloprovincialis* Oliv. Einige Stücke hat **v. Heyden II** aus Kiefernholz erzogen, welches aus dem Frankfurter Wald war.

Astynomus. Stephens.

1. *A. aedilis* Linn. Ueberall gemein.

Liopus. Serville.

1. *L. nebulosus* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten, besonders an Hainbuchen, von mir aber auch an Apfelbäumen beobachtet.

Exocentrus. Mulsant.

1. *E. balteatus* Linn. Bei Darmstadt nicht selten in Linden, bei Frankfurt von **v. Heyden I** ebenfalls aus Lindenholz erzogen, bei Mombach von **v. Heyden** einmal an Ulmen gefunden, bei Seligenstadt fand ich den Käfer nur sehr einzeln.

Pogonocherus. Latreille.

1. *P. fascicularis* Panz. Durchs ganze Gebiet verbreitet, gerade nicht selten.

2. *P. hispidus* Linn. Von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg gefunden.

3. *P. pilosus* Fabr. Im Süden des Gebietes an manchen Orten, z. B. Alsbacher Schloß, nicht selten an Epheu.

4. *P. ovalis* Gyll. Bei Darmstadt von **Klghfr.** an dünnen Kiefern- zweigen, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Seligenstadt und Dietzenbach einzeln von mir gefunden.

5. *P. multipunctatus* Georg. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir bei Ober-Lais von Eichen geklopft.

Mesosa. Serville.

1. *M. curculionoides* Linn. Im Süden des Gebietes, bei Seligenstadt, Dietzenbach und in der Bergstrasse einzeln von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden. Herr **v. Heyden** hat den Käfer in grosser Anzahl aus Eichen und Buchen gezogen.

2. *M. nubila* Oliv. Bei Seligenstadt einzeln von mir gefunden, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**; von **v. Heyden** häufig aus Buchen gezogen.

Anaesthetis. Mulsant.

1. *A. testacea* Fabr. Bei Seligenstadt und im Odenwald von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt, Soden und Ems von **v. Heyden** I, bei Cronthal von Dr. **Schmidt** gefunden.

Agapanthia. Serville.

1. *A. angusticollis* Schh. Bei Nidda von mir, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** aufgefunden.

2. *A. Cardui* Linn. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg gesammelt.

3. *A. violacea* Fabr. Bei Worms von Dr. **Nebel**, bei Friedberg von Dr. **Renner** gefunden.

Saperda. Fabricius.

1. *S. carcharias* Linn. Im ganzen Gebiete, im Süden desselben häufiger; im Vogelsberg noch nicht aufgefunden.

2. *S. scalaris* Linn. Durchs ganze Gebiet verbreitet, nicht häufig.

3. *S. Seydlii* Fröhlich. Von **v. Heyden** in Mehrzahl aus Aspenholz gezogen.

4. *S. populnea* Linn. Ueberall häufig.

Polyopsia. Mulsant.

1. *P. praeusta* Linn. Allenthalben häufig an Hasselsträuchern.

Menesia. Mulsant.

1. *M. bipunctata* Zubk. Im Schwanheimer Wald von **v. Twardowsky** und **Gerlach** aus Frankfurt mehrfach an der Blattunterseite von *Rhamnus frangula* gefunden.

Stenostola. Redtenbacher.

1. *S. nigripes* Fabr. Bei Darmstadt von Advocat **Hoyer** (an Linden), bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, im Isenburger Wald von **v. Heyden** I, bei Frankfurt von **Lindheimer** und bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.

Oberea. Mulsant.

1. *O. oculata* Linn. Im Süden des Gebietes an manchen Orten, Babenhausen, Aschaffenburg, nicht selten.

2. *O. pupillata* Schh. Bei Salzhausen von Dr. **Nebel**, bei Giefßen von **Zimmer** gefunden.

3. *O. erythrocephala* Fabr. Bei Darmstadt von **Höpfner** und mir, bei Mombach von **v. Heyden II**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gesammelt.

4. *O. linearis* Linn. Von mir bei Seligenstadt einmal in Mehrzahl an Hafseln gefunden, in deren dünnen Zweigen sich die Larven befanden; bei Dietzenbach einzeln gesammelt. Auf dem Röderberg bei Frankfurt wurde der Käfer von **v. Heyden**, **Jaennicke** und **M. Schmidt** ebenfalls auf Hafseln nicht selten gesammelt.

Phytoecia. Mulsant.

1. *P. Jourdani* Muls. Bei Mombach von Superintendent **Schmitt** in Mainz und **Stern** in Frankfurt aufgefunden.

2. *P. ephippium* Fabr. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von **Oechsner** und Dr. **Doebner**, bei Frankfurt und Soden von **v. Heyden II** gesammelt.

3. *P. Solidaginis* Bach. Bei Frankfurt von **v. Heyden** auf *Tanacetum* gefunden, von **Muhlig** daselbst aus *Artemisia* erzogen. Hauptmann **Fuhr** fand den Käfer auch bei Friedberg.

4. *P. cylindrica* Linn. Im Sodener Wald bei Ems von **v. Heyden I** aufgefunden.

5. *P. nigricornis* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, auf der Bieberer Höhe von **v. Heyden** auf *Echium* gefunden.

6. *P. virescens* Fabr. Im ganzen Gebiet, im Süden weniger selten, als im Norden; bei Frankfurt von **v. Heyden** auf *Echium* und *Cynoglossum* beobachtet.

Necydalis. Linné.

1. *N. major* Linn. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** und Dr. **Doebner** an Buchen, bei Frankfurt von **v. Heyden I** u. II und **Stern** an Eichen und Buchen gefunden. Bei Ober-Lais fand ich ein Weibchen, während es Eier an eine hohle Buche ablegte.

2. *N. Salicis* Muls. Bei Frankfurt von **v. Heyden II**, **M. Schmidt**, **Steitz** mehrfach, von mir mehrere Stück bei Friedberg an Weiden aufgefunden.

3. *N. minor* Linn. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** häufig an Fichten gefunden; **v. Heyden** hat den Käfer aus Buchenholz erzogen.

4. *N. umbellatarum* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten auf Blüten, besonders auf *Spiraeen*.

Rhamnusium. Latreille.

1. *R. Salicis* Fabr. Im ganzen Gebiet, im Süden weniger selten.

Rhagium. Fabricius.

1. *R. mordax* Fabr. Im ganzen Gebiet nicht selten.

2. *R. inquisitor* Fabr. Wie der Verige, häufiger.
3. *R. indagator* Linn. Ueberall häufig an Kiefern.
4. *R. bifasciatum* Fabr. Wie der Vorige.

Toxotus. Serville.

1. *T. cinctus* Fabr. Ein Stück, welches bei Kissingen von Herrn **Wiedergesess** gefangen wurde, befindet sich in **v. Heyden's** Sammlung.
2. *T. cursor* Linn. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** aufgefunden.
3. *T. meridianus* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.
4. *T. Quercus* Götz. Bei Friedberg von Dr. **Renner** und Hauptmann **Fuhr**, bei Ober-Lais von mir einzeln gefunden (an Eichen).

Pachyta. Serville.

1. *P. quadrimaculata* Linn. Soll in der Bergstrasse bei Auerbach vorkommen.
2. *P. octomaculata* Fabr. Im ganzen Gebiet häufig.
3. *P. collaris* Linn. Wie der Vorige, noch häufiger.

Strangalia. Serville.

1. *S. aurulenta* Fabr. In **v. Heyden's** Sammlung befindet sich ein bei Reichelsheim im Odenwald gefangenes Stück. Dr. **Doebner** hat zwei Stück bei Aschaffenburg, **v. Heyden** I eines bei Schlangenbad gefunden.
2. *S. quadrifasciata* Linn. Im Süden des Gebietes weniger selten, als im Norden desselben.
3. *S. villica* Fbr. = *revestita* Linn. Bei Darmstadt von Advocat **Heyer**, bei Seligenstadt von mir (Pappeln), bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden** (Buchen) einzeln gesammelt. Dr. **M. Schmidt** hat den Käfer bei Frankfurt an einer Pappel gefunden. Herr Hauptmann **v. Heyden** fand eine sehr schöne Varietät (*S. discicollis* Heydn), bei welcher Kopf, Beine und Hinterleib bis aufs vorletzte Segment, welches roth ist, schwarz sind und das Halsschild eine länglich viereckige, hinten etwas breitere, an die Basis anstossende schwarze Makel hat.
4. *S. atra* Fabr. Im Süden des Gebietes weniger selten, als im Norden desselben.
5. *S. armata* Hbst. Bei Seligenstadt, Aschaffenburg, im Taunus nicht selten, in Oberhessen nur einzeln vorkommend.
6. *S. annularis* Fabr. Von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** auf dem Kuhkopf bei Erfelden einzeln gesammelt.
7. *S. attenuata* Linn. Bei Worms von Dr. **Nebel**, auf dem Kuhkopf von **Klghfr.** und Advocat **Heyer**, bei Auerbach von **v. Heyden** I, im Odenwald von **Wider**, bei Frankfurt von **v. Heyden** II gefunden.
8. *S. nigra* Fabr. Im ganzen Gebiet nicht selten.
9. *S. bifasciata* Müller. Ueberall häufig.
10. *S. melanura* Linn. Wie die Vorige.

Leptura. Linné.

1. *L. testacea* Linn. Allenthalben gemein.
2. *L. scutellata* Fabr. Im ganzen Gebiet an Buchen nicht selten.
3. *L. tomentosa* Fabr. Im Süden des Gebietes an manchen Orten, besonders in Rheinhessen, nicht selten.
4. *L. sanguinolenta* Linn. Nach Dr. **Nebel** bei Darmstadt vorkommend.
5. *L. maculicornis* De Geer. In der Bergstrafse (Auerbach) von Advocat **Heyer**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr**, bei Salzhausen von Dr. **Nebel** aufgefunden.
6. *L. livida* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.
7. *L. erythroptera* Hagenb. Von Dr. **Haag** bei Isenburg (an Eichen) einigemal, von **v. Heyden** einmal bei Wiesbaden und von **Zimmer** einmal bei Marburg gefunden.

Anoplodera. Mulsant.

1. *A. sexguttata* Fabr. Bei Seligenstadt, Babenhausen und in der Bergstrafse von mir, bei Lorsch und Cronthal von **v. Heyden** einzeln gesammelt.
2. *A. rufipes* Schaller. Ein Stück bei Seligenstadt von mir, eins bei Ems von **Stern** aufgefunden.

Grammoptera. Serville.

1. *G. laevis* Fabr. Ueberall häufig.
2. *G. quadriguttata* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir gefunden.
3. *G. analis* Panz. Bei Frankfurt und Cronthal von **v. Heyden** mehrfach gesammelt.
4. *G. ruficornis* Fabr. Allenthalben gemein.
5. *G. praeusta* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden** aus Waldholz erzogen, bei Ober-Lais einige Stücke von mir auf Weifsdornblüthe gefangen.

Chrysomelinae.

Orsodacna. Latreille.

1. *O. nigriceps* Latr. und einige Varietäten bei Seligenstadt von mir, im Taunus von **v. Heyden**, bei Cronthal von Dr. **M. Schmidt** einzeln gesammelt.

Donacia. Fabricius.

1. *D. crassipes* Fabr. Von **Klghfr.** bei Darmstadt aufgefunden.
2. *D. bidens* Oliv. Bei Darmstadt von **Höpfner**, bei Bürgel von **v. Heyden**, bei Seligenstadt von mir nicht selten gesammelt.
3. *D. dentata* Hoppe. Bei Seligenstadt einigemal von mir, bei Heidelberg von **Jenison** gefunden.

4. *D. dentipes* Fabr. Ueberall im Gebiet häufig.
5. *D. Lemnae* Fabr. Im Süden des Gebietes häufiger als im Norden.
6. *D. Sagittariae* Fabr. Ueberall häufig.
7. *D. obscura* Gyll. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** aufgefunden.
8. *D. brevicornis* Ahr. Bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt häufig, im Vogelsberg einzeln von mir gefunden.
9. *D. thalassina* Germ. Bekannte Fundorte im Gebiete sind : Darmstadt (**Höpfner**), Frankfurt (**v. Heyden**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**), Ober-Lais (**Scriba**).
10. *D. impressa* Payk. Wie die Vorige.
11. *D. sericea* Linn. und Var. *violacea* Gyll. Im ganzen Gebiet nicht selten.
12. *D. nigra* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gefunden.
13. *D. discolor* Hoppé. Im ganzen Gebiete häufig.
14. *D. affinis* Kunze. Bei Seligenstadt und Frankfurt nicht selten; die Var. *rustica* Kunze aufer an den genannten Orten auch bei Ober-Lais vorkommend.
15. *D. semicuprea* Panz. Bei Seligenstadt, Aschaffenburg, Bürgel und Rumpenheim nicht selten.
16. *D. Menyanthidis* Fabr. Im Süden des Gebietes an manchen Orten, z. B. Seligenstadt häufig.
17. *D. linearis* Hoppé. Ueberall gemein.
18. *D. Typhae* Brahm. Bei Seligenstadt, Aschaffenburg und Bürgel einzeln.
19. *D. fennica* Payk. Einmal vor langer Zeit ein Stück von **v. Heyden** I bei Frankfurt gefunden.
20. *D. Hydrocharidis* Fabr. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** in Mehrzahl gesammelt.

Zeugophora. Kunze.

1. *Z. subspinosa* Fabr. Im ganzen Gebiet nicht häufig.
2. *Z. scutellaris* Suffr. Bei Frankfurt von **v. Heyden** auf Weiden, Pappeln und Erlen in Mehrzahl gesammelt.
3. *Z. flavicollis* Marsh. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** einzeln aufgefunden.

Lema. Fabricius.

1. *L. puncticollis* Curt. Bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir, bei Frankfurt und Königstein von **v. Heyden** sehr einzeln aufgefunden.
2. *L. cyanella* Linn. Im Süden des Gebietes häufiger, als im Norden desselben.
3. *L. Erichsonii* Suffr. Bei Seligenstadt und Frankfurt einzeln, bei Ober-Lais nicht selten.

4. *L. flavipes* Suffr. Bei Heidelberg von **v. Heyden I**, bei Isenburg von **Dr. Haag**, bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von **Dr. Doebner** sehr einzeln gefunden.

5. *L. melanopa* Linn. Ueberall häufig.

Crioceris. Geoffroy.

1. *C. meridigera* Linn. Ueberall gemein auf Lilien.

2. *C. brunnea* Fabr. Im ganzen Gebiet auf Maiblumen nicht selten.

3. *C. duodecimpunctata* Linn. Im Süden des Gebietes häufig auf Spargel.

4. *C. Asparagi* Linn. Wie die Vorige.

Clythra. Laicharting.

1. *C. (Labidostomis) tridentata* Linn. Bei Darmstadt von **Dr. Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden I** auf Birken, bei Herchenhain im Vogelsberg von mir aufgefunden.

2. *C. (Labid.) humeralis* Schneid. Bei Lorsch von **v. Heyden I**, bei Seligenstadt von mir je ein Stück, bei Aschaffenburg von **Dr. Doebner** in Mehrzahl gesammelt.

3. *C. (Labid.) axillaris* Lac. Bei Harxheim in Rhein Hessen einmal mehrfach von mir gefunden.

4. *C. (Labid.) longimana* Linn. Bei Seligenstadt nicht selten.

5. *C. (Lachnaea) longipes* Fabr. Von **Carl Stern** von Frankfurt 5 Exemplare auf dem Johannisberg bei Nauheim gefunden.

6. *C. (in specie) quadripunctata* Linn. Ueberall häufig.

7. *C. (in spec.), V.? quadrisignata* Märk. Bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir, bei Frankfurt und Soden von **v. Heyden** aufgefunden. Ich fand den Käfer an Eichen, Schlehen und Buchen fressend, aber stets nur in der Nähe von Colonieen der *Fornica rufa*; Herr **v. Heyden I** hat die Puppengehäuse in solchen Colonieen gefunden.

8. *C. (in spec.) laeviuscula* Ratzb. Im ganzen Gebiet häufig.

9. *C. (Gynandrophthalma) cyanea* Fabr. Ueberall gemein.

10. *C. (Gynandr.) affinis* Illig. Bei Königstein von **v. Heyden** auf Hafseln nicht häufig gefunden.

11. *C. (Gynandr.) aurita* Linn. Von **Dr. Nebel** bei Darmstadt, von **Dr. Doebner** bei Aschaffenburg gesammelt.

12. *C. (Cheilotoma) bucephala* Fabr. Bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** aufgefunden.

13. *C. (Coptocephala) scopolina* Linn. Bei Darmstadt von Advocat **Heyer**, bei Mombach von **v. Heyden** auf *Pseudocanum oreoselinum* häufig gefunden.

14. *C. (Coptoc.) quadrimaculata* Linn. Bei Darmstadt von Advocat **Heyer**, bei Offenbach und Mombach von **v. Heyden**, bei Aschaffenburg von **Dr. Doebner** gesammelt.

Lamprosoma. Kirby.

1. *L. concolor* Sturm. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Jugenheim in der Bergstrafse sehr häufig an Epheu gesammelt.

Eumolpus. Kugelann.

1. *E. obscurus* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.
2. *E. Vitis* Fabr. Bei Frankfurt und Heidelberg von **v. Heyden I**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, in Rheinhessen von mir gefunden.

Pachnophorus. Redtenbacher.

1. *P. arenarius* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Aschaffenburg von **Oechsner**, in Rheinhessen von mir aufgefunden.

Cryptocephalus. Geoffroy.

1. *C. Coryli* Linn. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Schlitz von Apotheker **Wasle** aufgefunden.
2. *C. cordiger* Linn. Bei Frankfurt einmal von **v. Heyden I** gefunden.
3. *C. variegatus* Fabr. Von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg einzeln gesammelt.
4. *C. variabilis* Schneid. Bei Frankfurt zwei Exemplare von **v. Heyden I**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gefunden.
5. *C. sexpunctatus* Linn. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von **v. Heyden I** einmal bei Falkenstein aufgefunden.
6. *C. violaceus* Fabr. Bei Frankfurt, Soden und Königstein von **v. Heyden** auf *Hieracium*, von mir bei Vilbel, von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg gesammelt.
7. *C. sericeus* Linn. Bei Frankfurt einzeln von **v. Heyden** gefunden.
8. *C. aureolus* Suffr. Im ganzen Gebiete häufig.
9. *C. Hypochoeridis* Linn. Wie der Vorige.
10. *C. Pini* Linn. Im Odenwald von **Wider**, bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt und Mombach von **v. Heyden** gesammelt.
11. *C. nitens* Linn. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir in der Bergstrafse und bei Seligenstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt auf Birken gefunden.
12. *C. nitidulus* Gyll. Bei Ems einmal von **v. Heyden I** auf Hafseln aufgefunden.
13. *C. quadripustulatus* Gyll. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt ein Stück von **v. Heyden I** gefangen.
14. *C. Moraei* Linn. Ueberall häufig.
15. *C. flavipes* Fabr. Bei Seligenstadt, im Odenwald und Rheinhessen von mir, bei Frankfurt, Falkenstein und Ems von **v. Heyden** gesammelt.
16. *C. decempunctatus* Linn. und Var. *bothnicus* Linn. Von **v. Heyden** und Dr. **M. Schmidt** einzeln bei Frankfurt und Enkheim aufgefunden.
17. *C. fulcratus* Germ. Bei Seligenstadt sehr einzeln.

18. *C. marginatus* Fabr. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** und Dr. **Doebner**, bei Soden einmal von **v. Heyden I** gefunden.

19. *C. vittatus* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.

20. *C. bilineatus* Linn. Einzeln bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt und Falkenstein von **v. Heyden I** gesammelt.

21. *C. pygmaeus* Fabr. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt und Ems von **v. Heyden**, bei Ober-Lais von mir in Mehrzahl gefunden.

22. *C. minutus* Fabr. Bei Seligenstadt und Dietzenbach von mir, bei Frankfurt, Offenbach und Wisselsheim von **v. Heyden** gesammelt.

23. *C. Populi* Suffr. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** einzeln aufgefunden.

24. *C. pusillus* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Dietzenbach von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** einzeln, bei Frankfurt und Soden von **v. Heyden** häufig auf Eichen angetroffen; von Letzterem auch bei Ems gefunden.

25. *C. gracilis* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt und Mainz von **v. Heyden** auf Weiden gesammelt.

26. *C. Hübneri* Fabr. Bei Seligenstadt, Aschaffenburg und Frankfurt nicht selten.

27. *C. labiatus* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten, von **v. Heyden** auf Weiden und Birken, von mir auch auf Eichen beobachtet.

28. *C. digrammus* Suffr. Von Senator **v. Heyden** einmal bei Ems gefunden.

29. *C. Wasastjerna* Gyll. Bei Seligenstadt einzeln von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt einmal von **v. Heyden I** aufgefunden.

30. *C. geminus* Gyll. Im Süden des Gebietes an manchen Orten nicht selten.

31. *C. querceti* Suffr. Einmal bei Frankfurt von **v. Heyden I** gefangen.

32. *C. sexpustulatus* Rossi. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gefunden.

33. *C. bistrispunctatus* Grm. Bei Ems einmal von **v. Heyden I**, aufgefunden.

34. *C. bipunctatus* Linn. Im Süden des Gebietes weniger selten als im Norden. Die Varietät *lineola* Fabr. wurde von mir bei Dietzenbach, von **v. Heyden I** bei Frankfurt gefunden.

35. *C. bipustulatus* Fabr. Im ganzen Gebiet nicht selten.

Pachybrachys. Suffrian.

1. *P. hieroglyphicus* Fabr. Bei Seligenstadt und Dietzenbach nicht selten auf Weiden von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt und Hofheim von **v. Heyden** ebenfalls auf Weiden, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gesammelt.

2. *P. histrio* Oliv. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Dietzenbach von mir, bei Ems von **v. Heyden** gefunden.

Timarcha. Latreille.

1. *T. laevigata* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten.
2. *T. coriaria* Fabr. Wie die Vorige, noch häufiger.
3. *T. globosa* H. Schaeff. Von **v. Heyden** I auf dem Feldberg, von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg gefunden.
4. *T. metallica* Fabr. Einmal von Dr. **Doebner** im Spessart gefangen.

Chrysomela. Linné.

1. *C. staphylea* Linn. Ueberall gemein.
2. *C. purpurascens* Germ. Bei Falkenstein im Taunus einmal von **v. Heyden** I, auf der Rhön einmal von Dr. **Doebner** aufgefunden.
3. *C. varians* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.
4. *C. goettingensis* Linn. Im Süden des Gebietes häufiger als im Norden desselben.
5. *C. haemoptera* Linn. Allenthalben häufig.
6. *C. Gypsophilae* Küst. Drei Exemplare bei Frankfurt von **v. Heyden** I aufgefunden.
7. *C. sanguinolenta* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.
8. *C. marginalis* Dft. Im Süden des Gebietes, an manchen Orten, als Seligenstadt, Frankfurt nicht selten.
9. *C. limbata* Fabr. In Sandgegenden der Provinz Starkenburg kommt der Käfer nicht selten vor.
10. *C. carnifex* Fabr. Bei Frankfurt, Mombach, Lorsch (häufig) von **v. Heyden**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gefunden.
11. *C. coerulescens* Suffr. Bei Lorsch und Mombach nicht selten, bei Frankfurt einzeln von **v. Heyden** gesammelt.
12. *C. marginata* Linn. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln aufgefunden.
13. *C. analis* Linn. Bei Frankfurt vorkommend, jedoch selten.
14. *C. violacea* Panz. Im ganzen Gebiet häufig auf Menthen.
15. *C. Menthastri* Suffr. Bei Darmstadt von Advocat **Heyer**, bei Umstadt von mir gesammelt. Die Varietät *fulminans* Suffr. habe ich bei Seligenstadt gefunden. Bei Aschaffenburg wurde von Dr. **Doebner** der Käfer in *copula* mit einem Männchen von *Chrysomela polita* Linn. gefangen.
16. *C. graminis* Linn. Bei Darmstadt und Seligenstadt nicht selten, bei Frankfurt einzeln vorkommend.
17. *C. fastuosa* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten.
18. *C. americana* Linn. Einige Stücke bei Seligenstadt gefunden.
19. *C. cerealis* Linn. Ueberall häufig.
20. *C. polita* Linn. Wie die Vorige.
21. *C. lamina* Fabr. Von **Klgbfr.** bei Darmstadt, von Dr. **Bose** bei Ortenberg aufgefunden.
22. *C. fucata* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.
23. *C. quadrigemina* Suffr. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt und Gonzenheim von **v. Heyden** einzeln gesammelt.

24. *C. duplicata* Zenker. Einmal von mir bei Crumstadt aufgefunden.

25. *C. geminata* Payk. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** einzeln gesammelt. Ein Stück der Varietät *didymata* Scriba habe ich bei Seligenstadt gefunden.

26. *C. (Oreina) speciosa* Linn. Ein Exemplar von Dr. **Doebner** auf der Rhön gefunden.

27. *C. (Oreina) speciosissima* Scop. Bei Aschaffenburg einige Male von Dr. **Doebner** gefangen.

Lina. Redtenbacher.

1. *L. aenea* Linn. Ueberall im Gebiete häufig.

2. *L. collaris* Linn. Von Dr. **Nebel** bei Wichshausen gefunden.

3. *L. cuprea* Fbr. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von **v. Heyden I** bei Frankfurt und Hofheim im Taunus je einmal gefangen.

4. *L. lapponica* Linn. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Friedberg von mir aufgefunden.

5. *L. Populi* Linn. Ueberall häufig.

6. *L. Tremulae* Fabr. Wie die Vorige.

7. *L. longicollis* Suffr. Bei Frankfurt und Falkenstein von **v. Heyden**, bei Frankfurt und Ober-Lais häufig von mir gesammelt.

Gonioctena. Redtenbacher.

1. *G. rufipes* De Geer. Im ganzen Gebiete häufig.

2. *G. viminalis* Linn. Wie die Vorige.

3. *G. flavicornis* Suffr. Bei Frankfurt und Hofheim im Taunus von **v. Heyden**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.

4. *G. Triandrae* Suffr. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** mehrfach, bei Ober-Lais von mir einzeln gefunden.

5. *G. litura* Fabr. Ueberall im Gebiete häufig.

6. *G. quinquepunctata* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, auf *Sorbus aucuparia*, im hohen Vogelsberg von mir nicht selten gesammelt.

7. *G. pallida* Linn. Auf dem Feldberg von **v. Heyden II**, bei Ober-Lais und im Vogelsberg von mir aufgefunden.

Gastrophysa. Redtenbacher.

1. *G. Polygoni* Linn. Ueberall häufig.

Plagiodera. Redtenbacher.

1. *P. Armoraciae* Linn. Im ganzen Gebiete gemein.

Phaedon. Latreille.

1. *P. pyritosum* Oliv. Allenthalben nicht selten.

2. *P. sabulicola* Suffr. Bei Seligenstadt einige Male gefangen.

3. *P. Betulae* Linn. Im ganzen Gebiet häufig.
4. *P. Cochleariae* Fabr. Wie das Vorige, noch häufiger.
5. *P. concinnum* Steph. Von **v. Heyden** I bei Salzhausen, Wisselsheim, Traishorloff, von Dr. **Bose** bei Selters auf *Trigloch in maritimum* gesammelt.

Phratora. Redtenbacher.

1. *P. Vitellinae* Linn. Ueberall gemein.
2. *P. tibialis* Suffr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Gernsbach von **v. Heyden** I gefunden.
3. *P. vulgatissima* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.
4. *P. laticollis* Suffr. Einmal bei Frankfurt von **v. Heyden**, einmal bei Ober-Lais von mir aufgefunden.

Prasocuris. Latreille.

1. *P. aucta* Fabr. Ueberall häufig.
2. *P. marginella* Linn. Bei Darmstadt, Seligenstadt und Frankfurt nicht selten auf *Ranunculus aquaticus*.
3. *P. hannoverana* Fabr. Bei Darmstadt von **Reifsig**, bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gesammelt.
4. *P. Phellandrii* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.
5. *P. Beccabungae* Illig. Bei Seligenstadt und Frankfurt häufig.

Adimonia. Laicharting.

1. *A. Tanaceti* Linn. Ueberall gemein.
2. *A. rustica* Schall. Wie die Vorige.
3. *A. interrupta* Oliv. Bei Lorsch, Jugenheim und Mombach von **v. Heyden** nicht selten, bei Zwingenberg und Friedberg einzeln von mir gefunden.
4. *A. Capreae* Linn. Allenthalben gemein.
5. *A. sanguinea* Fabr. Bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.

Galleruca. Fabricius.

1. *G. Crataegi* Forster. Bei Crumstadt und Harxheim in Rheinhessen, bei Mombach und Frankfurt von **v. Heyden** gesammelt.
2. *G. lineola* Fabr. Im ganzen Gebiet nicht selten.
3. *G. calmariensis* Linn. Wie die Vorige, seltener.
4. *G. tenella* Linn. Bei Seligenstadt häufig.
5. *G. Sagittariae* Gyll. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, im hohen Vogelsberg von mir aufgefunden.
6. *G. Nymphaeae* Linn. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gefunden.
7. *G. Viburni* Payk. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** nicht selten, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gesammelt.

Agelastica. Redtenbacher.

1. *A. Alni* Linn. Ueberall gemein an Erlen.
2. *A. halensis*. Im ganzen Gebiet an *Galium* nicht selten.

Phyllobrotica. Redtenbacher.

1. *P. quadrimaculata* Linn. Auf dem Kuhkopf bei Erfelden häufig von Advocat **Heyer**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir gesammelt.

Luperus. Geoffroy.

1. *L. circumfusus* Mrsh. Von **Oechsner** bei Aschaffenburg einzeln aufgefunden.
2. *L. pinicola* Duftschm. Ueberall im Gebiete häufig.
3. *L. rufipes* Fabr. Bei Wolfskehlen in Mehrzahl gefunden.
4. *L. xanthopus* Duft. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** nicht selten aufgefunden.
5. *L. flavipes* Linn. Im Süden des Gebietes an manchen Orten, z. B. Seligenstadt, nicht selten.
6. *L. dispar* Kiesw. in lit. Bei Ober-Lais findet sich eine neue, noch unbeschriebene Art häufig an Schlehen, welche ich Herrn **Kiesewetter** mitgetheilt habe, und die von demselben vorläufig den Namen *Dispar* erhalten hat; die Männchen haben ein schwarzes Halsschild und sind denen von *rufipes* ähnlich, dagegen sind die Weibchen mit einem rothen Halsschild, denen von *flavipes* ähnlich.

Haltica. Geoffroy.

1. *H. (Graptodera) consobrina* Duftschm. Bei Ober-Lais einige Stücke aufgefunden.
2. *H. ampelophaga* Guér. Bei Frankfurt von **v. Heyden** auf *Epilobium* nicht selten gefunden.
3. *H. Lythri* Aubé. Bei Frankfurt von **v. Heyden** häufig auf Birkenausschlägen gesammelt.
4. *H. Erucae* Oliv. Im ganzen Gebiet häufig auf Eichen.
5. *H. Coryli*. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, in Rheinhessen von mir einzeln auf Hafseln gesammelt.
6. *H. oleracea* Linn. Ueberall gemein.
7. *H. pusilla* Duftschm. Bei Frankfurt, Königstein, Soden von **v. Heyden** auf *Epilobium* gefunden.
8. *H. (Linostota) mercurialis* Fabr. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von **v. Heyden** nicht selten auf dem Melibokus und Falkenstein auf *Mercurialis perennis* gefunden.
9. *H. (Crepidodera) rufipes* Linn. Von **v. Heyden** im Taunus und bei Nauheim (auf *Vicia* und *Epilobium*), von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir bei Ober-Lais einzeln gesammelt.

10. *H. nitidula* Linn. Bei Nauheim einmal von **v. Heyden** I, bei Ortenberg von **Dr. Bose**, bei Ober-Lais von mir auf Schlichen in Mehrzahl gefunden.

11. *H. versicolor* Kutsch. Bei Offenbach und Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ober-Lais von mir nicht selten gesammelt.

12. *H. smaragdina* Foudr. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, Lorsbach, Falkenstein auf *Salix caprea* gefunden.

13. *H. chloris* Foudr. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt vorkommend.

14. *H. Helvines* Linn. Ueberall gemein auf Weiden.

15. *H. pubescens* E. H. und Var. *Atropae* All. Ueberall wo *Belladonna* vorkommt häufig.

16. *H. transversa* Mrsh. Im ganzen Gebiet häufig.

17. *H. ferruginea* Scop. Wie die Vorige.

18. *H. femorata* Gyll. Einzeln bei Ober-Lais gesammelt.

19. *H. nigritula* Gyll. Bei Darmstadt von **Dr. Nebel**, bei Offenbach, Frankfurt, Griesheim a. M. von **v. Heyden** aufgefunden.

20. *H. Modeeri* Linn. Ueberall im Gebiet häufig.

21. *H. Salicariae* Payk. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von **Dr. Doebner**, bei Rumpenheim und Frankfurt von **v. Heyden** auf *Lysimachia vulgaris* gefunden.

22. *H. ventralis* Illig. Bei Seligenstadt von mir, bei Cronthal und Ems von **v. Heyden** einzeln gesammelt.

23. *H. (Podagrica) fuscipes* Fabr. Bei Speyer und Oberstein in der Pfalz von **v. Heyden** auf Malven, von **Dr. Bose** bei Ortenberg, von mir bei Ober-Lais einzeln aufgefunden.

24. *H. fuscicornis* Linn. Ueberall auf Malven gemein.

25. *H. (Phyllotreta) Armoraciae* Ent. Hft. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von **v. Heyden** I einmal bei Frankfurt gefunden.

26. *H. flexuosa* Illig. Bekannte Fundorte im Gebiete sind: Darmstadt (**Klghfr.**), Frankfurt (**v. Heyden**), Ober-Lais (**Scriba**).

27. *H. Brassicae* Fabr. Im ganzen Gebiet häufig.

28. *H. ochripes* Curt. Wie die Vorige, aber selten.

29. *H. sinuata* Redt. Durchs ganze Gebiet nicht selten.

30. *H. undulata* Kutsch. Bei Frankfurt von **v. Heyden** einzeln aufgefunden.

31. *H. nemorum* Linn. Allenthalben gemein.

32. *H. vittula* Redt. Wie die Vorige, weniger häufig.

33. *H. atra* Ent. Hft. Wie die Vorige.

34. *H. obscurella* Illig. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, Soden, Rüdesheim, von **Dr. Doebner** bei Aschaffenburg gefunden.

35. *H. melaena* Foudr. Zwei Stücke von **v. Heyden** I bei Frankfurt aufgefunden.

36. *H. Lepedii* Ent. Hft. Ueberall häufig.

37. *H. antennata* Ent. Hft. Bei Frankfurt, Rumpenheim, Mombach von **v. Heyden**, in Rheinhessen von mir häufig auf wilder *Reseda* gesammelt.

38. *H. (Batophila) Rubi* Payk. Bei Hofheim und Cronberg im Taunus von **v. Heyden** auf *Rubus fruticosus* nicht selten, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gefunden.

39. *H. (Aphthona) Cyparissiae* Ent. Hft. Im ganzen Gebiet häufig.

40. *H. lutescens* Gyll. Bei Rumpenheim von **v. Heyden** auf *Lythrum* gesammelt.

41. *H. coerulea* Payk. Im ganzen Gebiet nicht selten.

42. *H. hilaris* Allard. Bei Frankfurt und Gießen von **v. Heyden**, bei Ober-Lais von mir gefunden.

43. *H. venustula* Kutsch. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** häufig gesammelt.

44. *H. cyanella* Redt. Ueberall im Gebiet nicht selten.

45. *H. violacea* Ent. Hft. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir bei Erfelden auf dem Kühkopf in Mehrzahl gesammelt.

46. *H. herbigrada* Curt. Durchs ganze Gebiet nicht selten auf *Campanula*.

47. *H. (Balanomorpha) rustica* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.

48. *H. Chrysanthemi* Ent. Hft. Im Süden des Gebietes bei Seligenstadt, in Rheinhessen (**Scriba**), Frankfurt, Bensheim, Griesheim (**v. Heyden**) vorkommend.

Longitarsus. Latreille.

1. *L. Echii* Ent. Hft. Einmal bei Frankfurt von Senator **v. Heyden** aufgefunden.

2. *L. obliteratus* Rosnh. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt und Bergen von **v. Heyden** auf *Origanum* einzeln gefunden.

3. *L. Anchusae* Payk. Im ganzen Gebiet auf *Cynoglossum*, *Echium*, *Pulmonaria* häufig.

4. *L. niger* Ent. Hft. Einmal bei Seligenstadt von mir, einmal bei Ems von **v. Heyden** I aufgefunden.

5. *L. parvulus* Payk. Bei Seligenstadt nicht selten von mir, bei Frankfurt und Soden von **v. Heyden** auf *Rubus* gesammelt.

6. *L. apicalis* Beck. Einige Stücke bei Seligenstadt gefunden.

7. *L. holsativus* Linn. Im ganzen Gebiet, nicht häufig.

8. *L. castaneus* Foudr. Einmal bei Frankfurt von **v. Heyden** aufgefunden.

9. *L. brunneus* Redt. Ueberall häufig.

10. *L. dorsalis* Fabr. Ein Stück bei Babenhausen von mir aufgefunden.

11. *L. Nasturtii* Fabr. Im ganzen Gebiet nicht selten.

12. *L. Verbasci* Panz. Wie der Vorige, auf Wollkraut.

13. *L. lateralis* Illig. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ober-Lais von mir in Mehrzahl gesammelt.

14. *L. atricillus* Gyll. Bei Seligenstadt und Ober-Lais nicht selten.

15. *L. melanocephalus* Gyll. Bei Seligenstadt einzeln von mir, bei Frankfurt und Rüdesheim von **v. Heyden** gesammelt.

16. *L. piciceps* Foudr. Im ganzen Gebiet nicht selten.
17. *L. abdominalis* Allard. Bei Offenbach an Schilf einige Exemplare von **v. Heyden** gefunden.
18. *L. Ballotae* Marsh. Durchs ganze Gebiet verbreitet.
19. *L. pusillus* Gyll. Wie der Vorige.
20. *L. femoralis* Marsh. Wie der Vorige.
21. *L. tabidus* Fabr. Bei Frankfurt und Enkheim von **v. Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais von mir aufgefunden. Nicht häufig.
22. *L. rubiginosus* Foudr. Bei Offenbach von **v. Heyden** I einmal in Mehrzahl am Main unter Weidengebüsch gefunden.
23. *L. ochroleucus* Marsh. Bei Frankfurt von **v. Heyden** gesammelt.
24. *L. pellucidus* Foudr. Von **v. Heyden** bei Frankfurt und Soden gefunden.
25. *L. ferrugineus* Foudr. Zwei Stücke bei Frankfurt von **v. Heyden** I aufgefunden.
26. *L. Teucriti* Allard. Bei Frankfurt, Gernsbach, Oberstein, Creutznach auf *Teucrium chamaedrys* von **v. Heyden** gesammelt.
27. *L. laevis* Duftschm. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, Soden, Königstein, Oberstein gefunden.

Plectroscelis. Redtenbacher.

1. *P. semicoerulea* Ent. Hft. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Frankfurt und Ems von **v. Heyden** aufgefunden.
2. *P. concinna* Marsh. Ueberall häufig.
3. *P. meridionalis* Foudr. Zwei Stücke bei Enkheim von **v. Heyden** gefunden.
4. *P. aridella* Payk. Allenthalben im Gebiet häufig.
5. *P. Sahlbergii* Gyll. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir, bei Griesheim a. M. einmal von **v. Heyden** I gefunden.
6. *P. Mannerheimii* Gyll. Einmal bei Frankfurt von **v. Heyden** I aufgefunden.
7. *P. aridula* Gyll. Im ganzen Gebiet nicht selten.
8. *P. confusa* Bohem. Einzeln bei Frankfurt von **v. Heyden** I gesammelt.

Psylliodes. Latreille.

1. *P. Dulcamarae* E. H. Bei Seligenstadt (**Scriba**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**), Frankfurt (**v. Heyden**) nicht häufig auf *Solanum dulcamare*.
2. *P. chalcamera* Illig. Bei Frankfurt, Hofheim und Griesheim a. M. von **v. Heyden**, in Rheinhessen und bei Ober-Lais von mir auf Disteln gesammelt.
3. *P. Hyoscyami* Linn. Im ganzen Gebiet verbreitet.
4. *P. nigricollis* Marsh. Einmal bei Offenbach von **v. Heyden** I aufgefunden.

5. *P. nucea* Illig. Bei Hofheim ein Exemplar von **v. Heyden** I gefunden.
6. *P. chrysocephala* Ent. Hft. Ueberall häufig.
7. *P. cyanoptera* Illig. Ein Stück bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** aufgefunden.
8. *P. Napi* Ent. Hft. Einmal bei Frankfurt von **v. Heyden** I gefangen, einmal von mir bei Seligenstadt.
9. *P. fusiformis* Illig. Einige Exemplare bei Ober-Lais gefunden.
10. *P. cuprea* Ent. Hft. Zweimal von Senator **v. Heyden** bei Frankfurt aufgefunden.
11. *P. attenuata* Ent. Hft. Im Süden des Gebietes an manchen Orten nicht selten; **v. Heyden** hat den Käfer häufig an Hanf gefunden.
12. *P. Kunzei* Foudr. Bei Frankfurt einmal von Dr. **M. Schmidt**, bei Soden einmal von **v. Heyden** I aufgefunden.
13. *P. affinis* Payk. Ueberall häufig.
14. *P. rufilabris* Ent. Hft. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln von mir gesammelt.
15. *P. luteola* Müll. Bei Seligenstadt von mir, bei Offenbach, Rödelheim und Frankfurt von **v. Heyden** gefunden.

Dibolia. Latreille.

1. *D. occultans* Ent. Hft. Bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir, bei Königstein von **v. Heyden** auf *Origanum* einmal, bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.
2. *D. Försteri* Bach. Einmal bei Heidelberg, einzeln im Taunus von **v. Heyden** gesammelt.
3. *D. cryptocephala* Ent. Hft. Bei Frankfurt und Wisselsheim von **v. Heyden**, bei Ober-Lais von mir in Mehrzahl gefunden.
4. *D. Cynoglossi* Ent. Hft. Bei Seligenstadt einmal von mir, bei Oberstein in der Pfalz einmal von **v. Heyden** aufgefunden.
5. *D. rugulosa* Redt. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Zwingenberg in der Bergstraße von mir häufig an *Euphorbia*, von **v. Heyden** bei Mombach und Eberstadt häufig auf *Gnaphalium arenarium* und bei Bergen auf *Origanum* gesammelt.
6. *D. timida* Illig. Bei Frankfurt und Ems je einmal von **v. Heyden** I aufgefunden.

Apteropeda. Redtenbacher.

1. *A. globosa* Illig. Nach **Klghfr.** bei Darmstadt vorkommend.
2. *A. graminis* Ent. Hft. Im Süden des Gebietes an manchen Orten, Seligenstadt, Aschaffenburg, Frankfurt nicht selten.

Mniophila. Stephens.

1. *M. muscorum* Ent. Hft. Bei Heidelberg von Dr. **Haag**, bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ems von **v. Heyden** I gefunden.

Sphaeroderma. Stephens.

1. *S. testacea* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Seligenstadt von mir, bei Offenbach, Frankfurt und Rüdesheim von **v. Heyden** einzeln aufgefunden.

2. *S. Cardui* Gyll. Im ganzen Gebiet häufig.

Hispa. Linné.

1. *H. atra* Linn. Ueberall nicht selten.

Cassida. Linné.

1. *C. equestris* Fabr. Allenthalben häufig auf Disteln.

2. *C. hemisphaerica* Hbst. Bei Seligenstadt, Aschaffenburg, Frankfurt einzeln, bei Ober-Lais nicht selten. Herr **v. Heyden** fand bei Frankfurt zwei Stücke, bei welchen die Mitte des Hinterleibs schwarz ist (Var. *nigriventris* Heyden).

3. *C. austriaca* Fabr. Ein Stück wurde vor langer Zeit von Senator **v. Heyden** und eins Ende April von Hauptmann **v. Heyden** bei Frankfurt gefunden. Im Taunus hat H. Kaufmann **Wiegand** den Käfer in Mehrzahl gesammelt.

4. *C. murraea* Linn. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Offenbach und Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gesammelt.

5. *C. sanguinosa* Suffr. Im ganzen Gebiete, aber selten vorkommend.

6. *C. rubiginosa* Illig. Ueberall nicht selten.

7. *C. vibex* Linn. Wie die Vorige.

8. *C. denticollis* Suffr. Zweimal bei Frankfurt von **v. Heyden**, einmal bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden.

9. *C. chloris* Suffr. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** einzeln auf *Achillea millefolium* aufgefunden.

10. *C. stigmatica* Suffr. Im ganzen Gebiet häufig.

11. *C. sanguinolenta* Fabr. Wie die Vorige.

12. *C. lucida* Suffr. Ein Stück von Dr. **Haag** bei Frankfurt, von Superintendent **Schmitt** bei Mainz aufgefunden. Bei Ems ist der Käfer nicht selten auf *Cucubalus*.

13. *C. margaritacea* Schall. Bei Seligenstadt, Frankfurt und Soden nicht selten, bei Ober-Lais sehr einzeln.

14. *C. subreticulata* Suffr. Ein Stück bei Darmstadt gefunden.

15. *C. nobilis* Linn. Ueberall häufig.

16. *C. oblonga* Illig. Im ganzen Gebiet, aber selten.

17. *C. obsoleta* Illig. Nirgends im Gebiete selten.

18. *C. ferruginea* Fabr. Wie die Vorige.

19. *C. nebulosa* Linn. Ueberall, zuweilen in großer Menge vorkommend.

Erotylidae.

Engis. Fabricius.

1. *E. sanguinicollis* Fabr. Bei Frankfurt von v. Heyden II, bei Ober-Lais von mir, bei Giefsen von Laubenheimer in einzelnen Exemplaren aufgefunden.

2. *E. humeralis* Fabr. Ueberall häufig in Baumschwämmen.

3. *E. rufifrons* Fabr. Bei Frankfurt einzeln von v. Heyden, bei Harxheim in Rheinhessen von mir am ausschwitzenden Saft von Bäumen in Mehrzahl gesammelt.

Triplax. Paykull.

1. *T. russica* Linn. Im ganzen Gebiet häufig.

2. *T. ruficollis* Steph. Bei Ortenberg von Dr. Bose gefunden.

3. *T. aenea* Payk. Einige Exemplare von v. Heyden bei Kirschberg aufgefunden.

Tritoma. Fabricius.

1. *T. bipustulata* Fabr. Allenthalben im Gebiete nicht selten in Baumschwämmen.

Coccinellidae.

Hippodamia. Mulsant.

1. *H. tredecimpunctata* Linn. Im ganzen Gebiet häufig.

2. *H. septemmaculata* De Geer. Bei Ober-Lais einzeln.

Coccinella. Linné.

1. *C. novemdecimpunctata* Linn. Im Süden des Gebietes häufiger, als im Norden desselben.

2. *C. mutabilis* Scriba. Ueberall häufig.

3. *C. oblitterata* Linn. Wie die Vorige.

4. *C. bothnica* Payk. Bei Frankfurt von v. Heyden, bei Aschaffenburg von Dr. Doebner einzeln aufgefunden.

5. *C. bipunctata* Linn. Allenthalben gemein.

6. *C. undecimnotata* Schneid. Bei Frankfurt, Soden und Mombach von v. Heyden einzeln gesammelt.

7. *C. marginepunctata* Schall. Bei Darmstadt von Advocat Heyer, bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt und Mombach von v. Heyden gefunden.

8. *C. impustulata* Linn. Ueberall gemein.

9. *C. quatuordecimpustulata* Linn. Im ganzen Gebiet häufig.

10. *C. variabilis* Illig. Wie die Vorige.

11. *C. hieroglyphica* Linn. Im Süden des Gebietes häufiger als im Norden desselben.

12. *C. quinquepunctata* Linn. Ueberall häufig.
13. *C. septempunctata* Linn. Wie die Vorige.

Halyzia. Mulsant.

1. *H. ocellata* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten.
2. *H. oblongoguttata* Linn. Wie die Vorige.
3. *H. tigrina* Linn. Bei Frankfurt und im Taunus von **v. Heyden** (auch die Var. *vigintiguttata* Linn.), bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** sehr einzeln aufgefunden.
4. *H. octodecimguttata* Linn. Durchs ganze Gebiet häufig.
5. *H. quatuordecimguttata* Linn. Wie die Vorige.
6. *H. decemguttata* Linn. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, von mir bei Friedberg einzeln gefunden.
7. *H. bis septemguttata* Schaller. Bei Seligenstadt einmal von mir, bei Aschaffenburg mehrmals von Dr. **Doebner** aufgefunden.
8. *H. sedecimguttata* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.
9. *H. duodecimguttata* Pod. Bei Seligenstadt, Dietzenbach und in der Bergstrafse von mir, bei Soden von **v. Heyden I** gesammelt.
10. *H. vigintiduopunctata* Linn. Ueberall häufig.
11. *H. quatuordecimpunctata* Linn. Wie die Vorige.

Micraspis. Redtenbacher.

1. *M. duodecimpunctata* Linn. Im ganzen Gebiet häufig.

Chilocorus. Leach.

1. *Ch. renipustulatus* Scriba. Im Süden des Gebietes häufiger, als im Norden.
2. *Ch. bipustulatus* Linn. Allenthalben häufig.

Exochomos. Redtenbacher.

1. *E. auritus* Scriba. Ueberall nicht selten.
2. *E. quadripustulatus* Linn. Wie der Vorige.

Hyperaspis. Redtenbacher.

1. *H. campestris* Hbst. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** einzeln gefunden.
2. *H. reppensis* Hbst. Durchs ganze Gebiet verbreitet, selten.

Epilachna. Chevrolat.

1. *E. undecimmaculata* Fabr. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt und Bergen von **v. Heyden**, stets an *Bryonia* und dann in Mehrzahl gefunden.
2. *E. globosa* Schneid. Ueberall sehr häufig.
3. *E. impunctata* Linn. Bei Falkenstein und Nauheim von **v. Heyden**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** gefunden.

Platynaspis. Redtenbacher.

1. *P. villosa* Foucr. Im ganzen Gebiet häufig.

Scymnus. Kugelann.

1. *S. quadrilunulatus* Illig. Auf Epheu am Alsbacher Schlofs und bei Ober-Lais von mir, bei Frankfurt und Gießen (Schmitte) von **v. Heyden** aufgefunden.
2. *S. Redtenbacheri* Muls. Ein Stück von **v. Heyden** I bei Frankfurt gefunden.
3. *S. biverrucatus* Panz. Durchs ganze Gebiet verbreitet, aber selten.
4. *S. nigrinus* Kugel. Im ganzen Gebiet, nicht selten.
5. *S. pygmaeus* Foucr. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** gesammelt.
6. *S. marginalis* Rossi. Bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir, bei Frankfurt und Ems von **v. Heyden** einzeln aufgefunden.
7. *S. Apetsii* Muls. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von mir bei Ober-Lais, von **v. Heyden** I bei Ems sehr einzeln gefunden.
8. *S. frontalis* Fbr. Ueberall häufig.
9. *S. Abietis* Payk. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Ober-Lais von mir häufig auf blühenden Fichten gesammelt.
10. *S. fasciatus* Foucr. Bei Lorsch von **v. Heyden** I häufig unter einer Blattlaus (*Aphis Sambuci*) gefunden.
11. *S. arcuatus* Rossi. In der Bergstrafse auf Epheu am Alsbacher Schlofs von mir, bei Aschaffenburg von **Oechsner** und Dr. **Doebner** gleichfalls an Epheu nicht selten aufgefunden.
12. *S. discoideus* Illig. Im ganzen Gebiet häufig.
13. *S. analis* Fabr. Bei Babenhausen von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** einzeln gesammelt.
14. *S. haemorrhoidalis* Hbst. Ueberall häufig.
15. *S. capitatus* Fabr. Im ganzen Gebiet nicht selten.
16. *S. ater* Kugel. Bei Seligenstadt einmal in Mehrzahl an einem alten Weidenstamm von mir, bei Frankfurt und Soden von **v. Heyden** gefunden.
17. *S. minimus* Payk. Im ganzen Gebiet häufig.

Rhizobius. Stephens.

1. *R. litura* Fabr. Ueberall sehr häufig.

Coccidula. Kugelann.

1. *C. scutellata* Hbst. Im Süden des Gebietes an manchen Orten an Schilf nicht selten.
2. *C. rufa* Hbst. Ueberall häufig.

Alexia. Stephens.

1. *A. globosa* Sturm. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** gefunden.

2. *A. pilifera* Müll. Bei Frankfurt und im Taunus von **v. Heyden** an Baumschwämmen gesammelt.

3. *A. pilosa* Panz. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg aufgefunden.

Corylophidae.

Sacium. Le Conte.

1. *S. pusillum* Gyll. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden** gesammelt.

Arthrolips. Wollaston.

1. *A. obscurus* Sahlbg. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** gefunden.

Sericoderus. Stephens.

1. *S. lateralis* Gyll. Im ganzen Gebiet nicht selten, von mir auch in den Nestern von *formica rufa* beobachtet.

Corylophus. Stephens.

1. *C. cassidoides* Marsh. Bei Seligenstadt nicht selten von mir im Anspulicht, bei Frankfurt von **v. Heyden** unter Schilf, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gesammelt.

Orthoperus. Stephens.

1. *O. brunripes* Gyll. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** und Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden** gefunden.

2. *O. corticalis* Redtenb. Im ganzen Gebiet unter Baumrinden, nicht selten.

3. *O. atomus* Gyll. Von **v. Heyden** einmal bei Frankfurt bei *formica rufa*, bei Giefsen (Schmitte) unter alten Brettern gefunden.

4. *O. atomarius* Heer. In Seligenstadt an alten Fässern in Kellern häufig von mir gesammelt.

Endomychidae.

Endomychus. Panzer.

1. *E. coccineus* Linn. Im Frankfurter Wald wurde der Käfer von Senator **v. Heyden** früher oft unter schimmeligem Holz und in Bovisten gefunden; auch bei Heidelberg.

Mycetina. Mulsant.

1. *M. cruciata* Schall. Einmal bei Frankfurt von **v. Heyden** I gefunden.

Lycoperdina. Latreille.

1. *L. Bovistae* Fabr. Bei Darmstadt von mir, bei Zwingenberg und Frankfurt von v. Heyden, bei Aschaffenburg von Oechsner und Dr. Doebner in Mehrzahl gesammelt.

2. *L. succincta* Linn. Bei Darmstadt von Advocat Heyer, bei Aschaffenburg von Dr. Doebner häufig, bei Offenbach und Frankfurt von v. Heyden gesammelt.

Dapsa. Mulsant.

1. *D. denticollis* Germ. Wurde einmal bei Hanau von Kaufmann Heynemann aufgefunden.

Leistes. Redtenbacher.

1. *L. seminigra* Gyll. Ein Stück fand ich bei Babenhansen in einem Baumschwamme.

Mycetaea. Stephens.

1. *M. hirta* Marsh. Ueberall häufig.

Symbiotes. Redtenbacher.

1. *S. latus* Redt. Einige Stück bei Aschaffenburg von Dr. Doebner aufgefunden.

2. *S. pygmaeus* Hampe. Bei Frankfurt von v. Heyden häufig an schimmeligem Waldholz, bei Mainz von Dr. M. Schmidt unter Rinden von Linden, bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir an faulen Eichen nicht selten gesammelt.

Myrmecoxenus. Chevrolat.

1. *M. subterraneus* Chevr. Bei Aschaffenburg von Dr. Doebner und Oechsner, bei Frankfurt von v. Heyden bei *formica rufa* gefunden.

(Nachtrag und Zusammenstellung folgt.)

II.

Pflanzenarealstudien in den Mittelrheingegenden.

Von Herrn Professor Hermann Hoffmann in Gießen.

(Hierzu eine Karte.)

Die nachfolgenden Mittheilungen bilden gewissermaßen eine Fortsetzung, eine Reihe weiterer Belege für meine in der Botanischen Zeitung von 1865 (Beilage) ausführlich publicirten „Untersuchungen zur Klima-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Scriba W.

Artikel/Article: [Die Käfer im Großherzogthum Hessen und seiner nächsten Umgebung 1-51](#)