

ihrer bedeutenden Leistungsfähigkeit gebührende Stellung und Ausdehnung endlich einzuräumen.

Es war, meine Herren, der eigentliche Zweck meines Vortrags, Ihnen die Nothwendigkeit dieser Maßregel nahe zu legen, in der Ueberzeugung, daß nützliche Einrichtungen nicht dem Zufall, sondern dem allgemein erkannten Bedürfnisse entstammen. Es galt mir, jeden Einzelnen von Ihnen anzuregen, die richtige Würdigung der Naturwissenschaften, die er als Mitglied dieses naturwissenschaftlichen Vereins bezeugt, auch dadurch zu be-thätigen, daß er allen ihm zu Gebote stehenden Einfluß aufbietet, um die Bedeutung der Naturwissenschaft als Unterrichtsgegenstand zu allgemeiner Anerkennung und zu allseitiger Verwirklichung zu bringen.

V.

Die Käfer im Großherzogthum Hessen und seiner nächsten Umgebung.

Von Herrn Decan **W. Scriba** in Wimpfen,
(früher Pfarrer in Ober-Lais bei Nidda).

(Nachtrag und Zusammenstellung).

I. Berichtigungen.

1. Bericht X :

S. 6 ist *Leistus rufomarginatus* Dftschm. zu streichen, indem eine Verwechslung mit *L. piceus* Fröhl. stattgefunden hat, welcher von **v. Heyden** bei Schlangenbad gefunden wurde.

S. 17. Statt *Bembidium (Peryphus) ustulatum* Lin. muß es heißen : *B. (Peryphus) littorale* Lin.

S. 54. *Tychus ibericus* Motsch ist nicht eigene Art, sondern Varietät mit rothen Flügeldecken von *T. niger* Payk.

S. 55. *Euplectus Kunzei* Aubé ist zu streichen. Die dafür gehaltene Art ist *Euplectus Duponti* Aubé.

S. 56. *Scydmaenus rubicundus* Schaum muß wegfallen. Es fand eine Verwechslung mit *Scydmaenus casinatus* Rey et Muls. Statt.

2. Bericht XI. Zu streichen sind :

S. 6. *Bacanius rhombophorus* Aubé und

S. 45. *Ptinus bicinctus* Sturm.

3. Bericht XII. Es müssen wegfallen :

S. 2. *Urodon pygmaeus* Schh.

XIII.

- S. 7. *Strophosomus retusus* Mrsh. und
S. 44. *Longitarsus abdominalis* Allard.

II. Nachträge.

1. Bericht X.

- S. 4. *Notiophilus rufipes* Curt. Einige Mal von Advocat **Heyer** bei Auerbach in der Bergstrafse, in Mehrzahl von **Klghfr.** bei Darmstadt gesammelt.
- S. 7. *Dyschirius thoracicus* Fabr. Nach Dr. **Nebel** bei Wimpfen vorkommend.
- S. 14. *Harpalus maculicornis* Duftschm. Von Advocat **Heyer** in Darmstadt in Mehrzahl gefunden.
- S. 15. *Harpalus tenebrosus* Dej. Zwei Exemplare fand **v. Heyden** bei Frankfurt.
- S. 17. *Bembidium (Philochthus) Mannerheimii* Sahlbrg. Bei Ober-Lais mehrmals von mir gefunden.
Bembidium (Peryphus) albipes Sturm. Von Advocat **Heyer** nicht selten bei Eberstadt an Torfbrüchen gesammelt.
- S. 20. *Hydroporus Victor* Aubé. In einem ausgetrockneten Waldbach bei Ober-Lais habe ich einige Exemplare gefunden.
- S. 22. *Agabus fontinalis* Steph. = *nitidus* Fabr. Einige Stücke bei Wimpfen in einem Bach an Mühlwald aufgefunden.
Acilius canaliculatus Nicol. Von Dr. **Nebel** einige Mal bei Darmstadt gesammelt.
- S. 23. *Hydrobius punctatostrigatus* Letz. Auf dem hohen Vogelsberg (Geißelsteiner Haide) von **Carl Stern** aus Frankfurt gefunden.
- S. 24. *Limnebius nitidus* Marsh. Bei Frankfurt von Dr. **Haag** gesammelt.
Helephorus quadrisignatus Bach. Von mir bei Wimpfen aufgefunden.
- S. 25. *Hydraena flavipes* Sturm. Bei Ober-Lais in einem fließenden Waldbach von mir gesammelt.
- S. 27. *Ocalea decumana* Er. Bei Deidesheim von Dr. **Eppelsheim** aufgefunden.
Ischnoglossa rufopicea Kraatz. Bei Ober-Lais in Mehrzahl unter loser Rinde abgestandener junger Eichen gefunden.
Stichoglossa semirufa Er. Mehrfach von Dr. **Eppelsheim** bei Deidesheim in der Rheinpfalz gesammelt.
- S. 28. *Aleochara tristis* Grav. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden.
Aleochara villosa Mannh. Von **Klghfr.** in Mehrzahl in Taubenmist in Darmstadt gesammelt.
- S. 29. *Atemeles pubicollis* Brisout. Vom verstorbenen **Oechsner** bei Aschaffenburg, von mir bei Ober-Lais in einer Colonie von *Formica rufa* gefunden.
- S. 31. *Oxypoda lentula* Er. Bei Seligenstadt ein Exemplar von mir aufgefunden.

Oxygoda rugulosa Kraatz. Ein Exemplar bei Deidesheim von Dr. **Eppelsheim** gefunden.

Oxygoda filiformis Redt. Auf ein bei Ober-Lais von mir gefundenes Exemplar trifft die Beschreibung **Redtenbacher's** vollständig zu, nur sind die Fühler nicht blofs an der Basis, sondern ganz röthlich gelb.

Homalota oblonga Er. Einige Exemplare im hohen Vogelsberg von mir im Kötscher gesammelt.

S. 32. *Homalota pilicornis* Thoms. Bei Ober-Lais gefunden.

S. 34. *Homalota subtilis* Scriba. Häufig von mir bei Ober-Lais an Aas gesammelt.

Homalota nudiuscula Thoms. Ein Exemplar bei Ober-Lais aufgefunden.

Homalota contristata Kraatz. Sehr selten bei Ober-Lais gesammelt. Auch bei Deidesheim von Dr. **Eppelsheim** gefunden.

Homalota laevana Muls. Bei Ober-Lais im Dünger und an Aas nicht selten.

S. 35. *Schistoglossa viduata* Er. Von Advocat **Heyer** in Mehrzahl am Ufer des Bessunger Teiches gesammelt.

S. 36. *Gyrophaena lucidula* Er. Das Käferchen fand ich in grosser Menge auf dem Kuhkopf bei Erfelden an Schwämmen, welche an faulen Weidenschwämmen wuchsen.

Myllaena dubia Grav. Am Ufer des Bessunger Teiches von Advocat **Heyer** aufgefunden.

S. 37. *Tachinus pallipes* Grav. Ein männliches Exemplar habe ich bei Ober-Lais gefunden.

Tachyporus tersus Er. Im hohen Vogelsberg einige Mal aufgefunden.

S. 38. *Bryoporus rufus* Er. Von Dr. **Döbner** bei Aschaffenburg, von mir ein Stück im hohen Vogelsberg aufgefunden.

S. 39. *Mycetoporus angularis* Muls. Ein Stück bei Deidesheim von Dr. **Eppelsheim** gefunden.

S. 41. *Ocypus micropterus* Redt. Einige Exemplare hat Advocat **Heyer** bei Auerbach in der Bergstrasse gefunden.

S. 42. *Philonthus tenuicornis* Muls. Bei Ober-Lais an Aas mehrmals gesammelt.

S. 43. *Philonthus bipustulatus* Panz. Von Dr. **Haag** bei Frankfurt, von mir bei Ober-Lais aufgefunden.

S. 44. *Xantholinus lentus* Grav. Einige Exemplare habe ich bei Ober-Lais unter Kiefernrinde gefunden.

S. 47. *Euaesthetus laeviusculus* Mann. Bei Deidesheim vorkommend.

Stenus longitarsis Thoms. Mehrfach bei Ober-Lais im Anspüllicht und an nassen Localitäten gesammelt.

Stenus argentellus Thoms. Bei Seligenstadt am Ufer des Maines vorkommend.

Stenus carbonarius Gyll. Einige Exemplare bei Ober-Lais von mir aufgefunden.

S. 48. *Stenus bifoveolatus* Gyll. Bei Ober-Lais und bei Wimpfen am Schilfgras von mir beobachtet.

Stenus solutus Er. In Mehrzahl von **v. Heyden** I bei Offenbach gesammelt. Ein von Stadtgerichtsrath **Witte** in der Mark Brandenburg gefundenes Exemplar wurde mir zur Bestimmung mitgetheilt.

S. 49. *Bledius crassicornis* Lac. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Wimpfen von mir gefunden.

Bledius erraticus Er. Mehrfach von Dr. **Bose** bei Ortenberg gesammelt.

Oxytelus fulvipes Er. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gesammelt.

S. 50. *Oxytelus Saulcyi* Pandelle. Je ein Exemplar bei Ober-Lais und Wimpfen von mir aufgefunden.

Trogophloeus nitidus Baudi. Bei Deidesheim von Dr. **Eppelsheim** gesammelt.

S. 52. *Lathrimaeum fuscum* Er. Von Dr. **Döbner** bei Aschaffenburg entdeckt.

Omalium exiguum Gyll. Einige Exemplare habe ich bei Ober-Lais an Aas gefunden.

Omalium testaceum Er. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Döbner** einzeln gesammelt.

S. 53. *Omalium amabile* Heer. In Mehrzahl bei Ober-Lais an Aas von mir gesammelt.

Omalium inflatum Gyll. Auf dem hohen Vogelsberg nicht selten an faulem Holz gefunden.

Anthobium silesiacum Letzn. Ich habe das Käferchen in großer Anzahl im hohen Vogelsberg auf nassen Wiesen an Schirmblumen gesammelt.

Megarthus affinis Mill. Bei Ober-Lais und Wimpfen einzeln von mir aufgefunden.

S. 55. *Bryaxis xanthoptera* Reichenb. Bei Ems von **v. Heyden** aufgefunden.

Bythinus validus Aubé. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt, Soden und auf der Schmitte bei Gießen vorkommend.

Euplectus Erichsonii Aubé. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden.

Euplectus Fischeri Aubé = *Kirbyi* Denny. Von **v. Heyden** zu Frankfurt aus dürrer Waldholz erzogen.

Euplectus Duponti Aubé. Bei Soden von **v. Heyden** aufgefunden.

Euplectus punctatus Muls. et Rey. Aus dürrer Waldholz von **v. Heyden** zwei Exemplare erzogen.

S. 56. *Claviger longicornis* Müller. Von Professor **Schenk** öfters bei Weilburg, von **v. Heyden** bei Ems gefunden.

Euthia Schaumii Kiesw. Ein Exemplar hat **v. Heyden** bei Soden aufgefunden.

Scydmaenus Godarti Latr. Von Dr. **M. Schmidt** ein Stück bei Frankfurt gefunden.

Scydmaenus exilis Er. Ein Exemplar wurde von mir bei Ober-Lais aufgefunden.

Scydmaenus carinatus Rey et Muls. Bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.

Scydmaenus confusus Brisout. Ein von **Höpfner** bei Darmstadt gefundenes Exemplar befindet sich in der Sammlung **v. Heyden's**.

S. 57. *Scydmaenus nanus* Schaum. Ein Exemplar habe ich bei Ober-Lais unter Rinden bei Ameisen aufgefunden.

Choleva intermedia Kraatz. Einige Stücke hat Dr. **Haag** bei Frankfurt gesammelt.

S. 58. *Colon puncticolle* Kraatz. Von Dr. **Döbner** bei Aschaffenburg aufgefunden.

S. 59. *Silpha nigrita* Creutz. Auf dem hohen Rothskopf im Vogelsberg, Anfangs Mai 1867 in Mehrzahl unter Steinen gefunden.

Necrophorus gallicus Duv. Bei Ober-Lais nicht selten an Aas. Der Käfer ist ohne Zweifel eine gröfsere Form des *N. fossor* Er., da deutliche Uebergangsformen vorkommen.

Necrophorus microcephalus Thoms. Bei Ober-Lais mehrfach von mir gesammelt. Auch diesen Käfer halte ich nur für eine kleinere Abart des *N. ruspator* Er.

Agyrtes subniger Fairm. Bei Frankfurt je ein Stück von **v. Heyden II** und Dr. jur. **Siebert** aufgefunden.

Anisotoma rugosa Steph. Ein männliches Exemplar habe ich bei Ober-Lais gekötschert. Nach Dr. **Nebel** auch bei Darmstadt vorkommend.

Anisotoma Triepkii Schmidt. Einzeln im Frankfurter Wald von **v. Heyden** gesammelt.

S. 60. *Anisotoma nigrita* Schmidt. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ober-Lais von mir (1 ♂) gefunden.

Anisotoma rubiginosa Schmidt. Von **v. Heyden** bei Frankfurt gesammelt.

Agaricophagus cephalotes Schmidt. Von Dr. **M. Schmidt** bei Frankfurt, von mir bei Ober-Lais aufgefunden.

S. 61. *Agathidium rotundatum* Er. Ein Exemplar habe ich auf dem hohen Rothskopf im Vogelsberg gefunden.

Clambus armadillo De Geer. Bei Frankfurt von **v. Heyden** nicht selten, bei Aschaffenburg von Dr. **Döbner**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gesammelt.

2. Bericht XI.

S. 3. *Hister helluo* Truqui. Einmal bei Hofheim im Taunus von Senator **v. Heyden** auf Erlen beobachtet, wo der Käfer die Larven von *Agelastica alni* auffrafs.

S. 6. *Acritus fulvus* Aubé. Von **v. Heyden I** ein Stück bei Frankfurt aufgefunden.

Acritus atomarius Aubé. Von **Böttger** bei Frankfurt entdeckt.

S. 7. *Brachypterus fulvipes* Er. Bei Seligenstadt einige Exemplare von mir gefunden. Nach Berliner Zeitschrift VIII, S. 392 wurde das Käferchen auch bei Hildesheim von **H. Wilken** entdeckt.

S. 8. *Epuraea melanocephala* Mrsh. Auf dem hohen Vogelsberg in Mehrzahl im Kötcher gesammelt.

S. 9. *Meligethes gagatinus* Er. Einige Stücke bei Ober-Lais von mir aufgefunden.

S. 10. *Rhizophagus dispar* Payk. In Mehrzahl auf dem hohen Rothskopf gesammelt.

S. 11. *Diodesma subterranea* Er. An einem faulenden, auf dem Boden liegenden Eichenast im Walde bei Wimpfen ein Exemplar aufgefunden.

Aulonium sulcatum Oliv. In der Sammlung von **C. Stern** zu Frankfurt befindet sich ein aus Holz von daselbst erzogenes Exemplar.

S. 21. *Syncalypta paleata* Er. Am Rande des Bessunger Teiches von mir aufgefunden.

S. 22. *Pomatinus substriatus* Müll. Von Senator **v. Heyden** einige Stücke bei Baden-Baden gesammelt.

Elmis Germari Er. Bei Grebenhain von mir aufgefunden.

S. 23. *Elmis subviolaceus* Müll. Bei Wimpfen nicht selten in einem Bach am Mühlewald.

Heterocerus fossor Kiesw. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt gefunden.

S. 25. *Aphodius corvinus* Er. Ein Exemplar bei Ober-Lais von mir aufgefunden.

Aphodius sanguinolentus Panz. Ein bei Frankfurt von **Böttger** gefundenes Stück befindet sich in der Sammlung von **v. Heyden**.

S. 31. *Agrius litura* Kiesw. Zwei Exemplare habe ich von einer Eiche im Faulbruch bei Arheilgen abgeklopft.

S. 34. *Corymbites serricornis* Payk. Zwei Exemplare von **v. Heyden II** bei Frankfurt gefunden.

Corymbites Quercus Gyll und

Corymbites angustulus Kiesw. finden sich einzeln auf dem hohen Vogelsberg. Ebendasselbst wurde auch

Campylus rubens Pill et Mitt. einige Mal aufgefunden.

S. 35. *Betarmon picipennis* Bach. Von **v. Heyden I** bei Frankfurt, von mir bei Wimpfen einzeln gesammelt.

Adrastus lateralis Er. Nach Dr. **Nebel** bei Darmstadt vorkommend.

S. 36. *Melanotus crassicornis* Er. Ich besitze ein von Advocat **Heyer** bei Darmstadt gefundenes Stück.

Megapenthes lugens Germ. Oefter aus Holz von **v. Heyden II** zu Frankfurt erzogen.

S. 37. *Cardiophorus ebeninus* Germ. Ein Exemplar hat **v. Heyden II** beim Frankfurter Forsthaus unter Rinde gefunden.

S. 38. *Cyphon pallidulus* Boh. Bei Wimpfen von mir aufgefunden.

S. 39. *Cantharis pilosa* Payk. In hohen Vogelsberg nicht selten.

S. 40. *Malthodes pellucidus* Kiesw. Einmal in der hohen Mark im Taunus von **v. Heyden I** gefunden.

S. 42. *Dasytes subaeneus* Schh. Von **v. Heyden** bei Flörsheim, Soden und Oberstein an der Nahe gesammelt.

Dasytes aerosus Kiesw. Senator **v. Heyden** hat den Käfer bei St. Goarshausen gefunden.

Haplocnemus ahenus Kiesw. Von Senator **v. Heyden** im Sauerthal bei St. Goarshausen gesammelt.

Julistus memnonius Kiesw. Bei Darmstadt von Advocat **Heyer** aufgefunden.

S. 46. *Anobiium Fagi* Muls. Von **v. Heyden** in Mehrzahl bei Frankfurt, von mir einzeln bei Ober-Lais gesammelt.

S. 49. *Cis glabratus* Mellié. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** gefunden.

S. 51. *Allecula rhenana* Bach. Zwei in der Frankfurter Gegend gefundene Exemplare befinden sich in der Sammlung von **v. Heyden**.

S. 55. *Anthicus sellatus* Panz. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** aufgefunden.

S. 56. *Mordellistena stricta* Costa. Ein Exemplar bei Ober-Lais von mir aufgefunden.

Mordellistena stenidea Muls. Bei Ober-Lais und Wimpfen in Mehrzahl von mir gesammelt.

Anaspis (Silaria) latiuscula Muls. Einige Stücke habe ich bei Seligenstadt gefunden.

Anaspis (Silaria) Chevrolatii Muls. In großer Menge bei Harxheim in Rheinhessen auf blühendem *Ligustrum vulgare* von mir gesammelt.

Anaspis (Silaria) phalerata Germ. Ich besitze Exemplare von Erlangen, Augsburg und Cassel; es läßt sich demnach mit Bestimmtheit annehmen, daß der Käfer auch im Gebiete sich findet.

S. 58. *Dryops femorata* Fbr. Ein Exemplar wurde bei Alsbach in der Bergstrasse aufgefunden.

S. 59. *Oedemera tristis* Schmidt. Im hohen Vogelsberg einige Stücke von mir gefunden.

3. Bericht XII.

S. 1. *Bruchus picipes* Germ. Ein Exemplar von **v. Heyden** I bei Frankfurt, eins von **Jenison** bei Heidelberg gefunden.

Bruchus pusillus Germ. Senator **v. Heyden** hat ein Stück bei Frankfurt gefunden.

Bruchus debilis Schh. Nach **v. Heyden** bei Offenbach, Bergen und Mombach nicht selten.

Bruchus virescens Schh. Im Sauerthal bei St. Goarshausen einmal von **v. Heyden** I gesammelt.

S. 2. *Urodon conformis* Suffr. Bei Ems von **v. Heyden** gefunden.

Tropideres Edgreni Schh. Ein Exemplar habe ich von alten Eichen bei Ober-Lais abgeklopft.

S. 3. *Rhynchites tristis* Fabr. Auf dem hohen Vogelsberg von **Carl Stern** und mir aufgefunden.

S. 10. *Phytonomus Burlinii* Schh. Nach **v. Heyden** einzeln bei Frankfurt vorkommend.

S. 15. *Anthonomus Schönherri* Desbrochers. In der Sammlung von **v. Heyden** befinden sich von **Jenison** bei Heidelberg gefundene Exemplare.

Die Varietät *conspersus* hat **v. Heyden** II einmal im Taunus auf *Sorbus aucuparia* gesammelt.

S. 16. *Balaninus pellitus* Schh. = *Mastodon* Jekel. Einmal von **v. Heyden** bei Frankfurt, in Mehrzahl von mir bei Ober-Lais von Eichen abgeklopft.

Balaninus cerasorum Hbst. Ein Exemplar hat **v. Heyden** II bei Frankfurt aufgefunden.

Tychius lineatulus Germ. Von **v. Heyden** im Frankfurter Wald und bei Falkenstein im Taunus gesammelt.

Tychius genistae Schh. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt selten vorkommend.

Tychius sparsutus Oliv. Auf *Genista* bei Frankfurt, Rüdesheim, Oberstein und Ems von Senator **v. Heyden** gesammelt.

Tychius curtus Brisout. Ein Stück im Rebstock-Wald bei Frankfurt von **v. Heyden** aufgefunden.

S. 17. *Litodactylus velatus* Beck. Von Dr. **M. Schmidt** ein Stück bei Frankfurt gefunden.

Orchestes melanocephalus Oliv. Bei Frankfurt einmal von Senator **v. Heyden** aufgefunden.

S. 18. *Orchestes Rusci* Hbst. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt und Königstein vorkommend.

Orchestes rufitarsis Germ. Ein Stück bei Frankfurt von **v. Heyden** I gefunden.

Baridius sulcipennis Bris. Das einzige bekannte Exemplar wurde bei Frankfurt von Senator **v. Heyden** entdeckt.

Baridius pusio Schh. (Var. von *T.-album* Lin.). Bei Frankfurt mehrmals von **v. Heyden** I gefunden.

Baridius morio Schh. Bei Frankfurt vorkommend.

Baridius fallax Bris. Ein Exemplar von **v. Heyden** I bei Frankfurt aufgefunden.

S. 19. *Acalles Quercus* Schh. Ein Stück habe ich im Bonfelder Wald bei Wimpfen an einem morschen Eichenast gefunden.

S. 22. *Gymnetron pascuorum* Gyll. Bei Königstein im Taunus von **v. Heyden** I gesammelt.

S. 23. *Gymnetron netus* Grm. Ein Exemplar hat Senator **v. Heyden** bei Rüdesheim gefunden.

Mecinus janthinus Germ. Bei Frankfurt einzeln vorkommend.

Mecinus Heydeni Wenker. Das einzige bekannte Exemplar hat **v. Heyden** II bei Frankfurt entdeckt.

S. 25. *Xyloterus Quercus* Eichhoff. Ein bei Aschaffenburg gefundenes Exemplar erhielt ich von Professor Dr. **Döbner** daselbst.

Cryphalus binodulus Ratzbg. Von **v. Heyden** zu Frankfurt oft aus Holz gezogen.

S. 26. *Bostrychus Coryli* Perris. Ein Exemplar von **v. Heyden** I bei Frankfurt gefunden.

Bostrychus Lichtensteinii Ratzbg. Aus jungen Kiefernzweigen von **v. Heyden** erzogen.

Bostrychus cryptographus Ratzbg. Aus Aspenholz von **v. Heyden II** oftmals erzogen.

Bostrychus Kaltenbachii Bach. Bei Frankfurt nicht selten in *Stachys sylvatica* vorkommend.

S. 28. *Clytus liciatus* Lin. Bei Darmstadt von **Klghfr.** gefunden; von **v. Heyden II** und **Stern** zu Frankfurt nicht selten aus Holz erzogen.

S. 29. *Acanthoderus varius* Fabr. Ein Exemplar hat Oberst **Klingelhöffer** im Sommer 1868 im Faulbruch, einem Eichwalde bei Arheilgen, gefunden.

S. 30. *Saperda phoca* Fröhlich. Von Dr. **Steitz** in Frankfurt wurde ein Stück aufgefunden.

S. 31. *Phytoecia molybdaena* Schh. Nach **v. Heyden** im Schwanheimer Wald vorkommend.

S. 36. *Cryptocephalus punctiger* Payk. Bei Darmstadt von **Klghfr.** aufgefunden.

S. 39. *Phaedon carniolicum* Germ. Auf dem hohen Vogelsberg an *Stellaria nemorum* häufig vorkommend.

S. 41. *Cuperus betulinus* Foudr. Nach **v. Heyden** im Taunus nicht selten.

Haltica (Graptodera) cognata Kutsch. Von **Vicomte de Bonvouloir** in Ems aufgefunden.

S. 43. *Longitarsus luridus* Scop. Von **v. Heyden** bei Rumpenheim und Königstein gesammelt.

Longitarsus thoracicus Allard. Bei Frankfurt von **v. Heyden II** und **Stern** gefunden.

S. 44. *Longitarsus rufulus* Foudr. Bei Frankfurt vorkommend (**v. Heyden**).

Longitarsus cerinus Allard. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, Soden und Rüdesheim gesammelt.

Longitarsus ordinatus Foudr. Bei Offenbach an Schilf von **v. Heyden** gefunden.

Longitarsus subquadratus Allard. Ein Exemplar hat **v. Heyden** bei Frankfurt aufgefunden.

S. 45. *Psylliodes Thlapsis* Foudr. Häufig bei St. Goarshausen auf *Isatis tinctoria* (**v. Heyden I**).

Psylliodes instabilis Foudr. Ebendasselbst häufig auf *Cheiranthus cheiri* (**v. Heyden I**).

III. Zusammenstellung.

	Species
1. <i>Cicindelidae</i>	4
2. <i>Carabici</i>	300

zu übertragen 304

	Uebertrag	Species 304
3. <i>Dytiscidae</i>		100
4. <i>Gyrinidae</i>		7
5. <i>Palpicornia</i>		68
6. <i>Staphylinidae</i>		689
7. <i>Pselaphidae</i>		37
8. <i>Clavigeridae</i>		2
9. <i>Scydmaenidae</i>		24
10. <i>Silphales</i>		98
11. <i>Clambidae</i>		5
12. <i>Sphaeriidae</i>		1
13. <i>Trichopterygia</i>		23
14. <i>Scaphidilia</i>		6
15. <i>Histeridae</i>		58
16. <i>Phalacridae</i>		12
17. <i>Nitidulariae</i>		96
18. <i>Trogositidae</i>		4
19. <i>Colydiadae</i>		19
20. <i>Cucujidae</i>		28
21. <i>Cryptophagidae</i>		54
22. <i>Lathridiidae</i>		53
23. <i>Mycetophagidae</i>		11
24. <i>Dermestidae</i>		25
25. <i>Byrrhidae</i>		17
26. <i>Georyssidae</i>		1
27. <i>Parnidae</i>		21
28. <i>Heteroceridae</i>		6
29. <i>Lucanidae</i>		5
30. <i>Scarabaeidae</i>		115
31. <i>Buprestidae</i>		52
32. <i>Eucnemidae</i>		11
33. <i>Elateridae</i>		90
34. <i>Dascillidae</i>		16
35. <i>Malacodermata</i>		97
36. <i>Telmatophilidae</i>		9
37. <i>Cleridae</i>		17
38. <i>Lymexylonidae</i>		2
39. <i>Piniores</i>		62
40. <i>Cisidae</i>		18
41. <i>Tenebrionidae</i>		31
42. <i>Cistelidae</i>		16
43. <i>Pythidae</i>		7
44. <i>Melandryadae</i>		17

zu übertragen 2334

	Uebertrag	Species
45. <i>Lagriariae</i>		1
46. <i>Pedilidae</i>		4
47. <i>Anthicidae</i>		10
48. <i>Pyrochroidae</i>		3
49. <i>Mordellonae</i>		31
50. <i>Rhipophoridae</i>		3
51. <i>Stylopidae</i>		4
52. <i>Meloidae</i>		14
53. <i>Oedemeridae</i>		16
54. <i>Bruchidae</i>		20
55. <i>Curculionidae</i>		539
56. <i>Xylophagi</i>		55
57. <i>Cerambycidae</i>		117
58. <i>Chrysomelinae</i>		310
59. <i>Erotylidae</i>		7
60. <i>Coccinellidae</i>		63
61. <i>Corylophidae</i>		8
62. <i>Endomychidae</i>		10
	zusammen	3549.

VI.

Die Aetzfiguren des Meteoreisens.

Von Herrn Dr. **Otto Buchner**.

Es ist bekannt, daß zeitweise Stein- und Metallmassen aus dem Weltraum auf die Erde herabfallen. Je sorgfältiger auf diese Erscheinung geachtet wird, um so reichlicher sind die Jahresernten an diesen merkwürdigen Körpern, die zwar schon frühe das Staunen der Menschheit erregten, aber auch noch an vielen Stellen der Erde nicht so gewürdigt werden, wie sie als einzige Repräsentanten der außerirdischen festen Materie verdienen.

Diese Meteoriten, die, wie im Alterthum, noch jetzt* bei wilden Völkerschaften heilig verehrt werden, deren Existenz dann geradezu, allen Thatsachen zum Trotz, als Aberglaube verworfen wurde und erst durch den Steinregen von l'Aigle (1803) auch in dem am längsten und eifrigsten widersprechenden Frankreich Anerkennung fand, diese Meteoritenmassen wurden eine Zeit lang als Auswürflinge von Erd- oder Mondvulkanen angesehen, oder auch als zusammengerommene, in der Erdatmosphäre enthaltene Erdausdünstungen. Daß der Altmeister **Goethe** Anhänger dieser Ansicht

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Scriba W.

Artikel/Article: [Die Käfer im Großherzogthum Hessen und seiner nächsten Umgebung 89-99](#)