

Beiträge zur geographischen Verbreitung von Phanerogamen und Gefäßkryptogamen in den Ostalpen

nach einem Manuskript von Adalbert Rüdel in Ansbach
zusammengestellt von Prof. Dr. K. W. Dalla Torre (Innsbruck).

Herr Reallehrer, jetzt Professor, Adalbert Rüdel in Ansbach, jetzt in Rothenburg a. d. Tauber, hatte vor Jahren die Freundlichkeit, für unsere Flora von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein eine Liste mit Pflanzenstandorten zur Aufnahme in dieselbe einzusenden. Da dies wegen des bereits weit vorgeschrittenen Druckes nicht mehr möglich war, wurde sie einstweilen zurückgelegt. Mit Erlaubnis des Verfassers bringe ich sie nun mit einigen systematischen, geographischen und nomenklatorischen Aenderungen zur Veröffentlichung, einerseits, weil sie wertvolle neue Daten und Bestätigungen älterer Angaben bringt, und andererseits, weil in derselben nicht nur Tirol (T), sondern auch Kärnten (K), Salzburg (S), Bayern (B), die Schweiz (Schw) und Italien (J) Berücksichtigung gefunden haben. Da der Verfasser wie es scheint, Wert darauf legt, zu unterscheiden, was von ihm und was von seinem Vater gefunden worden war, wurden die Funde mit j(unior) und s(enior) gekennzeichnet; die fremden Sammlernamen sind stets ganz ausgeschrieben.

- Notholaena Marantae* (L.) Br.—**T** Johanniskofel (Prell) und Runkelstein (j), Guntschaberg bei Bozen (s)
Adiantum capillus Veneris L.—**T** Sarntal (j), Kronmetz, zwischen Fai und Mezzo Lombardo bei Rocchetta am Nonsberg (s), Ponalefall (j)
Blechnum Spicant (L.) Sm.—**T** Schwarzensee bei Volderbad, Hintersteiner See bei Kufstein (j), **B** Tufttal bei Schliersee (j)
Scolopendrium vulgare Sm.—**B** Obersee bei Königssee (j)
Asplenium viride Huds.—**T** Kramsach bei Brixlegg (s); Welschnofen (j); **S** Kaprunertal (s); **B** Herzogenstand (j)

- A. septentrionale* (L.) Hoffm.—**T** Stiftsalpe im Voldertal (j), Runkelstein (s), Welschnofen (j); **S** unterhalb Paß Thurn gegen Mittersill (j); **J** zwischen Bormio und St. Catarina (s)
- A. adiantum nigrum* L.—**T** Sarntal (j)
- Aspidium Lonchitis* (L.) Sw.—**T** Schwarznasen gegen Rosenjoch, Hintertux, Stephansbrücke bei Patsch; Costalunga gegen die Westseite des Rosengartens (j), Malga Brenta alta und bassa (s), **S** Kapruner Tal, Steinernes Meer (j)
- A. lobatum* (Huds.) Sw.—**T** Voldertal, Hintersteiner See bei Kufstein; **S** Ebenwald im Kapruner Tal (j); **B** Partnachtal, Herzogenstand gegen Waldhensee (j)
- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.—**T** Rosenjoch (j)
- C. regia* (L.) Dess.—**B** Zwischen Knorrhütte und Partnachklamm (j)
- Onoclea Struthiopteris* (L.) Hoffm.—**S** Ebenwald im Kapruner Tal, Fuschertal (j)
- Woodsia alpina* (Bolt.) Gray—**T** Rosenjoch; Sasso nero in Contrin, 2480 m, **K** Kleinfleißtal östlich Heiligenblut (j); zwischen Bormio und St. Catarina (s)
- W. ilvensis* (L.) RBr.—**T** Val di Sol (j)
- Botrychium Lunaria* (L.) Sw.—**T** Griffalpe und Hintertux, Golfrion zwischen Cavalese und Welschnofen, 1800 m, Westseite der Teufelswand im Rosengarten (j), Stilsferjochstraße (s); **S** Kapruner Tal, **B** Torrenerjoch, Priesbergalm am Königssee (j)
- Lycopodium Selago* L.—**T** Volderer Wildbach; **S** Trattenbachfall in den Dierbacher Hohlwegen, Kolm-Saigurn gegen den Hohen Sonnblick, Wasserfallboden, **B** Krottenkopf, Herzogenstand, Kahlersberg (j)
- L. clavatum* L.—**T** Voldertal, Hintertux, Welschnofen (j)
- L. complanatum* L.—**T** Ueber dem Brennerpaß (j)
- L. alpinum* L.—**T** Kaunsertal (s), Hintertux gegen das Weitenttal (j), Tonale (s), **S** Imbachhorn-Saalgrat (j)
- Selaginella selaginoides* (L.) Lk.—**T** Griffalpe, Stripsenjoch und St. Johann, **B** Südende des Waldhensees zwischen Jettenberg und Ramsau (j)
- S. helvetica* (L.) Lk.—**T** Volderer Wildbad, Hintertux, Kufstein—Sparchen, Welschnofen gegen Untereggental, 1100 m; **S** Dierbacher Hohlwege, Salzach bei Golling (j)
- Taxus baccata* L.—**T** Kaisertal bei Kufstein (j)
- Pinus Cembra* L.—**T** Glungetzer und Umgebung (j)
- Juniperus nana* Willd.—**B** Reiteralm und Ramsau (j)
- Typha minima* Funck—**T** Sigmundskron (j)
- Sesleria varia* (Jacq.) Wettst.—**T** Navisjoch (j)

- Poa alpina* L. f. *vivipara* **T** Voldertal, Hintertux gegen Schmirnjoch (j)
- Juncus trifidus* L.—**T** Griffalpe zur Geierspitze, Zangenberg zwischen Cavalese und Welschnofen 2490 m (j)
- Luzula albida* (All.) DC.—**T** Latemar 2500 m (j)
- Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb.—**S** Wasserfallboden; **B** Reichenhall, Herzogenstand (j)
- T. palustris* Huds.—**K** Berger Thörl, Kalser Tauern (j), **B** Kammerlinghorn (j)
- Veratrum album* L. var. *Lobelianum* Bernh.—**T** Zangenberg 1900 m gegen Golfrion am Westfuß des Latemar (j), **S** Wasserfallboden (s), Landtal zwischen Gotzen und Kahlersberg (j)
- Paradisica Liliastrum* (L.) Bertol.—**T** Casa Bolognini gegen Madronhöhe (j)
- Anthericum Liliago* L.—**T** Runkelstein, Lavis (j)
- Llodia serotina* (L.) Salisb.—**T** Schaubachhütte (s); **S** Kaprunertal, Uebergang ins Stubbachtal (j), **K** Peischlachalm zwischen Kals und Heiligenblut, zwischen Heiligenblut und Pasterze, Franz-Josef-Hütte b. d. Pasterze
- Allium Victorialis* L.—**S** Kapruner Tal (s)
- A. montanum* Schmidt — **K** Kals (j)
- A. sibiricum* L.—**T** Pra di Contrin, südlich Campitello 2350 m, Westseite des Costalungapasses (j); **B** Reitertritt an der Reiteralm und Ramsau (s)
- A. carinatum* L.—**T** Bozen (s)
- Lilium bulbiferum* L.—**T** Monte Roën (s), Lavis (j)
- L. Martagon* L.—**B** Partnachtal mit 19 Blüten (j)
- Muscari botryoides* (L.) Mill.—**T** Ausgang des Valsugana (j)
- M. comosum* (L.) Mill.—**T** Lavis (j)
- Ruscus aculeatus* L.—**T** westliche Höhen bei Riva (j)
- Streptopus amplexifolius* (L.) DC.—**B** Schliersee (Rodner), Buchwald über Ramsau (s), vom Eibsee zur Wiener Neustädter Hütte (j)
- Polygonatum verticillatum* (L.) All.—**B** Kaltenbrunn bei Partenkirchen (j)
- Tamus communis* L.—**T** Mendelstraße oberhalb Eppan im Kastanienwald (s), Lavis, westliche Höhen über Doß Trent (j)
- Crocus albiflorus* Kit.—**T** Brennerpaß; **S** Rainerhütte im Kapruner Tal (s); **B** Krottenkopf (j)
- Orchis coriophora* L.—**B** Eingang ins Partnachtal (j)
- O. ustulata* L.—**T** Costalunga gegen Rosengarten, Westseite 2000 m (j)

- Orchis militaris* L.—**T** Ponalefall (j)
- O. globosa* L.—**T** Unter der Kölner Hütte, 1700 m, Joch nördlich von Welschnofen 1550 m, Pousin westlich Campitello 2380 m, Torbole; **K** Spöttling Tauern im Kalser Tal, **B** Partnachtal, Karlsboden am Kammerlinghorn (j)
- O. incarnata* L. var. *ochrolenca* —**B** Ohlstadt bei Partenkirchen (j)
- Serapias longipetala* (Ten.) Poll.—**T** Gardasee (Rittler)
- Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.—**T** Ponalestraße am Gardasee (j)
- Chamaeorchis alpina* (L.) Rich.—**T** Südseite des Latemar 2500 m, Punta Selle bei Pellegrino, 2600 m (j); **K** Bergerthörl zur Puschlachalm, zwischen Heiligenblut und Pasterze; **S** Sonnenstein am Südrand des Steinernen Meeres, Naßwald über dem Wasserfallboden, **B** Bärensunk am Kahlersberg, Kammerlinghorn am Hirschbühel
- Herminium Monorchis* (L.) RBr.—**T** Sumpfige Waldwiese östlich Welschnofen, 1650 m; **S** Eberwald im Kaprunertal, Diesbacher Hohlwege des Saalachtals; **B** Obersee und Fischunkel am Königsee, Ramsau (j) **Schw** Sent Lins in Unterengadin (s)
- Coeloglossum viride* (L.) Hartm.—**T** Geierspitze, Latemar, Galfrion zwischen Welschnofen und Cavaleser Wald im Contrintal 17—1800 m (j)
- Nigritella nigra* (L.) Wettst.—**T** Kaunsertal, Griffalpe, Monte Roën, Stilsfer Joch, Col Laz im Contrintal bei Campitello, Val di Genova (s); **S** Kaprunertal (s); **B** Karlskopf und Kammerlinghorn, Priesbergalm über dem Königssee, Karlskopf und Kammerlinghorn (j)
- Gymnadenia albida* (L.) Rich.—**T** Griffalpe bei der Geierspitze, Matten unter der Kölnerhütte 1650—1700 m; **B** Eibsee zur Zugspitze (j)
- G. odoratissima* (L.) Rich.—**T** Griffalpe, zwischen Fai und Andalo (j); Stilsferjoch gegen Bormio (s), **S** Diesbacher Hohlwege des Saalachtals zwischen Jettenberg und Ramsau im Schwarzbachtal, Reichenhall (s)
- G. suaveolens* (Vill.) Wettst.—**T** Bosin westlich Campitella 2350 m (j), **K** Bergerthörl, Kals—Matreier Thörl (j)
- Epipactis palustris* (L.) Crantz—**B** Wimbachklamm (j)
- Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch und *C. rubra* (L.) Rich.—**B** Heimgarten nach Ohlstadt (j)
- Limodorum abortivum* (L.) Rich.—**T** Beim alten Schloß westlich von Riva (j)
- Listera ovata* (L.) KBr.—**T** Goldbrünnl bei Windegg im Voldertal, Bewaller, südwestlich Welschnofen, 1400 m,

- östlich von Welschhofen bei Zaneier, 1625 m (j), **S** Stubbachtal
- Goodyera repens* (L.) RBr.—**T** Kramsach bei Brixlegg (s), Kufstein gegen Hintersee (s), Stripsenjoch (j), St. Johann in Tirol (j), Tal südlich Welschnofen (j), Contrintal 1600 m am Wasserfall (j), **S** Ebenwald im Kapruner Tal (s), Diesbacher Hohlwege im Saalachtal; **B** Alpgartental bei Reichenhall (s)
- Microstylis monophylla* (L.) Lindl.—**S** Kaprunertal, **B** Fischunkel am Königssee, Hintersee gegen Ramsau, zwischen Reichenhall und Jettenberg (j)
- Coralliorrhiza innata* RBr.—**B** Hänge des Warteck am Königssee (j)
-
- Salix herbacea* L.—**T** Rosenjoch (j); **K** Dorfer Tal zum Kalser Tauern (j); **J** Stilsferjoch zum Umbrail, Murangatal gegen das Wormserjoch (s)
- S. myrsinites* L.—**T** Monte Roën, Stilsferjoch (s)
- S. retusa* L.—**T** Monte Roën (j); **S** Kaprunertal, **B** Oberes Gotzental am Königssee, Krottenkopf, vom Eibsee zur Zugspitze (j)
- S. serpyllifolia* Scop.—**K** Wasserfall unter dem Zirmsee, 2200 m, im Kleinen Fleißtal bei Heiligenblut; **S** Wasserfallboden (j)
- S. reticulata* L.—**T** Geierspitze, Gefrorene Wand (j), Monte Roën (s), Latemar 2600 m (j); **S** Kaprunertal (s)
- S. glabra* Scop.—**B** Auf Kalk am Hirschbüchel-Kammerlinghorn (j)
- Ostrya carpinifolia* Scop.—**T** Eggental, Sarntal (j), von Tramin zum Monte Roën (s)
- Alnus alnobetula* (Ehrh.) Hart.—**S** Rainerhütte im Kaprunertal
- Quercus lanuginosa* (Lam.)—**T** Runkelstein (s)
- Q. austriaca* Willd.—**T** Lavis (j)
- Parietaria officinalis* L.—**T** Eggental (j)
- P. ramiflora* Moench—**T** Sarntal, San Zeno nach Fai (j)
- Thesium montanum* Ehrh.—**T** Mendel bei Bozen (s), Lavis (j)
- Th. intermedium* Schrad.—**T** Trient (j)
- Th. pratense* Schrad.—**S** Kaprunertal (s)
- Th. alpinum* L.—**T** Hintertux (j), **S** Kaprunertal (s)
- Rumex scutatus* L.—**T** Sarntal, **B** Reichenhall, Ramsau nach Hintersee (j)

- Oxyria digyna* (L.) Campd.—**T** Kaunsertal (s), Griffalpe, Gefrorene Wand, Rosenjoch, Sasso negro bei Kontrin, Rif. Taramelli im Val Selle bei Monzoni; **K** Bergerthörl, Kalser Tauern und Dorfalpe (j)
- Polygonum viviparum* L.—**T** Auf Matten am Westfuß des Latemar, 1500 m; Welschnofen (j), Stilsferjochstraße (s); **S** Kapruner Tal (s)
- Montia minor* Gmel.—**T** Griffalpe (j)
- Montia rivularis* Gmel.—**T** Ehrenhauser Alm im Volder-tale (j)
- Cerastium strictum* Haenke—**J** Gaviapaß (j)
- C. alpicolum* Brügg.—**J** IV. Cantoniera am Stilsferjoch, Gaviapaß (s)
- C. alpinum* L.—**S** Wasserfallboden (j)
- C. uniflorum* Murith—**T** Kaunsertal, Stilsferjoch und Ta-barettawände (s), **S** Kaprunertal; **B** Kammerlinghorn (j); **J** Gaviapaß (s)
- Saginanodosa* (L.) Fenzl—**B** Hintersee bei Ramsau (j)
- Alsine recurva* (All.) Wahlenb.—**T** Rosenjoch (j), Stilsfer-joch, Bocca di Brenta, Mandronhütte, Piz Umbrail (s)
- A. verna* (L.) Wahlenb.—**K** Kals gegen Matreier Thörl (j), **B** Reiteralpe (s)
- A. Gerardi* (Willd.) Wahlenb.—**T** Stilsferjoch, **J** Gaviapaß (s)
- A. octandra* (Sirb.) Kern.—**S** Sonnenstein am Steinernen Meer (j)
- A. Villarsii* (Balbis) Mert. u. Koch.—**J** I—III. Cantoniere und am Wormserjoch (s)
- A. austriaca* (Jacq.) Wahlenb.—**T** Stilsferjoch (s)
- A. sedoides* (L.) Kittel—**T** Rosenjoch, Stilsferjoch, Payer-hütte (s); **B** Zugspitze (s), Kahlersberggipfel (j)
- A. biflora* (L.) Wahlenb.—**B** Zugspitze (s)
- Arenaria ciliata* L.—**T** Stilsferjoch, (s); **P** Imbadhorn (j)
- A. biflora* L.—**T** Rosenjoch, **K** Bergerthörl gegen Peisch-lachalm, 2450 (j)
- Moehringia bavarica* (L.) Kern.—**T** Ponalestraße (j)
- M. polygonoides* (Wulf.) Mert. u. Koch—**B** Feuchte Stellen der Käseralpe bei Obersdorf (K. Groß)
- M. muscosa* L.—**B** Ramsau bei Reichenhall, (j) Seisen-bergklamm südlich Hirschbüchel (s)
- Viscaria alpina* (L.) G. Don—**K** Vom Bergerthörl gegen die Peischlachalpe an der Kalserseite, 2500 m (j)
- Silene Saxifraga* L.—**T** Mendel (s), Torbole (j)
- S. elongata* Bell.—**T** Dreisprachenspitze am Ortler, (s); **S** Kaprunertal (s); **B** Kahlersberggipfel (j), Zugspitze gegen Ehrwald (s)

- Silene rupestris* L.—**T** Casa Bolognini; **J** Piz Umbrail (s)
S. Armeria L.—**T** Mittleres Eggental, Dimaro (s)
S. Otites (L.) Sm.—**T** Lavis
Heliosperma quadrifidum (L.) Rchb.—**T** Costalunga gegen Vajolonpaß, Westseite des Rosengartens (j); **B** Herzogenstand (s), zwischen Jettenberg und Ramsau im Schwarzbachtal (j), Rote Wand bei Schliersee (Rodler)
Gypsophila repens L.—**T** Tonalepaß (s), **B** Reiteralpe, Fischkunkel beim Königssee (j), Rote Wand bei Schliersee (Rodler), Flußgerölle der Trettach bei Spielmannsau (s); **Schw** Straße nach Schüls (s), **J** zwischen Bormio und Stilfserjoch, Gaviapaß (s)
Tunica Saxifraga (L.) Scop.—**T** Sarntal (j)
Dianthus monspessulanus L.—**T** Mittleres Eggental (j)
D. speciosus Rchb.—**T** Karwald zum Bewaller, Pra di Contrin, Pellegrino (j)
D. glacialis Haenke—**T** Geierspitze, Weryhütte im Hintertux (j), Bedole zum Mandron (s), **K** Bergerthörl, **S** Imbachhorn (j), **J** Piz Umbrail (s)
 var. *Buchneri* DT—**K** zwischen Glockner und Heuschober am Berger Thörl 2450 m (25. Juli 1891, j)
D. Seguieri Vill.—**T** Runkelstein (s)
D. inodorus (L.)—**T** Stilfserjochstraße am Weißen Knott, Casa—Mandron (s), Bolognini, **K** Kals, Berger Thörl (j)
Saponaria Pumilio (L.) Fenzl—**S** Hoher Sonnblick bei Kolm Seigurn, 2500 m (j)
S. ocymoides L.—**T** Stephansbrücke bei Innsbruck an der Brennerbahn, Sterzing, San Nicolo (j), Val di Sol (s)
Nuphar Spennerianum Gaud.—**B** Spitzingsee bei Schliersee (Rodler)
Trollius europaeus L.—**T** Monte Roën (s), **S** Ebenwald im Kapruner Tal (s), **B** Rainthaler Bauer oberhalb Partenkirchen (j)
Callianthemum coriandrifolium Rchb.—**T** Frauenwand bei Hintertux, **S** Imbachhorn (j)
Helleborus niger L.—**S** Bluntauatal südlich von Golling, 470 m (j)
Aquilegia atrovioacea (Ave-Lallm.) **T** Golfrion am Westfuß des Latemar (j), **B** Reichenhall (s)
A. Einseleana F. Schultz—**T** Hinter Schluderbach—Höhlenstein, 1700 m (Buchner)
Aconitum ranunculifolium Rchb.—**T** Golfrionalpe und Karerwald (j)
A. paniculatum Lam.—**T** zwischen Obereggenenthal und Golfrionalpe; Fassatal zwischen Campitello und Alba (j)

- Aconitum rostratum* Bernh.—**T** Obereggenal nach Golfrionalpe; Val Monzoni bei San Nicolo; **B** Landtal oberhalb des Königssees, 1300 m (j)
- A. medium* Schrad.—**T** Nordfuß des Latemar (j)
- Pulsatilla vernalis* (L.) Mill.—**T** Westliche Anhöhe über Brennerpaß; Latemar, Golfrion westlich von Latemar (j); **J** Umbrail (s)
- P. alpina* (L.) Schrk.—**T** Griffalpe unter der Geierspitze (j); **B** Reiteralm bei Ramsau unter Grünanger (s), Landtal zwischen Gotzen und Kahlersberg am Königssee gegen den Bärensunk, 1700 m, Heimgarten bei Ohlstadt, Krottenkopf bei Partenkirchen (j)
- P. sulfurea* (L.) DT. u. S.—**T** Zangenberg, Rotella am Sella-joch in Gröden (j)
- Anemone trifolia* L.—**T** Kreuzberg im Fischleintal bei Sexten (Buchner)
- A. baldensis* L.—**T** Latemar am Südabhang, Pra di Contrin zum Col Laz, Val Selle 2450 m zwischen San Pellegrino und San Nicolo in Fassa (j)
- Clematis recta* L.—**T** Val di Non, San Romedio nach San Zeno (s); Eingang im Valsugana bei Trient (s)
- Cl. alpina* (L.) Mill.—**J** Nößlalm im Voldertal, zwischen Golfrion und Reiterjoch westlich des Latemar (j), Schuß bei Kreuzberg zwischen Sexten und Padola (Buchner), Aufstieg zum Monte Roën bei Malga Roman (s), **K** Kalsertal über der Klamm am Spöttlingtauern, 1750 m; **B** Zugspitze zwischen Eibsee und Wiener Neustädter Hütte (j), Reiteralm bei Ramsau (s)
- Oxygraphis glacialis* (L.) DT.—**T** Rosenjoch, Val Selle bei San Pellegrino (j), Stilsferjoch (s), **S** Gipfel des Hohen Sonnblick bei Kolm-Seigurn, Wintergasse zwischen Hocheisen und Hohe Riffel bei Kaprun, vom Kapruner Thörl zur Rudolphütte im Stubachtal (j); **J** Gaviapaß südl. San Catarina und Ortler, dunkelrot (s)
- Ranunculus parnassifolius* L.—**T** Sonnenjoch bei der Pertisau am Achensee; Val Selle nordwestlich von San Pellegrino (j)
- R. alpestris* L.—**B** Reiteralm bei Ramsau, Herzogenstand (j)
- R. Seguieri* Vill.—**T** Südhänge des Kleinen Latemar 2500 Meter; Col Laz bei Contrin, Val Duron, Ostseite des Rosengartens (j)
- R. aconitifolius* L.—**T** Griffalpe; **S** Mooserboden; **B** Kuhalm zwischen Krottenkopf und Walchensee (j); Reiteralm bei Ramsau (s)

- Ranunculus platanifolius* L.—**T** Karwald Temblweg zum Berwaller; Pirschatal bei Welschnofen (j); **B** Königsbach über dem Königssee (j)
- R. phthora* Crantz—**T** Bachertal bei Sexten (Buchner); Südseite des Cizellepasses zwischen Contrin und Pellegrino, Passo di Contrin zum Col Laz, vom Karerseehotel zur Kölner Hütte (j); **S** Torrener Joch vom Bluntautal ins Königsbachtal 1728 m (j)
- R. montanus* Willd.—**B** Kammerlinghorn, 2000 m (j)
- R. Breyninus* Crantz—**B** Herzogenstand bei Kochel mit starker Vergrünung (s)
- Thalictrum aquilegifolium* L.—**T** Volderer Wildbad (j), Monte Roën, Torbole (s), **B** Reichenhall (s)
- Th. foetidum* L.—**Schw** zwischen Martinsbruck und Altfinsternmünz (s)
- Th. flexuosum* Bernh.—**T** Prad (s), oberhalb Riva am Westufer des Gardasees (j), **B** zwischen Jettenberg und Reichenhall (s)
- Epimedium alpinum* L.—**T** Lavis (j)
- Papaver aurantiacum* Lois.—**T** Rosengarten, Ost- und Westseite; Circellapaß nördlich Contrin, Latemar (j), unter der Payerhütte, 2500 m (s), Bocca di Brenta (Prell)
- P. Sendtneri* Kern.—**B** Zugspitze (j)
- Corydalis lutea* (L.) DC.—**T** Ponalefall und Riva am Gardasee (j)
- Biscutella laevigata* L.—**T** Stephansbrücke bei Patsch an der Brennerbahn (j); Griffalpe (j); **S** Dierbacher Hohlwege des Saalachtals (j), Kapruner Tal (j); **B** Matten auf Obermädele bei der Kemptener Hütte (s)
- Aethionema saxatile* (L.) RBr.—**T** Westliche Höhen über Riva (j)
- Petrocallis pyrenaica* (L.) RBr.—**B** Gipfel des Kochlersberges (j)
- Thlaspi rotundifolium* (L.) Gaud.—**T** Stripsenjoch bei Kufstein, Ost- und Westfuß des Rosenjoches, Latemar, Circellapaß bei Contrin, Pellegrino (j), **S** Sonnenstein am Steinernen Meer (j), **B** Zugspitze (s) und Abstieg vom Kahlersberg ins Gotztal beim Königssee (j)
- Kernera saxatile* (L.) Rchb.—**T** Geierspitze (j), Kufstein (s) vom Trafoi zur Payerhütte (s), **B** Reintal bei Partenkirchen, Karlskopf bei Hirschbühl (j)
- Rhizobotrya alpina* Tausch—**T** Latemar nahe der Kölnerhütte (j)

- Sisymbrium Columnae* Jacq.—**T** Karwald und Niger bei Welschnofen (j), **B** Obersee am Königssee (j) zwischen Grünanger und Schwegelalpe, der Reiteralp und Ramsau (s)
- Cardamine trifolia* L.—**S** Gollinger Wasserfall (j)
- C. alpinia* Willd.—**T** Kaunsertal (s), Geierspitz, Gefrorene Wand (j), Val Selle nordwestlich Pellegrino (j), **K** Bergerthörl (j), **S** Hoher Sonnblick bei Kolm-Saigurn (j), **J** IV. Cantoniera am Wormserjoch (s)
- C. resedifolia* L.—**T** Kaunsertal (s), Geierspitz, Rosenjoch, Gefrorene Wand, Zangenberg im Obereggenal, Sasso negro bei Contrinhaus (j), Stilsferjoch (s), **K** Dorfertal und -alm (j)
- Lunaria rediviva* L.—**T** Kronmetz (s)
- Hutchinsia alpina* (L.) RBr.—**T** Griffalpe gegen Geierspitz, Kölnerhütte (j), **B** Zugspitze, Partnachtal, Reiteralpe (s) und Hintersee in Ramsau (j)
- H. brevicaulis* Hoppe—**T** Rosenjoch (j), Col Laz in Contrin und Sasso negro (j), **B** Zugspitze (s), **J** Gaviapaß (s)
- Draba confusa* Ehrh.—**K** Leitertal südlich Glocknerkar (j)
- D. tomentosa* Wahlenb.—**T** Latemar, Kölner Hütte (j), **B** Kammerlinghorn (j)
- D. dubia* Sauter—**T** Payerhütte an der Tabarettawand (s), **S** Wasserfallboden; **B** Kammerlinghorn (j)
- D. fladnitzensis* Wulf.—**T** Geierspitz, Latemar (j)
- D. aizoides* L.—**T** Latemar, Kölner Hütte (j), Paternsattel am Fuß der Dreizinnen (Buchner); **K** Berger Thörl (j); **B** Zugspitze (s), Kammerlinghorn (j); **J** Piz Umbrail (s)
- D. Hoppeana* Rchb.—**T** Rosenjoch (j)
- D. Sauteri* Hoppe—**T** Großer Latemar (j), **B** Gipfel des Kammerhorns (j)
- Arabis ciliata* (Reyn.) RBr.—**K** Bergerthörl; **B** Kahlersberg am Königssee, Hintersee und Ramsau mit *acaulis* (j)
- A. Turrita* L.—**T** Eggental und Runkelstein (j)
- A. pumila* Jacq.—**T** Gefrorene Wand, Latemar, Kölnerhütte, Vajolethütte zum Tschagerjoch am Rosengarten; **B** Kammerlinghorn (j), Gatterl im Wettersteingebirge (s), **J** Gaviapass (s)
- A. bellidifolia* Jacq.—**T** Griffalpe bei Geierspitz, Gefrorene Wand (j), **K** Leitertal, Südseite des Glocksners (j), **S** Kaprunertal (s)
- A. caerulea* (All.) Haenke—**T** Gefrorene Wand, Griesspitz an der Westseite; Sasso negro westlich Contrinhaus, Antermoja-Tal, Passo Selle zwischen San Nicolo und

- San Pellegrino (j), Schaubachhütte im Suldentale (s), **K** Bergerthörl südlich Glockner (j), **S** Sonnenstein am Südrand des Steinernen Meeres bei Saalfelden (j); **J** IV. Cantoniera am Wormserjoch (s)
- Arabis alpina* L.—**T** Werghütte auf der Gefrorenen Wand (j), **B** Zugspitze (s), Kammerlinghorn, zwischen Jettenberg und Ramsau im Schwarzbachtale (j); **J** Gaviapaß (s)
- Erysimum Cheiranthus* Pers.—**T** Zwischen Gossensaß und dem Eisacktunnel (j); **K** oberhalb Heiligenblut gegen die Pasterze (j)
- Matthiola valesiaca* Gay—**T** Westliche Höhen bei Riva am Gardasee (j)
- Reseda lutea* L.—**T** Eisacktunnel bei Gossensaß, Sarntal, Lavis (j)
- Drosera anglica* Huds.—**S** Saalfelden (s)
- Sedum roseum* (L.) Scop—**T** Rif. Taramelli im Monzontal, Contrinhaus (j), **K** Am Katzensteig im Leitertal südlich Großglockner; **S** zwischen Kolm-Seigurn und dem Radhaus auf den Hohen Sonnblick, **J** Gaviapaß (s)
- S. dasyphyllum* L.—**T** Welschnofen (j), **K** Kals und Heiligenblut, **S** Mauern in Rauris, Bucheben—Kolm—Seigurn (j)
- S. alpestre* Vill.—**T** Stilsferjoch (s)
- S. atratum* L.—**T** zwischen Trafoi und Stilsferjoch; **K** Leitertal und Pasterzenboden, Kalsertal; **S** Kleinfleißtal von Sonnblick nach Heiligenblut; **B** Zugspitze, Herzogenstand, Kahlersberg (j)
- S. annuum* L.—**T** Welschnofen (j); **K** Heiligenblut, Mauern bei Kals; **J** Wasserfall des Braulio bei Bormio (s)
- Sempervivum montanum* L.—**T** Volderbad (j), Stilsferjoch (s); **S** Moorboden vor dem Karlinger Kees (j)
- S. arachnoideum* L.—**T** Kaunsertal (s); **K** Mauern bei Kals (j), **J** Gaviapaß (s)
- Saxifraga adscendens* L.—**K** vom Kleinfleißkees zum Zirmsee östlich Heiligenblut, Kalsertal über der Klamm 1700 m, Glocknerhaus 2200 m (j)
- S. rotundifolia* L.—**T** Pircha zum Berwaller und Karerwald bei Karersee (j), Mandronhütte (s); **S** Kapruner Tal, **B** Schwarzbachtal zwischen Jettenberg und Ramsau (j)
- S. stellaris* L.—**T** Geierspitze (j), Stilsferjochstraße (s); **S** Kaprunertal; **B** Hintersee in Ramsau (j)
- S. muscoides* Wulf. var. *vulgaris* Engl.—**T** Sella Joch, Monzoni und Pellegrino, Sasso negro b. Contrin (j) var. *moschata* (Wulf.)—**S** Imbachhorn, Mooserboden (j) und Kapruner Tal (s), **J** III.—IV. Cantoniera am Stilsferjoch (s)

- Saxifraga muscoides* Wulf. var. *pygmaea* Haw.—**T** Gipfel des Großen Latemars 2800 m (j)
var. *atropurpurea* (Sternb.)—**T** Rosengarten, Westseite 2300 m (j)
- S. androsacea* L.—**T** Rosenjoch, Gefrorene Wand, Stilsferjochstraße (s), **K** vom Glocknerhaus zur Pfandlscharte (Buchner), Pasterzengletscher—Elisabeth-Glocknerhaus—Franz Josefshöhe (j); **B** Kahlersberg (j), **J** Piz Umbrail, Gaviapaß (s)
- S. hohenwarthii* Sternb.—**T** Westfuß der Coronelle am Rosengarten 2300 m (j)
- S. aphylla* Sternb.—**B** Kammerlinghorn (j), **J** Gaviapaß (s)
- S. aspera* L.—**T** Ehrenhauser Alm im Voldertal (s), Mandronfall (s), **S** Kleinfleiß zwischen Sonnblick und Heiligenblut (j)
- S. bryoides* L.—**T** Kaunsertal (s), Geierspitze (j), Stilsferjochstraße (s), **K** vom Kalsertauern nach Kals (j), **S** Imbachhorn (j), Naßwand am Mooserboden (j), **J** Gaviapaß (s)
- S. aizoides* L.—**T** Volderbad, Contrintal (j), **K** Pasterzenboden (j), **B** Herzogenstand bei Kochel (s), Kammerlinghorn, Hintersee in Ramsau (j), **S** Kaprunthal (j)
- S. hostii* Tausch—**T** Rif. Taramelli in Valle Sille gegen San Pellegrino 2000 m, Sasso negro bei Contrin (j)
- S. rhaetica* Kern.—**T** Trafoi zur Pragerhütte, Dimaro (s)
- S. aizoon* L.—**T** Mendel (j), Stilsferjochstraße, Schaubachhütte (s), **K** Kals gegen das Matreier Thörl (j), **S** Kaprunertal (s); **B** Landtal bei Berchtesgaden über Obersee (j); **J** Wasserfälle des Braulio (s)
var. *brevifolia* Sternb.—**T** Griffalpe am Geierspitz, Rosenjoch (j); **Schw** Remüs—Martinsbruck (j)
- S. caesia* L.—**T** Geierspitze, Kölner Hütte; **S** Kapruner Tal, **B** von Reichenhall nach Jettenberg (j), Herzogenstand (s); **J** Piz Umbrail (s)
- S. tombeanensis* Boiss.—**T** Matten bis 2250 m auf Dolomit unter der Kölner Hütte (j)
- S. oppositifolia* L.—**T** Gefrorene Wand, Latemar Westgipfel 1800 m (j), **S** Mooserboden (s), **B** Kammerlinghorn (j), **J** Gaviapaß (s)
- S. rudolphiana* Hornsch.—**T** Geierspitz (j)
- S. biflora* All.—**T** Geierspitz, Gefrorene Wand (j), **K** Berger Thörl, östlich Kals, (j), **S** Kaprunertal gegen Kalsertauern, Imbachhorn (j)
- Aruncus silvester* Kostel.—**B** Staubfall des Schwarzbaches bei Jettenberg (j)

- Rosa pendulina* L.—**T** Karwald nördlich Latemar (j), **B** Herzogenstand, Reiteralm bei Ramsau (s), Eingang zur Partnachklamm (j)
- Alchemilla pentaphyllea* L.—**T** Casa Bolognini gegen Mandronhütte (s), **J** IV. Cantoniera gegen Piz Umbrail, Gaviapaß (s)
- A. alpina* L.—**T** Glungezer (j); **B** Fischunkel bei Königssee (j), zwischen Reichenhall und Jettenberg (s)
- A. montana* Schmidt—**T** Oberhalb Gries am Brenner (j)
- A. glaberrima* Schmidt—**T** Val Donna gegen Campitello im Rosengarten (j), **S** Steinernes Meer (j); **J** Piz Umbrail (s)
- Sibbaldia procumbens* L.—**T** Schwarzsee im Voldertal, Rosenjoch (j), **K** Kaiser Franz Josefhöhe unter dem Glockner (j), **S** zwischen Bucheben und Kolm Seigurn in Rauris (j)
- Potentilla nitida* L.—**T** Karerseehotel gegen die Kölner Hütte, Cirellepaß (j), Brentagebiet (s)
- P. caulescens* L.—**T** Kaisertal bei Kufstein (s), Adlerwirt gegen Karersee (j), **B** von Reichenhall nach Jettenberg (j), Neuhaus bei Schliersee (Rodler)
- P. grandiflora* L.—**T** Pra Molin gegen Bousin westlich Campitello (j); Agums—Prad—Gomagoi, unterer Teil des Val di Genova (s)
- P. frigida* Vill.—**T** Rosenjoch (j)
- P. dubia* (Crantz) Zimm.—**B** Kammerlinghorn (j)
- P. sabnuda* Lam. u. DC.—**T** Glungezer und Rosenjoch (j)
- P. aurea* L.—**T** Glungezer oberhalb Gries an der Brennerbahn (j), **S** Kaprunertal (s); Gotzental bei Berchtesgaden (j); **J** IV. Cantoniera am Stilsferjoch (s)
- Geum montanum* L.—**T** Rosenjoch (j); Schaubachhütte bei Sulden (s), Zangenberg (j), **S** Kapruner Tal (j), **B** Reiteralm bei Ramsau (s)
- G. reptans* L.—**T** Rosenjoch, Hoher Latemar; **S** Kapruner Tal zum Riffelkees, unter dem Kleinen Fleißkees am Hohen Sonnblick (j)
- Dryas octopetala* L.—**T** Hinterbärenbad im Kaisertal, Monte Roën (s), Kölnerhütte gegen Karersee (j), **B** Reiteralm in Ramsau, Alpgartental bei Reichenhall (j), Südende des Waldensees (j)
- Cotoneaster tomentosa* Lindl.—**T** Westlicher Bergwald über Doß Trento, **B** Ufer des Hintersees in Ramsau (j)
- C. integerrima* Medik.—**T** Zangenberg, Stilsferjoch, Campitello gegen Pra Molin (j)
- Amelandier rotundifolia* (Lam) K. Koch—**T** zwischen Brennerpaß und Sterzing (j)

- Sorbus Aria* L.—**B** Partnachtal über der Knorrhütte (s)
- S. Chamaemespilus* (L.) Crantz—**T** Kölbllegg am Rosengarten, zahlreich (j), Monte Roën oberhalb Tramin (s); **B** Grat zwischen Herzogenstand und Heimgarten (j)
- Spartium junceum* L.—**T** Monte Brione, zwischen Torbole und Riva (j)
- Genista radiata* (L.) Scop.—**T** Zwischen Malga San Zeno und San Romedio; zwischen Monte Roën und San Romedio am Nonsberg, zwischen Fai und Andalo (j); westliche Höhen über Riva am Gardasee (j)
- Cytisus sessilifolius* L.—**T** Westlicher Bergwald über Doß Trento (j)
- C. nigricans* L.—**T** Mendel (s); Welschnofen nach Gummer (j)
- C. purpureus* Scop.—**T** Westliche Höhe über Riva am Gardasee; Lavis (j)
- C. Hirsulus* L.—**T** Lavis; westlicher Bergwald über Doß Trento (j)
- Ononis Natrix* L.—**T** Mendel, Tramin, Prad, Ufer des Molveno-Sees (s)
- O. rotundifolia* L.—**T** Finstermünz (s), **Schw** Schuls—Martinsbruck
- Medicago falcata* L.—**T** San Stefano im Val di Genova (s)
- M. rigidula* L.—**T** Torbole (j)
- Trifolium minus* Smith—**T** Höhe westlich von Doß Trento (j)
- T. badium* Schreb.—**T** Largotzalm ober Volderbad (j), Ehrwaldenalpe im Wettersteingebirge (s), von Obereggenal zur Golfrionalm (j), Stilfserjochstraße (s), **S** Kaprun; **B** Karlsboden am Kammerlinghorn (j)
- T. alpinum* L.—**T** Kaunsertal (s), Reiterjoch westlich Latemar (j); Stilfserjoch (s), Casa Bolognini zur Madronhütte (s)
- Dorycnium hirsutum* (L.) Ser.—**T** Zwischen Auer südlich Bozen und Tramin; zwischen San Zeno und San Romedio im Val di Non; von Cles nach Romeno (s)
- D. herbaceum* Vill.—**T** Monte Roën, zwischen Auer und Tramin (s)
- D. sericeum* Neilr.—**T** Absteig bei Nassereith (s)
- Lotus villosus* Thuill.—**T** Bozen, Brennerbahn bei Gries (s)
- Tetragonolobus siliquosus* (L.) Roth—**Schw** zwischen Ramüs und Martinsbruck in Unterengadin (s); var. *hirsutus*—**T** Prad.
- Galega officinalis* L.—**T** Mendel (s)
- Colutea arborescens* L.—**T** Eggental, Runkelstein (j)

Astragalus australis (L.) Lam.—**S** Kapruner Tal (s);
J Mündung des Braulio in die Adda (j)

A. alpinus L.—**S** Kaprunertal (j); **J** IV. Cantoniera nahe
den Wasserfällen des Braulio (s)

A. frigidus (L.) DC.—**T** Geierspitze, **K** Dorfer Tal nördlich
Kals auf der Dorfer Alpe (j); **S** Kaprunertal 1700 m (j)

A. Onobrychis L.—**T** Zwischen Agum und Prad (s); **Schw**
Finstermünzstraße bei Sins, zwischen Remüs—Martins-
bruck (s)

A. leontinus Wulf.—**J** Altes Bad Bormio zur I. Cantoniera (s)

A. leucanthus Sal. Marschl.—**T** Zwischen Glurns u. Prad (s)

Oxytropis Jacquini Bunge—**T** Geierspitze (j); **B** Landtal
oberhalb Königssee gegen den Kahlersberg (j); **Schw**
Sins in Unterengadin (s)

O. pilosa (L.) DC.—**T** Prad (s); **Schw** zwischen Remüs
und Finstermünz (s)

O. campestris (L.) DC.—**T** Finstermünz (s), Latemar,
K Spöttlingstauern bei Kals und Dorfer Ebene (j)

O. velutina (Sieb.) Schur.—**Schw** Sins—Martinsbruck (s);
J Umbrail, I., II. und IV. Cantoniera am Wormserjoch (s)

Coronilla Emerus L.—**T** Saumtal (j), Kronmetz über
Deutsch-Metz, zwischen Fai und Andalo (s)

C. vaginalis Lam.—**T** Pukelinsteg am Karersee, Costalunga
gegen Vajolonpaß, Westseite (j); **S** Trattenbachfall bei
Frohnwies-Saalach (j)

C. coronata L.—**T** Campitello gegen Bousin, westliche Höhen
über Riva (j)

Hedysarum obscurum L.—**T** Madseitbach bei Hintertux (j),
Latemar Pellegrino (j); **S** Kaprunertal (s), **B** Zugspitze (s),
Kahlersberg im Gagengebirge (j)

Vicia lutea L.—**T** Sarntal (j)

Lathyrus Aphaca L.—**T** Torbole (j)

L. variegatus (Ten.) Gren. u. Godr.—**T** Sarntal (j)

Geranium silvaticum L.—**T** Pircha-Bewaller-Karersee (j)

G. sanguineum L.—**T** Ponalestraße bei Riva (j)

Linum tenuifolium L.—**T** Von Deutschmetz nach Kron-
metz, zwischen San Michele u. Mezzolombardo, zwischen
Fai und Andalo, Monte Roën (s), Ponalestraße am Garda-
see (j)

L. viscosum L.—**T** Mendelpaß, Monte Roën, zwischen Fai
und Andalo (s)

Ruta graveolens L.—**T** Torbole (j)

Dictamnus albus L.—**T** Sarntal, Höhen westlich von Doß
Trento (j)

- Polygala Chamaebuxus* L. var. *grandiflora* Gaud.—**T** Oberhalb der Brennerbahn an den östlichen Hängen bei Gries (j)
- Euphorbia dulcis* L.—**T** Westlicher Bergwald bei Doß Trento (j)
- E. carniolica* Jacq.—**T** Westlich von Welschnofen bei Pircha 1300 m; Karwald am Fuß des Latemar, 1500 m (j)
- E. Gerardiana* Jacq.—**T** Mendelstraße bei Bozen (s), Riva (j)
- E. amygdaloides* L.—**B** Fuß des Watzmann (s), zwischen Jettenbach und Reichenhall (j)
- Empetrum nigrum* L.—**T** Sonnenbergalpe bei Hintertux (j), **K** Rudolfshütte im Kalser Tauern (j), Bergerthörl zur Puschlalgalm (s); **J** Piz Umbrail (s)
- Buxus sempervirens* L.—**T** Höhen über Riva am Gardasee (j)
- Pistacia Terebinthus* L.—**T** Guntschnaberg bei Bozen (j)
- Cotinus Coggygria* Scop.—**T** Sarntal (j); Val di Non zwischen Cles und San Zeno (s)
- Hibiscus syriacus* L.—**T** Weinbergmauern bei Deutschmetz, zwischen San Michele und Mezzolombardo (s)
- Myricaria germanica* (L.) DC.—**T** San Nicolo im Fassatal und Nikolatal (j), **B** Hintersee in Ramsau (j)
- Helianthemum apenninum* (L.) Mill.—**T** Mendelpaß zum Penegal (j)
- H. vineale* (Willd.) Spreng.—**T** Westl. Höhen über Riva (j)
- H. alpestre* (Jacq.) DC.—**T** Monte Roën (j), Latemar (j); **B** Partnachklamm gegen die Knorrhütte (s), Kahlersberg bei Berchtesgaden (j), Kammerlinghorn mit var. *hirtum* Koch.
- Fumana nudifolia* (Lam.) Janchen—**T** Zwischen Fai und Andalo (s), Lavis, Val Sugana (j)
- Viola biflora* L.—**T** Rosenjoch (j), **S** Kaprunertal, von Kolm Seigurn zum Hohen Sonnblick (j), **B** Reiteralp bei Ramsau, Herzogenstand (s)
- V. calcarata* L.—**J** IV. Cantoniera am Wormser Joch zum Piz Umbrail (s)
- Daphne cneorum* L.—**T** Monte Roën (s)
- D. striata* Tratt.—**T** Sonnenbergalm bei Hintertux; Golfriön am Westfuß des Latemar, 1800 m; **K** zwischen Heiligenblut und Pasterze; **B** Grat zwischen Herzogenstand und Heimgarten (j)
- Hippophaë rhamnoides* L.—**T** Fassatal bei San Nicolo (j), **B** Reichenhall (s)

- Epilobium Dodonaei* Vill.—**T** Eggental, Runkelstein (j)
E. Fleischeri Hochst.—**T** Zwischen Gomagoi und St. Gertrud bei Sulden, Gampenhöfe bei Sulden (s); San Stefano im Val di Genova
E. alpestre (Jacq.)—**S** Kaprunertal (s)
E. alsinefolium Vill.—**T** Lagerwand unter der Schaubachhütte (s); **S** Kaprunertal (s); **B** Hintersee in Ramsau (j); **J** Piz Umbrail (s)
Circaea alpina L.—**T** Contrintal (j); **B** zwischen Ramsau und Hintersee (j)
Astrantia vulgaris (Koch)—**T** Mendel, Torbole; **B** Ramsau (s)
A. involucrata (Koch)—**T** Monte Roën (s)
A. minor L.—**T** Casa Bolognini, am Ende des Val di Genova (s); **J** zw. St. Apollonia und dem Gaviapaß, südlich Bormio (s)
Bupleurum stellatum L.—**J** Südseite in halber Höhe des Gaviapasses (s)
Trinia glauca (L.) Dum.—**T** Val Gujana; westliche Höhen über Doß Trent (j)
Laserpitium latifolium L.—**T** Temblweg bei Bewaller-Karensee (j), Costalunga gegen Vajolonpaß, Westseite (j)
L. Siler L.—**B** Karlstein bei Reichenhall (s)
-
- Pyrola uniflora* L.—**T** Umgebung von Welschnofen, Lavis, Torbole (j)
P. media Twardt.—**T** Lochnertal östlich Welschnofen, 1200 m, westlich Welschnofen im Wald zwischen Pircha und Bewaller, 1350 m (j)
Rhododendron ferrugineum L.—**B** Reiteraln bei Ramsau, Kammerlinghorn; weißblühend, Kaunsertal, Gepatschhaus, Glungezer (j)
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.—**T** Glungetzer, Zangenberg (j); **K** Bergerthörl bei Kals, Seebichlhaus bei Zirmsee östlich Heiligenblut (j); **S** Imbachhorn bei Kaprun (j); Geisstein am Kitzsteinhorn (s); **J** Umbrail (s)
Rhodothamnus Chamaecistus (L.) Rchb.—**S** Sonnenstein, Südrand des Steinernen Meeres bei Saalfelden (j); **B** Zwischen Heimgarten und Herzogenstand bei Kochel (j); Reiteraln und Reitersteinberg bei Ramsau (s), Fuß des Gotzen im Landtal am Königssee, Kammerlinghorn (j)
Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng.—**T** Oberhalb Gries an der Brennerbahn; Sommerbergalm bei Hintertux; Welschnofen (j), Monte Roën, Mendelstraße (s)

- Arctous alpina* (L.) Niedz.—**T** Unter der Kölner Hütte, 2222 m, Weißlahnbad (j)
- Erica carnea* L.—**B** Herzogenstand, Kammerlinghorn bei Hirschbüchl, Krottenkopf (j)
- Primula farinosa* L.—**T** Brenner, Golfrian und Mailenhaus am Reiterjoch westlich von Latemar (j), **B** Krottenkopf, Hintersee und Reiteralm bei Ramsau, Grünau bei Partenkirchen (j)
- P. longiflora* All.—**T** Kölnerhütte, 2250 m; Val Donna gegen Duronpaß 2250 m, Lasso negro bei Contrin (j); **B** Bergerthörl östlich Kals (j)
- P. Auricula* L.—**T** Stripenkopf im Zahmen Kaiser; **S** Steinernes Meer; **B** Grat vom Herzogenstand nach Heimgarten, Karlskopf am Kammerlinghorn (j), Reiteralm bei Ramsau (s)
- P. villosa* All.—**T** Voldertal, Schwarzensee gegen Rosenjoch (j)
- P. glutinosa* Wulf.—**T** Glungezer und Rosenjoch (j); Kaunsertal (s), Helm (Buchner) Lagerwand bei der Schaubachhütte (j), **S** Hoher Sonnblick in der Rauris, Kapruner Thörl gegen die Kalser Tauern; **J** Gaviapaß, Piz Umbrail (s)
- P. minima* L.—**T** Rosenjoch; **S** Kapruner Tal (j)
- P. Floerkeana* Schrad.—**T** Hintertux (j)
- Douglasia Vitaliana* (L.) Hook.—**T** Bosin gegen Donnaß westlich Campitello; Punta di Selle bei Pellegrino, 2600 m (j); Padonpaß nördlich von der Marmolata (Prell)
- Androsace Chamaejasme* Host—**T** Latemar, Zangenberg (j); **B** Reitersteinberg auf der Reiteralm bei Ramsau (s), Zugspitze, Kammerlinghorn, Bärensunk am Kahlersberg (j)
- A. obtusifolia* All.—**T** Griffalpe am Geierspitz, Rosenjoch (j), Latemargipfel 2800 m (j), Spitze des Helm (Buchner), Kals-Matreier-Thörl (j); **Schw** Novellaweg bei Martinsbruck (s); **J** Piz Umbrail (s)
- A. helvetica* (L.) Gaud.—**T** Latemar, 2800 m
- A. alpina* (L.) Lam.—**T** Kaunsertal (s), Rosenjoch (j), Stilsferjochstraße (s), Punta di Selle bei Pellegrino (j), **S** Mooserboden (j), **J** Gaviapaß (s)
- Soldanella alpina* L.—**B** Krottenkopf, Herzogenstand, Hochschirr am Kahlersberg (j)
- S. pusilla* Baumg.—**T** Rosenjoch (j), Schaubachhütte (j), **S** Wasserfallboden im Kapruner Tal (s)
- S. minima* Hoppe—**S** Wasserfallboden im Kapruner Tal (j)
- Cyclamen europaeum* L.—**T** Eingang ins Valsugana (s), **B** zwischen Reichenhall und Jettenberg (j)

- Armeria alpina* (Hoppe) Willd.—**T** Val di Selle bei Pellegrino, 2100 m (j), Val Vermiglio (s); **K** Leiertal am Glockner (j), **J** Gaviapaß (s)
- Erythraea ramosissima* (Vill.) Pers.—**T** Kramsach bei Brixlegg (s)
- Gentiana lutea* L.—**B** Herzogenstand (s)
- G. punctata* L.—**T** Rosenjoch bei Volders, Geierspitze (j); Monte Roën (s); **K** Peischlachalm bei Kals (j)
- G. pannonica* Scop.—**B** Alpenmatten der Rotwand bei Schliersee und Abstieg nach Spitzingsee (Kränzle); Hirschbüchel gegen Kammerlinghorn (j.)
- G. asclepiadea* L.—**T** Hinterbärenbad bei Kufstein; **B** Tegernsee (j)
- G. cruciata* L.—**B** Hirschbüchel (j)
- G. vulgaris* Neilr. (acaulis auct.) **B** zwischen Urfeld und Waldensee, Herzogenstand, Kahlersberg bei Königssee, Kammerlinghorn (j), Reiteralm bei Ramsau (s)
- G. latifolia* (Gren. und Godr.) (excisa auct.) **T** Griffalpe am Geierspitz (j), oberhalb Gries am Brenner (j), Südausläufer des Latemar, fl. albis (j), Torbole (s); **K** Imbachhorn (j); **S** Kapruner Tal (j); **J** Pez Umbrail (s)
- G. brachyphylla* Vill.—**T** Rosenjoch, Geierspitze (Stilfserjoch) (s); **B** Kammerlinghorn (j), **J** Umbrail (s)
- G. bavarica* L.—**S** Kapruner Tal (j); **B** Kahlersberg bei Königssee, Kammerlinghorn (j)
- G. nivalis* L.—**T** Geierspitze, unter der Kölner Hütte, 2250 m (j), Stilfserjoch (s), **S** Mooserboden
- G. utriculosa* L.—**S** Vom Hohen Sonnenblick nach Heiligenblut (j)
- G. antecedens* Wettst.—Stilfserjochstraße (s)
- G. Sturmiana* Kern.—**K** Spöttlingtauern bei Kals (j)
- G. solstitialis* Wettst.—**T** Matten südlich von Golfrion 1800 m am Westfuß des Latemar (j), **K** Spöttlingtauern bei Kals (j)
- G. rhaetica* Kern.—**K** Spöttlingtauern bei Kals (j)
- G. tenella* Rottb.—**T** Lagerwand zwischen Gampenhöfen und Schaubachhütte (s); **S** Kaprunertal (s)
- Sweetia perennis* L.—**T** Abhänge des Helm gegen Sexten (Buchner)
- Polemonium caeruleum* L.—**T** Monte Roën, Stilfserjochstraße (s)
- Cynoglossum creticum* Vill.—**T** Monte Brione, zwischen Torbole und Riva (j)
- Lappula edinata* Gilib.—**T** Eggental; Wolfsgrube bei Welschnofen gegen Tiers (j)
- L. deflexa* (Wahlenb.) Garcke—**T** Mittleres Eggental 600 m

- Eritrichium terglouense* (Hacq.) Kern.—**T** Padonpaß im Marmolatagebiet 2300 m (Prell), Passo di Selle bei Pellegrino 2550 m und Punta Sella (j), Sasso negro bei Contrin 2480 m, **J** Gaviapaß bei Aqua benedetta (s)
- Andrusa italica* Retz.—**Schw** Zwischen Remms und Martinsbruck in Unterengadin (s)
- Myosotis alpestris* Schmidt—**S** Kapruntal, Imbachhorn (j)
- Cerintho alpina* Kit.—**T** Zwischen Obereggenal und dem Golfriön 1750 m Westfuß des Latemar (j)
- Ajuga genevensis* L.—**T** Rosenjoch (j)
- A. pyramidalis* L.—**T** Hintertux gegen Sommerbergalm, oberhalb Gries an der Brennerstraße, Umgebung von Welschnofen, Sasso negro bei Contrin 2480 m (j)
- Teucrium montanum* L.—**T** Costalungastraße - Karersee—Vigo (j); **S** Ramsau und Hintersee; Golling (j)
- T. Chamaedrys* L.—**T** Kramsach bei Brixlegg (s); Eggenal (j); Mendel bei Bozen (s)
- Melittis Melissophyllum* L.—**T** Sarntal albo; westlich Bergwald über Doß Trento (j)
- Lamium Orvala* L.—**T** Ponte alto im Val Sugana; Bergwald über Doß Trento (j)
- Stachys Jacquini* (Gren. und Godr.) Briq.—**T** Umgebung von Welschnofen; unter der Kölner Hütte gegen Kolblegg (j), Fischleintal bei Sexten (Buchner), **B** Fischunkel hinter dem Königsee (j)
- St. hirsuta* (L.) D.T. u. S.—**T** Pra Molin zwischen Pousin und Compitello (j)
- St. alpina* L.—**T** von der Wolfsgrube bei Welschnofen nach Tiers (j), **B** Partnachtal (s), zwischen Hintersee und Ramsau (j)
- Salvia Hormium* L.—**T** Val Suganabahn bei Trient (j)
- Hormium pyrenaicum* L.—**T** Umgebung von Welschnofen, Zangenberg westlich Latemar 1950 m (j), Fischleintal (Buchner), Stilsferjochstraße (s), **B** Funtenseealm, Königsee (j), **J** Gaviapass (s)
- Satureja grandiflora* (L.) Schede—**T** zwischen Fai und Andalo; im unteren Val di Genova (s)
- S. nepetoides* (Jord.) Briq.—**T** Eggenal 600 m (j)
- Cymbalaria muralis* Baumg.—**T** Eingang ins Val Sugana (j)
- Linaria alpina* (L.) Mill.—**T** Glungezer—Rosenjoch, zwischen Gossensaß und dem Eisackttunnel, Rosengarten nahe der Kölner Hütte 2300 m, Stilsferjochstraße (j); **S** Mooserboden, Kahlersberg (j); **B** Kammerlinghorn (j)
var. *concolor* Bruhin—**T** Geierspitz, **B** unter der Wiener Neustädter Hütte und Zugspitze (j)

- Scrophularia vernalis* L.—**T** Val Monzoni östlich vom Fassatal 1800 m (j)
- Sc. Hoppei* Koch.—**T** Fucchiade bei Pellegrino, Eingang ins Val Sugana, Malga Brenta alta nach Malga Brenta bassa (j)
- Veronica Bonarota* L.—**T** Südseite des Latemar 2600 m, Kölner Hütte 2350 m; Ref. Taramella im Val Selle bei Pellegrino 2000 m; von Pellegrino über den Cirelle nach Contrin 2280 m (j), Molveno an der Brenta (s); Val Fondo des Monte Cristallo (Buchner)
- V. spicata* L.—**T** Mendel; **J** St. Catarina nach Bormio (s)
- V. fruticans* Jacq.—**T** Sonnenbergalpe bei Hintertux, Costalungapaß (j); **B** Kammerlinghorn (j)
- V. fruticulosa* L.—**T** Welschnofen zur Kölner Hütte gegen Costalungapaß 2300 m, Karersee Hotel 1350 m (j)
- V. alpina* L.—**T** Sommerbergalpe, Rosenjoch, Schmirnerjoch (j)
- V. serpyllifolia* L. var. *nummularioides* Lec. Lunn.—**T** Kölnerhütte gegen Costalungapaß 2300 m (j)
- V. bellidioides* L.—**T** Latemar (j), **K** Spöttingtauern bei Kals (j); **Schw** Scarlpaß zwischen Taufers und Schuls-Tarasp, Wovellenweg zwischen Altfinstermünz und Martinsbruck (s); **J** Marengofall gegen Wormser Joch, Piz Umbrail (s)
- V. Teucrium* L.—**T** Welschnofen (j)
- V. aphylla* L.—**T** Gefrorene Wand, Gipfel des Latemar 2800 m (j), **S** Kaprun (s), **B** Krottenkopf, Fuß des Gotzen im Landtal am Königssee; Kammerlinghorn (j)
- Digitalis lutea* L.—**T** Sarntal, Welschnofen und Umgebung, Pircha 1380 m (j), Gomagoi im Suldental, Val di Genova (s)
- Melampyrum silvaticum* L.—**T** Welschnofen (j), **B** Ramsau (j)
- Tozzia alpina* L.—**B** Waldensee; vom Königssee über Sagereck aufs Steinerne Meer (j)
- Euphrasia minima* Jacq.—**T** Largotzalpe bei Volderbad; Zamaier Trögl bei Welschnofen (j)
- E. pulchella* Kern.—**T** Kolblegg westlich unter der Kölner Hütte, Sasso nero im Contrintal 2480 m (j)
- Bartschia alpina* L.—**T** Kölner Hütte (j), **S** Salzburg (s); **B** Grat zwischen Herzogenstand und Heimgarten (j); **J** Gaviapaß (s)
- Alectorolophus lanceolatus* (Kov.) Sterneck.—**T** Kolblegg bei Welschnofen, Zangenberg (j)
- Pedicularis tuberosa* L.—**T** Griffalpe zur Geierspitz (j); **S** Imbachhorn (j), **K** Kalsertal am Spöttingtauern (j)
- P. elongata* Kern.—**T** Golfriön am Westfuß des Latemar; Matten bei Kolblegg gegen die Kölner Hütte 1700 m (j)

- Pedicularis rostratospicata* Crantz—**B** Kahlersberg am Königssee (j)
- P. rostratocapitata* Crantz—**T** Geierspitz, Latemar 2700 m, unter der Kölner Hütte, hellrosa (j); Stilsferjoch (s), **K** Kals gegen Bergerthörl, hellrosa (j), **S** Wasserfallboden (j); Herzogenstand bei Kochel (j), Kammerlinghorn (j)
- P. Kernerii* DT.—**T** Passo di Selle bei Pellegrino, 2525 m; Sasso negro bei Contrin 2480 m (j), Mandronhütte, Stilsferjoch (s)
- P. asplenifolia* Flörke—**T** Naviser- und Rosenjoch (j), **K** Matten oberhalb des Zirmsees über Heiligenblut
- P. verticillata* L.—**T** Golfrion am Westfuß des Latemar 1800 m; Sasso negro bei Contrin 2480 m; Kölner Hütte (j); **B** Rote Wand bei Schliersee (Rodler); **J** Mündung des Braulio in die Adda; Piz Umbrail (s)
- P. recutita* L.—**S** Kaprunertal (j)
- P. foliosa* L.—**B** Landtal über dem Königssee (j)
- P. rosea* Wulf.—**T** Kölner Hütte 2300 m; Latemar, Südseite 2650 m (j)
- Pinguicula alpina* L.—**T** Oberhalb Gries an der Brennerbahn; **S** Mooserboden; **B** von Partenkirchen zum Krottenkopf (j)
- P. vulgaris* L.—**T** Torbole (j); **S** zwischen Bucheben und Kolm-Seigurn; **B** Wiesen bei Partenkirchen (j)
- Globularia nudicaulis* L.—**B** Herzogenstand, Krottenkopf, zwischen Jettenberg und Reichenhall (j)
- G. cordifolia* L.—**T** Hintertux; Fassatal bei San Nicolo; westliche Höhen über Doß Trento, **S** Diesbacher Hohlwege im Saalachtal; **B** Herzogenstand, zwischen Urfeld und Walchensee, zwischen Reichenhall und Jettenberg (j)
- Plantago alpina* L.—**T** Karwald gegen Latemar 2200 m (j)
- P. serpentina* Vill.—**T** Weißer Knott an der Stilsferjochstraße (j)
- P. montana* Huds.—**B** Eschenalm am Krottenkopf (j)
- Asperula aristata* L.—**T** Monte Roën, zwischen Fai und Andalo (s)
- Galium aristatum* L.—**T** Kufstein, im Kaisertal (j)
- G. verum* L.—**T** Lavis (j)
- G. purpureum* L.—**T** Eggental (j), Runkelstein, zwischen Fai und Andalo (s)
- G. helveticum* Weigel—**T** Lavis (j)
- G. boreale* L.—**T** Bozen (s)
- Linnaea borealis* L.—**T** Kaunsertal, zwischen St. Gertrud und Gomagoi (s)

- Lonicera nigra* L.—**T** Karwald und Umgebung (j)
L. caerulea L.—**T** Joch zwischen Pircha und Bewaller bei Welschnofen, Karwald, Kolblegg gegen die Kölner Hütte (j)
L. alpigena L.—**T** Karwald und Umgebung, Bozen; **B** Reichenhall hinter dem Mauthäusl (j)
Valerianella dentata (L.) Pollich var. *lasiocarpa* Rchb.—**T** Valsugana (j)
Kentranthus ruber (L.) DC.—**T** Sarntal (j)
K. angustifolius (Vill.) DC.—**T** Von Tramin und Monte Roën (j)
Valeriana supina L.—**T** Westfuß der Rotwand des Rosengartens, von Fucciade zum Civelle — hier auch mit gestreckten Internodien; Kölner Hütte, Latemar (j)
V. saxatilis L.—**T** Latemar, westliche Höhen hinter Doß Trento (j); **B** Herzogenstand (s), Karlskopf am Kammerlinghorn (j); **J** Umbrail (s)
V. elongata L.—**T** Kölner Hütte, Cirellapaß von Contrin nach Pellegrino, Südseite (j)
V. montana L.—**T** Griffalpe westlich der Geierspitze, Kölner Hütte, westliche Höhen hinter Doß Trento (j); **B** Kammerlinghorn (j), Reintal bei Partenkirchen (s)
V. tripteris L.—**T** Zwischen Hintersee und Ramsau (j), Reiteralp bei Ramsau (s)
Scabiosa Columbaria L.—**T** Hintertux (j)
S. lucida Vill.—**S** Zell am See, Saalfelden (s)
S. graminifolia L.—**T** Torbole am Gardasee (j)
Campanula barbata L.—**T** Glungetzer, Welschnofen (j); **S** Kaprun (j), Priesbergalm am Königssee (j)
C. alpina Jacq.—**B** Kahlersberg im Hagengebirge (j)
C. cochlearifolia Lam.—**T** Gefrorene Wand (j)
C. Scheuchzeri Vill.—**T** Schwarzensee im Voldertale, Hintertux (j); **S** Kaprunertal (j); **B** Partnachtal (j), var. *hirta* Nsm.—**T** Hintertux (j)
C. spicata L.—**T** Mendel, Monte Roën (s), Welschnofen (j); **K** Kals (j)
C. cervicaria L.—**B** Eibsee bei der Zugspitze (j)
Synotoma comosum (L.) Schulz—**T** Contrintal—Marmolata-Gruppe 2000 m (Prell)
Phyteuma Halleri All.—**T** Ehrenhausenalm im Voldertal, Temblweg zum Bewaller südlich Welschnofen 1500 m (j), Gampenhöhe bei Sulden, zwischen St. Gertraud und Gomagoi (s)
Ph. betonicifolium Vill.—**T** Voldertal (j)

- Phyteuma Michellii* All.—**T** Nöslalm im Voldertal (j), Sarnthal (j), **S** Riedlalm am Imbadhorn (j)
- Ph. orbiculare* L.—**T** Köblegg gegen die Kölner Hütte (j), **S** Imbadhorn, Saalachtal im Diesbacher Hohlwege (j)
- Ph. Siberi* Spreng.—**T** Duronpaß, Kölner Hütte gegen Karersee 2300 m, Sasso negro gegen Col Laz 2480 m, Latemar 26—2700 m, Punta Sella bei Pellegrino 2550 m (j)
- Ph. charmelioides* Biroli—**T** Bozen, Lavis (j), Denno (s)
- Ph. hemisphaericum* L.—**T** Glungetzer, Rosenjoch (j), Schuß zwischen Sexten und Padola (Buchner), Zangenberg (j), Stilsferjoch (s), **K** Kalsertal, Berger Thörl, **S** Imbadhorn (j), **Schw** Sins-Sent im Unterengadin (s), **J** Piz Umbrail, Gaviapaß (s)
- Ph. hedraianthifolium* Schulz—**J** Alte Bäder von Bormio am Braulio (s)
- Ph. pauciflorum* L.—**T** Geierspitze, bei der Kölner Hütte 2320 m, Passo Selle bei Pellegrino, Sasso negro bei Contrin, **K** Berger Thörl bei Kals, **S** Radhaus am Hohen Sonnblick der Rauris (j), **J** Piz Umbrail (s)
- Adenostyles Alliariae* (Gouan) Kern.—**T** Karwald und Umgebung (j), **K** Dorfertal bei Kals (j)
- A. alpina* (L.) Bl. und Fing.—**T** Wasserfälle bei Hintertux (j), **S** Kaprunertal (s), **B** zwischen Zellenberg und Ramsau im Schwarzachtal (j)
- Solidago alpestris* Waldst. und Kit.—**T** Griffalpe zur Geierspitze (j), **K** Kals—Matreier Thörl (j)
- Aster alpinus* L.—**T** Rosenjoch, Frauenwand in Hintertux, Mendel (s), Latemar, Westseite des Rosengartens (j), **K** Dorferalm bei Kals (j), **S** Imbadhorn, **B** Kahlersberg bei Königsee, Reiteralm bei Ramsau (s)
- A. Bellidiastrum* (L.) Scop.—**T** Kölner Hütte (j), **B** zwischen Ramsau und Hintersee (j), Reiteralm bei Ramsau (s), Waldhensee (s)
- Erigeron polymorphus* Scop.—**B** Landtal zwischen Gotzen und Kahlersberg, Kammerlinghorn, Engert zwischen Ramsau und Hirschbühel (j)
- E. uniflorus* L.—**T** Geierspitze, Rosenjoch, Kölner Hütte, Monte Roën, Punta Selle bei Pellegrino (j), Bedole (s), Lagerwand in Sulden (s), **K** Seebüchel und Zirmssee östlich Heiligenblut (j)
- Trimorpha alpina* (L.) Vierh.—**T** Stilsferjoch (s), Val Monzoni (j), **S** Kaprunertal (s), **B** Reiteralm bei Ramsau (s), **Schw** Remüs—Martinsbruck im Unterengadin (s)
var. *grandiflora* (Hoppe) Vierh.—**S** Kaprunertal

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bl. und Fing.—**T** Latemar, Sasso negro bei Contrin (j), **J** Piz Umbrail, Gaviapaß (s)

Leontopodium alpinum Cass.—**T** Frauenwand, Kallenspitze und Geierspitze bei Hintertux, Hochnißl östlich Achensee, Kölner Hütte und nach Karersee, Latemar Südseite, Punto di Sella bei Pellegrino, Col Laz bei Contrin (j), Monte Roën (s), **K** Kleinfleißkees nach Heiligenblut, Berger Thörl bei Kals, zwischen Heiligenblut und Glocknerhaus (j), **S** Naßwand am Mooserboden, Imbachhorn (j), **B** Kahlersberg im Hagengebirge, Hohes Brett (j), **J** Gaviapaß bei Aque Venedette, über den alten Bädern bei Bormio (s)

Gnaphalium norwegicum Gunn.—**T** Geierspitze, Sasso negro bei Contrin (j)

G. supinum L.—**T** Griffalpe, Rosenjoch (j), **S** Kapruner Tal, Reiteralm bei Ramsau, **J** IV. Cantoniera am Wormserjoch (s)

Inula britannica L.—Bozen (s)

Pulicaria dysenterica (L.) Gärtner.—**T** Mendelstraße (j)

Buphthalmum salicifolium L.—**T** Torbole (s)

Achillea atrata L.—**T** Wasserfallboden und Naßwand im Kapruner Tal (j), Karlsboden am Kammerlinghorn (j), **B** Reiteralm bei Ramsau (j)

var. *monocephala* Sendtn.—**T** Latemar, Rotwand am Westfuß der Kölner Hütte (j)

A. moschata Wulf.—**T** Griffalpe auf Geierspitze, Rosenjoch und Umgebung, Naviserjoch, Zangenberg bei Obereggen (j), Stilsferjoch (s), Spitze des Helm bei Sexten (Buchner), **S** Radhaus am Hohen Sonnblick bei Kolm—Seigurn (j), Kapruner Tal (s), **J** Umbrail (s)

Achillea Clavenae L.—**T** Monte Roën (s), Karersee zur Kölner Hütte (j), **B** Reiteralm bei Ramsau (s), Bärensunk am Kahlersberg bei Königsee (j), Kalskopf am Kammerlinghorn (j)

A. nana L.—**T** Lagerwand unter der Schaubadhütte bei Sulden, **J** Gaviapaß (s)

A. macrophylla L.—**T** Oberhalb Kreuzberg bei Sexten 1900 m an der venetianischen Grenze (Buchner)

A. tomentosa L.—**T** Dimaro, **J** Gaviapaß (s)

Chrysanthemum coronopifolium Vill.—**T** Rodella am Sellajoch bei Gröden, Stilsferjoch, Val di Genova (s), **S** Imbachhorn, Wasserfallboden im Kaprunertal (j)

- Artemisia Lobelii* All.—**T** Valsugana (j)
- A. laxa* (Lam.) Fritsch—**T** Gefrorene Wand, Rosenjoch (j) an dem Lagerrand bei Sulden; zwischen Gampenhöfen und Schaubadhütte (s); **K** Pasterzenboden, Winterpass zwischen Hocheisen und Glockner, Berger Thörl bei Kals (j)
- A. Genipi* Weber—**T** Schaubadhütte am Ortler (s); Punta di Sella bei Pellegrino; Sasso negro bei Contrin; Westgipfel des Latemar; **K** Bergerthörl bei Kals, Pasterzenboden am Glockner (j)
- Petasites albus* (L.) Gaertn.—**B** Von der Kuhalm nach Walchensee (j)
- P. niveus* (Vill.) Baumg.—**T** An der Brennerbahn bei Gries (j)
- Homogyne alpina* L. Cass.—**T** An der Brennerbahn bei Gries; Latemar (j), Stilfserjoch (s); **S** Kaprunertal (s), **B** Aufstieg zum Krottenkopf (j), Reiteralm bei Ramsau; Herzogenstand bei Kochel (s)
- Doronicum Clusii* (All.) Tausch—**T** Vom Naviserjoch zum Mollgrübler (j); **K** Kleinfleißtal östlich Heiligenblut (j)
- D. glaciale* (Wulf.) Nyman—**T** Punta di Selle (j); **J** Marangotal gegen das Wormserjoch (s)
- D. grandiflorum* Lam.—**B** Fuß des Gotzen im Landtal bei Königssee (j); Reiteralm bei Ramsau (s)
- Senecio alpinus* (L.) Scop.—**T** San Pellegrino; **B** Partnachtal bei Partenkirch (j), Spitzingsee bei Schliersee (Rodler)
- S. rupestris* Waldst. und Kit.—**T** Ratzöler Tal bei Welschnofen (j)
- S. abrotanifolius* L.—**T** San Pellegrino, auch mit gelben Blüten; Val Donna (s)
- S. carniolicus* Willd.—**T** Rosenjoch; Pousinkette zwischen Campitella und Donnapaß (j), Passo di Selle gegen Pellegrino (j), Stilfserjoch (s); **K** Kals-Matreier Thörl, Seebühlhaus zum Zirmsee und Heiligenblut (j)
- S. Fuchsii* Gmel.—**T** Volderer Wildbad (j)
- S. Doronicum* L.—**T** Griffalpe zwischen Geierspitze, Col Laz bei Contrin (j), Stilfserjochstraße (s)
- Saussurea alpina* (L.) Spreng.—**T** Latemar Westgipfel; **K** Glocknerhaus gegen Heiligenblut (j)
- S. lapathifolia* (L.) Beck—**T** Vom Passo di Contrin zum Col Laz (j)
- Carduus Personata* (L.) Jacq.—**T** Nösslalpe und Ehrenhauser Alpe im Voldertal (j)
- C. defloratus* L.—**T** Hintertux (j)

- Cirsium heterophyllum* (L.) All.—**T** Nösslalpe im Volder-
tal (j)
- C. rivulare* (Jacq.) Link—**T** Karwald und Umgebung (j)
- C. Erisithales* (L.) Scop.—**T** Bad Ratzes am Schlern;
Bewaller zum Temblweg gegen Karersee (j)
- C. spinosissimum* (L.) Scop.—**T** Voldertal (j)
- Centaurea montana* L.—**B** Landtal unter dem Kahlers-
berg (j); Herzogenstand bei Kochel (s)
- C. maculosa* Lam.—**T** Welschnofen (j), Bozen (s)
- C. rhenana* Bor.—**T** Eggental (j), Bozen, Mendelstraße (s)
- C. dubia* Suter—**T** Temblweg zum Bewaller, Karersee-
hotel (j)
- C. elatior* (Gaud.)—**T** Nösslalm im Voldertal (j), **S** Kaprun (s),
B Hirschbüchel gegen Kammerlinghorn (j)
- C. plumosa* Lam.—**T** Golfrion am Westfuß des Latemar
unter der Kölnerhütte (j), Umgebung des Karerseehotels,
Pellegrino, Pra di Contrin (j)
- Hypochaeris uniflora* Vill.—**T** Griffalpe am Geierspitz,
Golfrionmatten, Monte Croce in Sexten (j), Stilsferjoch,
Val di Genova (s); **K** Kals—Matreier Thörl (j)
- Leontodon Taraxaci* (All.) Loisel.—**T** Westfuß des Rosen-
garten nahe der Kölner Hütte, 2300 m (j)
- Scorzonera humilis* L.—**T** Sumpfige Matten zwischen
Pircha und Bewaller; Köblbleggmatten östlich Welschnofen (j)
- Sc. cristata* Ramond—**T** Golfrion, Westfuß des Latemar,
unter der Kölner Hütte, Pra di Contrin gegen Col Laz
südlich Campitello (j)
- Willemetia stipitata* (Jacq.) DT.—**T** Vom Mösl zu den
Kölblingwiesen östlich Welschnofen 1650 m (j)
- Mulgedium alpinum* (L.) Cass.—**T** Unter der Frauen-
wand bei Hintertux, westlich Karwald am Fuß des Late-
mar; **B** Königsache über dem Königssee, Reiteralm bei
Ramsau (s)
- Crepis incarnata* (Wulf.) Tausch—**T** Fischleintal bei Sex-
ten (Buchner)
- C. aurea* (L.) Cass.—**B** Partnachtal, Reiteralm in Ramsau (j)
- C. blattarioides* (L.) Vill.—**T** Westlich unter Pra del Ma-
sere nördlich von Costalunga 1800 m auf Dolomit des
Rosengarten (j)
- C. montana* (L.) Tausch—**T** Costalunga gegen Vajolonpaß,
Westseite (j)
- Prenanthes purpurea* L.—**T** Karwald bei Welschnofen (j);
B Weißbachklamm am Hochkalter, von Jettenberg nach
Reichenhall (j)

- Hieracium aurantiacum* L.—**T** Golfrion am Westfuß des Latemar (j)
H. villosum Jacq.—**T** Golfrion am Westfuß des Latemar (j), Stilsferjoch (s); **B** Landtal am Königssee (j), Reiteralm in Ramsau (s)
H. glabratum Hoppe—**B** Zwischen Kochel und Waldensee (s), Landtal am Königssee (j)
H. scorzonerifolium Vill.—**T** Golfrion am Latemar (j)
H. glanduliferum Hoppe—**K** Bergerthörl bei Kals (j)
H. Murettii Gremlı—**T** Welschnofen auf Porphyrfelsen, 1100 m (j)
H. humile Vill.—**B** Hirschbüchel gegen Oberweißbach (j)
H. alpinum L.—**T** Bedole in Val di Genova (s)
H. intybaceum Wulf.—**T** Vorderer Wildbad, Schwarzensee im Voldertal, Hintertux (j), Stilsferjochstraße (s)
H. picroides Vill.—**T** Rätzöler Tal bei Welschnofen (j)



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen](#)

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: [14_1920](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl]
Wilhelm von

Artikel/Article: [Beiträge zur geographischen Verbreitung von
Phanerogamen und Gefäßkryptogamen in den Ostalpen 27-54](#)