© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at

Die alpine Flora des Plose-Gebirges (2561 m) bei Brixen a. E. (Südtirol).

Von Raimund v. Klebelsberg in Brixen a. E.

NACHTRAG.

Flechten und Moose.

Im Gegensatz zu dem letztes Jahr erschienen Hauptteil dieses Verzeichnisses bildet der folgende Nachtrag durchaus keine selbständige Arbeit, er ist zum weitaus grössten Teil eine blosse Zusammenstellung anderorts veröffentlichter Angaben; als Quellen dienten ausschliesslich die betreffenden Bände (IV. und V.) der neuen Tiroler Flora von Prof. Dr. v. Dalla Torre und Ludwig Graf Sarnthein, wo besonders für die Flechten zahlreiche Fundortsangaben unser Gebiet berühren; weniger weit ist die Erforschung seiner Moose vorgedrungen. Für letztere stammen die Angaben aus Afers der Mehrzahl nach von Ausserdorfer, die übrigen von Sarnthein und Pfaff. Um eine einfache untere Grenze der Alpinen zu finden, werden hier nur jene Arten angeführt, die über 1000 m Meereshöhe wachsend vorgefunden wurden. Die Anordnung ist nach Dalla Torre und Sarnthein.

Flechten (Lichenes).

Lat. Name.	Fundort.
Usnea barbata (L.) Hoffm.	Ueberall.
Alectoria iubata (L.) Arn.	An Zirbelkiefern ober Afers, im Trametschtal.
Ramalina pollinaria Ach.	Auf Schieferblöcken im Trametschtal und an den Abhängen der Plose gegen Lüsen.

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at

Stereocaulon coralloides Fr.	Im hinteren Afers und Lüsen.
— alpinum Laurer	Zerstreut auf Erdboden im ganzen Plosegebiet.
Philophorus cereolus Fr.	Bei St. Nikolaus im hinteren Lüsen.
Cladonia rangiferina (L.) Web.	Lüsen, Afers, Trametschtal.
— papillaria Hoffm.	Plosebühel, Telegraphspitze.
— digitata (L.) Schaer.	Afers, Lüsen.
— gracilis Willd.	Lüsen; im Kamrilltal am Plosebühel.
— degenerans Spr.	Lüsen, Afers; selten.
Stictina scrobiculata Nyl.	Am Gabler gegen Afers.
— fuliginosa Nyl.	Am Freien Bühel.
Nephromium levigatum Nyl.	Lüsen.
Peltigera canina Hoffm.	Desgl.
— horizontalis Hoffm.	Desgl.
Peltidea venosa (L.) Ach.	In Gunggan auf Erdboden.
Lecothecium nigrum (Huds.) Mass.	Im Talschluss von Lüsen.
— subradiatum Nyl.	Desgl.
Cetraria islandica (L.) Ach.	Auf allen Alpen des Gebietes.
— tenuissima (L.)	Desgl., aber zerstreut.
— nivalis (L.) Ach.	Desgl., seltener
— pinastri (Scop.) Ach.	An Zirbelkiefern im Trametschtal und in Afers.
— aleurites Fr.	Desgl.
Parmelia ambigua (Wulf.) Ach.	Trametschtal, Afers.
— saxatilis (L.) Ach.	Afers, Lüsen.

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at

Parmelia omphalodes (L.) Ach.	Desgl.
— physodes (L.) Ach.	An Zirbelkiefern ober Afers, am Plosebühel, im Trametschtal.
— papulosa (Anzi) Wainio	Desgl.
Gyrophora cylindrica (L.) Ach.	Im hinteren Lüsen.
— flocculosa (Wulf.) Kbr.	Desgl.
Physcia caesia (Hoffm.) Nyl.	Im hinteren Afers und Lüsen.
Gasparrinia cirrochroa Fr.	Auf Kalkgestein in Gunzgau.
Caloplaca flavovirescens Fr.	Im hinteren Lüsen.
— aurantiaca Fr.	Lüsen, Afers.
Rhinodina arenaria Fr.	Im hinteren Lüsen.
— pyrina Fr.	An Zirbelkiefern im ganzen Gebiet.
Acarospera glaucocarpa (Wahlb.) Kbr. u. conspersa Fr.	Auf Dolomit im hinteren Afers.
— squamulosa Fr.	Am Kofeljoch und in Gunggan.
Placodium murale Arn.	Im Mittelgebirge ober St. Andrae.
Lecanora atra (Huds.) Ach. subfusca (L.) Ach.	Bei St. Nikolaus im hinteren Lüsen.
— ecoilocarpa Ach.	An Zirbelkiefern im Trametschtal.
— badia (Pers.) Ach.	Im hinteren Lüsen.
— b) cinerascens Nyl.	Im Trametschtal.
— polytropa (Ehr.) Schaer.	Im Trametschtal; auf Silikatgestein im hinteren Afers und Lüsen.
— c) alpigena (Ach.)	Im hinteren Lüsen.
— intricata Ach.	Desgl.

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at

Lecanora varia Ach.	An Zäunen im hintersten Lüsen. An Zirbelkiefern im Trametschtal.
— symmictera Nyl.	An Zirbelkiefern im ganzen Gebiet.
— pumilionis Rehm.	Auf Alpenrosengeäste und an Zirbelkiefern; Trametschtal, Afers.
— mugicola Nyl.	An morschen Zäunen im Lüsental.
Aspicilia verrucosa Kbr.	Auf Kalkboden am Kofeljoch.
— gibbosa Kbr.	Im hintersten Lüsen.
— cinerea (L.) Mass.	Desgl.
— alpina Fr.	Desgl.
— cinereorufescens Kbr.	Plosebühel, Trametschtal, Lüsen.
Haematomma ventosum (L.) Mass.	Im hinteren Lüsen.
Diploschistes bryophilus Zahlbr.	Desgl.
Jonaspis epulotica Fr.	Auf Kalk am Kofeljoch.
Gyalecta cupularis (Ehrh.) Schaer.	Desgl.
Ochrolechia androgyna Arn.	Bei St. Nikolaus im hinteren Lüsen.
— upsaliensis (Ach.) Mass.	Alpe Gunggan.
Sphyridium placophyllum Fr.	Am Telegraph, im Trametschtal.
Toninia syncomista Fr.	Auf Dolomit am Kofeljoch.
Thalloidima caeruleonigricans Poetsch.	Desgl.
Sporastatia testudinea (Ach.) Mass.	Am Telegraph, im Trametschtal.
Psora demissa Fr.	Trametschtal, Plosebühel, Alpen gegen Afers.
Biatora rupestris Fr.	In Afers, Gunggan.
— lucida Fr.	In der Rienzschlucht; am Aferer Bach.

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at

Biatora Nylanderi Anzi	An Zirbelkiefern und Lärchen der Voralpen; so in Afers, im Trametschtal, in Lüsen.
— turgidula Nyl.	Desgl.
— Berengeriana Mass.	Am Kalk am Kofeljoch.
Lecidea lithophila Ach.	Im hinteren Lüsen.
— tenebrosa Fw.	Desgl.
— leucitica Fw.	Verbreitet im ganzen Gebiet.
— declinans Nyl.	Trametschtal, hinteres Lüsen.
— lactea Floerke.	Ueber 1000 m im hinteren Lüsen.
— petrosa Arn.	Auf Sandstein im hinteren Afers nahe der Alpe Gunggan.
— lithyrga Fr.	Im hinteren Afers und Lüsen.
— platycarpa Ach.	In Afers vor der Alpe Gunggan.
— albocaerulescens (Wulf.) Schaer.	Hinteres Lüsen.
— crustulata Ach.	Desgl.
— meiospora Nyl.	Lüsental.
— grisella Floerke	Desgl.
— latypea Ach.	Hinteres Lüsen.
Buellia leptocline (Fw.) Kbr.	Desgl.
Rhizocarpon obscuratum (Schaer.) Kbr.	Lüsental.
— concentricum Beltram.	Im hinteren Afers.
Arthonia mediella Nyl.	An Zirbelkiefern im Trametschtal, auf dem Freienbühel.
Dermatocarpon miniatum (L.) Fr.	Am Kofeljoch.
Lithoicea nigrescens (Pers.) Mass.	Selten im hinteren Lüsen.
Verrucaria aethiobola Wahlb.	Im Trametschtal, am Pfannberg.
— rupestris Schrad.	Auf Kalk am Kofeljoch.

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at

Polyblastia singularis Arn.	Auf Dolomit in Gunggan.
— cupularis Mass.	Desgl.
— abscondita Arn.	Desgl.
Arthopyrenia pyrenastrella Nyl. Arn.	An Zirbelkiefern im Trametschtal und ober Afers.
Collema multifidum (Scop.) Schaer.	Auf Dolomit am Kofeljoch.
— cristatum (L.) Hoffm.	Desgl.

Moose (Bryophyta).

Lat. Name.	Fundort.
Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi	Afers.
Pleuridium subulatum (Huds.) Rbh.	Afers.
Hymennostylium curvirostre (Ehrh.) Lindb.	Afers.
Cynodontium gracilescens (Web. et Mohr) Schimp.	Afers.
Oncophorus virens (Swartz) Brid.	Am Fuss des Peitlerkofels im hinteren Afers bei ca. 2000 m.
Dicranella heterophylla (L.) Schimp.	In Trametschtal.
Fissideus adiantioides (L.) Hedw.	Afers.
Ceratodon purpureus (L.) Brid.	Afers, Lüsen, St. Andrae.
Pottia latifolia (Schwägr.) K. Müll.	Am Fuss des Peitlerkofels im hinteren Afers, auf Dolomit.
Tortula subulata (L.) Hedw.	Am Weg von Klerant nach Afers.
Ulota americana (Pal.-Beauv.)	Bei Lüsen.
Eucalypta ciliata (Hedw.) Hoffm.	Desgl.

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at

Bryum capillare L.	Im Trametschtal, auf der Telegraphspitze.
— alpinum (Huds.)	Desgl.
Mnium punctatum (L.)	Afers.
Meesea trichodes (L.)	Afers.
Philonotis fontana (L.) Brid.	Afers.
Pogonatum urnigerum (L.) Pal.-Beauv.	Lüsen, Telegraph.
Polytrichum alpinum L.	Lüsen.
— formosum Hedw.	Lüsen, Kamrilltal, Telegraph.
Brachythecium salebrosum (Hoffm.)	Afers.
— populeum (Hedw.)	Afers.
— velutinum L.	Afers.
Plagiothecium neckeroideum Br.	Afers.
Hypnum stellatum Schreb.	Gemein.
— molluscum Hedw.	Afers.
— cupressiforme L.	Afers, Lüsen u. a.
Hylocomium splendens (Hedw.)	Gemein.
— Schreberi (Willd.)	In Wäldern bei Platzbon, in Afers, am Freienbühel, auch auf den Alpen des Gebietes, z. B. am Schönjöchl und Plosebühel.
— triquetrum (L.)	Wie vorige, bis zur Waldgrenze.

Zum Schlusse sei erwähnt, dass die im letztjährigen Berichte verzeichneten Angaben von dem Vorkommen von Adianthum Capillus Veneris L. und von Sedum Anacampseros L. (Seite 62 bez. 74) irrig sind.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bericht des Vereins zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 5_1905

Autor(en)/Author(s): Klebelsberg Raimund von

Artikel/Article: Die alpine Flora des Plose-Gebirges bei Brixen 74-80