

Literaturhinweise für Beringer

- ACKERMANN, G., MÜLLER, H., SCHARNWEBER, Ch. (1983):
Das Acrocephalus-Programm im Bezirk Neubrandenburg. – Orn. Rundbr. Meckl. N. F. 26, 27–29.
- BARDIN, A. V. (1983):
Territorial behaviour and migration of the Crested Tit (*Parus cristatus* L.). (Revierverhalten und Zug der Haubenmeise). – Comm. Balt. Comm. Study Bird Migr. 14, 43–69 (russ., engl. Zus.).
- BLOMQVIST, S. (1983):
Bibliography of the Genera *Calidris* and *Limicola*. Special report from Ottenby Bird Observatory Nr. 3, 103 S.
- BLOMQVIST, S. (1983):
Bibliography of the Genus *Phalaropus*. Special report from Ottenby Bird Observatory No. 4, 27 S.
- BUB, H. (1983):
Ornithologische Beringungsstationen in Europa. Dachverband Deutscher Avifaunisten, Bonn, 190 S.
- BUB, H. (1984):
Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel. 3. Teil: Seidenschwanz, Wasseramsel, Zaunkönig, Braunellen, Spötter, Laubsänger, Goldhähnchen. Neue Brehm-Bücherei 550, Wittenberg.
- BUSSE, P. (1983):
Biometrical standards in the Operation Baltic work. – The Ring 116, 125–138.
- DE KROON, G. H. J. (1984):
Zug und Wintervorkommen der Wasserralle (*Rallus aquaticus*) in Europa. – Beitr. Vogelkd. 30, 97–110.
- DORSCH, H. (1983):
Vergleichende Untersuchungen von Körpermaßen einer Ungarischen und einer Leipziger Teichrohrsänger-Population (*Acrophaluschirpaceus*). – Zool. Abh. Mus. Tiere Dresden 39, 67–69.
- GLÜCK, E. (1982):
Jahresperiodik und Zug südwestdeutscher Stieglitze (*Carduelis carduelis*) – Freilandbeobachtungen, Ringfundauswertungen und Zugaktivitätsuntersuchungen. – Vogelwarte 31, 395–422.
- GREVE, K. (1983):
Die Massenberingung von Saatkrähen (*Corvus frugilegus*) bei Braunschweig und die bisher erzielten Wiederfunde. – Vogelk. Ber. Niedersachs. 15, 5–10.
- GROMADZKA, J. (1983):
Results of bird ringing in Poland. Migrations of dunlin *Calidris alpina*. (Wanderungen des Alpenstrandläufers). – Acta orn. 19, 113–136.
- GROMADZKA, J., PRZYSTUPA, B. (1984):
Problems with the ageing of dunlins in autumn. (Probleme der Altersbestimmung bei Alpenstrandläufern im Herbst.) – Wader Study Group Bull. 41, 19–20.
- HARENGERD, M. (1982):
Beziehungen zwischen Zug und Mauser beim Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (Linné 1758, Aves, Charadriiformes, Charadriidae). Diss. Univ. Bonn, 148 S.
- HENLE, K. (1983):
Populationsbiologische und -dynamische Untersuchungen am Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) auf der Insel Mellum. – Vogelwarte 32, 57–76.
- HERREMANS, M. (1982):
Notes on measurements and moult of irruptive Red Crossbills (*Loxia curvirostra curvirostra*) in central Belgium. (Notizen über Maße und Mauser eingeflogener Fichtenkreuzschnäbel im zentralen Belgien). – Le Gerfaut 72, 243–254.

- HUDEC, K., RUTSCHKE, E. (1982) :
The Greylag Goose *Anser anser* in Europe (I). (Die Graugans in Europa). — Acta Sc. Nat. Brno 16 (12), 1–49.
- HUDEC, K., RUTSCHKE, E. (1984) :
The Greylag Goose *Anser anser* in Europe (II). — Acta Sc. Nat. Brno 18 (1), 1–55.
- JAKOBER, H., STAUBER, W. (1983) :
Zur Phänologie einer Population des Neuntöters (*Lanius collurio*). — J. Orn. 124, 29–46.
- JENNI, L. (1983) :
Zur Altersbestimmung des Tannenhäfers *Nucifraga caryo-catactes* im Herbst. — Orn. Beob. 80, 136–137.
- JENNI, L., WINKLER, R. (1983) :
Altersbestimmung und Umfang der Jugendmauser in Abhängigkeit von der Jahreszeit beim Zaunkönig. — Orn. Beob. 80, 203–207.
- JENNI, L.; SCHAFFNER, U. (1984) :
Herbstbewegungen von Haus- und Feldsperling *Passer domesticus domesticus* und *P. montanus* in der Schweiz. — Orn. Beob. 81, 61–67.
- KANIA, W. (1983) :
System of training and examining candidates for ringers in Poland. (Zystem der Schulung und der Prüfung von Beringer-Kandidaten in Polen). — The Ring 117, 170–173.
- KNEIS, P., GÖRNER, M. (1984) :
Zur Brutvogelwelt des Naturschutzgebietes „Schwellenburg“ bei Erfurt mit Untersuchungen am Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*). — Landschaftspflege und Naturschutz Thür. 21, 36–45.
- KÖNIGSTEDT, D., MÜLLER, H. E. J. (1983) :
Zur Unterscheidung von Bergpieper (*Anthus spinoletta spinoletta*) und Felsenpieper (*Anthus sp. littoralis*). — Beitr. Vogelkd. 29, 77–88.
- KRÖL, W. (1983) :
Bird ringing results in Poland. Migration of the buzzards *Buteo buteo buteo*. (Zug des Mäusebussards). — Acta orn. 19, 137–151 (pol., engl. Zus.).
- KRÖL, W. (1983) :
Movements of White-tailed Eagles (*Haliaetus albicilla*) of Central and Eastern Europe. (Bewegungen mittel- und osteuropäischer Seeadler). The Ring 114/115, 97–103.
- LÖVEI, L. (1983) :
Wing Shape Variations of Chiffchaffs on Autumn Migration in Hungary. (Variation der Flügelform bei Zilpzalps während des Herbstzuges in Ungarn). — Ringing and Migration 4, 231–236.
- MATTHIJSEN, E., DHONDT, A. A. (1983) :
Die Ansiedlung junger Kleiber (*Sitta europaea*) im Spätsommer und Herbst. — J. Orn. 124, 281–290.
- MEYBOHM, E., FIEDLER, G. (1983) :
Neue Fälle von hohem Alter, Ortstreue, Um- und Fernsiedlung und anderen brutbiologischen Befunden beim Weißstorch (*C. ciconia*). — Vogelwarte 32, 14–22.
- NEHLS, H. W. (1983) :
Studies on the Sandwich Tern *Sterna sandvicensis* population of the Baltic with special regard to the coast of the German Democratic Republic. (Untersuchungen an der Brandseeschwalben-Population der Ostsee mit besonderer Berücksichtigung der DDR-Küste). — Ornis Fennica, Suppl. 3, 79–80.
- NORMAN, S. C. (1983) :
Variations in Wing-lengths of Willow Warblers in relation to Age, Sex and Season. (Variation der Flügelänge beim Fitis in Beziehung zu Alter, Geschlecht und Jahreszeit). — Ringing and Migration 4, 269–274.
- PEARSON, D. J., BACKHURST, G. C. (1983) :
Moult in the River Warbler *Locustella fluviatilis*. (Mauser beim Schlagschwirl). — Ringing and Migration 4, 227–230.
- SCHWABL, H. (1983) :
Ausprägung und Bedeutung des Teilzugverhaltens einer südwestdeutschen Population der Amsel *Turdus merula*. — J. Orn. 124, 101–116.

STIEFEL, A., SCHEUFLER, H., STURMHOEFEL, E. (1982) :

Die wissenschaftliche Vogelberingung auf Oie und Kirr und die bisherigen Ergebnisse.
In: Das Küstenvogelschutzgebiet „Insel Oie und Kirr“, Meer und Museum (Stralsund)
3, 55–66.

STUBBE, M. (1982) :

Brutdichte und Altersstruktur einer Rotmilan-Population – *Milvus milvus* (L., 1758) –
im nördlichen Harzvorland der DDR im Vergleich zum Mäusebussard *Buteo buteo* (L.,
1758). – Arch. Naturschutz und Landschaftsforsch. 22, 205–214.

J. Ulbricht

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [1984_5](#)

Autor(en)/Author(s): Ulbricht Joachim

Artikel/Article: [Literaturhinweise für Beringer 147-149](#)