

Literaturhinweise für Beringer

- BAUER, H.-G. (1987): Geburtsortstreue und Streuungsverhalten junger Singvögel. — Vogelwarte 34: 15—32.
- BAUER, H.-G.; TERRILL, S. B. (1988): „Spischen“ — eine wirksame Methode zur Anlockung von Singvögeln. — Vogelwelt 109: 25—31.
- BERNDT, R.; WINKEL, W. (1987): Zu Ortstreue, Ortswechsel und Lebensalter beim Feldsperling (*Passer montanus*). — Vogelwelt 108: 98—105.
- BUB, H. (1987): Atlas der Wanderungen des Berghänflings (*Carduelis f. flavirostris*). Nr. 3. Alter und Geschlecht in Wilhelmshaven beringter Berghänflinge. — Beitr. Vogelkd. 33: 313—325.
- BÜHLER, U.; KLAUS, R. (1987): Resultate von Habichtberingungen (*Accipiter gentilis*) in der Schweiz. — Orn. Beob. 84: 111—121.
- DITTBERNER, H.; DITTBERNER, W. (1987): Postjuvenile Teilmauser und postnuptiale Vollmauser mitteleuropäischer Schafstelzen, *Motacilla f. flava* L. — Mitt. zool. Mus. Berl. 63, Suppl.: Ann. Orn. 11: 35—56.
- DITTBERNER, H.; DITTBERNER, W. (1988): Zum Geschlechtsdimorphismus beim Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*). — Orn. Mitt. 40: 87—91.
- FIUCZYNSKI, D. (1987): Der Baumfalke. Neue Brehm-Bücherei 575. Wittenberg Lutherstadt.
- HJORT, C.; PETTERSSON, J. (1986): Bird ringing figures and the monitoring of the bird populations — a summary of PMK-related work at Ottenby Bird Observatory. Special report from Ottenby Bird Observatory No. 7, 23 S.
- HOFER, J.; MARTI, C. (1988): Beringungsdaten zur Überwinterung des Gänseäfers *Mergus merganser* am Sempachersee: Herkunft, Zugverhalten und Gewicht. — Orn. Beob. 85: 97—122.
- HOLZ, R. (1987): Altersmerkmale von Sandregenpfeifern (*Charadrius hiaticula*) der südwestlichen Ostseeküste. — Beitr. Vogelkd. 33: 233—243.
- MENZEL, H. (1988): Der Weißstorch im Kreis Hoyerswerda. Natur und Umwelt im Kreis Hoyerswerda H. 2, 56 S.
- MÜLLER, H. E. J. (1987): Eine effektive Methode zur Altersbestimmung bei lebenden Sperlingsvögeln mit Hilfe der Schädelverknöcherung. — Beitr. Vogelkd. 33: 265—270.
- NOWAK, E.; BERTHOLD, P. (1987): Die Satelliten-Telemetrie in der Erforschung von Tierwanderungen: eine Übersicht. — J. Orn. 128: 405—422.
- SAEMANN, D. (1987): Phänologische und biometrische Untersuchungen an Goldhähnchen (*Regulus regulus* und *R. ignicapillus*) am Nordrand des Erzgebirges. — Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden 43: 1—13.
- SCHULZ, H. (1987): Thermoregulatorisches Beinkoten des Weißstorches (*Ciconia ciconia*). Analyse des Verhaltens und seiner Bedeutung für Verluste bei beringten Störchen im afrikanischen Winterquartier. — Vogelwarte 34: 107—117.
- SUMMERS, R. W.; CROSS, S. J. (1987): Winter movements and habitat use of Starlings in Norfolk. — Ringing & Migration 8: 11—18.
- WALINDER, G.; KARLSSON, L.; PERSSON, K. (1988): A new method for separating Marsh Warblers *Acrocephalus palustris* from Reed Warblers *A. scirpaceus*. — Ringing & Migration 9: 55—62.

J. Ulbricht

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [1989_9](#)

Autor(en)/Author(s): Ulbricht Joachim

Artikel/Article: [Literaturhinweise für Beringer 105](#)