

Literaturhinweise für Beringer

- BUB, H., DORSCH, H., u. a. (1988): Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel, 4. Teil: Cistensänger, Seidensänger, Schwirle, Rohrsänger. — Neue Brehm-Bücherei, Wittenberg Lutherstadt.
- DRAULANS, D., DE MEULENAER, T. (1987): Analyse van Belgische ringvondsten van de Buizerd (*Buteo buteo*) met betrekking tot verplaatsingen en mortaliteit. — Le Gerfaut 77: 371–382.
- FRANZ, D. (1988): Wanderungen der Beutelmeise *Remiz pendulinus* während der Brutperiode – Ausdehnung, Häufigkeit und ökologische Bedeutung. — Vogelwelt 109: 188–206.
- GÖRNER, M., KNEIS, P., HENKEL, A., HAUPT, R. (1989): Registrierfang-Untersuchungen an Sperlingsvögeln im Biosphärenreservat „Vessertal“ im Thüringer Wald. — Landschaftspflege u. Naturschutz Thüringen 26: 1–16.
- HASSELQUIST, D., HEDENSTRÖM, A., LINDSTRÖM, A., BENNSCH, S. (1988): The seasonally divided flight feather moult in the Barred Warbler *Sylvia nisoria* – a new moult pattern for European passerines. — Ornis Scandinavia 19: 280–286.
- JAKOBER, H., STAUBER, W. (1989): Beeinflussen Bruterfolg und Alter die Ortstreue des Neuntöters (*Lanius collurio*)? — Vogelwarte 35: 32–36.
- KÄMPFER, A., LEDERER, W. (1988): Dismigration des Steinkauzes *Athene noctua* in Mittelwestfalen. — Vogelwelt 109: 155–164.
- KAVANAGH, B. (1988): Discriminating the sex of Magpies *Pica pica* from morphological data. — Ringing & Migration 9: 83–90.
- KÖHLER, P. (1986): Die Entenfangsanlage am Ismaninger Speichersee. — Anz. orn. Ges. Bayern 25: 1–10.
- LÖHMER, R. (1989): Kritische Anmerkungen zur Beringung des Weißstorches (*Ciconia ciconia*). In: Weißstorch. Proc. I. Int. Stork Conserv. Symp., Schriftenreihe des DDA 10: 425–433.
- MATTHYSEN, E. (1987): A long-term study on a population of the European nuthatch *Sitta europaea caesia* Wolf. — Sitta 1: 2–17.
- MÖCKEL, R. (1989): Die Hohltaube. Neue Brehm-Bücherei, Wittenberg Lutherstadt.
- OAG Münster (1989): Beobachtungen zur Heimzugsstrategie des Kampfläufers *Philomachus pugnax*. — J. Orn. 130: 175–182.
- SCHLÄPFER, A. (1988): Populationsökologie der Feldlerche *Alauda arvensis* in der intensiv genutzten Agrarlandschaft. — Orn. Beob. 85: 309–371.
- SCHLENKER, R. (1988): Zum Zug der Neusiedlersee- (Österreich) Population des Teichrohrsängers (*Acrocephalus scirpaceus*) nach Ringfunden. — Vogelwarte 34: 337–343.
- SCHWABL, H. (1988): Raum-zeitliches Verhalten der Amsel (*Turdus merula*) im Herbst und seine Beziehung zum Phänomen des Teilzuges. — Vogelwarte 34: 312–318.
- TEUBERT, W., KNEIS, P. (1988): Raumzeitliche Einnischung im sächsischen Elbtal bei Riesa überwinternder Sperber (*Accipiter nisus*) nach dem Geschlecht. — Acta ornithoecol. 1: 325–346.
- VIKSNE, J. A. (Hrsg., 1989): Migrations of birds of eastern Europe and northern Asia: Anseriformes. Nauka, Moskau (russ.).
- WINKEL, W. (1989): Zum Dispersionsverhalten und Lebensalter des Kleibers (*Sitta europaea caesia*). — Vogelwarte 35: 37–48.

J. Ulbricht

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [1990_10](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturhinweise für Beringer 90](#)