

CHRYSOMELIDEN (COL.) AUS DEM BEZIRK WEIZ (STEIERMARK)

Von Alfred Mauerhofer, Koglhof

ABSTRACTChrysomelidae from the Weiz-district (Styria).

114 species of Chrysomelidae are listed. With a first record of *Lema rufocyanea* SUFF. from Styria.

EINLEITUNG

Nach den bereits vorliegenden und sehr ausführlich gehaltenen Darstellungen der Großschmetterlingsfauna des Bezirkes Weiz von HABELER (1971-1973) und der Wirbeltiere des Bezirkes Weiz von KEPKA (1975) sollen nun die Käfer des Bezirkes als eine weitere wichtige Tiergruppe in Form einer Faunenliste umfassend dargestellt werden. Das sehr umfangreiche Datenmaterial und die große Artenfülle lassen eine Aufgliederung in einzelne Käferfamilien vorteilhaft erscheinen. Die Listenreihe soll mit den hier auf Grund des Erforschungsgrades vorangestellten Chrysomeliden ihren Anfang nehmen.

Der politische Bezirk Weiz liegt im Osten der Steiermark und umfaßt nach HABELER (1971) geographisch Anteile des Oststeirischen Hügellandes, des Mittelsteirischen Berglandes und östliche Ausläufer der Zentralalpen. Die Fläche des Bezirkes mißt 1050 km², der tiefste Punkt hat eine Seehöhe von 320 m, der höchste von 1782 m, die Oberfläche des Gebietes ist über weite Teile sehr abwechslungsreich gegliedert und umfaßt submontane, montane und subalpine Vegetationsstufen. Weitere, sehr ausführliche Angaben über die regionalen Verhältnisse des Bezirkes Weiz findet man in HABELER (1971), KEPKA (1975) und PRATL (1970).

Das hier erwähnte Material wurde in den Jahren 1958 bis 1974 gesammelt. Als Sammler sind zu nennen: Herr Bruno Sumper (Weiz), der mir freundlicherweise seine Koleopterensammlung mit Aufsammlungen aus den Jahren 1958 bis 1967 übergeben hat, die auch etliche Chrysomeliden enthält. Alle weiteren, hier ohne Sammler angeführten Tiere wurden von mir selbst unter der liebenswürdigen Mithilfe meiner Frau, Christine Mauerhofer, und meiner Kinder gesammelt. Wesentliche Teile der angeführten Tiere wurden von Herrn Carolus Holzschuh (Wien) bestimmt, der Rest von mir. Die Nomenklatur bezieht sich auf FREUDE, HARDE & LOHSE (1966), die Reihung erfolgte nach WINKLER (1924 - 1932). Alle angeführten Individuen befinden sich in der Sammlung Mauerhofer. Neufunde für den Bezirk oder weitere Teile der Steiermark sind nicht extra bezeichnet. In Hinsicht auf das Erscheinen eines Chrysomelidenbandes von HORION ist diese Zusammenstellung als Ergänzung zu werten.

Besonderen Dank sagen möchte ich Herrn Carolus Holzschuh für die mühevollen Determinationsarbeit, meinem Chef, Herrn Kustos Dr. Erich Kreissl (Graz) und meinem Kollegen, Herrn Eugen Bregant, für die zahlreichen Ratschläge, Herrn Bruno Sumper, meiner Frau Christine und meinen Kindern für das Aufsammeln zahlreicher hier erwähnter

Käfer. Herrn Dr. Johann Gepp (Graz) danke ich für die Hilfe bei der Zusammenstellung des Manuskriptes.

LISTE DER FUNDORTE

Die Gebietseinteilung wurde nach FRANZ (1954) vorgenommen. Die Nummern der Fundorte entsprechen denen auf der beigefügten Skizze des Gebietes. Die Höhenangaben beziehen sich auf den besammelten Teil des jeweiligen Fundortes. Der Einfachheit halber wurde bei den einzelnen Arten (um Wiederholungen zu vermeiden) auf nähere Fundortangaben verzichtet; diese können der folgenden Liste entnommen werden.

Grazer Bergland

- 1 Plankogel: W. Birkfeld, 1400-1532 m
- 2 Königsberg: NNW Anger, ca. 1000 m
- 3 Pommes Berg: NW Anger, 1000-1288 m
- 4 Eibisberg: zwischen Pommes Berg und Zetz, 1100-1186 m
- 5 Steg-Korngraber: rechter Seitengraben der Feistritz, NNW Anger, 500-700 m
- 6 Zetzgebiet
 - a) Pointergraben: rechter Seitengraben des Naintschgrabens, 510-800 m;
Naintschgraben: rechter Seitengraben der Feistritz, NNW Anger
 - b) Pözlgraben: rechter Seitengraben des Naintschgrabens, 540-800 m
 - c) Steingraben: rechter Seitengraben des Naintschgrabens, 620-900 m
 - d) Flach: Zetz Ostseite, 940-1100 m
 - e) Wredeweg: Hohe Zetz-Ostseite-Wittgruber, 900-1080 m
 - f) Zetzwand: SW der Hohen Zetz, 900-1200 m
 - g) im Kessel: W der Hohen Zetz, 900-1200 m
 - h) Zetzwiese: Gipfelbereich des Hohen Zetz (1264 m)
 - i) Zetzkamm: Kammlinie Zetz (1264 m) - Hohe Zetz (1274 m)
- 7 St. Kathrein am Offenegg: N Weiz, ca. 970 m
- 8 Patscha Berg: W Anger, ca. 1000 m
- 9 Angererzeil: Seitengraben des Poniglgrabens NE Weiz, 600-820 m
- 10 Raabklamm: zwischen Arzberg und Haselbach, 530-570 m
- 11 Rechberg+Ostseite, ca. 900 m

Östliche Voralpen

- 12 Kleiner Pfaffenbach: NE Rettenegg, 1030-1300 m
- 13 Birkfeld: 620 m
- 14 Rabenwaldgebiet: östlich der Feistritz NNE Anger
 - a) Reith-Petz, 520-700 m
 - b) Holzhöf, 800-1000 m
- 15 Anger - Steg: linke Seite des Feistritztales zwischen Anger und Steg, 470-500 m
- 16 Safenthal: NW Kaindorf (zwischen Kaindorf und Pöllau) 376 m

Östliches Alpenvorland

- 17 Siegersdorf: bei Herberstein E Weiz, ca. 560 m
- 18 Kulm Berg: E Weiz, ca. 900 m
- 19 Puch: E Weiz, ca. 450 m
- 20 Busenthal: E Weiz, Frauenwald, 400-440 m




Abb. 1: Die Lage der angeführten Fundorte von Chrysomeliden im Bezirk Weiz. Die Nummern beziehen sich auf die beigegebene Liste der Fundorte.

- 21 a) Weiz, 477 m
b) Thannhausner Teich: bei Weiz
22 Hohenkogel: SSW Weiz, 500-600 m
23 Mitterdorf: im Raabtal S Weiz, ca. 400 m
24 Ilz: Teiche N Ilz, E Gleisdorf

CHRYSOMELIDAE

Donacia clavipes F.

Pointnergraben, 550 m, 18.5.1966, im Steinbruch angefliegen.

Donacia versicolora (BRAHM)

Thannhausner Teich, 480 m, 31.7.1958, leg. Sumper.

Donacia semicuprea PANZ.

Ilz, 300 m, 24.5.1974.

Donacia aquatica (L.)

Thannhausner Teich, 480 m, 17.10.1959, leg. Sumper; Ilz, 300 m, 18.5.1970.

Donacia bicolor ZSCHACH.

Ilz, 300 m, 18.8.1970, 24.5.1974, von Igelkolben geklopft.

Donacia simplex F.

Ilz, 300 m, 18.5.1970.

Plateumaris sericea (L.)

Pointnergraben, 550 m, 24.5.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 26.5.1969; Ilz, 300 m, 18.5.1970, 24.5.1974; in Sumpfwiesen und an Bachrändern.

Plateumaris consimilis (SCHRK.)

Königsberg, 1070 m, 27.6.1970; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 26.5.1969, 560 m, 1.6.1973; Busenthal, 470 m, 3.5.1970; Ilz, 300 m, 18.5.1970. In Sumpfwiesen und an Teichrändern sehr häufig.

Orsodacne cerasi (L.)

Pointnergraben, 600 m, 13.6.1967, 20.6.1967, 550 m, 21.5.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 3.5.1969, 600 m, 20.5.1971, 560 m, 3.6.1973, 12.5.1974. Alle Exemplare vereinzelt.

Zeugophora subspinosa (F.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 16.7.1972, 10.9.1973, 560 m, 1.10.1972; von *Corylus avellana* geklopft.

Lema cyanella (L.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 22.7.1972, von Gras geketschert.

Lema lichenis VOET.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550-600 m, 14.5.1967, 550 m, 30.3.1970, 560 m, 20.5.1971, 1.6.1973, 17.6.1973; Busenthal, 411 m, 1.5.1972; Ilz, 300 m, 24.5.1974; auf Wiesen geketschert, sehr häufig.

Lema melanopus (L.)

Wrede-Weg, 940 m, 26.6.1971; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 14.5.1967, 27.4.1969, 7.5.1970, 13.5.1971, 560 m, 28.4.1974; Anger-Steg, 496 m, 24.5.1974; Siegersdorf, 500 m, 30.7.1974, Busenthal, 411 m, 31.10.1970, 1.5.1972; Mitterdorf, 406 m, 20.7.1973; geketschert, sehr häufig.

Lema rufocyanea SUFF.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 27.4.1969, von Wiese geketschert. Im Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas von HORION 1951 für die Steiermark noch nicht angegeben.

Lilioceris lili (SCOP.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 11.5.1972, am Waldrand.

Lilioceris meridigera (L.)

Pointnergraben, 600 m, 5.6.1968; Wittgruber beim Zetz, 900 m, 31.5.1969; Wrede-Weg, 1040 m, 1.5.1967, 5.7.1969; Kleiner Pfaffenbach, NE Rettenegg, 1100 m, 8.6.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m,

- 19.4.1970, 560 m, 14.5.1972. Auf Lilien sehr häufig, besonders auf Türkenbund.
- Labidostomis humeralis (SCHNEID.)
 Pointnergraben, 600 m, 22.5.1969, auf Erlengebüsch.
- Labidostomis longimana (L.)
 Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 520 m, 20.7.1966, 560 m, 26.7.1973, von trockenen Wiesen geketschert.
- Lachnaea sexpunctata (SCOP.)
 Weiz, 477 m, 24.5.1959, auf Eichengebüsch, leg. Sumper.
- Clytra quadripunctata (L.)
 Kleiner Pfaffenbach, 1100 m, 8.6.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 12.5.1968; aus Ameisennest schwärmend und auf Gebüsch.
- Clytra laeviuscula RATZ.
 Ilz, 300 m, 28.7.1973.
- Gynandrophthalma cyanea (FAB.)
 Pointnergraben, 600 m, 3.5.1968, 21.5.1968, 22.5.1969; Wittgruber im Zetzgebiet, 900 m, 17.5.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 20.5.1970, 1.6.1972, 18.6.1972, 25.6.1972, 560 m, 22.5.1972, 650 m, 1.7.1972; Ilz, 300 m, 18.5.1970; im Gebiet nicht selten auf Salweiden.
- Gynandrophthalma flavicollis (CHARP.)
 Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 18.6.1972.
- Gynandrophthalma aurita (L.)
 Pointnergraben, 550 m, 3.6.1965.
- Gynandrophthalma affinis (Ill.)
 Wittgruber, 900 m, 17.5.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 30.7.1971, 13.5.1973; Ilz, 300 m, 24.5.1974.
- Cryptocephalus coryli (L.)
 Pointnergraben, 550 m, 30.5.1965, 24.5.1964, 21.5.1969, 600 m, 6.6.1965; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 30.4.1967.
- Cryptocephalus octopunctatus (SCOP.)
 Pointnergraben, 550 m, 19.6.1969; Anger-Steg, 480 m, 10.5.1969; Ilz, 300 m, 24.5.1974.
- Cryptocephalus sexpunctatus (L.)
 Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 16.5.1971, 22.5.1974, 560 m, 12.5.1974; Anger-Steg, 496 m, 11.6.1973; an Eberesche und Salweide.
- Cryptocephalus bipunctatus (L.)
 Pointnergraben, 600 m, 21.5.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 19.6.1966; Hohenkogel, 480 m, 26.5.1973; an Corylus avellana und Salix caprea häufig.
- Cryptocephalus biguttatus (SCOP.)
 Pointnergraben, 550 m, 1.6.1967; Hohenkogel, 480 m, 26.5.1973.
- Cryptocephalus aureolus SUFFR.
 Pointnergraben, 600 m, 30.5.1967, 6.6.1967, 14.6.1969; Flach, 1200 m, 5.7.1969; Wittgruber, 1000 m, 31.5.1969, 1050 m, 6.8.1974; Zetzweise, 1264 m, 23.8.1970, 1100 m, 13.8.1967, 28.6.1970, 10.7.1971; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 14.7.1966, 600 m, 22.5.1969; Ilz, 300 m, 24.5.1974.
- Cryptocephalus sericeus (L.)
 Pointnergraben, 600 m, 14.6.1969, 19.6.1969; Flach, 1275 m, 5.7.1969; Zetzweise, 1220 m, 10.7.1971, 1260 m, 4.8.1968; Rechberg, 900 m, 30.6.1971; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 1.7.1967.
- Cryptocephalus hypochoeridis (L.)
 Flach, 1275 m, 13.7.1969; Wittgruber, 1000 m, 31.5.1969; Zetzweise, 1100 m, 15.8.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 12.7.1969, 24.8.1974; Anger-Steg, 496 m, 9.6.1974.
- Cryptocephalus violaceus LAICH.
 Zetzweise, 1250 m, 26.6.1971, 10.7.1971, 18.7.1971; Rechberg,

- 900 m, 30.6.1971; Anger-Steg, 496 m, 3.6.1974.
- Cryptocephalus nitidus (L.)
Pointnergraben, 550 m, 19.6.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 20.5.1971; Anger-Steg, 496 m, 3.6.1974.
- Cryptocephalus nididulus F.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 22.5.1974; auf *Corylus avellana*.
- Cryptocephalus marginatus F.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 14.5.1966, 10.6.1967, 11.6.1967, 20.5.1971, 25.6.1972, 27.5.1973; an *Betula spec.* sehr häufig.
- Cryptocephalus quinquepunctatus (SCOP.)
Pointnergraben, 550 m, 6.5.1969.
- Cryptocephalus moraei (L.)
Flach, 1200 m, 5.7.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 25.7.1969, 23.7.1972, 10.9.1972, 13.8.1972.
- Cryptocephalus quadripustulatus GYLL.
Birkfeld, 600 m, 13.5.1967; Siegersdorf, 500 m, 17.7.1974.
- Cryptocephalus flavipes F.
Pointnergraben, 600 m, 22.5.1969; Zetzweise, 1250 m, 26.6.1971.
- Cryptocephalus signatifrons (SUFF.)
Pointnergraben, 600 m, 24.5.1967.
- Cryptocephalus ocellatus DRAP.
Anger-Steg, 496 m, 11.6.1973, 24.5.1974; Mitterdorf, 406 m, 20.7.1973.
- Cryptocephalus labiatus L.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 30.7.1972, 650 m, 1.7.1972, 560 m, 13.8.1972.
- Cryptocephalus pusillus F.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 30.7.1972, 13.8.1972, 10.9.1972, 560 m, 5.8.1973; Mitterdorf, 406 m, 20.7.1973.
- Adoxus obscurus (L.)
Wittgruber, 900 m, 17.5.1969.
- Leptinotarsa decemlineata SAY.
Pointnergraben, 600 m, 8.10.1969, 10.6.1972; Eibisberg, 1180 m, 10.7.1972; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 18.5.1969, 26.5.1969, 13.6.1969.
- Chrysomela marcasitica GERM.
Pointnergraben, 600 m, 7.10.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 14.5.1968, 27.4.1969, 30.5.1971; Anger-Steg, 496 m, 9.6.1974.
- Chrysomela haemoptera L.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 22.9.1971.
- Chrysomela diversipes BED.
Pointnergraben, 550 m, 3.5.1969, 23.10.1969; Raabklamm, 550 m, 19.5.1974; Anger-Steg, 496 m, 11.6.1973.
- Chrysomela staphylea L.
Pointnergraben, 550 m, 28.3.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 22.2.1968, 24.3.1968, 22.9.1971, 23.9.1973, 28.10.1973, 1.5.1974, 13.7.1974, 600 m, 24.8.1974.
- Chrysomela oricalcia MUELL.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 14.4.1974; Anger-Steg 496 m, 11.6.1973.
- Chrysomela cerealis L.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 510 m, 31.5.1969, 14.9.1969.
- Chrysomela herbacea DUFT.
Pointnergraben, 600 m, 8.5.1968, 21.5.1969, 10.6.1972; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 520 m, 14.8.1969, 30.5.1971. Leg. Sumper.
- Chrysomela varians SCHALL.
Zetzweise, 1264 m, 15.8.1967, 28.6.1970, 12.7.1970, 2.8.1970,

23.8.1970, 10.7.1971, 15.7.1972; Kleiner Pfaffenbach, 1200 m, 29.9.1973; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 26.5.1969, 3.8.1969, 19.7.1970; an *Hypericum* sehr häufig.

Chrysomela polita L.

Pointnergraben, 600 m, 10.6.1972, 20.10.1973; Wrede-Weg, 940 m, 6.6.1971; im Kessel, 900 m, 12.7.1970; Zetzweise, 1264 m, 28.6.1970; Kleiner Pfaffenbach, 1100 m, 8.6.1974.

Diochrysa fastuosa (SCOP.)

Eibisberg, 1250 m, 13.7.1969; Pointnergraben, 600 m, 15.7.1969; St. Kathrein am Offenegg, 975 m, 2.8.1970; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 25.7.1969, 3.8.1969, 20.9.1970, 18.7.1971; Mitterdorf, 406 m, 20.7.1973.

Chrysochloa gloriosa (F.)

Pointnergraben, 600 m, 21.9.1969; Raabklamm, 530 m, 8.7.1967. Leg. Sumper.

Chrysochloa cacaliae (SCHRK.)

Kleiner Pfaffenbach, 1100 m, 8.6.1974, 1040 m, 9.9.1973; Weiz, 477 m, 30.8.1968. Leg. Sumper.

Chrysochloa speciosissima (SCOP.)

Plankogel, 1400 m, 27.6.1970; Eibisberg, 1180 m, 10.7.1972; Pointnergraben, 700 m, 13.6.1968; Flach, 1250 m, 6.8.1974; Wittgruber, 940 m, 31.5.1969; Wrede-Weg, 940 m, 26.6.1971, 4.7.1971; Zetz-Wiese, 1260 m, 28.6.1970; Kleiner Pfaffenbach, 1200 m, 29.9.1973.

Gastroidea viridula (DEG.)

Pointnergraben, 600 m, 24.8.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 21.4.1968, 27.4.1969, 26.10.1969, 28.6.1970.

Phaedon cochleariae (F.)

Steg-Korngraber, 550 m, 30.10.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 27.4.1969, 19.4.1970, 26.4.1970, 28.4.1974.

Phaedon pyritosus (ROSSI)

Pointnergraben, 600 m, 24.8.1969.

Sclerophaedon carnolicus (GERM.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 27.4.1969, 26.4.1970, 2.6.1974.

Plagioderia versicolora (LAICH.)

Anger-Steg, 496 m, 16.5.1970.

Melasoma aenea (L.)

Pointnergraben, 550 m, 8.5.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 14.5.1967, 19.5.1968, 24.5.1969, 600 m, 25.6.1972, 22.7.1972; Busenthal, 410 m, 31.10.1970; Ilz, 300 m, 18.5.1970.

Melasoma vigintipunctata (SCOP.)

Pointnergraben, 600 m, 18.4.1968; Anger-Steg, 480 m, 23.6.1967.

Melasoma populi (L.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 15.5.1969, 7.5.1970, 4.8.1968.

Melasoma tremulae (F.)

Wittgruber, 950 m, 31.5.1969.

Phyllodecta tibialis SUFF.

Pointnergraben, 550 m, 22.5.1966, 12.4.1967; Birkfeld, 600 m, 6.5.1967; Anger-Steg, 496 m, 14.4.1974.

Phyllodecta vitellinae (L.)

Pointnergraben, 600 m, 24.8.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 13.5.1971, 20.5.1971; Anger-Steg, 480 m, 16.5.1970, 24.5.1974.

Timarcha metallica (LAICH.)

Pointnergraben, 550 m, 31.3.1968, 14.5.1969; Kleiner Pfaffenbach, 1200 m, 29.9.1973, 1100 m, 8.6.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 26.10.1969, 14.5.1972, 15.4.1974.

Galerucella lineola (F.)

Anger-Steg, 480 m, 10.5.1969, 496 m, 19.8.1973, 14.4.1974.

- Galeruca tanacetii (L.)
Pointnergraben, 550 m, 22.5.1968, 19.9.1968; Rabenwaldgebiet
Reith-Petz, 700 m, 22.6.1968.
- Galeruca pomonae (SCOP.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 29.8.1969, 14.9.1969.
- Lochmaea capreae (L.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 14.5.1966.
- Lochmaea crataegi (FORST.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 540 m, 2.6.1974.
- Phyllobrotica quadrimaculata (L.)
Safenthal, 376 m, 3.8.1969.
- Luperus circumfusus (MARSH.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 30.7.1972, 24.6.1973.
- Luperus xanthopoda SCHRK.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 19.10.1969.
- Luperus lyperus SULZ.
Wittgruber, 900 m, 10.6.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m,
20.5.1971, 22.5.1974, 650 m, 1.7.1972.
- Agelastica alni (L.)
Pointnergraben, 600 m, 21.6.1967, 3.5.1968, 17.5.1968; Anger-Steg,
480 m, 10.5.1970, 16.5.1970; Ilz, 300 m, 18.5.1970.
- Phyllotreta undulata KUTSCH.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 28.4.1974.
- Phyllotreta tetrastigma (COM.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 27.5.1973, 31.3.1974, 6.4.1974,
24.4.1974.
- Phyllotreta atra (F.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 28.4.1974.
- Phyllotreta nigripes (F.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 1.4.1972, 28.4.1974.
- Aphthona coerulea (GEOFFR.)
Ilz, 300 m, 24.5.1974.
- Aphthona ovata FOUĐ.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 10.9.1972.
- Longitarsus apicalis (BECK.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 1.11.1971.
- Longitarsus luridus (SCOP.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 1.11.1971.
- Longitarsus rubellus (FOUĐ.)
Kleiner Pfaffenbach, 1100 m, 8.6.1974.
- Hermaeophaga mercurialis (F.)
Pointnergraben, 600 m, 20.4.1974.
- Batophila rubi (PAYK.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 1.11.1972, 600 m, 25.5.1974.
- Crepidodera ferruginea (SCOP.)
Steg-Korngraber, 520 m, 2.8.1969; Rabenwaldgebiet-Reith-Petz,
600 m, 23.9.1967, 1.11.1971, 560 m, 1.7.1972, 2.7.1972, 16.7.1972,
6.8.1972, 13.8.1972, 24.9.1972.
- Crepidodera femorata (GYLLH.)
Pointnergraben, 600 m, 13.7.1969; Kleiner Pfaffenbach, 1100 m,
8.6.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 26.4.1970, 9.4.1972,
13.8.1972, 24.9.1972, 3.6.1973, 28.4.1974.
- Crepidodera cyanescens (DUFT.)
Kleiner Pfaffenbach, 1100 m, 8.6.1974.
- Derocrepis rufipes (L.)
Pointnergraben, 600 m, 13.4.1974, 550 m, 2.5.1967.
- Chalcoides aurea GEOFFR.
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 7.5.1967, 3.6.1969, 11.5.1971,
20.5.1971, 1.6.1972, 18.6.1972, 25.6.1972, 16.7.1972, 1.5.1974,
8.5.1974.

Chalcoides fulvicornis (F.)

Ilz, 300 m, 28.7.1973, 24.5.1974.

Chalcoides aurata (MARSH.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 16.5.1971, 20.5.1972, 10.9.1972, 5.6.1973; Mitterdorf, 406 m, 20.7.1973.

Chalcoides lamina BED.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 24.5.1969.

Chalcoides nitidula (L.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 3.5.1969, 11.5.1969, 1.6.1972, 560 m, 1.10.1972.

Epithrix pubescens (KOCH)

Ilz, 300 m, 24.5.1974.

Minota obesa (WALTL.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 12.4.1971, 560 m, 28.5.1972; Anger-Steg, 496 m, 9.6.1974.

Chaetocnema concinna (MARSH.)

Pointnergraben, 600 m, 20.4.1974.

Sphaeroderma testaceum (F.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 19.10.1969, 560 m, 13.8.1972.

Sphaeroderma rubidum (GRAELLS.) gyllenhali CAPRA

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 16.7.1972, 30.7.1972, 10.9.1972.

Psylliodes affinis (PAYK.)

Pointnergraben, 600 m, 24.8.1969.

Psylliodes napi (F.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 30.4.1972, 560 m, 31.3.1974, 6.4.1974, 28.4.1974.

Psylliodes dulcamarae (KOCH)

Ilz, 300 m, 24.5.1974.

Cassida viridis L.

Anger-Steg, 496 m, 9.6.1974.

Cassida hemisphaerica HBST.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 1.10.1972.

Cassida vibex L.

Pointnergraben, 550 m, 31.3.1969, 600 m, 21.5.1969; Wittgruber, 900 m, 17.5.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 9.5.1971, 13.8.1972.

Cassida rubiginosa MUELL.

Pointnergraben, 550 m, 21.5.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 16.3.1969, 30.3.1970.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Fundorte von 114 Chrysomelidenarten aus dem Bezirk Weiz sind aufgezählt.

LITERATUR

- HABELER H., 1971-1973: Die Großschmetterlingsfauna mit Funddaten von Kleinschmetterlingen des Bezirkes Weiz. Teil I-III. Weiz - Geschichte und Landschaft in Einzeldarstellungen, Leykam.
- KEPKA O., 1975: Die Wirbeltiere des Weizer Bezirkes. Weiz - Geschichte und Landschaft in Einzeldarstellungen, 9/A, Leykam.

PRATL F., 1970: Erläuterungen zur Vegetationskarte des Weizer Berg- und Hügellandes. Weiz - Geschichte und Landschaft in Einzeldarstellungen, 9/II, Leykam.

**Anschrift des Verfassers: Alfred MAUERHOFER
Rabendorf 63
A-8191 Koglhof**

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Arbeitsgemeinschaft für ökologische Entomologie in Graz](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Mauerhofer Alfred

Artikel/Article: [Chrysomeliden \(Col.\) aus dem Bezirk Weiz \(Steiermark\). 199-208](#)