

D I E S P I N N E R U N D S C H W Ä R - M E R D E S B A M B E R G E R U M - L A N D E S

von Bernhard STÖCKERT, Memmelsdorf

unter Mitarbeit von Herrn Dr. E. GARTHE, Bamberg, G. DERRA, Bamberg - W. PILOTEK, Gaustadt - R. WEIDNER, Drosendorf - A. RICHTER, Ebern - K.H. MÜLLER-KÖLLGES, Zeil - H. SEIDLEIN, Schweinfurt - und des Coburger Teams (HÖPFNER, BAUER, OTT, GICK)

Im Anschluß an die vorhergehende Veröffentlichung der Micro, Spinner und Eulen/1 berichte ich über die Spinner und Schwärmer des Bamberger Umlandes.

Im Gegensatz zu den großen, morphologisch weitgehend einheitlichen Familien der Spinner und Eulen, handelt es sich bei dieser Gruppe wie bei den Micros um ein Conglomerat verschiedenster, nicht miteinander verwandter Familien. Aus rein praktischen Gründen, aber ohne Berücksichtigung genetischer Zusammenhänge, stehen sie unter dem allgemeinen Begriff: Spinner, Schwärmer usw.

Nähere morphologische Untersuchungen in neuerer Zeit haben zu einigen Änderungen geführt/2. Die Gattung Diloba z.B., die bis zur Mitte dieses Jahrhunderts zu den Eulen gehörte, reiht man heute als eigene Familie bei den Spinnern ein.

Dieser Arbeit liegt die Nomenklatur und fortlaufende Nummerierung des Buches von Manfred Koch "Wir bestimmen Schmetterlinge" Band II/3 zugrunde.

Es werden alle Arten angegeben, ohne Rücksicht auf ihr Vorkommen im Gebiet. Um auch neuere Nomenklatur zu berücksichtigen, werden die entsprechenden Angaben von Forster

und Wohlfahrt/4 übernommen.

Alle Fänge und Beobachtungen (Wenn nicht anders vermerkt) stammen aus den Jahren 1950 - 1978.

Schon um 1861 wurde eine Bearbeitung der Spinner und Schwärmer des Bamberger Umlandes von Dr. FUNK vorgenommen.

Um 1960 hat WITTSTADT eine recht ausführliche Arbeit über die Schmetterlinge des Regnitztales geschrieben/5.

Die Angaben dieser beiden Sammler über seltene Falter werden unter (F) bzw. (W) übernommen.

Herr Dr. E. GARTHE veröffentlichte 1958 und 1964 "Die Nachtfalter an den Straßenbeleuchtungen des Bamberger Berggebietes" (6).

Herr STRASSBURGER schrieb über das Vorkommen des Totenkopfes und Windenschwärmers (7).

Die Abgrenzung des Gebietes erfolgt wie bei den vorhergehenden Arbeiten im Umkreis von 25 km (einzelne Angaben angenommen).

Da mit den Coburger Sammlern ein enges Arbeitsverhältnis besteht, und dort unseres Wissens noch keine Bearbeitung vorliegt, habe ich dieses Gebiet mit hereingenommen.

Ich werde diese Funde besonders kennzeichnen (Co).

Die Angaben von Herrn SEIDLEIN H. stammen aus der Umgebung von Schweinfurt und werden mit (S) versehen.

Der folgende Bericht wurde nur durch die gute Zusammenarbeit aller Sammelfreunde erreicht, die ihre Ergebnisse zur Verfügung stellten. Ich möchte hiermit allen danken, besonders Herrn Dr. GARTHE, der immer aufopfernd zur Seite stand.

Spezieller Teil

Zygaenidae, Blutströpfchen, Widderchen
 kleine plumpe, am Tage fliegende Falter.

Sie sind auffallend widerstansfähig gegen Zyankali.

Nr.1 *Aglope infausta*

(369)

Südliche Art, im Gebiet noch nicht gefunden.

2 *Procris pruni*

(371 *Rhagades pruni*)

Bisher nur wenig nachgewiesen

Memmelsdorf, Burglesau (St), Oberhaid (De)

Vereinzelt (F)

Ebern (Ri)

Tambach, Weißbachgrund (Co/Eckerlein)

3 *Procris globulariae*

(375 *Jordanita globulariae*)

Verbreitet, hauptsächlich im Jura

Ludwag, Burglesau, Stübig (St, De)

Kreunzberg, Daschendorf, Drügendorf, Veilbronn (Ga)

Im Coburger Gebiet noch nicht nachgewiesen

Häufig bei Münnernstadt (S)

4 *Procris statices*

(378)

Verbreitet in Memmelsdorf, Strullendorf, Reckendorf,

Kreuzberg, Börstig (St), Drosendorf, Ludwag (We)

Pettstadt, Stackendorf (De)

Nördliche Haßberge (S)

Tambach, Fischbach (Co/Hö)

Nr.5 *Procris geryon* Hb.

(381)

Verbreitet, Kreuzberg, Ludwag, Burglesau (St)

Hallstadt, Oberhaid, Hohe Metze, Tiefenellern (Ga)

5a *Procris notata*(376 *Roccia Notata*)

Vereinzelte Memmelsdorf, Ludwag (St)

Dörrnwasserlos, Pünzendorf (St, De)

5b *Procris chloros*(375 *Jordanita chloros*)5c *Procris subsolana*(372 *Lucasia subsolana*)

1 ♂ 26.6.70 Dornig/Staffelstein (Ga)

6 *Zygaena purpuralis* Brunn.(382 *Mesembrynos purpuralis*)

Verbreitet, Ludwag (St, De, We), Würgau, Pausdorf, Kreuzberg, Drügendorf (Ga), Stübig, Burglesau (St), Roßdach (We)

N Pünzendorf, Pettstadt (De)

Nördliche Haßberge, Hambach (S)

Tambach, Oberlauter (Co/Hö)

7 *Zygaena diaphana* ssp. *Pimpinellae* Guhn.(393 *Mesembrynos saraptensis* Krul.)

Vereinzelte Burglesau (St.), Kreuzberg (Ga). Stübig (De), Johannishof (Ga. De.)

Zur Bestimmung wurden Genitalpräparate angefertigt.

8 *Zygaena scabiosae* Schev.(386 *Silvicola scabiosae*)

Selten Bamberg-Bruderwald, Kreuzberg (Ga)

Selten Bruderwald u. Geißberge (F)
Zell/Schw. (S)

Nr. 9 *Zygaena cynarae* Esp.

(389 *Peucedanophile cynarae*)

10 *Zygaena achilleae* Esp.

(390 *Lictoria achilleae*)

Verbreitet Kreuzberg, Memmelsdorf, Burglesau (St)
Pünzendorf, Pettstadt, Ludwag (De), Würgau, Drügendorf (Ga), Häufig auf Bergwiesen des Juras (F)
Stettfeld (S)
Oberlauter (Co/Hö)

11 *Zygaena fausta* L

(393 *Agrumenia fausta*)

Im Gebiet nicht festgestellt

12 *Zygaena carniolica* Scop. ssp. *modesta*

(*Agrumenia carniolica* 394)

Verbreitet Burglesau, Stübig, Ludwag (St)
Poxdorf, Roßdach, Kreuzberg, Drügendorf (Ga)
Münnerstadt (S)

13 *Zygaena meliloti* Esp.

(395 *Thermophila meliloti*)

Verbreitet Burglesau, Ludwag, Kreuzberg (St)
Hohe Metze, Poxdorf, Drügendorf (Ga), Bbg/Altenburg (De)
Staffelferg, Stadelhofen (We)
Schwebheim, Ebelsbach, Stettfeld (S)
Tambach, Oberlauter (Co/Hö)

14 *Zygaena filipendulae* L.

(396)

Verbreitet und Stellenweise häufig
 Memmelsdorf, Herrnsdorf, Kreuzberg, Ludwag, Burglesau (St)
 Poxdorf, Drügendorf, Viereth (Ga)
 Münnerstadt (S)
 Tambach, Oberlauter (Co/Hö)

Nr.15 *Zygaena trifolii* Esp.

(397) *Huebneriana trifolii*)

Überall vereinzelt, Wiesen am Bruderwald, Dankenfeld (Ga)

Häufig in feuchten Wiesen (F.)

Hochröhn (S)

Roßdach, Lauter (Co/Ba)

16 *Zygaena lonicerae* Schev.

(398 *Huebneriana* L.)

Verbreitet, Memmelsdorf, Burglesau, Kreuzberg (St)

Hohe Metze, Poxdorf, Drügendorf, Bbg./Bruderwald (Ga)

Pünzendorf, Kobelsdorf (De) Staffelberg (We)

m Zell/Schwf. (S)

17 *Zygaena transalpina* Esp.

(399 *Polymorpha transalpina*)

Münnerstadt (S)

18 *Zygaena elegans* Bgff.

(401 *Polymorpha* - *elegans*)

19 *Zygaena angelicae* O.

(400 *Polymorpha angelicae*)

Vereinzelt, Poxdorf, Tiefenellern, Drügendorf (Ga)

Pünzendorf (De), Voittmannsdorf (We)

Münnerstadt (S)

19 *angelicae* ssp. *ratisbonensis* Bgff.

^a Roßdach, Pottenstein, Tiefenellern, Dörrnwasserlos,
 Poxdorf, Teuchatz (Ga).

- Nr. 20 *Zygaena ephialtes* L.
 (Polymorpha ephialtes 402)
 Vereinzelt, Oberhaid, Kreuzberg, Pettstadt, Streitberg
 (Ga), Tiefenellern, Burglesau (St) Börstig (De)
 28.7.78 sehr häufig Hangerberg/Oberhaid (Ga)
 Münnersstadt (S)

Syntomidae

Kleine am Tage fliegende Falter mit langen Fühlern, großen
 Vorder- und stark verkleinerte Hinterflügel.

- 21 *Syntomis phegea* L.
 (312 *Amata phegea*)
 Fehlt in unseren Gebieten
- 22 *Dysauxes ancilla*
 (314)
 Selten, Stettfeld (De) Ebelsbach (Ga)
 Zeil (M-K)

Arctiidae: Aufteilung in 2 Gruppen:

1. Kleinbären und Flechtenbären 23 - 49
 2. Bären 50 - 71
- 23 *Nola cuculatella* L.
 (234)
 1 Ex. Rödeltal (Co/G)
 Pettstadt, Börstig, Johannishof (Ga, De) Würgau (St)
- 24 *Roeselia togatulalis* Hb.
 (235)
- 25 *Roeselia albula* Schiff.
 (236)

- Nr. 26 *Roeselia strigula* Schiff.
(237)
Stettfeld, Stübig (De), Johannishof, Daschendorf (Ga)
Brudelwald, Hauptsmoor (F.)
Zell/Schwf. (S)
- 27 *Celama cicatricalis*
(238)
- 28 *Celama confusalis* Hs.
(239)
Johannishof (De, Ga), Burglesau (St), Memmelsdorf (We)
Strullendorf, Ludwag, Daschendorf, Veilbronn (Ga)
Zell (S)
Zeil (M-K)
- 29 *Celama centonalis* Hb.
(240)
Hesselberg (Ga. De)
- 30 *Nudaria mundana* L.
(263)
An Mauern in Miersberg (Weissenfeld) (F.)
- 31 *Comacla senex* Hb.
(317)
Börstig (St, Ga, De), Hohengüßbach (De), Hesselberg,
Breitengüßbach (Ga)
- 32 *Miltochrista miniata* Forst.
(266)
Lokal bei Johannishof, Pettstadt (St, Ga, De)
Kreuzberg, Daschendorf, (Ga, De), Stübig, Hohengüß-
bach (De)
Nicht selten im Bruderwald (F.)

Häufig bei Zell (S)

Nr.33 *Paidia murina* Hb.

(264)

34 *Philea irrorella* Cl.

(318)

Verbreitet bis häufig, Burglesau (St.), Ludwag (We)
Johannishof, Kreuzberg, Daschendorf, Börstig (Ga, De)
Zeil (M-K), Schwebheim, Zell (S)
Oberlauter (Co/Hö), Fischbach, Ketschenbach (Co/Do)

35 *Cybosia mesomella* L.

(265)

Verbreitet bis häufig in Memmelsdorf, Johannishof,
Kreuzberg, Ludwag, Daschendorf, Börstig (Ga, De, St)
Zeil (M-K), Schwebheim, Zell (S)
Oberlauter, Fischbach, Ketschenbach (Co/Hö, Do)

36 *Endrosa roscida* Schiff.

(320)

Häufig in Münnerstadt (S)

37 *Endrosa kuhlweini* Hb.

(321)

38 *Oeonistis quadra* L.

(267) *Lithosia quadra* L.

vereinzelt Stübig (St, De)
Bamberg-Kaulberg, Börstig, Daschendorf, Johannishof (Ga)
Oberlauter (Co/Hö) Callenberg (Co/Ba)
Zell/Schweinfurt (S)

39 *Lithosia deplana* Esp.

(268) *Filema depressa* Esp.)

Verbreitet Herrnsdorf, Pünzendorf, Würgau, Memmelsdorf,
Stübig (St.

Johannishof (P, Ga, De)

Daschendorf (Ga, De)

Börstig (Ga) Schammelsdorf, Kobelsberg (De)

Zell/Schweinfurt (S)

Nr.40 *Lithosia griseola* Hb.

(275) *Eilema griseola* Hb.

Ganz selten (F)

2 ♂ Schwebheim (S)

41 *Lithosia lurideola* Zink.

(273) *Eilema lurideola* Zink.

Vereinzelte Memmelsdorf, Johannishof (St) Stübig (St, We)

Daschendorf (Ga) Pünzendorf, Kobelsberg (De)

Zeil (M-K) 1 Stck.

1 ♂ Zell/Schweinfurt (S)

42 *Lithosia complana* L.

(272) *Eilema complana* L.

Verbreitet: Memmelsdorf, Ludwag, Stübig (St, De)

Daschendorf, Johannishof (Ga, De)

Kreuzberg (Ga)

Pettstadt (Co/Ba) Weissenbrunn (Gi) Wildenheid (Do)

Probstgrund (Hö)

2 Stck. (M-K) Zeil Münnerstadt (S)

43 *Lithosia unita* Hb.

(269) *Eilema unita* Hb.

Sehr häufig Gambach/Karlstadt 10.8.73 am Licht (S)

44 *Lithosia lutarella* L.

(271) *Eilema lutarelle* L.

Vereinzelte Tiefenellern, Burglesau (St)

Pettstadt (St, De) Voitmannsdorf (We)
 Poxdorf (Ga) Johannishof, Strullendorf (Ga, De)
 Sehr häufig: bei Gambach/Karlstadt am Licht
 2 Stck. Zeil (M-K) Weissenbrunn (Co/Gi)

- Nr.45 *Lithosia pallifrons* Z.
 (270) *Eilema pygmaeola*
 Vereinzelt: Memmelsdorf, Tiefenellern (St)
 Pettstadt (St, Ga, De)
 Stübig (De)
- 46 *Lithosia sororcula* Hufn.
 (278) *Systropha sororcula* Hufn.
 Verbreitet: Johannishof, 3 Stck. Memmelsdorf (St, Ga, De)
 Scheßlitz, Veilbronn (Ga) Pünzendorf, Stettfeld (De)
 nördl. Haßberge, Zell/Schweinfurt (S)
 3 Stck. Zeil (M-K)
- 47 *Pelosia muscerda*
 Hesselberg/Höchstädt (Ga, De)
- 48 *Pelosia obtusa* Hs.
- 49 *Gnophria rubricollis* L.
 (279) *Atolmis rubricollis* L.
 Verbreitet: Bbg./Bruderwald (De)
 Memmelsdorf, Würgau, Burglesau (St)
 Börstig (Ga, St)
 Johannishof, Geisdorf, Veilbronn (Ga)
 Zell/Schwft., Schwebheim, Hassberge (S)
 Oberlauter (Co/Hö)
 2 Stck. Zeil (M-K)
- 50 *Coscinia striata* L.
 (280)

Vereinzelte: Pettstadt, Burglesau (St)

Börstig (Ga, De)

Lange Meile (Ga, De)

Häufig: Münnerstadt (S)

Nr. 51 *Coscinia cribraria* L.

(281)

Vereinzelte: Strullendorf (Ga, De) Memmelsdorf (St)

Hesselberg/Höchstädt (Ga, De)

Jungenhofen (Ga Adelsdorf (De)

52 *Utetheisa pulchella* L.

(282)

53 *Chelis maculosa* Gern.

(284)

54 *Phragmatobia fuliginosa* L.

(286)

Häufig: Bamberg und Coburger Gebiet in 2 - 3 Generationen und Zeil (M-K) Schweinfurt

55 *Eucharis casta* Esp.

(287)

56 *Parasemia plantaginis* L.

(288)

Verbreitet: Memmelsdorf, Burglesau (St) Ludwag (We)

Mühlendorf, Gaustadt (P) Schammelsdorf (De)

Tiefenellern (Ga, St)

Dietersdorf, Oberlauter, Rottenbach Callenberg (Ott,

Gi, Hö, Ba) Zell, Schwebheim/Schweinfurt

57 *Spilarctia lutea* Hfng.

(291) *Spilosoma lubricipeda* L.

Häufig: Memmelsdorf (St, We)
 Börstig (Ga) Bbg./Kaulberg (Ga)
 Breitengüßbach (De)
 Callenberg (Ba, Ott) Wildenheid/Rödental (Gi)
 Zeil (M-K) Schweinfurt/Schwebheim

Nr.58 *Spilosoma menthastri* Esp.

(292)

Häufig: Bamberg, Memmelsdorf, Johannishof, Daschen-
 dorf, Börstig, Kreuzberg (Ga, St, De, We)

Häufig: (Co/Eck, Ba, Hö, Gi, Ott)

Zeil (M-K) und Zell/Schweinfurt

59 *Spilosoma urticae* Esp.

(293)

Bbg./Kaulberg 10.9.56 (Ga)

Oberlauter (Hö) Rödental, Weinberg (Gi)

Coburg (Eck)

60 *Arctinia caesarea* Goeze

(296)

im allgemeinen selten, jedoch 12 Stck. am 19.5.1971
 bei Ludwag (St, De)

Bbg./Michelsberg 2 Stck. (Ga) Stübig (De)

Sträublingshof/Staffelstein 2 Stck. (Ga)

Selten im Hauptsmoorwald (F.)

Selten im Cob.-Gebiet Oberlauter (Ba, Hö)

Rödental, Weinberg (Gi)

1 ♂ Zeil (M-K)

1 ♂ Zell und 1 ♀ Kronungen/Schweinfurt (S)

61 *Diaphora mendica* Cl.

(297) *Cynia mendica* Cl.

Verbreitet: Memmelsdorf, Ludwag (St, De)

Bbg./Stephansberg (Ga)

Staffelbach (Ga) Unterhaid, Kobelsberg (De)
 Verbreitet: Zell, Schwebheim/Schweinfurt (S)
 im Coburger Gebiet (Ba, Hö, Gi, Ott)
 2 Stck. Zeil (M-K)

Nr.62 *Rhyparia purpurata* L.

(300)

Vereinzelte: Memmelsdorf, Herrnsdorf, Burglesau (St)
 Gaustadt (P)

Hallstadt, Geisdorf, Heroldsmühle (Ga)

Ludwig, Börsting, Stübing, Kobelsberg (De)

Nicht selten (F.)

Zell/Schweinfurt (S)

Vereinzelte: Cbg./Lauterberg, Staffelberg, Dieters-
 dorf, Weissbachgrund, Callenberg (Ba, Eck, Ro, Ott)

2 Stck. Zeil (M-K)

63 *Diacrisia sannio* L.

(302)

Verbreitet: Ludwig, Burglesau, Stübing (St, De)

Veilbronn, Aufseß (Ga)

Oberlauter, Dietersdorf, Haarbrücken, Ketschenbach,

Weidach, Buchberg (Ba, Hö, Gi, Do, Ott)

Schwebheim (S)

64 *Hyphoraia aulica* L.

(303)

nur in Roßdach/Bbg. (St) festgestellt

und Walberla (Forchh.) (St, De)

Callenberg (Co/Ba) Staffelberg (Co/Ott)

selten in Münnerstadt (S)

65 *Pericallia matronula* L.

(304)

Juni 196 Dietzhof

1936 3 F. Friesner Warte
 1926 1 ♂ Giechburg
 1948 u. 1957 1 ♂ Heiligenstadt
 1954 4 F. Weihermühle Lukasch
 Hier sehr selten, einige Male bei Miersberg und Ebermannstadt (F)

Nr.66 *Arctia caja* L.

(305)

Verbreitet bis häufig: Memmelsdorf, Pettstadt, Stübig, Burglesau (St, De)
 Johannishof, Börstig, Hallstadt, Bbg./Kaulberg (Ga, De)
 Drosendorf (We)
 Regelmäßig im Cob.-Gebiet gefangen (Ba, Hö, Gi, Ott)
 Zeil (M-K) und Umgebung Schweinfurt

67 *Arctia villica* L.

(307)

nach dem Krieg (1945) nicht mehr gefangen.
 (Schmitt) Hauptsmoorwald 1932 mehrere gesammelt
 Nicht häufig, öfters bei der Wunderburg (F.)

68 *Arctia hebe* L.

(308) *Ammobiota festiva* Hufn.)

nach dem Krieg (1945) nicht mehr gefangen
 Hauptsmoorwald 1932 (Schmidt)
 Vereinzelt, öfters bei Miersberg (F.)
 Rossach, Staffelberg (Eck)

69 *Callimorpha dominula* L.

(309) *Panaxia dominula* L.

Stellenweise häufig bei Forchheim (St, Schrüfer, Schaupp, Ga, De)
 Häufig im Hauptsmoorwald (F.)
 Häufig im Fischbacher Teich (Co/Ba, Gi, Hö, Do, Ott)
 Ködeltal (Ga)

- Nr.70 *Callimorpha quadripunctaria* Pd.
 (310) *Panaxia quadripunctaria* Pd.
 Würgau, Wattendorf (Ott)
 Memmelsdorf, Burglesau, Weismain (St) Drosendorf (We)
 Teuchatz, Börstig (Ga)
 Unterhaid, Hohengüßbach, Drügendorf (De)
 Zeil, Stettfeld (M-K)
 Callenberg (Ott)
- 71 *Hipocrita jacobaeae* L.
 (311) *Thyria jacobaeae* L.
 Häufig: Ludwag (St, De) Burglesau (St)
 Börstig (Ga, De, We)
 Pettstadt, Herrnsdorf (De)
 Häufig in Lautenberg, Rodach, Tambach (Ba, Hö, Gi, Ott)
 Häufig in Zeil (M-K) und Hambach/Schweinfurt (S)
- 72 *Dasychira selenitica* Esp.
 (245)
 ca. 100 Raupen Sept./1976 bei Herrnsdorf (St)
 Raupen Okt./1978 Drügendorf (Kl)
 häufig in Münnerstadt und Thüngersheim/Main (S)
- 73 *Dasychira fascelina* L.
 (246)
 Vereinzelt: Herrnsdorf, Burglesau (St)
 Raupen in Tiefenellern (Ga)
 Adelsdorf (De)
 (IGNG-Cob.)
- 74 *Dasychira abietis* Schiff.
 (247)
- 75 *Dasychira pudibunda* L.
 (248)

überall häufig auch im Coburger Gebiet
Zeil (M-K)

Nr.76 *Orgyia gonostigma* F.

(250)

Seltener als *antiqua* (F.)

77 *Orgyia antiqua* L.

(251) *Orgyia recens* Hb.

überall verbreitet Memmelsdorf, Ludwag (St)

Tiefenellern (Ga) Zeegendorf (De)

und im Coburger Gebiet und Schweinfurt

78 *Orgyia ericae* Germ.

(252)

79 *Laelia coenosa* Hb.

(254)

80 *Arctornis l-nigrum*

(255)

Verbreitet: Johannishof (St, Ga, De) Ludwag (St, De, We) Stübig, Würgau (St)

Kreuzberg, Daschendorf (Ga, De) Buckenhofen (Kl)

Probstgrund, Gallenberg (Co/Hö, Gi, Ott)

Zeil (M-K) Zell, Schwebheim (S)

81 *Stilpnotia salicis* L.

(256)

Seltener als *l-nigrum* Memmelsdorf (St, We)

Johannishof, Börstig (Ga, De) Bbg./Michelsberg (Ga)

Hesselberg (De) Unter- u. Oberlauter, Probstgrund,

Rödental, Weinberg (Co/Hö, Ba, Gi, Ott) Zeil (M-K)

Schwebheim (S)

Nr.82 *Lymantria dispar* L.

(257)

Vorkommen jahrweise verschieden

1978 sehr häufig (St, Ga, De)

Probstgrund, Fischbacher Teich (Co/Hö, Gi)

Zeil (M-K) Poppenhausen (S)

83 *Lymantria monacha* L.

(258)

Verbreitet: Pünzendorf, Stübig, Pettstadt (St)

Johannishof, Börstig, Strullendorf (Ga, De)

Unterhaid, Kobelsberg (De)

Leutertal, Weissenbrunn, Rödental, Weinberg, Callenberg (Co/Hö, Gi, Ott)

Zeil (M-K) Zell, Schwebheim Stettfeld (S)

83a *eremita* + *f.atra*

Johannishof (Ga)

Pünzendorf, Pettstadt (St, De) Stackendorf (De)

84 *Ocneria detrita* Esp.

(259)

85 *Ocneria rubea* F.

(260)

86 *Porthesia similis* Fuessl.

(262)

Verbreitet: Memmelsdorf (St, De) Börstig (St, Ga, De)

Bbg/Kaulberg (Ga) Johannishof, Daschendorf, Weizendorf (Ga, De)

Lautertal, Rödental, Weinberg, Wildenheid (Co/Hö, Gi, Do)

Zeil (M-K) und Schwebheim (S)

87 *Euproctis chrysorrhoea* L.

(261)

z.Zt. selten. 1 ♂ 3.7.1968 Memmelsdorf (St)

1 F 13.7.1971 Börsting (Ga)

2 ♂ Schwebheim (S)

Nr.88 *Thaumetopoea processionea* L.

(329)

Kreuzberg 24.8.1961 1 ♂ (Ga)

Johannishof 4.9.1972 (Ga)

Raupen häufig zwischen Haßfurt und Schweinfurt (M-K, S)

89 *Thaumetopoea pinivora* Tr.

(330)

Lasiocampidae Glucken, Wollraupenspinner90 *Malacosoma neustria* L.

(454)

Verbreitet bis häufig im Bbg. und Cbg. Gebiet
 Zeil (M-K) jährlich an der B 26 zwischen Gelders-
 heim und Werneck Kahlfraß an Apfelbäumen (S)

91 *Malacosoma castrensis* L.

(455)

Im Bbg. Gebiet häufig: Burglesau, Daschendorf,
 Ludwag, Stübig, Geisdorf (St, De, Ga)
 Im Cbg. Gebiet selten: (Weidach/Ott)
 Zeil (M-K) Haubach, Münnerstadt

92 *Malacosoma franconica* Esp.

(456)

93 *Trichiura crataegi* L.

(458)

Jahrweise verbreitet Memmelsdorf 1966-1968 (St)
 Bbg./Kaulberg, Würgau, Johannishof, Veilbronn (Ga)
 Bbg./Altenburg, Daschendorf, Schammelsdorf (De)
 1973 in Anzahl Zeil (M-K)
 In Schwebheim alle Jahre häufig

Nr.94 *Poecillocampa populi* L.

(460)

Verbreitet und häufig auch im Cobg. Gebiet u. Schweinfurt

1 ♀ Zeil (M-K)

95 *Eriogaster rimicola* Hb.

(462)

Bbg./Kaulberg, Michelsberg 1954-1956

Die Raupen nicht selten im Hain und auf der Altenburg (F.)

96 *Eriogaster catax* L.

(463)

Bei Miersberg, Eggolfsheim und Schlüssellau (F.)

97 *Eriogaster lanestris* L.

(464)

häufig Tiefenellern, Ludwag, Burglesau (St, De, Ga)
 und Schweinfurter Gebiet (S)

weniger im Cbg. Gebiet Probstgrund (Gi)

1 ♂ Zeil (M-K)

98 *Lasiocampa quercus* L.

(466)

Verbreitet bis häufig im Sandgebiet Herrnsdorf (St, De, Ga) auch im Coburger Gebiet (Ba, Hö, Gi, Do, Ott)

99 *Lasiocampa trifolii* Esp.

(467) *Pachygastria trifolii* Esp.

Häufig: Memmelsdorf, Stübig, Ludwag, Börstig (St)
Bbg./Kaulberg, Börstig, Pettstadt, Johannishof (Ga, De)
Dornig, Wildenheid, Rödental, Weissbachgrund, Probst-
grund (Ott, Do, Gi, Hö, Ba)
Stettfeld (M-K) und Schweinfurter Gebiet (S)

Nr.100 *Macrothylacia rubi* L.

(408)

überall verbreitet u. häufig Bbg., Cbg., Zeil, Schwein-
furt

101 *Cosmotriche potatoria* L.

(469) *Philudoria potatoria* L.

Verbreitet Memmelsdorf, Pünzendorf (St)
Börstig, Johannishof (Ga, De)
Stübig, Hesselberg, Daschendorf (De)
Ebersdorf (Eck) Michelau (Ott)
Stettfeld (M-K) und Schwebheim, Heidenfeld (S)

102 *Selenephra lunigera* Esp.

(470) *Cosmotriche lunigera* Esp.

Vereinzelte, Memmelsdorf, Ludwag, Würgau (St)
Staffelstein (Ga)
Callenberg, Rödental, Weinberg (Ba, Gi, Ott)

103 *Epicnaptera ilicifolia* L.

(471)

2 ♂ Wildenheid (Gi)

104 *Epicnaptera tremulifolia* Hb.

(472)

Vereinzelte Memmelsdorf (St)
Bbg./Friedrichsbrunnen (Ga)
Unterhaid (De) Raupen öfters im Michelsberger Wald

auf Eichen (F)
 Probstgrund (Ba)
 1 ♂ Zeil (M-K)

Nr.105 *Gastropacha quercifolia* L.

(473)

Jahrweise verbreitet Memmelsdorf, Stübig, Pünzen-
 dorf (St)

Bbg./Kaulberg, Bruderwald, Daschendorf, Börstig,
 Stübig, Johannishof (Ga)

Ludwig, Bamberg (De)

Zeil (M-K)

Neustadt (Gi, Hö)

106 *Gastropacha populifolia* Esp.

(474)

1 ♂ am 22.6.66 in Memmelsdorf (St)

Bbg./Nonnenbrücke am 21.6.57 (Ga)

vereinzelt (F)

107 *Odonestis pruni* L.

(475)

ziemlich selten (F)

108 *Dendrolimus pini* L.

(476)

Verbreitet bis häufig Memmelsdorf, Börstig, Stübig,
 Burglesau, Johannishof (Ga, St, De)

auch im Cbg. Gebiet verbreitet (Ba, Hö, Gi, De, Ott)
 Münnerstadt (S)

109 *Lemoniidae* Herbstspinner

=====

Lemonia taraxaci Esp.

(452)

Nr.110 *Lemonia dumi* L.

(453)

1 ♂ am 8.10.1978 (Kl) selten Bruderwald u. Miersberg (F.)

Ebern (Ri)

Massenvorkommen 1976 bei Heubach/Schweinfurt und Münnerstadt (S)

am 18.10.1977 1 ♂ Zeil (Kuhn)

1 ♀ 7.10.76 Meilschnitz (Co/Gi)

Endromididae Scheckflügel

=====

111 *Endromis versicolora* L.

(477)

Memmelsdorf (St) Bbg./Stephansberg, Distelberg, Johannishof, Burggrub (Ga)

Fischbacher Teich (Hö, Gi) Callenberg (Ott)

Zeil (M-K) u. verbreitet bei Gambach, Karlstadt, Schwebheim (S)

Drepanidae Sichelflügler

=====

112 *Drepana falcataria* L.

(438)

verbreitet in 2 Generationen (St, Pi, Ga, De, We)
(Ba, Hö, Gi, Ott)

Zeil (M-K) Schwebheim (S)

113 *Drepana curvatula* Bkh.

(439)

114 *Drepana harpagula* Esp.

(440)

Selten Memmelsdorf, Börstig (St)
 Börstig, Johannishof (Ga, De) Unterhaid (De)
 4 Stck. Zeil (M-K) 1974
 häufig bei Schwebheim (S)

Nr.115 *Drepana lacertinaria* L.
 (441)

Verbreitet Memmelsdorf, Stübig, Ludwag (St) Gaustadt (P)
 Pünzendorf (We)
 Johannishof, Bbg./Stephansberg (Ga)
 Börstig, Stackendorf (De)
 Rödental, Wildenheid (Gi) Callenberg (Ott)
 1 Stck. Zeil (M-K) Schwebheim (S)

116 *Drepana binaria* Hfn.
 (442)

Verbreitet Memmelsdorf, Ludwag, Johannishof (St)
 Gaustadt (P)
 Bbg./Kaulberg, Börstig, Weizendorf, Veilbronn, Stett-
 feld, Daschendorf, Unterhaid (Ga)
 Cbg./Probstgrund (Ba, Hö) Callenberg (Ott)
 Zeil (M-K) Schwebheim (S)

117 *Drepana cultraria* F.
 (443)

Verbreitet Memmelsdorf, Daschendorf, Pünzendorf, Ludwag
 (St, De)
 Johannishof (P, Ga) Tiefenellern, Burggrub, Strullen-
 dorf (Ga)
 Cbg. /Probstgrund, Hofgarten, Wildenheid (Hö, Gi, Ro)
 Zell/Schweinfurt (S)

118 *Cilix glaucatus* Scop.
 (444)

Verbreitet Memmelsdorf, Ludwag, Stübig (St)

Gaustadt (P)

Bbg./Kaulberg, Börstig (Ga)

Daschendorf, Unterhaid (De)

Cbg./Probstgrund, Rödental, Wildenheid (Hö, Gi)

Zeil (M-K) Zell/Schweinfurt

Saturniidae Nachtpfauenaugen

=====

Nr.119 *Eudia pavonia* L.

(449)

verbreitet bis häufig

Memmelsdorf, Stübig, Ludwag (St) Gaustadt (P),

Drosendorf (We)

Sandhof, Kreuzberg, Burggrub (Ga)

Unter- u. Oberlauter, Neustadt, Rottenbach, Schweighof (Ba, Hö, Gi, Do)

Zeil (M-K) Schwebheim, Zell (S)

120 *Agria tau* L.

(445)

Verbreitet, Memmelsdorf, Stübig, Pünzendorf (St)

Johannishof, Kreuzberg, Kübelstein (Ga)

Daschendorf, Hohengüßbach (De)

Bausenberg, Ketschenbach, Rödental, Callenberg (Ba, Hö, Gi, Ott)

Zeil (M-K) Schwebheim u. Zell/Schweinfurt (S)

Sphingidae Schwärmer

=====

121 *Acherontia atropos* L.

(410)

Jahrweise Puppen bzw. Raupen in Kartoffelfeldern

Memmelsdorf (St) Altendorf (Straßburger)

Falter: Bbg./Kaulberg, Domberg, Gartenstadt, Birkach (Ga)
 Sehr vereinzelt (F.)
 Bertelsdorf, Dietersdorf, Veste-Coburg (vor 1940)
 (Ba, Ro)

Nr.122 *Herse convolvuli* L.

(411)

Jahrweise Puppen i. Kartoffelfeldern (St, We, Straß-
 burger)

Falter vereinzelt 2 Stck. Bamberg 1976 (St)

Bbg./Kaulberg 8 Stck. 1956 (Ga)

Herzogenreuth (De)

123 *Sphinx ligustri* L.

(412)

verbreitet Memmelsdorf, Stübig, Ludwag (St, De)

Pünzendorf (We) Veilbronn (Ga)

Cbg./Probstgrund (Hö) Wildenheid (Gi)

Zahlreiche Raupen in Rödental 1974 (Gi)

124 *Sphinx pinastri* L.

(413) *Hyloicus pinastri* L.

Überall verbreitet u. stellenweise häufig (St, P, Ga,
 De, We)

Coburg (Ba, Hö, Gi, Do, Ott)

Zeil (M-K)

125 *Mimas tiliae* L.

(406)

verbreitet bis häufig

Bbg./Kaulberg, Johannishof, Veilbronn (Ga)

Memmelsdorf (St) Gaustadt (P) Stübig, Daschendorf,
 Strullendorf, Stettfeld (De)

Cbg./Callenberg (Ba, Ott) Hofgarten (Hö) Rödental
 und Wildenheid (Gi)

Zeil (M-K)

- Nr.126 *Smerinthus ocellatus* L.
 (409)
 verbreitet Memmelsdorf, Börstig (St)
 Bamberg, Börstig, Kreuzberg (Ga)
 Kobelsberg (De)
 Unterleiter, Callenberg, Rödental, Wildenheid (Ba,
 Gi, Do, Ott)
 Zeil (M-K)
- 127 *Amorpha populi* L.
 (407) *Laothoe populi* L.
 Memmelsdorf, Stübig, Pettstadt, Daschendorf (St)
 Gaustadt (P) Bbg./Kaulberg, Johannishof, Veilbronn (Ga)
 Pünzendorf, Börstig
 Callenberg, Wildenheid, Rödental, Fischbach (Ba, Hö,
 Gi, Do, Ott)
 Zeil (M-K)
- 128 *Haemorrhagia tityus* L.
 (425)
 Pünzendorf, Stübig, Burglesau (St)
 Häufig auf dem Jura (F)
 Ebern (Ga) Oberläuter (Hö), Weissenbrunn 29.5.-31.5.77
 über 20 Stck. (Gi)
- 129 *Haemorrhagia fuciformis* L.
 (426)
 Zahlreiche Raupen Lange Meile (Ga)
 Drügendorf, Stackendorf (De)
 Häufig im Jura, hier nicht so häufig (F.)
 Cbg./Probstgrund (Hö)
 11.6. - 18.6.77 Weissenbrunn 11 Falter (Gi)
 Zell, Gambach (S)
- 130 *Deilephila nerii* L.

(414) *Daphnis nerii* L.

1 ♀ 22.9.65 Bamberg, Neue Residenz

Nr.131 *Proserpinus proserpina* Pall.

(423)

4.5.68 2 Exemplare Johannishof (Ga)

Raupen fast jedes Jahr in mehreren Exemplaren (F.)

132 *Macroglossum stellatarum* L.

(424)

Jährlich v. Aug. bis Okt.

Memmelsdorf (St) Bamberg (Ga)

1 Ex. 15.6.77 Bbg. (We)

(Ba, Hö, Gi, Ott)

Zeil (M-K)

133 *Celerio euphorbiae* L.

(415)

Überall verbreitet bis Häufig (St, Ga, De)

Cbg. (Ba, Hö, Gi, Ott)

Zeil (M-K)

134 *Celerio gallii* Rott.

(418)

1 ♂ 14.8.76 Dörfleins (De)

4.8.76 Lohndorf (We)

Raupen nicht gerade selten, aber sehr vereinzelt (F.)

Cbg./Callenberg, Kögeltalsperre (Ba, Hö)

(Wildenheid (Do) Callenberg (Ott)

135 *Celerio lineata*

(419)

136 *Pergesa elpenor* L.

(420) *Deilepila elpenor* L.

Überall verbreitet (St, P, Ga, De)
 Zeil (M-K)

- Nr.137 *Pergesa porcellus* L.
 (421) *Deilephila porcellus* L.
 überall verbreitet bis häufig (St, P, Ga, De, We)

- 138 *Hippotion celerio* L.
 (422)

Notodontidae Zahnspinner
 =====

- 139 *Cerura bicuspis* Bkh.
 (332) *Harpyia bicuspis*
 Vereinzelt
 2 ♂ Memmelsdorf (St) Gaustadt (P) Buckenhofen (Kl.)
 Strullendorf, Johannishof (De)
 Veilbronn (Ga)
 4 ♂ Rödental/Weinberg (Gi), Wildenheid (De) Callenberg (Ott)
 Coburg (Ro) Kronungen/Schweinfurt (S)
- 140 *Cerura furcula* Clerk.
 (333) *Harpyia furcula* Clerk.
 Verbreitet Memmelsdorf (St)
 Mönchröden (Hö) Rödental/Wernberg (Gi)
 1 ♂ Zeil (M-K)
- 141 *Cerura bifida* Hb.
 (334) *Harpyia hermelina* Goeze
 Verbreitet
 Memmelsdorf (St) Bbg./Kaulberg (Ga) Börstig (Ga, De)
 Buckenhofen (Kle)

Cbg./Callenberg (Ba) Hofgarten (Hö) Rödental/Weinberg (Gi)

3 Stck. Zeil (M-K) Schwebheim (S)

Nr.142 *Dicranura erminea* Esp.

(335) *Cerura erminea* Esp.

vereinzelt

Memmelsdorf (St) Gaustadt (P)

Bbg./Kaulberg, Johannishof, Hauptsmoorwald (Ga)

Ludwig, Hohengüßbach (De)

Cbg./Hofgarten (Hö) Callenberg (Ott)

Schwebheim u. Zell/Schweinfurt (S)

143 *Dicranura vinula* L.

(336) *Cerura vinula* L.

verbreitet Memmelsdorf (St, We) Bbg./Kaulberg, Börstig, Kreuzberg, Veilbronn (Ga)

Ludwig, Herrnsdorf (De)

Cbg.-Neustadt (Hö)

Schwebheim, Poppenhausen (S)

144 *Stauropus fagi* L.

(337)

verbreitet Memmelsdorf (St) Gaustadt (P) Bbg./Kaulberg, Johannishof, Kreuzberg, Strullendorf (Ga)

Ludwig (De)

Cbg./Callenberg (Ba, Ott) Probstgrund (Hö) Rödental/Weinberg (Gi)

Zeil (M-K) und Zell/Schweinfurt (S)

145 *Hoplitis milhauseri* F.

(339) *Hybocampa milhauseri* F.

vereinzelt nur 1971 häufiger

Memmelsdorf, Ludwig, Johannishof (St, De) Gaustadt (P)

Bbg./Kaulberg, Johannishof, Börstig (Ga) Stettfeld (De)

Buckenhofen (Kl)
 Cbg./Callenberg (Ba) Hofgarten (Hö) Rödental/Weinberg,
 Weissenbrunn (Gi) Hofgarten (Ott)
 Zeil (M-K) Schwebheim, Münnerstadt, Kronungen (S)

Nr.146 *Gluphisia crenata* Esp.

(340)

Weidach (Brü)

1 ♂ 1 ♀ Zeil (M-K)

Schwebheim, Zell nicht selten (S)

147 *Drymonia querna* F.

(342)

Selten

Bbg./Kaulberg, Michelsberg (Ga) (De)

Würgau, Stübig (St) (Kl)

148 *Drymonia trimacula* Esp.

(343)

Memmelsdorf, Pünzendorf (St, De)

Bbg./Kaulberg, Johannishof, Börstig, Veilbronn (Ga)

Ludwig, Daschendorf, Stettfeld (De)

Cbg./Probstgrund (Hö), Rödental (Gi), Wildenheid (Do)

Callenberg (Ott)

Zeil (M-K) Schwebheim, Zell/Schwft. (S)

Stettfeld (Ga, De)

149 *Drymonia chaonia* Hb.

(344) *Drymonia ruficornis* Hufn.

Memmelsdorf, Schammelsdorf, Sassendorf (St)

Bbg./Kaulberg, Michelsberg, Börstig, Johannishof (Ga)

Hohengüßbach (De)

Cbg./Callenberg (Ba, Ott) Probstgrund (Hö) Rödental (Gi)

3 Stck. Zeil (M-K) Zell/Schwft. (S)

- Nr.150 *Pheosia tremula* Cl.
 (346)
 Memmelsdorf (St) Gaustadt (P)
 Bbg./Kaulberg, Stephansberg, Johannishof (Ga)
 Ludwag, Kobelsberg, Schammelsdorf (De) Buckenhofen (Kl)
 Cbg./Callenberg (Ba, Ott) Probstgrund (Hö)
 2 Stck. Zeil (M-K) Schwebheim (S)
- 151 *Pheosia dictaeoides* Esp.
 (347) *Pheosia gnoma* F.
 Memmelsdorf, Ludwag (St)
 Bbg./Kaulberg (Ga) Strullendorf, Unterhaid (De) Viereuth Steinbr. Callenberg (Ba, Ott) Probstgrund (Hö)
 Wildenheid (Gi, Do)
 Zeil (M-K) Schwebheim (S)
- 152 *Notodonta dromedarius* L.
 (350)
 verbreitet Memmelsdorf, Stübig (St) Gaustadt (P)
 Daschendorf (We) Bbg./Kaulberg, Börstig, Weizendorf, Pettstadt, Roßdach (Ga, De)
 Zeil (M-K) Schwebheim, Zell/Schweinfurt (S)
- 153 *Notodonta ziczac* L.
 (351)
 verbreitet
 Memmelsdorf (St) Gaustadt (P)
 Bbg./Kaulberg, Michelsberg, Börstig, Kreuzberg, Johannishof Pettstadt (Ga, De)
 auch im Cbg./Gebiet verbreitet
 Zeil (M-K) Schwebheim
- 154 *Notodonta anceps* Goeze
 (345) *Peridea anceps*
 verbreitet in Bamberg und Coburger Gebiet
 Zeil (M-K) Schwebheim Zell

- Nr.155 *Notodonta pheobe* Sieb.
 (348)
 verbreitet in Bamberg u. Coburger Gebiet
 Bbg./Kaulberg, Stephansberg, Johannishof, Veilbronn (Ga)
 Memmelsdorf (St)
 Zeil (M-K) Schwebheim, Zell/Schweinfurt (S)
- 156 *Notodonta tritophus* Esp.
 (349) *Notodonta torva* Hb.
 verbreitet im Bbg. u. Cbg. Gebiet
 Bbg./Kaulberg, Börstig, Johannishof (Ga)
 Memmelsdorf (St, De)
 Zeil (M-)) Schwebheim, Zell/Schweinfurt (S)
- 157 *Spatalia argentina* Schiff.
 (352)
 Juli-Aug. ca. 10 Exemplare Buckenhofen (Kl)
 Raupen jedes Jahr selten und zerstreut (F)
 Unterhaid (De) Stettfeld 8 Exempl. (Ga, De)
 16.6.67 Cbg./Callenberg (Ba)
- 158 *Leucodonta bicoloria* Schiff.
 (353)
 vereinzelt, Memmelsdorf, Ludwag (St)
 Bbg./ Kaulberg, Johannishof (Ga) Stettfeld (De)
 Pünzendorf, Hohengüßbach (De) Buckenhofen (Kl)
 Cbg./Hofgarten (Hö, Rö) Callenberg (Ott)
 häufig bei Schwebheim u. Obbach/Schweinfurt (S)
- 159 *Ochrostigma velitaris* Hfn.
 (354)
 1 ♂ 28.6.74 Hangerberg/Unterhaid (De)
 nicht selten (F.)
 1 ♂ 3.7.75 Rödental (Gi)

Nr.160 *Ochrostigma melagona* Bkh.

(355)

Memmelsdorf, Stübig, Ludwag, Pünzendorf (St, De)

Veilbronn, Johannishof, Roßdach (Ga)

3 Stck. Zeil (M-K)

verbreitet in Schwebheim u. Münnerstadt (S)

161 *Odontosia carmelita* Esp.

(356)

Memmelsdorf (St) Sandhof, Johannishof, Veilbronn (Ga)

Stackendorf, Hohengüßbach (De)

Cbg./Callenberg, Probstgrund, Rödental (Ba, Hö, Gi)

4 ♂ Schwebheim, Gambach (S)

162 *Lophopteryx camelina* L.

(358)

verbreitet Memmelsdorf, Pünzendorf, Stübig (St)

Bamberg, Johannishof, Börstig, Veilbronn (Ga, De)

Cbg./Probstgrund (Ba) Rodach, Callenberg (Ott)

Zeil (M-K) Schwebheim, Zell/Schweinfurt (S)

163 *Lophopteryx cuculla* Esp.

(359)

verbreitet Würgau, Pünzendorf, Ludwag, Stübig, (St,De)

Börstig (Ga) Johannishof, Stackendorf (De)

Cbg./Callenberg (Ba) Rödental (Gi)

Schwebheim, Zell/Schweinfurt (S)

164 *Pterostoma palpinum* L.

(360)

verbreitet Memmelsdorf, Daschendorf (St) Gaustadt (P)

Bbg./Kaulberg, Stephansberg, Sandhof, Börstig, Kreuz-

berg, Pettstadt (De, Ga)

Cbg./Callenberg, Probstgrund, Rödental (Ba, Hö, Gi, Ott)

Zeil (M-K) Schwebheim Zell

- Nr.165 *Ptilophora plumigera* Esp.
 (361)
 verbreitet Stübig (We)
 Memmelsdorf (St) Bbg./Kaulberg (Ga) Stackendorf (De)
 Cbg./Probstgrund (Hö) Callenberg (Ott)
 Zell/Schweinfurt alle Jahre recht häufig
- 166 *Phalera bucephala* L.
 (362)
 verbreitet und häufig im Bbg. u. Cbg. Gebiet (St, Ga, De)
 Zeil (M-K) und Schweinfurter Gebiet
- 167 *Pygaera anastomosis* L.
 (367) *Clostera anastomosis* L.
 Johannishof, Pettstadt (G)
 1 ♂ Memmelsdorf (St) 15.8.71 Altenburg, Börstig (De)
 Cbg./Callenberg (Ba) Schwebheim (S)
- 168 *Pygaera curtula* L.
 (365) *Clostera curtula* L.
 verbreitet in 2 Gen. (April u. August)
 im Cbg.-Gebiet in Mai - Juni (Ba, Do)
 Zeil (M-K) Schwebheim, Zell (S)
- 169 *Pygaera anachoreta* F.
 (366) *Clostera anachoreta* F.
 Bamberg/Stephansberg (Ga)
 Cbg./ Rödental (Gi) 1 ♀ mit Licht
- 170 *Pygaera pigra* Hufn.
 (368) *Clostera pigra* Hufn.
 Viereth/Steinbruch (Ga)
 Zeil (M-K) Schwebheim (S)
 1 ♂ 10.5.76 Wildenheid (Gi)

Cymatophoridae Eulenspinner
 =====

- Nr. 171 *Habrosyne derasa* L.
 (428) *Habrosyne pyritoides* Hufn.
 Bbg./ Michelsberg, Börstig, Johannishof, Hallstadt
 Veilbronn (Ga)
 Würgau, Börstig, Memmelsdorf (St) Daschendorf, Hessel-
 berg (De)
 1 Stck. Stettfeld (M-K)
- 172 *Thyatira batis* L.
 (429)
 Bbg./Kaulberg, Johannishof (P) Börstig, Veilbronn (Ga)
 Memmelsdorf, Pünzendorf (St) Daschendorf, Hesselberg (De)
 1 Stck. Zeil (M-K)
- 173 *Palimpsestis fluctuosa* Hb.
 (430 *Tethea fluctuosa* Hb.
 Börstig (Ga) Dörrnwasserlos (De, St)
 Schwebheim nicht selten (S)
- 174 *Palimpsestis duplaris* L.
 (431) *Tethea duplaris*
 Stübig (We)
 Börstig, Johannishof (Ga, De)
 Memmelsdorf, Pünzendorf, Börstig (St)
 3 Stck. Zeil (M-K)
 Schwebheim u. Münnerstadt je 1 ♂ (S)
- 175 *Palimpsestis or* F.
 (432) *Tethea or* Schiff.
 Gaustadt (P) Börstig, Johannishof, Bamberg/Stephans-
 berg, Veilbronn (Ga) Memmelsdorf, Pünzendorf, Pett-
 stadt (St) Oberhaid, Hesselberg (De)
 1 ♀ Zeil (M-K) Schwebheim (S)

- Nr. 176 *Palimpsestis ocularis* L.
 (433) *Thetia ocularis* L.
 Börstig, Johannishof, Förtschenried (Ga)
 Memmelsdorf, Würgau, Ludwag, Börstig (St)
 Hesselberg, Daschendorf (De)
 1 ♂ Zeil (M-K)
- 177 *Polyploca diluta* F.
 (434)
 Bbg./Kaulberg, Johannishof (Ga)
 Memmelsdorf, Würgau (St) Daschendorf (De)
 häufig Zeil (M-K)
- 178 *Polyploca flavicornis* L.
 (435)
 Bbg./Bruderwald, Höfen (Ga) Johannishof, Daschen-
 dorf (Ga, De) Memmelsdorf (St)
 Zell, Kronungen (S)
- 179 *Polyploca ridens* F.
 (436)
 Strullendorf, Johannishof (Ga) Stackendorf (De)
 Schwebheim, Zell
- 180 *Diloba caeruleocephala* L.

 Bbg./Kaulberg (Ga)
 Burglesau (e.l.) Johannishof (St)
 Zeil (M-K)

Limacodidae Schildmotten
 =====

- 181 *Cochlidion limacodes* Hfn.

Kreuzberg, Börstig, Johannishof, Bbg./Friedrichs-
brunn (Ga)

Memmelsdorf, Pünzendorf (St) Pettstadt, Daschendorf (De)
Drosendorf (We)

Zeil (M-K) Schebheim

Nr.182 *Heterogenea asella* Schiff.

Kobelsberg/Aufseß (De)

Psychidae Sackträger
=====

183 *Acanthopsyche atra* L.
(480)

184 *Canephora unicolor* Hfn.
(483)

185 *Sterrhopteryx hirsutelle* Hb.
(497)
Börstig, Johannishof, Veilbronn (Ga)
Börstig (St) Bruderwald, Pettstadt (De)
(Zeil (M-K) 1 ♂)

186 *Epichnopteryx pulla* Esp.
(518)

187 *Fumea casta* Pall.
(541)

Thyrididae Fensterfleckchen
=====

188 *Thyris fenestrelle* Scop.
(478) 25.6.72 Lange Meile (De)

Aegeriidae Glasflügler

=====

- Nr.189 *Aegeria apiformis* Cl.
(580)
Memmelsdorf, Bbg.-Süd (St)
Bamberg (De) in manchen Jahren häufig (F)
- 190 *Aegeria melanocephala* Dalm.
(581)
- 191 *Sphecia crabroniformis* Lewin
(582)
- 192 *Paranthrene tabaniformis* Rott.
(583)
- 193 *Bembecia hylaeiformis* Lasp.
(584)
Bbg./Seelgasse (Ga)
bei Schlüsselau (F.)
- 194 *Synanthedon scoliaeformis* Bkh.
(585)
- 195 *Synanthedon spheciiformis* Gern.
(586)
Bug b. Bamberg (v. 1955)
- 196 *Synanthedon tipuliformis* Cl.
(590)
die häufigste Art Anfang Juni in Johannisbeersträuchern
schwärmend (F.)
1 St Zeil (M-K)

- Nr.197 *Synanthedon cephiiformis* O.
(592)
- 198 *Synanthedon conopiformis* Esp.
(593)
zerstreut und selten (F.)
- 199 *Synanthedon vespiformis* L.
(594)
- 200 *Synanthedon myopaeiformis* Bkh.
(595)
- 201 *Synanthedon culiciformis* L.
(597)
selten am Abhang der Altenburg (F.)
- 202 *Synanthedon formicaeiformis* Esp.
(599)
- 203 *Dipsosphecia ichneumoniformis* F.
(601)
Tütschengereuth (De) Roßdach (Ga) Oberhaid
nicht selten Altenburg u. Geissberge (F.)
- 204 *Chamaesphecia chrysidiformis* Esp.
(604)
Siehe Veröffentlichung
Atlanta (Gi)
- 205 *Chamaesphecia empiformis* Esp.
(610)
Stackendorf, Pettstadt, Wattendorf (De)
Oberhaid, Herzogenreuth (Ga) häufiger im Hauptsmoor (F.)

Nr.206 *Chamaesphecia leucopsiformis*
(616)

207 *Chamaesphecia muscaeformis* View.
(618)

Cossidae Holzbohrer
=====

208 *Cossus cossus* L.
(623)

Bbg./Michelsberg, Börstig (Ga) Memmelsdorf (e.l.) (St)
3 Stck. Zeil (M-K)

209 *Zeuzera pyrina* L.
(627)

Bbg./Kaulberg, Börstig, Johannishof, Dörrnwasserlos (Ga)
Memmelsdorf (St, We)
1 ♂ Zeil (M-K)

210 *Phragmataecia castaneae* Hbn.
(628)

Hepialidae Wurzelbohrer
=====

211 *Hepialus humuli* L.
(629)

Schammelsdorf (We) Veilbronn, Förtschenried (Ga)
die Raupe öfters in verschiedenen Wurzeln bei Miersberg
(F.)

212 *Hepialus fusconebulosus* d.G.
(631)

213 *Hepialus sylvinus* L.
(633)

Drosendorf, Lohndorf (We)
Bbg./Kaulberg, Börstig (Ga)
Memmelsdorf, Burglesau Würgau (St)

Nr.214 *Hepialus lupulinus* L.
(634)
Johannishof, Stettfeld (Ga)
Memmelsdorf, Börstig (St)

215 *Hepialus hectus* L.
(636)
Memmelsdorf (St) 6 Stck.
Drosendorf (We)
nicht selten im Hauptsmoor (F)

L i t e r a t u r

=====

- 1.) Naturforschende Gesellschaft Bamberg

Bericht	1973	"Microlepidoptera des Bamberger Umlandes" (Dr. Erich Garthe)
Bericht	1975	"Geometriden im Bamberger Umland" (Dr. Erich Garthe)
Bericht	1976	"Noctuiden des Bamberger Umlandes" (Müller.Köllges)

- 2.) S.G. Kiriakoff

(Familie Dilobidae)
Nachrichtenblatt Münchner Entom. Nr. 19 (1970 S. 101-104)

- 3.) Manfred Koch

"Wir bestimmen Schmetterlinge" II Schwärmer, Bären und Spinner (Radebeul 2. Auflage 1964)

- 4.) Forster und Wohlfahrt

"Die Schmetterlinge Mitteleuropas" Band 3 Spinner und Schwärmer (Stuttgart, Franksche Verlag)

- 5.) Wittstadt

"Die Großschmetterlinge des Regnitzgebietes" 37. Bericht der Naturf.Ges.Bbg. 1960
--

- 6.) Dr. Erich Garthe

"Die Nachtfalter an Straßenbeleuchtungen des Bamberger Berggebietes"
--

- 7.) XLII.Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg


"Das Auftreten v. Totenkopf u. Windenschwärmer bei Altendorf/Lkr. Bbg." i.d. Jahren 1964-1967

A b k ü r z u n g e n

(Ga)	Dr. E. Garthe, Bamberg
(De)	Georg Derra, Bamberg
(P)	W. Pilotek, Bamberg/Gaustadt
(We)	R. Weidner, Memmelsdorf-Drosendorf
(Ri)	A. Richter, Ebern
(M-K)	K.H. Müller-Köllges, Zeil
(Kl)	Dr. Kleinecke, Forchheim
(S)	H. Seidlein, Schweinfurt
(St)	Bernhard Stöckert, Memmelsdorf
(Hö)	Höpfner, Coburg
(Ba)	Bauer, Coburg
(Ott)	Ott, Coburg
(Gi)	Gick, Wildenheid/Coburg
(Ro)	Roschlaub, Coburg
(Do)	Domhardt, Wildenheid/Coburg

Anschrift des Verfassers: Bernhard STÖCKERT,
8602 Memmelsdorf, Hauptstraße 46

BAMBERGER RAUM mit Halbmesser 25 km um Bamberg



- I Börsting, 4 km nördl. BA
- II Strullendorf, 7 km s.
- III Pettstadt, 9 kms.
- IV Johannishof 8 km nw.
- V Hesselberg, Weihergebiet

- VI Altenburg / Bamberg
- VII Daschendorf / Itz, 16 km n.
- VIII Tiefenellern, 15 km o.
- IX Pörsdorf, 13 km onw.
- X Ludwigs, 15 km onw.

- XI Dörrnwasserlos, 19 km no.
- XII Veilbrunn, 2,5 km osw.
- XIII Drügersdorf, 19 km so.
- XIV Kobelsberg, 30 km o
- XV Dietzhof, 30 km so.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der naturforschenden Gesellschaft Bamberg](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Stöckert Bernhard

Artikel/Article: [Die Spinner und Schwärmer des Bamberger Umlandes 100-143](#)