# Verzeichnis

# der vom 11. August bis zum 10. Sept. 1891 bei Bad Kissingen in Bayern gesammelten, meist parasitischen Pilze

von

#### P. Magnus (Berlin).

Der mich ehrenden Aufforderung der Herren Lehrer A. Allescher und J. N. Schnabl Folge leistend, teile ich hier das Verzeichnis der von mir während eines Kuraufenthaltes in Bad Kissingen gesammelten Pilze mit. Da meine speziellen Studien meist auf die parasitischen Pilze gerichtet sind, so war auch diesen vorzugsweise meine Aufmerksamkeit zugewendet, während ich die größeren Pilze, namentlich die Hymenomyceten vernachlässigt habe. Von den von mir gesammelten Pilzen habe ich einen beträchtlichen Teil noch nicht bestimmt oder bezeichnet; zum Teil, weil ich in dem mir vorliegenden Entwickelungsstadium noch keine sichere Bestimmung wage, zum Teil, weil sie, wie z. B. Cercosporella auf Geranium silvaticum von Kreuzberg i./Rh., oder eine Septoria auf Spiraea Chamaedryfolia, neue unbeschriebene Arten sein möchten, mir aber manche lokale Pilzverzeichnisse mangeln, in denen sie doch beschrieben sein könnten. Sehr interessant ist eine mannigfache Pilzflora, die sich auf dem welken Gewebe über der von den Larven der Faltern Cemistoma laburnella H. S. in den Blättern von Cytisus Laburnum L. ausgefressenen Minen angesiedelt hat, zu deren genauer Bearbeitung mir aber augenblicklich die Zeit mangelt.

Da ich in Kissingen nicht dachte, daß ich ein solches Verzeichnis liefern sollte, habe ich viele gemeinere Pilzarten, auch unter den parasitischen Pilzen, nicht gesammelt, und kann sie daher hier nicht angeben. Ich möchte daher nur hervorheben, daß aus ihrem Fehlen in diesem Verzeichnisse keineswegs ihr Fehlen bei Kissingen, oder auch nur ihre Seltenheit dort folgt.

So muß ich denn dieses Pilzverzeichnis als einen nur sehr geringen Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora Unterfrankens übergeben.

# Peronosporeae.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet. auf Centaurea Scabiosa, am Aufstieg zur Bodenlaube.

C. spinulosus de Bary auf Cirsium oleraceum, Wiese bei der Saline.

Berichte d. B. B. Ges. 1892.

Peronospora gangliformis Berk. auf Sonchus oleraceus häufig auf Feldern.

- P. effusa Gres. auf Chenopodium bonus Henricus beim Schweizer Hause.
- P. grisea Ung. auf Veronica Beccabunga, bei der Borstmühle.
- P. Ficariae Tul. auf Ranunculus repens, auf dem Stationsberge.
- P. Valerianellae Fckl. auf Valerianella rimosa, Äcker bei Frauenroth.
- P. Anagallidis Schroet, auf Anagallis coerulea, Felder am Stationsberg.
- P. Alsinearum Casp. auf Stellaria media häufig bei Kissingen, mit Conidienträgern in der Herbstgeneration!
  - P. Trifoliorum de Bary auf Medicago sativa auf Luzernefeldern in Garitz.
- P. Cyparissiae de Bary auf Euphorbia Cyparissias am Fußwege von Kissingen nach Seehof.
  - P. pusilla de Bary auf Geranium palustre auf Wiesen bei Neustadt a./S.
- P. Cytisi P. Magn. nov. sp. auf der Unterseite der Blätter von Cytisus Laburnum L. im Garten der Villa Betzer.

Rasen der Conidienträger schmutzig-grau. Conidienträger ca. 6 Mal wiederholt verzweigt. Endästchen pfriemlich, schwach gebogen. Conidien durchschnittlich 23,35 µ lang, 17,55 µ breit, Membran farblos. Oosporen unregelmäßig eckig mit dickem Epispor mit wenigen starken, sehr unregelmäßigen mehr oder weniger anastomosierenden Leisten, kugelig, von durchschnittlich 28 µ Durchmesser in einem Oogonium mit nicht verdickter Wandung. — Sie tritt auf der Unterseite brauner Blattflecken auf, deren Zellen durch sie getödtet werden. Das Mycel bleibt auf die erkrankten Blattflecke beschränkt. Es hat länglich-sackförmige, stets unverzweigte, aber zuweilen etwas gekrümmte Haustorien.

## Ustilagineae.

Ustilago longissima (Sowerby) Tul. auf Glyceria spectabilis bei der Saline.

- U. Avenae (Pers.) Rostr. auf Avena sativa auf Haferfeldern.
- U. violacea (Pers.) Tul. auf Dianthus deltoides bei Aura.

Entyloma Linariae Schroet. auf Linaria vulgaris in der Waldung hinter Seehof.

E. Calendulae (Oud.) de Bary auf Calendula officinalis in Gärten in Wirmsthal und Steinach a./S.; auf Hieracium murorum viel am Stationsberge.

# Uredineae.

Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl. auf Polygonum aviculare am Stationsberge.

U. lineolatus (Dsm.) Pers. auf Scirpus maritimus viel bei der Saline.

U. Fabae (Pers.) Schroet. auf Orobus vernus auf dem Stufenberge; auf Lathyrus montanus Bernh. an der Strafse nach Euerndorf.

U. striatus Schroet. auf Medicago sativa bei der Bodenlaube.

Puccinia Lampsanae (Schultz) Fckl. auf Lampsana communis häufig.

- P. Violae Schum. auf Viola canina häufig; auf Viola sp. Salzburg bei Neustadt a./S.
- P. Epilobii DC. auf Epilobium montanum auf dem Kreuzberg in der Rhön; Aecidien, Uredo und Puccinia wurden dort gleichzeitig am 17. August 1891 angetroffen.
  - P. Silenes Schroet. auf Silene inflata auf dem Staffelberge.
- P. asarina Kze. auf Asarum europaeum viel auf dem Altenberge, am Staffelberge und a. a. O.

- P. Hieracii (Schum.) Mart. auf Hieracium am Stationsberge; auf Taraxacum officinale verbreitet; auf Carduus crispus bei Bad Kissingen; auf Cirsium oleraceum, Wiese vor der Saline; auf Centaurea Scabiosa am Staffelberge und bei der Bodenlaube.
- P. Galii (Pers.) auf Galium silvaticum am Staffelberge; auf Galium Mollugo bei der Saline.
  - P. Pimpinellae (Str.) Lk. auf Anthriscus silvestris bei Steinach a./S.
  - P. Rumicis scutati (DC.) Wint. auf Rumex scutatus bei der Trimburg.
  - P. Rubigo-vera (DC.), das Aecidium auf Lycopus arvensis bei Bocklet.
  - P. Poarum Niels., das Aecidium auf Petasites officinalis häufig.
  - P. coronata Cda. auf Avena sativa, Äcker vor dem Scheinberg und a. a. O.
- P. Bistortae (Strauss) Wint. auf Polygonum Bistorta auf dem Kreuzberge vor der Rhön.
- P. Menthae Pers. auf Mentha arvensis in Frauenroth; auf Clinopodium yulgare am Wege zum Schützenhause; auf Mentha silvestris bei Hausen.
  - P. annularis Str. auf Teucrium Chamaedrys am Staffelberge.
  - P. Virgaureae (DC.) Wint. auf Solidago virga aurea am Staffelberge.
  - P. Glechomatis DC. auf Glechoma hederaceum, Wiesenrand hinter Seehof.
  - P. Arenariae (Schum.) auf Stellaria nemorum im Cascaden-Thale.
  - P. solida Schwein. auf Anemone silvestris am Aufstiege zur Bodenlaube.
  - Phragmidium Potentillae (Pers.) Wint. auf Potentilla verna bei Klaushof.
  - Ph. Sanguisorbae (DC.) Schroet. auf Poterium Sanguisorba am Staffelberge.
  - Ph. tuberculatum J. Müll. auf Rosa canina, Salzburg bei Neustadt a./S.

Gymnosporangium clavariaeforme Jacq., das Aecidium (Aec. penicillatum Oeder) auf Sorbus Aria viel auf dem Stufenberge, am Wege zur Trimburg u. a. a. O.

Melampsora betulina (Pers.) Tul. auf Betula pubescens am Staffelberg.

- M. Helioscopiae (Pers.) Wint. auf Euphorbia exigua häufig, z. B. Felder am Aufstieg zur Bodenlaube, bei Wald-Aschach etc.
  - M. populina (Jacq.) Cast. auf Populus balsamifera bei der Lindenmühle.
  - M. Aecidioides (DC.) Schroet. auf Populus alba bei der Saline.
  - M. Salicis Capreae Pers. Wint. auf Salix Caprea am Staffelberge.

Pucciniastrum pustulatum (Pers.) Magn. auf Epilobium montanum im Cascaden-Thale; auf Epilobium angustifolium bei Wald-Aschach.

Thekopsora Padi (Kze. et Schm.) Magn. auf Prunus Padus in den Kuranlagen von Bad Kissingen.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. auf Cynanchum Vincetoxicum auf dem Stufenberge, dem Finsterberge und der Bodenlaube.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév. auf Petasites officinalis auf dem Altenberge; auf Sonchus oleraceus häufig.

Col. Campanulae (Pers.) Lév. auf Campanula häufig.

Col. Rhinanthacearum (DC.) Lév. auf Melampyrum arvense am Wege nach Seehof. Chrysomyxa Abietis Ung. auf Picea excelsa auf der Klaushöhe.

Uredo Agrimoniae (DC.) Schroet, auf Agrimonia Eupatoria auf dem Staffelberge.

## Basidiomycetes.

Exobasidium Vaccinii Woron. auf Vaccinium Myrtillus am Staffelberge. Telephora intybacea Pers. auf Erde am Staffelberge.

Clavaria flava Pers. in prächtigen Stöcken zahlreich im Walde bei Klaushof. Cl. grisea Pers. am Staffelberge.

Jrpex obliquus (Schrad.) Fr. auf morschen abgefallenen Ästen von Fagus silvatica am Waldwege zur Saline, im Cascaden-Thale u. a. a. O.

Hydnum cyathiforme Schaeff. in großer Menge in dem Fichtenwalde zwischen Frauenroth und Hausen.

Marasmius Rotula (Scop.) Fr. auf Holz am Staffelberge.

M. perforans (G. Hoffm.) Fr. viel auf abgefallenen Nadeln von Picea excelsa im Walde bei Bocklet.

#### Ascomycetes.

Taphrina Sadebeckii Johans. auf Alnus glutinosa sehr verbreitet.

T. Tosquinetii (Westdp.) Magn. auf Alnus glutinosa bei der Saline u. a. a. O.

T. Betulae Fckl. auf Betula pubescens in der Waldung bei Wald-Aschach.

Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl. auf Ranunculus acer am Staffelberge. Sclerotinia baccarum (Schroet.) Rehm, das Sclerotium auf Vaccinium Myrtillus zwischen Klaushöhe und Wald-Aschach.

Hypoderma macrosporum R. Htg. auf Picea excelsa viel in dem Walde hinter Klaushof.

Rhytisma acerinum Fries. auf Acer platanoides auf dem Altenberge u. a. a. O.; auf Acer campestre bei der Bodenlaube u. a. a. O.

Stigmatea Robertiani Fries. auf Geranium Robertianum am Altenberge.

Mamiania fimbriata (Pers.) Ces. et De Not. auf Carpinus Betulus am Staffelberge u. a. a. O.

Polystigma rubrum (Pers.) DC. auf Prunus domestica sehr verbreitet, namentlich an Hecken.

Claviceps purpurea (Fries) Wint., das Sclerotium auf Phalaris avundinacea bei der Saline.

Dothidella betulina (Fr.) Wint. auf Betula alba am Staffelberge.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Wint. auf Trifolium repens am Altenberge, am Staffelberge u. a. a. O.; auf Trifolium pratense auf der Wiese bei der Saline.

Ph. Podagrariae (Roth) Wint. auf Aegopodium Podagrariae bei Steinach a./S., auf dem Kreuzberge in der Rhön u. a. a. O.

Ph. Angelicae (Fr.) Fckl. auf Angelica silvestris am Wege nach Seehof.

Ph. graminis Nke. auf Triticum repens bei Bad Kissingen; auf Triticum caninum bei der Salzburg bei Neustadt a./S.

Sphaerotheca Castagnei Lév. auf Taraxacum officinale bei Wald-Aschach; auf Centaurea Scabiosa bei Neustadt a./S.; das Oidium auf Sanguisorba minor auf der Bodenlaube.

Microsphaera Astragali (DC.) Wint. auf Astragalus glycyphyllos am Staffelberge.

M. Grossulariae (Wallr.) auf Ribes Grossularia in der Salzburg bei Neustadt a./S.

M. Ehrenbergii Lév. auf Lonicera tatarica in einem Garten in Bad Kissingen. Calocladia Berberidis-Lév. auf Berberis vulgaris viel in Gärten und den Anlagen in Bad Kissingen.

Uncinula Aceris (DC.) auf Acer campestre auf dem Staffelberge und Stufenberge.

Erysiphe tortilis (Wallr.) auf Cornus sanguinea am Fusse des Staffelberges.

Er. Linkii Lév. auf Artemisia vulgaris bei Neustadt a./S.

Er. Martii Lév. auf Heracleum Sphondylium am Fusse des Scheinberges.

Er. Galeopsidis DC. auf Galeopsis Ladanum am Eisenbahndamm bei Neustadt a./S.; das Oidium auf Ballota nigra bei Hausen und bei der Salzburg bei Neustadt a./S.

Er. communis (Wallr.) auf Trifolium pratense am Scheinberge und am Staffelberge; auf Ranunculus acer am Fusse des Scheinberges.

## Sphaeropsideae.

Phyllosticta Impatientis (Kirchn. sub Depazea) P. Magn. auf Impatiens noli tangere auf dem Kreuzberge in der Rhön.

Ph. Tormentillae Sacc. auf Potentilla Tormentilla auf dem Staffelberge.

Ph. cornicola (DC.) Rbh. auf Cornus sanguinea am Weinberge auf dem Staffelberge.

Asteroma obscurum Dsm. auf Cornus sanguinea am Weinberge auf dem Staffelberge.

Cicinnobolus Cesatii de Bary auf Sphaerotheca Castagnei Lév. auf Centaurea Scabiosa bei Neustadt a. S.

Ascochyta Chelidonii Lib. auf Chelidonium majus sehr verbreitet.

A. Orobi Sacc. auf Orobus vernus bei Rupprechtstegen bei Nürnberg.

Septoria scabiosicola Dsm. auf Scabiosa Columbaria auf dem Staffelberge; auf Knautia arvensis häufiger, z. B. auf der Bodenlaube u. a. a. O.

- S. Vincetoxici (Schub.) Auersw. auf Cynanchum Vincetoxicum auf der Bodenlaube.
- S. quercina Dsm. auf Quercus sessiliflora am Scheinberge.
- S. Stachydis Rob. et Dsm. auf Stachys silvatica im Walde bei Klausthal an der Quelle.
  - S. Alismatis Oud. auf Alisma Plantago hinter der Saline.
  - S. curvata (Rbh. et Al. Br.) Sacc. auf Robinia Pseudacacia auf dem Altenberge.
  - S. Xylostei Sacc. et Wint. auf Lonicera Xylosteum auf dem Stufenberge.
- S. cornicola Dsm. auf Cornus sanguinea auf dem Altenberge; auf dem Staffelberge; auf dem Stufenberge häufig.
  - S. Galeopsidis West. auf Galeopsis speciosa auf dem Kreuzberg in der Rhön.
- S. Astragali Dsm. auf Astragalus glycyphyllos am Staffelberge; im Ankathale bei Rupprechtstegen bei Nürnberg.
  - S. Polygonorum Dsm. auf Polygonum Hydropiper in Frauenroth.

Phleospora Ulmi (Fr.) Wallr. auf Ulmus montana in den Kuranlagen von Bad Kissingen; auf Ulmus campestris am Staffelberge.

#### Melanconieae.

Gloeosporium Sanguisorbae Fckl. auf Sanguisorba officinalis auf Wiesen bei Neustadt a. S.

Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc. auf Juglans regia am Staffelberge.

# Hyphomycetes.

Ovularia decipiens Sacc. auf Ranunculus acer auf Wiesen bei Neustadt a. S.

0. Lamii (Fckl.) Sacc. auf Lamium album in den Kuranlagen von Bad Kissingen.

- 0. pusilla (Ung.) Sacc. auf Alchemilla vulgaris auf dem Kreuzberg in der Rhön.
- 0. bulbigera (Fckl.) Sacc. (Scolicotrichum bulbigerum Fckl.) auf Poterium Sanguisorba auf dem Staffelberge.
- 0. Asperifolii Sacc. auf Symphytum officinale häufig auf Wiesen bei Bad Kissingen, z. B. bei der Lindesmühle, am unteren Wege nach der Saline, hinter der Saline u. s. w.
  - 0. sphaeroidea Sacc. auf Lotus corniculatus auf einer Wiese bei Seehof.
- 0. Bistortae (Fckl.) Sacc. auf Polygonum Bistorta auf dem Kreuzberge in der Rhön.
  - 0. obliqua (Cooke) Oud. auf Rumex auf dem Kreuzberge in der Rhön.

Ramularia Winteri Thm. auf Ononis repens auf der Bodenlaube und bei der Salzburg bei Neustadt a. S.

- R. Coleosporii Sacc. auf Campanuia rapunculoides am Staffelberge.
- R. Virgaureae Thm. auf Solidago virga aurea auf dem Staffelberge und dem Stationsberge.
- R. Lampsanae (Desm.) Sacc. auf Lampsana communis am Stationsberge, auf Feldern vor der Bodenlaube, in den Kuranlagen von Bad Kissingen.
  - R. cylindroides Sacc. auf Pulmonaria officinalis auf dem Kreuzberge in der Rhön. Cercosporella n. sp.? auf Geranium silvaticum auf dem Kreuzberge in der Rhön.

Fusicladium pirinum (Lib.) Fckl. auf Blättern und Früchten von Pirus communis in Gärten. Die befallenen Birnen fielen infolge dessen frühzeitig und unreif im August ab und waren klein und hart geblieben.

F. dendriticum (Wallr.) Fckl. var. orbiculatum Dsm. auf Sorbus torminalis am Fußwege nach Seehof.

Cladosporium aecidiicolum Thm. (?) auf Coleosporium Campanulae (Pers.) Wint. auf Campanula rapunculoides am Fusse des Staffelberges.

Cercospora Violae Sacc. auf Viola hirta auf dem Stationsberge.

- C. Impatientis Bäumler auf Impatiens noli tangere auf dem Kreuzberge in der Rhön.
- C. Mercurialis Pass. auf Mercurialis perennis auf dem Staffelberge und dem Kreuzberge in der Rhön.
  - C. ferruginea Fckl. auf Artemisia vulgaris bei der Saline.
  - C. beticola Sacc. auf Beta vulgaris auf Äckern bei Frauenroth.
  - C. Epilobii Schn. auf Epilobium angustifolium auf dem Kreuzberge in der Rhön.

# Anhang

zu dem vorstehenden Verzeichnisse der von Herrn Professor Dr. Paul Magnus in Unterfranken gesammelten Pilze.

Von

#### Andr. Allescher.

Herr Professor Dr. P. Magnus in Berlin hatte die große Freundlichkeit, mir mehrere Pilze, die er in Unterfranken, besonders um Kissingen gesammelt, aber wegen Mangels an Zeit nicht mehr bestimmt hatte, zur Bestimmung zu übersenden.

# **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur</u>

Erforschung der Flora

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: 2-3

Autor(en)/Author(s): Magnus Paul

Artikel/Article: Verzeichnis der vom 11. August bis zum 10. Sept. 1891 bei Bad

Kissingen in Bayern gesammelten, meist parasitischen Pilze 1-6