

Ber. Bayer. Bot. Ges.	54	19–21	1. Dezember 1983	ISSN 0373-7640
-----------------------	----	-------	------------------	----------------

## Zwei neue *Taraxacum*-Arten aus den bayerischen Alpen

Von C. I. Sahlin, Kullavik

Im Zuge der Bearbeitung der *Taraxacum*-Arten der bayerischen Alpen (siehe S. in diesem Bericht) erwies es sich als nötig, zwei Arten neu zu beschreiben, was nachfolgend geschehen soll. Sie gehören beide zu *T. sect. Alpina*.

### *T. obitsiense* Sahlin, species nova

Folia 50–80 mm longa, prasino-viridia, glabra. Lobi laterales 3–6, sat distantes, hamati vel non raro  $\pm$  deltoidei, dorso vulgo dente unico et robusto praediti, in apicem acutum raro  $\pm$  dilatatum et subobtusum sat sensim angustati. Anguli loborum plicati et interlobia nonnumquam dente unico et robusto praedita. Lobus terminalis nunc triangularis sagittatus et saepe lobo apicali contracto nunc magnus et  $\pm$  ovatus. Petiolus alatus, viridis. Scapus 50–60 mm longus, glaber vel nonnumquam sparsim araneosus. Involucrum sat parvum, post anthesin 15 mm altum, prasinoviride. Squamae exteriores 2–2,5  $\times$  4–7 mm, paullo ad medium interiorum adtingentes, erectae – patentes, haud marginatae – immarginatae; interiores saepe leviter callosae. Calathium ca. 30 mm, croceum, sat planum. Ligulae marginales extus stria  $\pm$  pallide canciolacea ornatae; interiores apicibus saepe purpuracentibus. Stigmata sicca virescentia. Antherae sparse polliniferae. Achenuum stramineum, pyramide exclusa 3,4 mm longum, superne breviter squamulosum, in pyramidem 0,4–0,7 mm longam, laete conicam, sensim abiens. Rostrum ca. 6 mm longum. Pappus albus.

Holotypus: Bayern, Berchtesgadener Alpen; Funtenseetauern. August 1974, leg. X. Schmid 74-10, kultiviert im Botanischen Garten München, Kultur-Nr. 399 (M).

### *T. schmidianum* Sahlin, species nova

Folia 70–100 mm longa, sat prasino-viridia, glabra. Lobi laterales vulgo 3,  $\pm$  approximati, deltoidei-triangularis, breves, dorso recto, integro vel parce denticulato, apice sat acuto, patente – leviter reflexo. Lobus terminalis mediocris, triangularis-ovatus, vulgo hastatus, integer, sat obtusus. Petiolus sat late alatus, aequae ac nervus medianus pallide viridis. Scapus ca. 150 mm longus, glaber. Involucrum sat parvum,  $\pm$  obscure olivaceo-viride, ca. 15 mm altum. Squamae exteriores 2–3,5  $\times$  5–6 mm, ad medium interiorum adtingentes vel breviores, laxe adpressae, in apicem  $\pm$  contractae, conspicue sed anguste marginatae, ecallosae. Calathium ca. 35 mm, sat laete luteum, radians. Ligulae marginales extus stria pallide cano-violacea coloratae, interiores apicibus luteis. Stigmata sicca livescentia. Antherae polliniferae. Achenuum innotum.

Chromosomata  $2n = 32$ .

Holotypus: Bayern, Allgäuer Alpen: am Himmeleck, leg. X. Schmid 74-38. Kultiviert im Botanischen Garten München, Kultur-Nr. 412. (M)



Potenledra  
Stachsenordnung  
München



Botanische Staatssammlung München

*Taraxacum*

Bayeren

Allgäuer Alpen, am Himmelstuck

1974 leg. N. Schmidt 74-38

kultiviert im Botan. Garten München, Kultur-Nr. 412, Herbarbeleg vom Juni 1979

412

Blüten und Gattiel gelb  
Ligulae schwach grau gestreift  
Kopfe klein  
Blattstiele und -nerven grün  
Rosetten dicht gedrängt



*Taraxacum schmidianum* Sahlén, Holotypus (M)

Carl Ingemar SAHLIN, Sjöstigen 14, S-43041 Kullavik



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der Flora](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Sahlin Carl Ingemar

Artikel/Article: [Zwei neue Taraxacum-Arten aus den bayerischen Alpen 19-21](#)