

LICHENES EXSICCATI.

(1894—1899)

Nr. 1601—1800.

Von

Dr. F. Arnold.

MÜNCHEN.

Druck von Val. Höfling's Buchdruckerei

1899.

A.

- 10, b. *Lecidea jurana* Schaer.
 297, b. *Imbricaria physodes* L., c. ap.
 328, b. *Scolicosporum corticicolum* Anzi.
 359, c. *Lecidea rhaetica* Hepp.
 431, d. *Callopisma rubellianum* Ach.
 484, b. *Platysma complicatum* Laur.
 490, c. *Gyalolechia aurella* Hoff., Arn.
 510, b. *Buellia Schaereri* De Not.
 528, c. *Nephroma expallidum* Nyl.
 556, b. *Lecidea assimilata* Nyl.
 580, b, c. *Anaptychia ciliaris* L.
 593, b. *Bombyliospora pachycarpa* Duf.
 594, c. *Biatora Cadubriae* Mass.
 604, c. *Sporastatia testudinea* Ach. f. *coracina* Somft.
 617, b. *Lethagrium rupestre* L.
 636, b. *Lopadium pezizoideum* Ach.
 655, c. *Imbricaria excreescens* Arn.
 737, c. *Ramalina thrausta* Ach.
 765, c. *Lopadium pezizoideum* Ach.
 788, d. *Parmelia stellaris* L.
 789, c. *Dimelaena Mougeotii* Nyl.
 793, b. *Lecanora subfusca* L.
 822, d. *Usnea microcarpa* Arn.
 842, c. *Lecidea tenebrosa* Flot.
 848, b. *Lecidea parasema* Ach.
 943, b. *Rhizocarpon viridiatrum* Fl.
 984, b. *Cladonia uncialis* L.
 999, b. *Aspicilia polychroma* Anzi f. *candida* Anzi.
 1005, b. *Lecidea tessellata* Fl. f. *caesia* Anzi.
 1006, b. *Lecidea decorosa* Arn.
 1030, c. *Peltigera polydactyla* Neck.
 1044, b. *Aspicilia morioides* Blomb.
 1134, b. *Lichenes angiocarpi*.
 1145, b. *Ramalina dilacerata* Hoff. f. *pollinariella* Nyl.
 1146, b, c. *Sphaerophorus coralloides* L.
 1151, b. *Imbricaria perlata* L.
 1159, c. *Pleopsidium chlorophanum* Wbg. f. *oxytonum* Ach.
 1211, b. *Cladonia aleicornis* Lghtf.
 1217, b. *Lobaria amplissima* Scop.
 1218, b. *Nephroma arcticum* L.
 1220, b. *Guepinia polyspora* Hepp.
 1405, b. *Arthopyrenia Kelpii* Koerb.
 1483, b. *Stereocaulon coralloides* Fr.
 1521, b. *Callopisma pyraceum* Ach.
 1538, b. *Usnea barbata* L. f. *florida* L. (pl. *substerilis*).
 1552, b. *Aspicilia flavida* Hepp.
 1553, b. *Thelotrema lepadinum* Ach.
 1566, b. *Verrucaria aquatilis* Mudd.
 1566, b. *Arthopyrenia rivulorum* Kernst.
 1580, b. *Blastenia caesiorufa* Ach. f. *corticicola* Anzi.
 1601, a; 1601, c. *Alectoria jubata* L.
 1601, b. *A. jubata* L. pl. *fructifera*.
 1602. *A. jubata* L. pl. *sorediifera*.
 1603. *Ramalina cuspidata* Ach.
 1604. *Stereocaulon alpinum* Laur.
 1605. *Cladonia amaurocraea* Fl. f. *fasciculata* Kernst.
 1606. *C. verticillata* Hoff.
 1607; 1607, b. *C. cyanipes* Somft.
 1608. *Cornicularia divergens* Ach.
 1609. *Cetraria islandica* L. f. *crispa* Ach.
 1610. *Imbricaria prolixa* Ach. *pannariiformis* Nyl.
 1611. *Parmelia speciosa* Wulf.
 1612. *Parmelia endococcina* Koerb.

1613. *Gyrophora esculenta* Miyoshi.
 1614. *Pannaria caeruleobadia* Schl.
 1615. *Physcia cirrhochroa* Ach. thallus leprosus; comp. Arn. exs. 160, c.
 1616. *Placodium melanaspis* Ach.
 1617. *Rinodina polyspora* Th. Fries.
 1618. *Aspicilia laevata* Ach. f. *albicans* Arn.
 1619. *Jonaspis suaveolens* Ach.
 1620. *Biatora Kochiana* Hepp.
 1621. *Biatora turgidula* Fr.
 1622. *Biatora albofuscescens* Nyl.
 1623. *Lecidea subumbonata* Nyl.
 1624, a. *Lecidea incongrua* Nyl.
 1624, b. *Polycoccum* (*Sporastatie* Anzi f.) *incongruae* Arn.
 1625. *Lecidea olivacea* Hoff., *elaeochroma* Ach. Th. Fries.
 1625, c. *Lecanora pallida* Schreb.
 1626. *Catillaria grossa* Pers.
 1627. *Bacidia propinqua* Hepp.
 1628. *Buellia aethalea* Ach.
 1629; 1629, b. *Lecanactis abietina* Ach.
 1629, c: *planta spermogonifera*.
 1630. *Leprantha cinereopruinosa* Schaer.
 1631. *Cyphelium trichiale* Ach. f. *candelare* Schaer.
 1632. *Endocarpon rivulorum* Arn.
 1633. *Thelidium rivulicolum* Nyl.
 1634. *Pyrenula nitida* Weig. f. *aequata* Zahlbr.
 1635. *Thelopsis Isiaca* Stizb.
 1636—1643, icones *Cladoniarum*.
 1644, a. *Cladonia rangiformis* Hoff.
 1644, b. *C. rangiformis* f. *muricata* Del.
 1645. *Roccella phycopsis* Ach.
 1646. *Platysma saepincola* Ehr.
 1647; 1647, b. *Imbricaria saxatilis* L. f. *panniformis* Ach.
 1648. *Parmelia albonigra* Schl.
 1649. *Parmelia obscura* Ehr. f. *virella* Ach.
 1650. *Gyrophora anthracina* Wulf.
 1651. *Gyrophora deusta* L.
 1652. *Blastenia caesiorufa* Ach.
 1653. *Rinodina sophodes* Ach. f. *albana* Mass.
 1654. *Rinodina ramulicola* Kernst.
 1655. *Lecanora conizaea* Ach. f. *variola* Arn.
 1656; 1656, b. *Jonaspis carnosula* Arn.
 1657. *Lecidea distans* Kplh.
 1658. *Lecidea intumescens* Flot.
 1658. *Buellia saxatilis* Sch. f. *insularis* Arn.
 1658. *Lecanora sordida* Pers.
 1659. *Lecidea athroocarpa* Ach.
 1660. *Bilimbia chlorococca* Graewe.
 1661. *Bacidia albescens* Hepp.
 1662. *Rhizocarpon Oederi* Web.
 1663; 1663, b. *Coniangium luridum* Ach.
 1664. *Staurothele nigella* Kplh.
 1665. *Thelidium dominans* Arn.
 1666. *Microthelia Metzleri* Lahm.
 1667, a, b; 1667, c. *Arthopyrenia Kelpii* Koerb.
 1668. *Synechoblastus nigrescens* Huds.
 1669. *Arthopyrenia Gyrophorarum* Arn.
 1669. *Gyrophora cylindrica* L.
 1670. *Phaeospora geographicola* Arn.
 1670. *Rhizocarpon geographicum* L.
 1671. *Endococcus sphinctrinoides* Zw. (forma.)
 1671. *Physcia elegans* Lk.
 1672. *Nectria lecanodes* Cesati.
 1672. *Nephromium resupinatum* L.
 1673. *Arthopyrenia rivulorum* Kernst.
 1673. *Sphaeromphale fissa* Tayl.
 1674—1684: icones *Cladoniarum*.
 1685, a, b. *Usnea longissima* Ach.; (1685, a, cum apoth.)
 1686. *Usnea trichodes* Ach.
 1687. *Alectoria sarmentosa* Ach., c. ap.
 1688. *Chlorea Soleirolii* Duf.
 1689. *Roccella tinctoria* L.
 1690. *Cetraria hiascens* Fr.
 1691, a. *Sticta damaecornis* Ach.
 1691, b. *St. damaecornis* f. *microphylla* Laur.
 1692. *St. dichotoma* Del.
 1693. *Lobaria discolor* Bory.
 1694. *Umbilicaria pustulata* Dill., c. ap.
 1695. *Pannaria rubiginosa* Thunb., *affinis* Dicks.
 1696. *Calloposma viridirufum* Ach.

1697. *Ricasolia Genarii* Bagl.
 1698. *Psoroma fulgens* Sw.
 1699. *Placodium demissum* Flot.
 1700. *Rinodina atrocinerea* Dicks.
 1701. *Lecanora cenisia* Ach.
 1702. *Lecanora flavescens* Bagl.
 1703. *Lecanora albescens* Hoff.
 1704. *Phialopsis ulmi* Sw.
 1705. *Gyalecta cupularis* Ehr.
 1706, a, b. *Biatora lygaea* Ach.
 1707; 1707, b. *Lecidea subumbonata* Nyl.
 1708, a. *Lecidea subumbonata* Nyl.
 1708, b. *Tichothecium pygmaeum* Koerb.
 1709. *Bacidia incompta* Borr.
 1710. *Diplotomma porphyricum* Arn.
 1711, a, b. *Leprantha leucopellaea* Ach.,
Arthonia marmorata Ach.
 1712; 1712, b. *Verrucaria aethiobola* Wbg.
 1713. *Thelidium decipiens* Hepp f. *scrobiculare* Garov.
 1714. *Thelopsis rubella* Nyl.
 1715. *Sagedia leptalea* Dr. Mtg.
 1716. *Collema crispum* Ach.
 1717. *Coenogonium germanicum* Glück.
 1718. *Epicoccum Usneae* Anzi.
 1718. *Usnea barbata* L.
 1719; 1719, b. *Evernia furfuracea* L.
 1720, a, b. *Ramalina farinacea* L.
 1721. *Ramalina Roesleri* Hochst. (icon).
 1722. *Cladonia subcariosa* Nyl.
 1723; 1723, b. *Platysma fallax* Web.
 1724. *Parmelia dubia* Floerke.
 1725; 1725, b. *Gyrophora erosa* Web.
 1726. *Gyrophora proboscidea* L.
 1727. *Sarcogyne latericola* Steiner.
 1728. *Aspicilia verruculosa* Kplh.
 1729; 1729, b. *A. sanguinea* Kplh. f. *subcandida* Arn.
 1730. *Pertusaria inquinata* Ach.
 1731. *P. (Variolaria) ophthalmiza* Nyl.
 1732, a. *Lecidea jurana* Schaer. f. *dispersa* Arn.
 1732, b. *Tichothecium pygmaeum* Kb.
 1733. *Lecidea platycarpa* Ach. f. *steriza* Ach., Anzi m. r. 288.
 1734. *Lecidea viridans* Flot.
 1735. *Biatorella microhaema* Norm.
 1736. *Buellia verruculosa* Borr.
 1737, a. *Rhizocarpon excentricum* Nyl.
 1737, b. *Phaeospora rimosicola* Leight.
 1738. *Rhizocarpon reductum* Th. Fries (pl. *danica*.)
 1739. *Endocarpon aquaticum* Weis, fluviale Web.
 1740. *Arthopyrenia fallax* Nyl. f. *conspurcata* Steiner.
 1741. *Arthopyrenia Cerasi* Schrad.
 1742. *Microthyrium maculans* Zopf.
 1742. *Gyrophora hirsuta* L.
 1743. *Echinothecium reticulatum* Zopf.
 1743. *Imbr. saxatilis* L.
 1744. *Lecidea fuliginosa* Tayl.
 1745. *Physcia pusilla* Mass. (var.)
 1746. *Ramalina tinctoria* Web. polymorpha Ach. f. *capitata* Ach.
 1747, a, b. *Cladonia botrytes* Hag.
 1748. *Siphula ceratites* Wbg.
 1749. *Gyrophora arctica* Ach.
 1750. *Endocarpon miniatum* L. f. *papillosum* Anzi.
 1750, b. *Endoc. miniat.* f. *complicatum* Sw.
 1751. *Gyrophora hyperborea* Ach.
 1752. *Ramalina dilacerata* Hoff., *minuscula* Nyl.
 1752, a. f. *pollinariella* Nyl.
 1752, b. f. *obtusata* Arn.
 1753. *Cladonia pityrea* Fl. 1. *Zwackhii* A. Wainio Clad. 2. p. 354.
 1753, b. *C. pityrea* Fl. f. *hololepis* Fl.
 1754. *Cladonia firma* Nyl.
 1755; 1755, b. *Imbricaria sinuosa* Sm.
 1756. *Imbricaria acetabulum* Neck.
 1757. *Peltidea venosa* L.
 1758; 1758, b; 1758, c. *Sticta aurata* Sm.
 1759. *Stictina silvatica* Huds. f. *microphylla* Kplh.
 1760. *Nephromium laevigatum* Ach. f. *pyraceum* Hoff., Schaer.
 1761. *Rinodina milvina* Wbg.
 1762, a. *Rinodina corticola* Arn.

— 6 —

- | | |
|--|--|
| 1762, b. <i>Rinodina pyrina</i> Ach. | 1781. <i>Rhizocarpon illotum</i> Nyl. |
| 1763. <i>Thalloidima mesenteriforme</i> Vill. | 1782. <i>Physma Mülleri</i> Hepp. |
| 1764. <i>Biatora vernalis</i> L. f. <i>minor</i> Nyl. | 1783. <i>Cornicularia umhausensis</i> Auwd. |
| 1765. <i>Biatora obscurella</i> Somft., <i>phaeostigma</i> Kb. | 1784; 1784, b. <i>Cladonia furcata</i> Huds. f. <i>adpersa</i> Fl. |
| 1766. <i>Lecidea atronivea</i> Arn. | 1785. <i>Gyrophora anthracina</i> Wulf. |
| 1767. <i>Buellia aethalea</i> Ach. | 1786. <i>Pannaria plumbea</i> Lightf. |
| 1768. <i>Placographa tesserata</i> DC. | 1787, a. <i>Rinodina corticola</i> Arn. |
| 1769. <i>Acolium tigillare</i> Ach. | 1787, b. <i>Lecidea parasema</i> Ach. |
| 1770. <i>Thelidium papulare</i> Fr. | 1788. <i>Lecanora atriseda</i> Fr. |
| 1771. <i>Lecidea dispersula</i> Arn. | 1789. <i>Lecanora constans</i> Nyl. |
| 1771. <i>Aspicilia polychroma</i> Anzi f. <i>candida</i> Anzi. | 1790. <i>Pertusaria Variolaria ophthalmiza</i> Nyl. |
| 1772. <i>Rhymbocarpus punctiformis</i> Zopf. | 1791. <i>Pertusaria Variolaria Waghornei</i> Hult. |
| 1772. <i>Rhizocarpon geographicum</i> L. | 1792. <i>Biatora symmictiza</i> Nyl. (forma). |
| 1773. <i>Echinothecium reticulatum</i> Zopf. | 1793. <i>Lecidea jurana</i> Schaer. |
| 1773. <i>Imbricaria conspersa</i> Ehr. | 1794. <i>L. jurana</i> Schaer. f. <i>dispersa</i> Arn. |
| 1774. <i>Gyrophora vellea</i> L. | 1795. <i>Lecidea crustulata</i> Ach. (pl. <i>corticola</i>). |
| 1775. <i>Lecanora argopholis</i> Wbg. | 1796. <i>Bilimbia corisopitensis</i> Picquenard. |
| 1776. <i>Buellia minutula</i> Hepp. | 1797. <i>Thelidium dominans</i> Arn. |
| 1777. <i>Physcia scopularis</i> Nyl. | 1798, a, b. <i>Leptogium sinuatum</i> Huds. |
| 1778. <i>Lecanora expallens</i> Ach., Nyl. | 1799, a, b. <i>Collema multifidum</i> Scop. |
| 1779. <i>Lecidea promixta</i> Nyl. | 1800. <i>Arthopyrenia Kelpii</i> Kb. |
| 1780. <i>Buellia nigerrima</i> Nyl. | 1800. <i>Tornabenia flavicans</i> Sw. |

B.

Usnea Dill.

- | | |
|---|-------------------------------|
| longissima Ach.: 1685, a: c. ap.; 1685, b. | barbata (cum Parasit.): 1718. |
| trichodes Ach.: 1686. | microcarpa Arn.: 822, d. |
| barbata L. florida L. (pl. substerilis): 1538, b. | |

Alectoria Ach.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| sarmentosa Ach.: 1687. | jubata L. cum sorediis: 1602. |
| jubata L.: 1601; 1601, c. | jubata L. c. apoth.: 1601, b. |

Evernia Ach.

- furfuracea L. c. ap.: 1719.
 1719, b: planta Tirol XXVIII, p. 114 memorata.

Chlorea Nyl.

- Soleirolii Duf.: 1688.

— 7 —

Ramalina Ach.

- | | |
|---|--|
| tinctoria Web. (comp. Schaer. En. p. 8,
Arn. fragm. 23 in Flora 1880, p. 567,
fragm. 27 in Flora 1882, p. 408). | Roesleri Hochst.: 1721 (icon). |
| f. capitata Ach. c. apoth.: 1746. | dilacerata Hoff.: minuscule Nyl. |
| cuspidata Ach.: 1603. | f. obtusata Arn.: 1752, b. |
| farinacea L.: 1720, a; 1720, b. | f. pollinariella Nyl.: 1145, b; 1752, a. |
| | thrausta Ach.: 737, c. |

Stereocaulon Schreb.

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| coralloides Fr.: 1483, b. | alpinum Lr.: 1604. |
|---------------------------|--------------------|

Sphaerophorus Pers.

- coralloides Pers.: 1146, b, c.

Cladonia Hill.

- | | |
|---|--|
| uncialis L.: 984, b. | verticillata Hoff.: 1606. |
| amaurocraea Fl. f. fasciculata Kernst.: 1605. | pityrea Fl. 1. Zwackhii A.: Wainio Clad. |
| cyanipes Somft.: 1607; 1607, b. | 2. p. 354: 1753. |
| botrytes Hag.: 1747, a, b. | f. hololepis Fl.: 1753, b. |
| furcata H. f. adspersa Fl.: 1784; 1784, b. | subcariosa Nyl.: 1722. |
| rangiformis Hoff.: 1644, a. | firma Nyl.: 1754. |
| f. muricata Del.: 1644, b. | alcicornis Lghtf.: 1211, b. |

Roccella DC.

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| tinctoria L.: 1689. | phycopsis Ach.: 1645. |
|---------------------|-----------------------|

Siphula Fr.

- ceratites Wbg.: 1748.

Cornicularia Schreb.

- | | |
|-----------------------|--|
| divergens Ach.: 1608. | umhausensis Auwd.: 1783 (Arn. exs. 480). |
|-----------------------|--|

Cetraria Ach.

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| islandica L. f. crispa Ach.: 1609. | hiascens Fr.: 1690. |
|------------------------------------|---------------------|

Platysma Hoff.

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| complicatum Lr.: 484, b. | saepincola Ehr.: 1646. |
| fallax Web.: 1723; 1723, b. | |

Imbricaria Schreb.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| perlata L.: 1151, b. | physodes L.: 297, b (c. apoth.). |
| I. excrescens Arn.: 655, c. (Zopf in
Liebigs Annalen der Chemie, 297. Bd.;
1897, p. 280. | sinuosa Sm.: 1755; 1755, b. |
| saxatilis L.: 1743 (cum Parasit.). | conspersa Ehr.: 1773 (cum Parasit.). |
| panniformis Ach.: 1647; 1647, b. | acetabulum Neck.: 1756. |
| | prolixa Ach.: 72 (cum Parasit.). |
| | pannariiformis Nyl.: 1610. |

Anaptychia Kb.

- ciliaris L.: 580, b; 580, c.

Parmelia Ach.

- | | |
|-------------------------------|---|
| <i>speciosa</i> Wulf.: 1611. | <i>dubia</i> Fl.: 1724. |
| <i>stellaris</i> L.: 788, d. | <i>endococcina</i> Kb.: 1612. |
| <i>albonigra</i> Schl.: 1648. | <i>obscura</i> Ehr. f. <i>virella</i> Ach.: 1649. |

Sticta Schreb.

- | | |
|--|------------------------------|
| <i>aurata</i> Sm.: 1758; 1758, b; 1758, c. | <i>dichotoma</i> Del.: 1692. |
| <i>damaecornis</i> Ach.: 1691, a. | |
| f. <i>microphylla</i> Laur.: 1691, b. | |

Stictina Nyl.

- silvatica* L. f. *microphylla* Kplh. Lich. Bay.
p. 129: 1759.

Lobaria Schreb.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <i>amplissima</i> Scop.: 1217, b. | <i>discolor</i> Bory: 1693. |
|-----------------------------------|-----------------------------|

Nephroma Ach.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| <i>arcticum</i> L.: 1218, b. | <i>expallidum</i> Nyl.: 528, c. |
|------------------------------|---------------------------------|

Nephromium Nyl.

- laevigatum* Ach. f. *papyraceum* Hoff.: 1760. | *resupinatum* L.: 1672 (cum Parasit.).

Peltidea Ach.

- venosa* L.: 1757.

Peltigera Willd.

- polydactyla* Neck.: 1030, c.

Pannaria Del.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| <i>Coccocarpia plumbea</i> Lightf.: 1786. | <i>caeruleobadia</i> Schl.; 1614. |
| <i>rubiginosa</i> Thunb., <i>affinis</i> Dicks.: 1695. | |

Guepinia Hepp.

- polyspora* Hepp: 1220, b.

Umbilicaria Hoff.

- pustulata* L. (c. apoth.): 1694.

Gyrophora Ach.

- | | |
|--|--|
| <i>vellea</i> L.: 1774. | <i>deusta</i> L.: 1651. |
| <i>hirsuta</i> L.: 1742 (cum Parasit.). | <i>hyperborea</i> Ach.: 1751. |
| <i>esculenta</i> Miyoshi: 1613. | <i>arctica</i> Ach.: 1749. |
| <i>anthracina</i> Wulf.: 1650; 1785 (c. apoth.). | <i>erosa</i> Web.: 1725; 1725, b. |
| <i>proboscidea</i> L.: 1726. | <i>cylindrica</i> L.: 1669 (cum Parasit.). |

Tornabenia Mass.

- flavicans* Sw.: 1800.

Physcia Fr.

- | | |
|--|--|
| <i>elegans</i> Lk.: 1671 (cum Parasit.). | <i>cirrhochroa</i> Ach.: 1615 (thallus lignicolus, |
| <i>scopularis</i> Nyl.: 1777. | leprosus; comp. Arn. 160, c. |
| <i>pusilla</i> Mass.: 1745 (forma; planta palli- | |
| deflava, lobi sat rari, perminuti, apo- | |
| thecia rara, minuta, sporae 0,012 n. n. | |
| lg., 0,003 n. n. lat.). | |

Callopisma De Not.

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <i>rubellianum</i> Ach.: 431, d. | <i>pyraceum</i> Ach.: 1521, b. |
| <i>viridirufum</i> Ach.: 1696. | |

Gyalolechia Mass.

- aurella*
- Hoff., Arn.: 490, c.

Blastenia Mass.

- caesiorufa*
- Ach.: 1652.

- f.
- corticicola*
- Anzi: 1580, b.

Ricasolia Mass.

- Gennarii*
- Bagl.: 1697.

Psoroma Ach.

- fulgens*
- Sw.: 1698.

Placodium Hill.

- melanaspis*
- Ach.: 1616.

- |
- demissum*
- Flot.: 1699.

Pleopsidium Kb.

- chlorophanum*
- W. f.
- oxytonum*
- Ach.: 1159, c.

Sarcogyne Flot.

- latericola*
- Steiner: 1727.

Dimelaena Norm.

- Mougeotioides*
- Nyl.: 789, c.

Rinodina Ach.

- atrocinerea*
- Dicks.: 1700.

- |
- pyrina*
- Ach.: 1762, b.

- sophodes*
- Ach. f.
- albana*
- Mass.: 1653.

- |
- corticola*
- Arn.: 1762, a; 1787, a.

- milvina*
- Wbg.: 1761.

- |
- polyspora*
- Th. Fr.: 1617.

- ramulicola*
- Kernst.: 1654.

Lecanora Ach.

- subfusca*
- L.: 793, b.

- |
- sordida*
- Pers.: 1658 (cum Parasit.).

- cenisia*
- Ach.: 1701.

- |
- pallida*
- Schreb.: 1625, c.

- constans*
- Nyl.: 1789.

- |
- flavescens*
- Bagl.: 1702.

- atriseda*
- Fr.: 1788 (comp. Stein siles. 1879

- |
- albescens*
- Hoff.: 1703.

- p. 136, Arn. fragm. 36 p. 11).

- |
- expallens*
- Ach., Nyl.: 1778.

- argopholis*
- Wbg. (1803),
- thiodes*
- Spreng.

- |
- conizaea*
- Ach. f.
- variola*
- Arn.: 1655.

- (1821): 1775 (comp. Arn. exs. 1162).

Aspicilia Mass.

- polychroma*
- Anzi f.
- candida*
- Anzi: 999, b; |
- sanguinea*
- Kplh. f.
- subcandida*
- Arn.: 1729;

- 1771 cum Parasit.

- 1729, b.

- laevata*
- Ach. f.
- albicans*
- Arn.: 1618.

- |
- morioides*
- Blomb.: 1044, b.

- verruculosa*
- Kplhbr.: 1728.

- |
- flavida*
- Hepp: 1552, b.

— 10 —

- Jonaspis* Th. Fries.
carnosula Arn.: 1656; 1656, b. | *suaveolens* Ach.: 1619.
Gyalecta Ach.
cupularis Ehr.: 1705.
Thelotrema Ach.
lepadinum Ach.: 1553, b.
Phialopsis K b.
ulmi Sw.: 1704.
Pertusaria DC.
inquinata Ach.: 1730.
Variolaria Ach.
ophthalmiza Nyl.: 1731; 1790. | *Waghernei* Hult.: 1791.
Thalloidima Mass.
mesenteriforme Vill.: 1763.
Lopadium K b.
pezizoideum Ach. disciforme Flot.: 636, b;
 765, c.
Bombyliospora De Not.
pachycarpa Duf.: 593, b.
Biatora Fr.
vernalis L. f. minor Nyl.: 1764. | *Kochiana* Hepp: 1620.
Cadubriae Mass.: 594, c. | *lygaea* Ach.: 1706 a; 1706, b.
obscura Somft., *phaeostigma* Koerb.: | *turgidula* Fr.: 1621.
 1765. | *albofuscens* Nyl.: 1622.
symmictiza Nyl. (forma): 1792 (comp. |
 Wainio Adj. 2 p. 47).
Lecidea Ach.
athrocarpa Ach.: 1659. | *promixta* Nyl.: 1779.
tenebrosa Flot.: 842, c. | *jurana* Schaer.: 10, b; 1793.
intumescens Flot.: 1658. | f. *dispersa* Arn.: 1732, a (cum Parasit.);
 1794.
fuliginosa Tayl.: 1744. | *platycarpa* Ach. f. *steriza* Ach., Anzi: 1733.
tessellata Fl. f. *caesia* Anzi: 1005, b. | *crustulata* Ach. (pl. corticola): 1795.
distans Kplh.: 1657. | *incongrua* Nyl.: 1624, a (cum Parasit.).
subumbonata Nyl.: 1623; 1707; 1707 b; | *parasema* Ach.: 848, b; 1787, b.
 1708, a (cum Parasit.). | *olivacea* Hoff.: 1625 (a, b).
decorosa Arn.: 1006, b. | *viridans* Flot.: 1734.
rhaetica Hepp: 359, c. | *assimilata* Nyl.: 556, b.
atronivea Arn.: 1766.
Catillaria Mass.
grossa Pers.: 1626.
Bilimbia De Not.
chlorococca Graewe: 1660. | *Nitschkeana* Lahm: 503, c, d.
corisopitensis Picq.: 1796.
Bacidia De Not.
propinqua Hepp: 1627. | *incompta* Borr.: 1709.
albescens Hepp: 1661.

— 11 —

Scoliciosporum Mass.

corticolum Anzi: 328, b.

Biatorella De Not.

microhaema Norm.: 1735.

Sporastatia Mass.

testudinea Ach. f. coracina Smft.: 604, c.

Buellia De Not.

aethalea Ach.: 1628; 1767.

verruculosa Borr.: 1736.

minutula Hepp: 1776.

nigerrima Nyl.: 1780.

Schaereri De Not.: 510, b.

saxatilis Schaer. f. insularis Arn.: 1658.

Diplotomma Flot.

porphyricum Arn.: 1710.

Rhizocarpon Ram.

geographicum L., cum Parasit.: 1670;
1772.

viridiatrum Fl.: 943, b.

excentricum Ach.: 1737 a (cum Parasit.).

illotum Nyl.: 1781.

reductum Th. Fries (pl. danica): 1738.

Oederi Web.: 1662.

Lecanactis Eschw.

labietina Ach.: 1629; 1629, b

cum spermog.: 1629, c.

Leprantha Duf.

eucopellaea Ach., Arthonia
Ach.: 1711 a, b.

marmorata | cinereopruinosa Schaer.: 1630.

Coniangium Fr.

luridum Ach.: 1663; 1663, b.

Placographa Th. Fr.

tesserata DC.: 1768.

Acolium Ach.

tigillare Ach.: 1769.

Cyphelium Ach.

trichiale Ach. f. candelare Schaer.: 1631.

Endocarpon Hedw.

miniatum L. f. complicatum Sw.: 1750, b.
papillosum Anzi: 1750.

aquaticum Weis, fluviatile Web.: 1739.

rivulorum Arn.: 1632.

Sphaeromphale Rehb.

fissa Tayl.: 1673 (cum Parasit.).

Verrucaria Wigg.

aethiobola Wbg.: 1712; 1712, b.

aquatilis Mudd: 1566, b (cum Parasit.).

Thelidium Mass.

papulare Fr.: 1770.

dominans Arn.: 1665; 1797.

decipiens Hepp f. scrobiculare Garov.: 1713.

rivulicolum Nyl.: 1633.

— 12 —

- Staurothele* Norm.
nigella Kplh.: 1664.
- Microthelia* Kb.
Metzleri Lahm: 1666.
- Pyrenula* Ach.
nitida Weig. f. *aequata* Zahlbr.: 1634.
- Thelopsis* Nyl.
Isiaca Stizb.: 1635, (Nyl. Lich. Paris. | *rubella* Nyl.: 1714.
1896 p. 124).
- Arthopyrenia* Mass.
fallax Nyl. f. *conspurcata* Steiner: 1740. | *Kelpii* Kb.: 1405, b; 1667, a, b; 1667, c:
Cerasi Schrad.: 1741. | 1800.
- Sagedia* Ach.
leptalea Dr. Mtg.: 1715.
- Lichenes angiocarpi*.
1134, b (*Thelidium decipiens* Hepp, Poly-
blastia cupularis (Mass.) Arn. f. mi-
crocarpa Arn.; rarius *Staurothele*
rupifraga Mass. et aliae species).
- Synechoblastus* Trev.
nigrescens Huds.: 1668.
- Lethagrium* Ach.
rupestre L.: 617, b.
- Collema* Hill.
multifidum Scop.: 1799, a; 1799, b. | *crispum* Ach.: 1716.
- Leptogium* Ach.
sinuatum Huds.: 1798; 1798, b.
- Physma* Mass.
Mülleri Hepp: 1782.
- Coenogonium* Ehrbg.
germanicum Glück: 1717 (sec. Nylander
in lit. est *Racodium rupestre* Pers.).
-
- Lecidea* Ach.
(intumescens Flot.: 1658). | *dispersula* Arn.: 1771.
- Buellia* De Not.
saxatilis Sch. f. *insularis* Arn.: 1658.
- Rhymbocarpus* Zopf.
punctiformis Zopf: 1772.

— 13 —

Nectria Fr.

lecanodes Ces.: 1672.

Arthopyrenia Mass.

rivulorum Kernst.: 1566; 1673.

| Gyrophorarum Arn.: 1669.

Microthyrium Zopf.

maculans Zopf: 1742.

Endococcus Nyl.

sphinctrinoides Zw. (forma): 1671.

Tichothecium Flot.

pygmaeum Kb.: 1708, b; 1732, b.

Polycoccum Saut.

Sporastatae Anzi f. incongruae Arn.:

1624, b.

Phaeospora Hepp.

rimosicola Leight.: 1737, b.

| geographicola Arn.: 1670.

Echinothecium Zopf.

reticulatum Zopf: 1743; 1773.

Epicoccum Anzi.

Usneae Anzi: 1718.

C.

1. Baglietto:

580, c. 1648. 1689.

594, c. 1650. 1697.

604, c. 1651. 1702.

1644, a, b. 1666 1720, b.

1645. 1688.

2. Baumgartner:

431, d. 1652. 1750.

789, c. 1694. 1763.

1159, c. 1696. 1775.

1220, b. 1746. 1776.

3. Baur:

528, c. 1747, a, b. 1751, b.

1218, b. 1748. 1785.

1725, b. 1749.

4. Billing: 1716.

5. Boll: 1663. 1797.

6. Branth: 1738.

7. Britzelmayr: 1795. 1798, b.

8. Canepa:

580, c. 1688. 1702.

1644, a. 1697. 1720, b.

9. Carestia: 594, c. 604, c. 1648. 1650. 1666.

10. Delamare: 1145, b.

11. Fünfstück: 297, b. 1723, b.

12. Gennari: 1689.

13. Glück: 1717.

14. Gmelch: 1703.

15. Gujonvare'h: 1758, b.

16. Hellbom: 1608. 1628. 1690. 1756. 1786.

17. Hue: 1686. 1692. 1693.

18. In de Betou: 1690.

- | | | | |
|--|---|-------|-------------|
| 19. Johansson: 1628. | 33. Schnabl: | | |
| 20. Kernstock: 1605, 1654, 1662. | 1611. | 1653. | 1719. |
| 21. Lederer: 1700. | 1614. | 1656. | 1731. |
| 22. Loesch: | 1622. | 1660. | 1745. |
| 617, b. 1687. | 1723. | 1626. | 1664. |
| 636, b. 1698. | 1744. | 1627. | 1695. |
| 943, b. 1699. | 1782. | 1629. | 1709. |
| 1146, c. 1720, a. | | 1630. | 1711, a, b. |
| 23. Lojka: 1151, b. | | 1633. | 1715. |
| 24. Lukasch: 1722. | | | 1791. |
| 25. Marcucci: 1645. | | | 1792. |
| 26. Miyoshi: 1613. | 34. Sickenberger: 1635. | | |
| 27. Neugschwenter: | 35. Steiner: 793, b, 1615, 1617, 1727, | | |
| 999, b. 1707 | 1740. | | |
| 1005, b. 1707, b. | 1729, b. | | |
| 1006, b. 1708, a, b. | 1794. | | |
| 28. Picquenard: 1758, 1758, c; 1796; 1800. | 36. Stizenberger: 1635. | | |
| 29. Rieber: 1719, b, 1721, 1724, 1767. | 37. Swensson: 1786. | | |
| 30. Rodriguez: 1686, 1692. | 38. Viaud Grand Marais: 1603, 1754, | | |
| 31. Ruess: 1745. | 1758. | | |
| 32. Sandstede: | 39. Vill: 1217, b. | | |
| 328, b. 1667, a, b c. | 1779. | | |
| 1211, b. 1712, b. | 1780. | | |
| 1405, b. 1753. | 1781. | | |
| 1629, b, c. 1753, b. | 1784. | | |
| 1646. 1777. | 1784, b. | | |
| 1661. 1778. | 1800. | | |
| | 40. Zahlbruckner: 1634; 1691, a, b, 1704, | | |
| | 1714. | | |
| | 41. Zopf: | | |
| | 737, c. 1616. | 1739. | |
| | 1601. 1725. | 1742. | |
| | 1609. 1726. | 1774. | |

D.

- | | | | |
|--|---|-------|-------|
| 1. Fränkischer Jura: 10, b, 1030, c, | 1732, a. | 1759. | 1789. |
| 1663, b, 1757, 1769. | 1732, b. | 1760. | 1791. |
| 2. Allgäu (Britzelmayr, Ruess, Schnabl): | 1755, b. | 1765. | 1792. |
| 1719; 1745; 1768; 1798, b. | | | |
| 3. Bayerische Alpen (Arnold, Schnabl): | 4. Oberbayerische Hochebene (Arnold, | | |
| 379. 1629. | Schnabl): 665, c; 1715. | | |
| 593, b. 1630. | | | |
| 1553, b. 1633. | 5. München (Arnold, Gmelch, Schnabl): | | |
| 1611. 1653. | 490, c. 1566, b. 1655. | 1703. | |
| 1614. 1656. | 984, b. 1606. | 1660. | |
| 1622. 1656, b. | | | |
| 1626. 1664. | 6. Augsburg (Britzelmayr): 1795. | | |
| 1627. 1685, a. | 7. Andere bayerische Gegenden (Lederer, | | |
| | Vill): 1217, b; 1700. | | |

8. Baden (Fünfstück, Lösch):
 297, b. 1146, c. 1720, a.
 617, b. 1687. 1723.
 636, b. 1698. 1723, b.
 943, b. 1699. 1744.
 1782.
9. Württemberg (Rieber): 1721 (icon);
 1724.
10. Oldenburg (Sandstede):
 328, b. 1667, a, b. 1779.
 1211, b. 1667, c. 1780.
 1405, b. 1712, b. 1781.
 1629, b. 1753. 1784.
 1629, c. 1753, b. 1784, b.
 1646. 1777. 1800.
 1661. 1778.
11. Andere deutsche Gegenden (Billing,
 Glück, Zopf).
 1609. 1725. 1742.
 1716. 1726. 1774.
 1717. 1739.
12. Oesterreich. Tirol (Arnold, Boll, Kern-
 stock, Neugschwenter, Rieber, Schnabl,
 Zopf):
 359, c. 1134, b. 1623. 1672.
 484, b. 1146, b. 1624, a. 1673.
 510, b. 1183, b. 1624, b. 1701.
 556, b. 1521, b. 1625. 1706, a.
 580, b. 1538, b. 1631. 1706, b.
 737, c. 1552, b. 1632. 1707.
 765, c. 1580, b. 1647. 1707, b.
 788, d. 1601, a, b, c. 1647, b. 1708, a.
 822, d. 1602. 1649. 1708, b.
 842, c. 1604. 1654. 1710.
 848, b. 1605. 1657. 1712.
 999, b. 1607. 1658. 1718.
 1005, b. 1607, b. 1659. 1719, b.
 1006, b. 1610. 1662. 1728.
 1044, b. 1612. 1663. 1729.
 [1082 est 1616. 1665. 1729, b.
 planta 1618. 1668. 1730.
 hunga- 1619. 1669. 1733.
 rica, non 1620. 1670. 1734.
 tirolensis]. 1621. 1671. 1735.
1736. 1755. 1770. 1788.
 1737, a. 1761. 1771. 1790.
 1737, b. 1762, a. 1772. 1793.
 1741. 1762, b. 1773. 1794.
 1743. 1764. 1783. 1797.
 1750, b. 1766. 1787, a. 1798, a.
 1752. 1767. 1787, b. 1799, a, b.
13. Klagenfurt (Steiner).
14. Niederösterreich (Baumgartner).
15. Andere österreichische Gegenden
 (Lojka, Lukasch, Zahlbruckner):
 1151, b. 1704. 1722.
 1634. 1714.
16. Frankreich (Gujonvare'h, Picquenard,
 Viaud):
 1603. 1758, a. 1758, c.
 1754. 1758, b. 1796.
 1800.
17. Italien (Baglietto, Canepa, Carestia,
 Gennari, Marcucci):
 580, c. 1645. 1688.
 594, c. 1648. 1689.
 604, c. 1650. 1697.
 1644, a. 1651. 1702.
 1644, b. 1666. 1720, b.
18. Schweden, Norwegen, russisches Lapp-
 land (Baur, Hellbom, In de Betou,
 Johansson, Swensson):
 528, c. 1725, b. 1751, b.
 1218, b. 1747, a. 1756.
 1608. 1747, b. 1785.
 1628. 1748. 1786.
 1690. 1749.
19. Dänemark (Branth): 1738.
20. Aegypten (Sickenberger, Stizen-
 berger): 1635.
21. Miquelon (Delamare: 1145, b).
22. Mauritius, Bourbon, Madagascar (Hue,
 Rodriguez, Zahlbruckner):
 1686. 1692.
 1691, a. 1693.
 1691, b.
23. Japan (Miyoshi): 1613.

E.

Zusammenstellung der Zahl der Exemplare: I. (1894), II. (1899).

Deutsches Reich.			Summe.
Bayern.			
Fränkischer Jura:	I. 520.	II. 5.	525.
Keuper:	I. 38.		38.
Hochebene nördlich der Alpen, München, Augsburg:	I. 76.	II. 10.	86.
Bayerische Alpen, Allgäu:	I. 102.	II. 35.	137.
Andere bayerische Gegenden:	I. 4.	II. 2.	6.
	(Bayern: 792).		
Baden, Heidelberg:	I. 29.	II. 13.	42.
Württemberg:	I. 18.	II. 2.	20.
Westfalen:	I. 43.		43.
Nordwestliches Deutschland, Oldenburg:	I. 47.	II. 17.	64.
Andere deutsche Gegenden:	I. 23.	II. 8.	31.

(200)

(Deutsches Reich: 992).

Oesterreich.			
Tirol:	I. 697.	II. 100.	797.
Andere österreichische Länder:	I. 89.	II. 22.	111.

(Oesterreich: 908).

Schweiz:	I. 25.		25.
Frankreich:	I. 44.	II. 7.	51.
Italien:	I. 5.	II. 15.	20.
Corfu:	I. 2.		2.
England:	I. 4.		4.
Schweden, Norwegen, Insel Gotland, russisches Lappland:	I. 34.	II. 14.	48.
Dänemark:	I. 4.	II. 1.	5.

(155).

Afrika, Algier, Aegypten:	I. 13.	II. 1.	14.
America, Bourbon, Mauritius, Neuseeland, Japan:	I. 36.	II. 7.	43.

(Exoten: 57).

Gesamtsumme der Exemplare:

Deutsches Reich:	992.
Oesterreich:	908.
Andere Länder in Europa:	155.
Exoten:	57.

2112 Exemplare.

Hiezu kommen 159 Nummern Cladonien-Abbildungen:

I. 1263—1356,	II. 1636—1643,
1412—1431,	1674—1684,
1450—1463,	
1484—1496,	

auf 145 Lichtdrucktafeln.

F.

Ein Verzeichniss der Besitzer der *Lichenes exsiccati* ist in der Flora 1882 nr. 11 p. 175 enthalten. Gegenwärtig, im Herbst 1899, sind die Empfänger: 1. Medicinalrath Dr. Rehm in München; 2. G. Schnabl in München; 3. k. botanische Gesellschaft in Regensburg; 4. k. Kreisschulrath Dr. Britzelmayr in Augsburg; 5. v. Zwackh, k. Rittmeister à la suite in Heidelberg; 6. Universität Heidelberg; 7. Apotheker Leiner in Konstanz; 8. k. Naturalienkabinet in Stuttgart; 9. Professor Dr. Fünfstück in Stuttgart; 10. Professor Dr. Rieber in Ehingen; 11. Universität Strassburg; 12. Senckenbergisches Museum in Frankfurt am Main; 13. Dr. Minks, Arzt in Stettin; 14. Universität Berlin; 15. Buchhändler Friedländer in Berlin; 16. Universität Göttingen; 17. H. Sandstedt in Zwischenahn; 18. Universität Kiel; 19. Universität Wien; 20. k. k. Hofmuseum, botanische Abtheilung, in Wien; 21. k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien; 22. Dr. Steiner, k. k. Gymnasialprofessor in Wien; 23. k. k. Staatsgymnasium in Salzburg; 24. P. P. Strasser, Kapitulär und Pfarrverweser in Sonntagsberg; 25. Ferdinandeum in Innsbruck; 26. E. Kernstock, Professor an der k. k. Realschule in Klagenfurt; 27. Dr. Hegetschweiler, Arzt in Riffersweil; 28. Herbarium E. Boissier-Barbey in Genf; 29. Universität Zürich (früher Dr. Stizenberger); 30. Professor Dr. Baglietto in Genua; 31. Museum im Jardin des Plantes in Paris; 32. Abbé Hue in Paris; 33. Dr. Viaud Grand Marais, Professor in Nantes; 34. Abbé Harmand, Professor in La Malgrange bei Nancy; 35. 36. Royal Herbarium in Kew bei London; 37. Professor Dr. Darbishire in Manchester; 38. k. Nationalmuseum in Stockholm; 39. Professor Dr. Th. Fries in Upsala; 40. Adjunkt Hellbom in Örebro; 41. Dr. D. Branth, Pfarrer in Snepdrup bei Skanderborg in Dänemark; 42. Universität Helsingfors; 43. Universität Helsingfors (früher Dr. W. Nylander); 44. Dr. E. Wainio in Helsingfors; 45. Harvard Universität in Cambridge, Massachussetts. — (Mehrere Jahre hindurch wurden die Lich. exsic. an Professor Bodberski in Tarnopol und an Ingenieur C. Flagey in Constantine gesendet.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der Flora](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [7_1](#)

Autor(en)/Author(s): Arnold F.

Artikel/Article: [Lichenes Exsiccati \(1804-1809\) Nr. 1601-1800 1-17](#)