

Ein neuer amerikanischer Skorpion.

Von *Dr. F. Karsch.*

Herr Geheimrath Paasch hatte die Freundlichkeit, dem Berliner Museum zwei für dasselbe neue Skorpione zu überlassen, von denen einer sich als noch unbeschrieben erwiesen hat. Der bereits bekannte ist *Centrurus elegans* Thorell, von Batavia, zu dessen von Thorell gegebener sehr ausführlicher Beschreibung nur zu bemerken ist, dass, obwohl dem Wortlaute nach seinem ersten Caudalsegmente nur 8 Längskiele zukommen, doch deren 10 vorhanden sind, wie bei den übrigen Arten dieser grossen Gattung. Die andere Art ist ein *Hadrurus* Thorell und liegt in einem Exemplare vor.

Hadrurus Paaschi, nov. sp., long. trunc. 24, caudae 44 mm. *Cephalothorax antice subtruncatus, fronte laevi, lateribus dorsoque pone oculos crasse granulatus, segmenta abdominalia antice laevia, postice dense granulosa, segmentum septimum crasse granulatum, granulis in series ordinatis, segmenta caudae 1 m.—4 m. carinis dorsualibus crasse granulosis, segmenta 1 m.—4 m. lateralibus superioribus, segmentum primum laterali media perfecta insuper, in segmentis 2^o et 3^o antice valde abbreviatis, granulosis, segmenta 1 m.—5 m. carinis lateralibus inferioribus haud, segmentum quartum crassius, quintum crasse granulosis, segmenta 1 m.—4 m. subtus laevia, segmentum quintum subtus sparse granulatum, carina media singula ordinaria crasse granulosa, vesica valde incrassata, basi supra procursu magno utrinque munita, manus valde incrassata, supra sublaevis, intus carina granulosa in digitum immobilem transiente, subtus carinis binis, basi appropinquantibus granulosis munitus, extus bicostatus, digitus mobilis manu postica triplo longior, digiti spatium S-formem inter se clausi relinquunt. Dentes pectinum 20. Color testaceus carinis caudalibus fuscis, digitis infuscatis, segmenta abdominalia supra medio longitudinaliter infuscata, 3 m.—6 m. basi maculis binis albidis ornata, pedibus flavis.*

Die durch die sehr dicken Hände der Palpen auffallende Art steht dem *Hadrurus charcasus* Karsch von Bolivia sehr nahe, unterscheidet sich aber von diesem hauptsächlich durch den breiten Zwischenraum, welchen die geschlossenen Finger der Hand zwischen sich lassen, die starken Hände und das geschwollene Endglied des Schwanzes, sowie durch stärkere Behaarung der Gliedmassen und des Schwanztheils; auch ist bei ihm der vordere Rand des Cephalothorax mehr abgerundet als der Quere nach abgeschnitten; seine Färbung ist überdies bleicher gelb, aber die gelblichen Rückenflecken an der Basis des dritten bis sechsten Hinterleibssegmentes hat er mit *H. charcasus* gemeinsam.

Das einzige Stück stammt von Ecuador.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Karsch Ferdinand Anton Franz

Artikel/Article: [Ein neuer amerikanischer Skorpion. 290](#)