

Neun neue Coleopteren von Colombo (Ceylon).

Von

Dr. F. Karsch.

1. *Serica bombycina*. Rufo-testacea, capite, pronoto, pedibus nitidis, elytris pallidioribus, opacis, sericeis, singulo striis novem signato, supra et subtus grossius punctato, prothorace macula transversa infuscata irregulari, punctoque laterali nigro ornato. Long. 6,5 mm.

Sie liegt in mehreren Stücken vor und zeigt grosse Aehnlichkeit mit der von Burmeister beschriebenen *Serica pallida*; doch entbehrt sie der starken Bewimperung am Rande des Pronotum und der Flügeldecken.

2. *Rhinoplia discors*. Rubro-testacea, nitida, capite, humeris, elytrorum margine, sutura nigris, pronoto maculis duabus subtriangularibus mediis nigris punctoque nigro utrinque laterali ornato; femoribus anticis bidentatis. Grossius punctata, elytris punctato striatis, stria suturali secunda postice abbreviata, stria septima cum nona postice conjuncta, interstitio posthumerali elevato. Long. 10—11 mm.

Eine durch die grossen schwarzen dreieckigen Flecke auf dem Rückenschild und die Zweizähnigkeit der Vorderschienen leicht kenntliche Art.

3. *Strongylium latericostatum*. Elongatum, subcylindricum, paullo depressum, dilutius fusco-brunneum, subopacum, antennis longioribus, pronoto basi longitudine latiore, supra longitudinaliter subsulcato, lateribus convexis, punctato-rugoso; elytris crenatim punctato-striatis, stria suturali postice abbreviata, interstitio quinto, septimo acute, interstitis sexto, octavo minus acute carinatis. Long. 15—16 mm.

4. *Episomus figuratus*. Griseus, coxis pedum quatuor posteriorum basi fuscis, elytris macula submedia laterali maculaque dorsali pone medium flava, prothorace angusto, canaliculato, transversim rugoso, elytris ovatis, valde convexis, compressis, apice caudulato-productis, profunde remote sulcato-punctatis, antennarum clava nigra. Long. ca. 20 mm.

Die Art variirt in hellerer und dunklerer grauer Grundfarbe. Sie scheint dem *E. pauperatus* am nächsten zu stehen, unterscheidet sich aber von ihm durch den fast schuppenlosen Leib und die zwei kleinen gelben Fleckchen jeder Flügeldecke, deren innerer (vorderer) im zweiten, deren äusserer (hinterer) im sechsten gewölbten Zwischenraum der Flügeldeckenfurchen gelegen ist.

5. *Desmidophorus caelatus*. *Niger, nitidus, squamis griseis albidisque tectus, rostro longiore rugoso-punctato, nudo, fronte flavo-squamoso, prothorace scabro, squamis albidis tecto, elytris valde convexis, squamis griseis tectis, vitta communi transversa arcuata media, vittaque praecipicali transversa suturam versus interrupta, singulo striis novem tigillis transversis nigris nitidis scalas quasi angustas formantibus instructo tuberculisque fasciculatis septem munito, suturali paullo pone scutellum trinisque in interstitio secundo quartoque; pedibus albido-squamosis, tibiis anticis apice nigropilosis, femoribus subtus dente nigro armatis*. Long. ca. 10,5 mm.

Diese in mehreren vorliegenden Stücken ganz übereinstimmende Art schwankt nur in der Grösse, die zwischen 7 und 13 mm. variirt.

6. *Tropi(do)deres verrucosus*. *Brunneo-fuscus, impresso-punctatus, prothorace maculis rubro-brunneo pubescentibus ornato, elytris parte declivi macula lata communi transversa albida signatis, vix striatis, verrucoso-tuberculatis, tuberculis singulo in series quatuor ordinatis, prope suturam tubercula tria, apicem elytrorum versus decrescentia, deinde marginem versus quatuor, quatuor, tres, apicem elytrorum versus magnitudine crescentia; pedibus fuscis, albido pilosis, tibiis albido-annulatis*. Long. 7—8mm.

7. *Cyrtotriplax colombonica*. *Oblongo-ovata, rufescente fusca, nitida, scutello, elytris nigris, his fortius seriatim punctatis, singulo seriebus septem tantum munitis, interstitiis convexis, subtiliter punctatis, capite thoraceque parce punctatis, hoc transverso, basi utrinque sinuato, lateribus marginatis, abdomine evidenter punctato*. Long. ca 5 mm.

Sie scheint mit dem *Cyrtotriplax* (?) *postica* Crotch zunächst verwandt, aber die Flügeldecken ermangeln der rothen Apicalmakel.

8. *Mesosa rosa*. *Pallide rubro-brunnea, prothorace disco maculis punctiformibus quatuor plagaque laterali longitudinali*

nigris, elytris maculis tribus communibus, suturalibus, nigris, interstitiis albidis separatis, primo elytrorum medio, secundo pone medium, tertio praeapicali, singulo albido nigroque variegato, interdum vitta lata undulata mediana transversa albida, plus minusve rubro-brunneo interrupta ornato, pedibus antennis fuscis, his albedo, illis grisescente annulatis, segmento abdominali (maris) ultimo sulco longitudinali instructo. Long. 12—17 mm.

Sie ist der *M. columba* Pascoe ähnlich, aber die Zeichnung der Flügeldecken auffallend abweichend von der Beschreibung Pascoe's.

9. *Stromatium carinulatum*. *Fusco-luteo-testaceum, pronoto quinque noduloso, elytris parallelis, basi infuscatiss, singulo carinulis duabus parallelis longitudinalibus, apicem versus sensim evanescentibus, his basi medioque flavo-maculatis, macula basali interna longitudinali lineari, maculis mediis elytri singuli confluentibus marginibus undulatis, fusco marginatis. Long. exempli singuli 18 mm.*

Die Art scheint dem *Stromatium eburioides* Lac. sehr ähnlich zu sein; aber von den beiden Längskielen jeder Flügeldecke, die namentlich an den gelben Stellen bei *carinulatum* deutlich hervortreten, erwähnt Lacordaire nichts.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Karsch Ferdinand Anton Franz

Artikel/Article: [Neun neue Coleopteren von Colombo \(Ceylon\). 387-389](#)