

Neue Coleoptera von Westafrika.

Von

H. J. Kolbe.

Während der Guessfeld'schen Expedition in Westafrika wurde von Herrn Stabsarzt Dr. Falkenstein bei Chinchoxo, nördlich von der Mündung des Congo, dem Insectenleben reiche Aufmerksamkeit gewidmet. Augenblicklich haben wir die hierbei gesammelten Coleoptera vor uns. Ein Theil derselben ist schon bearbeitet, und zwar hat Herr Dr. F. Karsch im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift über die *Chrysomelidae*, *Endomychidae* und *Coccinellidae* geschrieben, während, gleichzeitig mit vorliegender Abhandlung, durch Herrn General-Major G. Quedenfeldt die *Cerambycidae* an diesem selben Orte in die Oeffentlichkeit treten. Der ganze Rest wurde von mir einer Bearbeitung unterzogen, obgleich man nicht annehmen darf, dass ich allein mich damit beschäftigt hätte; denn bereits von Anbeginn an, als die afrikanische Ausbeute in Berlin angelangt war, waren es die Herren Prof. Dr. Gerstaecker, Baron von Harold und Dr. F. Karsch, welche den grössten Theil des Materials sichteten, die bereits bekannten Species determinirten und die neuen mehr oder weniger ausschieden. Einige Elateriden und Lyciden haben die Herren Candèze bezw. Bourgeois unter den Augen gehabt. — Von Freund Dr. Karsch wurde nunmehr der bis dahin vorgerückte Status quo in anerkennenswerther Liebenswürdigkeit auf mich übertragen. Indessen blieben die oben angeführten Familien hiervon ausgeschlossen.

Das ganze von mir angelegte Manuscript hier zu veröffentlichen, erlaubt nicht der Raum der Zeitschrift; und es folgen hier nur die Diagnosen der neuen Species.

Das letzte Decennium hat die Wissenschaft über die afrikanischen Coleoptera ungemein gefördert. Wir verdanken dies den kühnen Pionieren der Wissenschaft der Geographie, die gerade auch von deutscher Seite auszogen zur Erforschung des dunklen Erdtheils Afrika. Aber auch frühere kühne Reisende, welche vorzüglich die Erforschung des afrikanischen Naturlebens zu ihrer Aufgabe gemacht, haben unsere Museen reichlich gefüllt.

Doch nun zur Sache.

Carabidae.

1. *Chlaenius occultans*. *Subaeneo-niger, nitidus, subtilissime vel vix sericeus, capite viridi-aeneo, thorace obscuriore, sat lato, ad basin fortiter et densius, antice multo remotius punctato, ante marginem posticum sat longitudinaliter biimpresso; elytris nigris, vix aeneis, sat profunde striatis, interstitiis dense granulato-punctulatis, 4. et 6. postice parva macula singula flava notatis; pedibus rufo-testaceis, tarsis, antennis, palpis rufo-ferrugineis.* — Long. 14 mm. — Nahe mit *Ch. Bohemanni* verwandt.

2. *Chlaenius guineensis*. *Viridi-aeneus, elytris obscure vel obscuro-coeruleo-viridibus, opacis, antrorsum viridescentibus, leviter sericeis, macula majore, satis pone medium posita, irregulari, flava; thorace angustato, creberrime et grosse punctato, latitudine fere longiore, postice distincte attenuato; elytris punctato-striatis, interstitiis dense et subrugulose punctulatis; antennis fusco-rufis, articulis 3 primis, palpis pedibusque testaceis.* — Long. 11,5 mm. — Dem *Ch. coecus* sehr ähnlich.

3. *Megalonychus subaeneus*. *Obscurus, capite thoraceque nitidis, hoc aeneo-virente, illo coeruleo vel viridi-coeruleo, elytris obscure fusco-aeneis; thoracis angulis posticis distinctis, obtusis; elytris punctato-striatis, interstitiis planis, tertio eorum puncto unico significato; corpore subtus nigro, pedibus antennisque testaceis.* — Long. 11 mm. — Mit *M. patroboides* und *angolensis* sehr nahe verwandt.

4. *Hypolithus murinus*. *Nigro-fuscus, opacus, thoracis limbo laterali rufescente, elytris sat profunde striatis, interstitiis leviter subconvexis; thorace ad marginem lateralem postice recto, angulis posticis leviter obtusis, pedibus testaceis.* — Long. 10,5 mm. — Sehr nahe mit *H. holosericeus* Dj. verwandt.

5. *Dioryche ludifica*. *Obscura, atra, parum nitida, vix aeneo-nigra, lateribus corporis supra sericeis; antennis fuscis, articulis 1. testaceo, 2. brunneo, pedibus brunneo-, abdomineque nigropiceis; capite fere rugulose et dense punctato, thorace rugulis densatis, haud vastis, punctisque distinctioribus, profundis, inaequalibus cribrato, linea discoidali, antice et postice valde abbreviata, per longitudinem leviter impressa; elytris profunde striatis, striis vix conspicue punctulatis, interstitiis alternis leviter altioribus.* — Long. 7,5 mm. — Der *D. Thunbergi* nahestehend.

6. *Dioryche aemulatrix*. Obscure viridi-aenea, elytris viridi- et cupreo-picescentibus, supra levissime pilosa, capite thoraceque nitidis, hoc retrorsum parum angustato, inaequaliter et grosse subrugose punctato, elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis leviter subconvexis, dense subtilissime punctatis; pedibus laete testaceis, antennis rufo-piceis, articulis 1. et 2. testaceis. — Long. 7 mm. — Am nächsten mit *D. Schönherr*i verwandt.

7. *Dioryche tibialis*. Piceo-nigra, subnitida, supra ad latera levissime argenteo-grisea, thorace retrorsum sat angustato, rugose punctato, elytris striatis, vix punctulatis, pedibus antennisque rufo-piceis, harum articulo 1. testaceo, 2. brunneo, tibiis testaceo-ferrugineis. — Long. 6,5 mm. — Der *D. Thunbergi* nahe verwandt.

8. *Harpalus latiusculus*. Obscure castaneus, nitidus, antennis, ore, pedibus flavo-pallidis; thorace brevi, longitudine dimidio latiore, lateribus rotundatis, angulis posticis rotundato-obtusis, anticis rotundioribus, ante marginem posticum ruguloso, utrinque impresso; elytris subovalibus, latiusculis, striatis, interstitiis convexis, interstitio 3. versus apicem punctato. — Long. 10 mm. ♂. — In der Körperform einem *Bradytus* ähnlich.

9. *Harpalidium* nov. gen. Harpalinorum: ad mentum dente medio deficiente, palporum articulo ultimo acuminato, interstitiis elytrorum tertio, quinto, octavo punctis septem profundis instructis, lateribusque illorum creberrime et densissime punctulatis.

H. punctigerum. Ferrugineum, nitidum, elytris supra vix fumatis, linea interna ad margines laterales pallidiore; thorace quadrato, postice vix angustato, angulis anticis et posticis obtusiusculis, marginibus, praesertim posteriore, dense punctulatis, margine postico utrinque vix impresso, disco laevigato, impunctato, linea longitudinali mediana tenui, impressa, elytrorum interstitiis fere planatis; pedibus pallidis. — Long. 6,75 mm.

10. *Stenolophus laeviceps*. Atrofuscus, nitidus, thorace subrotundato, antice obtuso, angulis posticis rotundatis, ad marginem posticum impresso, prope angulos profundius et dense ruguloso-punctato; capite thoraceque laevissimis; elytris nigro-fuscis, macula humerali flava, profunde striatis, interstitiis convexis, margine suturali lateribusque flavo-ferrugineis; corpore subtus ferrugineo, pedibus flavo-pallidis. — Long. 5,25 mm. — Mit *St. meridianus* nahe verwandt, aber grösser.

11. *Clivina interstitialis*. *Nigra, pedibus rubris, femoribus anticorum obscurioribus, antennis ferrugineis; thorace subrotundato, distincte marginato, linea longitudinali mediana impressa, in transversum tenuiter undulose strigato; elytris usque ad apicem profundissime striatis; interstitiis convexis, tertio punctis quatuor praedito, foveoliformibus, epipleuris elytrorum antice distincte biseriatim punctatis.* — Long. 6,33 mm. — Zunächst mit *C. aucta* Er. (Angola) verwandt.

12. *Eudema fuscicorne*. *Laeta, elytris fasciis utrinque duabus rufis, intus abbreviatis, parum transversim positis, ornatis; thorace fere semicirculari, antice subtruncato, latitudine duplo brevior, ad marginem posticum bisinuato, postice intra angulos sat impresso, supra profunde rugoso-punctato, in medio longitudinaliter canaliculato; elytris pone medium levissime ampliatis, striato-punctatis, striis punctis insculptis, crenulatis, interstitiis leviter convexis, dense punctulatis; antennis fuscis, articulis 3 primis nigris, articulo 3. fere duplo longiore 2.; pedibus nigris, tarsis brunneis.* — Long. 13 mm. — Mit *E. amplicolle* Schaum am nächsten verwandt.

Gyrinidae.

13. *Orectochilus angustior*. *Angustatus, supra flavo-pubescent, capite magno, clypeo amplo, quadrato, labro elongato, trigonali, nec barbato; thorace vitta media longitudinali, lata, laevissima, nigra, elytrisque vitta ex thoracis continuata, discoïdali, pone medium abbreviata, acuminata, castanea, ornatis; lateribus thoracis et elytrorum tenuiter flavo-limbatis; subtus pallide ferrugineus, pedibus concoloribus.* — Long. 8,75 mm. — Gehört zu der durch das verlängerte, meist unbehaarte Labrum ausgezeichneten Gruppe.

Staphylinidae.

14. *Paederus plagiator*. *Gracilis, cylindricus, capite rotundato, brevi, thorace abdominisque segmentis 4 primis rubris, illo robustulo, postice leviter attenuato, elytris vix angustiore, his coeruleis, griseo-pilosis, thoraci longitudine aequalibus; capite segmentisque duobus abdominalibus ultimis nigris, glaberrimis, nitidis; antennis fuscis, articulis 4 primis et ultimo palpisque ferrugineis, pedibus testaceo-ferrugineis, femoribus posticis apice nigris.* — Long. 7—8 mm. — Sehr nahe mit *P. riparius* (Europa) und *Erichsoni* Woll. (Cap Verdische Inseln) verwandt.

Scarabaeidae.

15. *Bolboceras rugifer* ♀. *B. capensi* affinitate multo approximatus, sed corpore aliquanto minore et obscuriore. Castaneo-fuscus, sat nitidus, fronte verticeque transversim rugosis, clypeo quadrato, antice obtuso, costula terminato, ore antennisque laete ferrugineis; thorace ante marginem anticum paululum ovali, impresso, bene, sed sparsim, versus latera crebrius punctulato, ad marginem posticum laevigato, foveola punctis congregatis completa; elytris admodum convexis, postice fere deorsum dehiscentibus, laevissimis, crenato-striatis, interstitiis vix convexis, impunctatis. Subtus fusco-ferrugineus. — Long. 9,5 mm. — Am nächsten mit *B. capensis* Klug verwandt.

16. *Serica latipes*. Oblongo-ovalis, brunnea, clypeo subquadrato, antice attenuato, leviter emarginato, angulis rotundatis, marginibus elevatis, supra densissime et profunde punctato, nitido, a fronte linea tenui, recurvata separato, fronte opaca, impunctata; antennis 9-articulatis, clava trifolliculata; thorace punctulato, elytris leviter striato-punctatis, punctis similibus intermissis, striis approximatis, femoribus tibiisque posticis sat dilatatis ut in *Trochalo* genere. — Long. 8,25 mm. — Nahe mit der japanischen Art *japonica* Motsch. verwandt.

17. *Trochalus rufobrunneus*. Rufo-brunneus, pruinosulus, opacus, capite thoraceque obscurioribus, brunneis; clypeo mediocriter porrecto, nec quadrangulariter elongato, dense ruguloso-punctato, linea frontali, interoculari curvata, antice concava, non elevata, vertice punctulato, postice fere impunctato; prothorace levissime et obsolete punctulatis, punctulis vix conspicuis, angulis anticis vix obtusis; elytris leviter 9-striatis, striis punctulatis, interstitiis haud sparsim punctulis, ut in prothorace, minimis instructis. — Long. 7,5 mm. — Nahe mit *chrysomelinus* Gerst. und *Serica cinnamomea* Klug verwandt.

18. *Trochalus concolor*. Rufo-brunneus, opacus, *Trochalo* rufobrunneo valde affinis, sed thorace cum elytris concolore, elytrorum interstitiis striarum distinctius punctatis thoraceque linea elevata mediana, antice abbreviata, instructo; capite rugoso, vertice punctulato, epistomate mediocriter attenuato, antennis ferrugineis; prothorace subtiliter punctato; elytris rufo-brunneis, opacis, punctato-striatis. Long. 7 mm. Nahe mit der vorigen Art verwandt.

19. *Trochalus semiaeneus*. *Supra semiaeneus, capite thoraceque ferrugineo-aeneis, elytris piceo-subaeneis, opacis, subtus ferrugineus; capite rugoso-punctato, punctis postice parcius positis; thorace haud subtilissime punctato, foveola singula mediana prope margines laterales distincta, his parum rotundatis, postice utrinque levissime sinuatis; elytris vix striatis, undique creberrime punctulatis*. — Long. 8 mm. — Scheint dem *T. sphaeroides* Blanch. nahe verwandt, aber deutlich von demselben verschieden zu sein.

20. *T. Falkensteini*. *Longulo-ovalis, rufo-ferrugineus, nitidus, glaber, punctatus, subtus pallide ferrugineus, capite rugulose punctato, punctis in vertice subtilibus, postice laevigato, clypeo sat brevi, attenuato, ad apicem non constricto, subsinuato, margine circuito elevato; thoracis lateribus subrotundatis, scutello punctulato, lateribus striaque mediana longitudinali laevigatis, elytris obsolete punctato-striatis, interstitiis dense punctulatis*. — Long. 4,75—6 mm. — Aeusserlich nahe verwandt mit *T. fulgidus* Fähr., gehört indessen zu der Gruppe von Arten, deren Clypeus vor dem Vorderrande nicht eingeschnürt ist.

Nach Herrn Dr. Falkenstein benannt.

21. *Apogonia affinis*. *Fusco-brunnea, A. cupreicollis affinis, elytris autem brunneis, nitidulis nec aeneis, capite cupreoinigro, fuscato, clypeo lato, rotundato-truncato, densissime et grosse punctato, prothorace crebris punctis insculpto, fusco, splendore aeneo; scutello singulariter punctato, in medio longitudinaliter glabrato; elytris irregulariter striato-punctatis, fere rugulosis, stria bigeminata discoidali indistincta; subtus glabra, nitida, punctis crebre insculptis*. — Long. 8 mm. — Mit *A. cupreicollis* nahe verwandt.

22. *Anomala Guessfeldi*. *Convexus, elongato-ovalis, fuscus, nitidus, subtus testaceus, thoracis lateribus scutelloque testaceis, elytris fusco-piceis, brunneo-marginatis, paulo irregulariter punctato-striatis, punctis transversim rugosis; thorace ad latera omnia marginato, glabro, haud densissime punctato, linea mediana longitudinali impressa, postice abbreviata; pygidio propygidioque opace testaceis, hoc ad basin fuscato, illo macula basali trigonali fusco-atra ornato*. — Long. 18 mm. — Gehört zu Blanchard's Gruppe XII. (Catal. Coll. ent. T. I. 1850). Die nächste Verwandte ist *tendinosa* Gerst. Zanzibar

Herrn Dr. Guessfeld, dem Leiter der afrikanischen Expedition, zu Ehren benannt.

23. *Oryctes Pechueli* ♀. *Castaneus, glaber, cylindricus, postice vix dilatatus, capite tuberculo acuto armato, pronoto antice retuso, clypeo minime sinuato, tibiis anticis dentibus quatuor denticuloque quinto inter dentem 2. et 3. armatis, dente ultimo brevi, obtuso, tibiis intermediis et posticis apice bidentatis; elytris glabris, vix striatis vel punctatis, striis discoidalibus tribus obsoletis, punctulisque disseminatis insculptis subtilissimis.* — Long. 39 mm. — Gehört in Burmeister's Gruppe von *Oryctes* II. B. b. und ist nahe mit *monoceros* Oliv. verwandt.

Herrn Dr. Pechuel-Loesche, Theilnehmer an der Gnessfeld'schen Expedition, zu Ehren benannt.

E l a t e r i d a e.

24. *Cardiophorus velatus* (Candèze). *Ater vel fuscus, parum nitidus, griseo-tomentosus, antennis pedibusque ferrugineis, elytris brunneis, sutura interdum obscuriore, punctato-striatis, punctis mediocribus, profundis, interstitiis indistincte et subtiliter punctulatis; thorace ad marginem posticum profunde bisinuato, lobo medio late emarginato.* — Long. 8—9,5 mm. — Mit *C. fastidiosus* Er. sehr nahe verwandt.

25. *Cardiophorus octonotatus* (Candèze). *Niger, vix depressus, convexiusculus: angulis thoracis posterioribus, macula elytrorum utrinque basali, fasciisque duabus, altera subbasali, integra, intus sat abbreviata, altera pone medium latiore, ad marginem dilatata, antice rotundata, postice utrinque sinuata albis vel flavescenti-albidis; antennis fuscis, articulis 3 primis pedibusque rufo-ferrugineis; thorace valde convexo, antrorsum dilatato, supra fere dense obsolete punctato, linea discoidali longitudinali glabra.* — Long. 6—8 mm. — Nahe verwandt mit *histrion* Er. (Capland), *sempunctatus* Latr. (Lusitanien), *Klugii* Dj. (Capland) etc.

M a l a c o d e r m a t a.

26. *Lycus seminiger* ♀. *Ovalis, elytris lateraliter sat dilatatis, ut thorace flavis, postice dimidia parte late nigris, quadricostatis, costa secunda elevata, margine elevato humerali carinato, parum dilatato, reflexo; thorace vitta mediana longitudinali nigra, in qua antice carina brevis, postice foveola longitudinalis, instructo; abdomine nigro, pedibus nigro-piceis.* — Long. 11 mm. — Am nächsten mit *L. spinosus* Har. verwandt.

27. *Lampyris Soyauxi*. Oblonga, parum convexa, dilute flavo-testacea, elytris thoraceque in disco usque interdum ad marginem posticum cinereis, illis ad latera suturaque anguste flavo-marginatis, antennis fusco-atris, in extrema apice flavo-terminatis, pedibus fuscis, femoribus intus et in basi flavis; prothorace amplo, confertissime et crebre punctato, versus basin carinulato, carinula antrorsum obsoleta, flava, antice intra apicem utrinque macula obliquata hyalina signato; elytris obscuris, in disco obsolete tricostatis. — Long. 12,5—14 mm. — Am nächsten verwandt mit *L. marginipennis* Boh. und *natalensis* Boh.

Nach Herrn Dr. Soyaux, Theilnehmer an der Guessfeld'schen Expedition, benannt.

28. *Luciola quadripunctata*. *L. puncticolli* Cast. affinitate valde approximata, longula, flavo-ferruginea, elytris atropiceis, intus marginibusque, his latius, testaceis, linea longitudinali discoidali ferruginea, capite atropiceo, juxta oculos brunneo, prothorace flavo-rufulo, punctis quatuor majusculis, rhomboidaliter scutello antepositis, nigris; elytris dense punctatis, hinc et illinc vix lineatis, lineis 2 discoidalibus glabris, distinctissimis. — Long. 12 mm. — Nahe mit *L. puncticolli* Cast. verwandt.

29. *Luciola pallida*. Oblonga, paulo convexa, flavo-pallida, subnitida, pallido-sericea, prothorace prorsum convexo, ante marginem posticum impresso, linea mediana longitudinali impressa, confertissime punctulata, punctis ad margines crassioribus, postice, medio excepto, insculptis, elytris irregulariter punctatis, lineis longitudinalibus obsoletis interdum conspicuis. Subtus flavo-pallida, segmento tertio, basi excepta, tibiis interdum anticis tarsisque omnibus fuscis. — Long. 8—10 mm. — Gehört zu der Gruppe der blassgelben Arten, die namentlich das tropische Asien und einzeln Africa bewohnen.

30. *Haplochrus tibialis*. Coeruleus, sericeus, antennis fuscis, articulis 5 primis flavis, pedibus atro-coeruleis, tibiis anticis flavo-testaceis tarsisque earundem fuscis, articulo ultimo testaceo; prothorace dense, in disco parcius et parum distincte punctato; elytris ruguloso-punctatis. — Long. 3,5 mm. — Nahe verwandt mit *H. flaviventris* Chevr., *azureus* Er. (Westafrika), *floralis* und *cognatus* Har. (Zanzibar).

Tenebrionidae.

31. *Himatismus Lindneri*. Griseus, sericeus, elytris fusco griseoque variegatis, capite mediocri, obovato, cum thorace dense

et fortiter punctatis, illo in vertice transversim ruguloso, linea subelevata mediana, longitudinali, usque ad marginem epistomatis anticum pertinente, laevi, antennis capite cum thorace brevioribus, hoc linea mediana longitudinali, indistincta obsito, subquadrato, transverso, lateribus subrotundatis, angulis posticis fere rectangularibus, margine postico parum elevato, in medio late lobato, elytris haud omnino regulariter punctato-striatis, interstitiis interrupte congregatim punctatis. — Long. 13—15 mm. — Zunächst mit *H. plebejus* Fähræus (Ofvers. K. Vetensk. Ak. Förh. 1870. p. 248) verwandt.

Nach Herrn Dr. Lindner, Theilnehmer an der Guessfeld'schen Expedition, benannt.

32. *Himatismus planicollis*. Griseus, elongatus, capite lato, planato, thorace minime angustiore, fronte depressa, antennis longitudini capitis cum thorace aequalibus, oculis valde prominentibus, thorace quadrato, plano, longitudine latiore, postice angustato, lateribus nonnihil rotundatis, margine antico posteriore latiore, in disco profunde et dense punctato, elytris sat irregulariter punctato-striatis, punctis haud valde robustulis, interstitiis alternatim et congeredienter punctatis punctulisque inspersis, ceterum glabratis. — Long. 13,5 mm. — Dem *H. buprestoides* Gerst. am nächsten verwandt. Scheint auch dem *H. trivialis* Gerst., der mir unbekannt, sehr nahe zu stehen. Erstere Art ist von Mosambique, letztere von Zanzibar.

33. *Psammodes rugicollis*. Ovalis, niger, nitidus, antennis apice, palpis, tarsis obscure brunneis, fronte longitudinaliter rugosa, inter antennis transversim impressa, clypeo profunde rugose punctato, thorace transverso, lateribus modice rotundato-ampliat, antice sat profunde exciso, postice truncato, ad margines omnes, posticum distinctius, marginato, in disco subplanato, parum convexo, densissime granuloso-punctato; elytris thorace latioribus, breviter ovalibus, convexis, marginatis, punctulis granuliformibus minimis, haud densissime insculptis; prosterno subsparsum punctato, punctis in disco parcius disseminatis; segmentis subtilissime longitudinaliter strigilatis, punctis intermissis; pedibus brevibus, gracilibus, femoribus anticis modice incrassatis, profunde punctatis. — Long. 23—24 mm. — Zunächst verwandt mit *Ps. scabricollis* Gerst. und *brevicornis* Haag, und zur Gruppe 139 in Haagrutenbergs Bestimmungstabelle der *Psammodes*-Arten (Col. Hefte VII. 1871. p. 74) gehörig.

34. *Gonocnemis sinuaticollis*. Corpus elongatum, parvum, fuscum, auriculis frontalibus supra basin antennarum valde productis, antice fere contingentibus, oculis in vertice linea tantum tenerrima seperatis, antennis robustulis, thorace paulo longioribus, apicem versus paululum crassioribus, articulis brevibus, obconicis, sequentibus tertio vix longiore, ultimo subgloboso, praecedentibus vix majore; thorace quadrato, longitudine vix latiore, subconvexiusculo, dense punctato, lateribus in medio obtus-angulariter productis, itaque leviter bisinuatis, apice attenuato, sat exciso; elytris thorace paulo latioribus, angustatis, latitudine plus duplo longioribus, punctato-striatis, interstitiis carinatis; pedibus haud elongatis, femoribus anticis crassis, dente subapicali permagno. — Long. 8 mm. — Scheint mit *G. strigipennis* Thoms. nahe verwandt zu sein.

35. *Opatrum subsetosum*. Cinereo-nigrum, oblongum, latiusculum, subdepressum, elytris postice convexis, fere declivibus, thorace transverso, antrosum angustato, antice profunde rotundato-exciso, ad basin utrinque subsinuato, in disco dense aequaliter cribroso, parce et minime setuloso; elytris substriatis, striis profunde punctatis, interstitiis setulis brevissimis fere seriatim vestitis. — Long. 10—11 mm. — Von der Statur des *O. contractum* Gerst.

Mylabridae.

36. *Decatoma diffinis*. Oblonga, latiuscula, subdepressa, violacea, parum nitida, sat griseo-sericea, antennis nigris, articulo ultimo in medio sutura vix diviso; elytris ad humeros elevatis, maculis binis bifasciatis, positae oblique, coloratis, macula humerali, marginali juxta scutellarique retrorsum porrecta, lineari, ad basin fere contingentibus, flavis, maculis duabus fasciae posterioris vix conjunctis, anterioris disjunctis, macula humerali angusta, elongata, maculam fasciae anterioris externam contingente, pedibus coeruleis, unguiculis brunneis. — Long. 12 mm. — Am nächsten mit *D. catenata* Gerst. verwandt.

37. *Lytta frontalis*. Opaca, coerulea, subnitida, fronte macula rubra signata, metasterno in medio late rufo; pedibus antennisque coeruleis; antennarum articulo primo sat crasso, plus dimidio brevior tertio; thorace antice attenuato, in disco haud dense tenuiter sed profunde punctato; elytris tenuissime et densissime granuloso-punctatis, striis 3 longitudinalibus minime conspicuis. — Long. 23 mm. — Aus der Verwandtschaft der *L. amethystina* Mäkl., pectoralis Gerst. und atrocoerulea Har.

Cistelidae.

38. *Allecula flavicornis*. *Elongata, leviter convexa, retrorsum vix angustata, fere opaca, ferruginea, levissime sericea, antennis, palpis, pedibus testaceis, femorum apice nigra, thorace capiteque brunneis. densissime punctulatis, hoc fere granulato, antice paulo rotundato-ampliato; labro et oculis atris, fronte fuscata, oculis supra distantibus, convexis; elytris thorace latioribus, punctato-striatis, striis impressis, punctis profunde insculptis, interstitiis vix convexiusculis, subtiliter punctulatis, punctis vix conspicuis. Subtus brunneus, segmentis abdominalibus 3 ultimis nigrescentibus.* — Long. 6 mm. — Zur Untergattung *Dietopsis* gehörig.

39. *Allecula plebeja*. *Elongata, convexa, postice ampliata, atro-picea, subnitida, leviter sericea, densissime punctata, femoribus rufo-brunneis, capite supra creberrime et distinctissime punctato, ante oculos transversim impresso, clypeo attenuato, vix convexiusculo, oculis in fronte sat distantibus; thorace ad apicem leviter attenuato, lateribus rotundatis, antice truncato, margine postico levissime trisinuato, densissime et profunde punctato; elytris ad basin thorace paulo latioribus, punctato-striatis, punctis insculptis, fere exiguis, dense seriatis, interstitiis creberrime punctulatis.* — Long. 12–13 mm. — Zur Untergattung *Dietopsis* gehörig.

40. *Synallecula* n. g. *Insecta exigua, corpore breviusculo, antennis mediocribus, vix subserratis, articulis 3 primis simplicibus, 3. quarto paulo longiore, ceteris sat brevibus, inter se aequalibus, articulo palporum ultimo fortissime securiformi, oculis magnis, prominentibus, in fronte sat approximatis; pedum omnium articulo paenultimo leviter lobato, anticorum tertio et paenultimo dilitatis, hoc late lobato; thorace postice lato, antrorsum angustato: coxis anticis processu prostornali separatis.* Gegründet auf *Allecula livida* und *picea* Thon. (Entom. Archiv II. Bd. 1. Heft 1829 p. 16, 17) so wie auf eine neue Art:

S. sororcula. *Fulva, griseo-sericea, abdomine ad apicem et latera nigrescente, pedibus rufis, antennis atris, articulis 6 primis ferrugineis; thorace semicirculari, longitudine fere duplo latiore, postice lato, ad marginem posticum in medio leviter late lobato, lobo obtuso, fere sinuato, utrinque lobi parum emarginato, supra dense punctato, punctis minimis, profundis; elytris oblongis, postice vix angustatis, striis octo punctigeris, punctis sat crassis,*

*interstitiis subtiliter biseriatim et minus irregulariter punctulatis. stria juxtascutellari mox abbreviata. — Long. 4 mm. — Am nächsten mit *S. livida* Thon. verwandt.*

L a g r i i d a e.

41. *Lagria Falkensteini*. Cyaneo-purpurea, capite thoraceque cyaneis, elytris purpureis vel viridi-aeneis et ad humeros tantum purpuratis; antennis dimidium corporis fere aequantibus, atris, basi piceis, articulis 3. et 4. subaequalibus, illo parum longiore, articulo terminali ovato, acuminato, 2 paenultimis fere brevioribus; thorace subquadrato, longitudine quarta parte latiore, lateribus fere rectis, parum inaequalibus, supra ante scutellum transversim impresso, in medio foveolato; elytris leviter ampliatis, dense punctulatis, transversim rugulosis, punctatione tenuiore quam in thorace. Long. 9–10 mm.

42. *Lagria simulatrix* ♀. Caput et thorax sordide viridi-aenea, illo vix purpurato, hoc ad marginem posticum fusco, antennis atris, articulo ultimo ovali, subacuminato, 2 paenultimis fere brevioribus, articulo 3. quantum longitudine valde superante; thorace subquadrato, longitudine quarta parte latiore, lateribus antice subrotundatis, supra grosse punctato, haud canaliculato; elytris leviter ampliatis, ferrugineis, subnitidis, scutello brunneo, corpore subtus piceo, ano testaceo, pedibus nigro-piceis, femoribus ad basin castaneis. — Long. 8,5 mm. — Nahe mit *L. lugubris* Fabr. verwandt.

43. *Lagria brevicornis* ♀. Caput et thorax viridi-aenea, illo parum purpurato, hoc ad marginem posticum ferrugineo, antennis brevibus, thoraci cum capite longitudine aequalibus, atris, basi picescentibus, articulo ultimo conico, subelongato, 2 paenultimis longitudine aequalibus, articulis 3. et 4. aequaliter brevibus; thorace longitudine tertia parte latiore, lateribus antice subrotundatis, grosse punctato, in medio supra per longitudinem canaliculato; elytris postice ampliatis, ferrugineis, nitidis, scutello nigro; corpore subtus piceo, nigrescente, ano concolore, pedibus picescenti-nigris, femoribus in dimidio basali rufo-fuscis. — Long. 9 mm. — Nahe mit *L. lugubris* Fabr. verwandt.

44. *Porrolagria* n. g. Corpus glabrum, paucis tantum pilis capiti adsertis; collo constricto; clypeo impressione profunda a fronte separato, antennis basin thoracis superantibus, versus apicem incrassatis, articulo ultimo ovali, brevi; prothorace vix

cordato, lateribus antice et postice distincte marginatis, antice rotundato-ampliatis, ante angulos posticos sinuatis; elytris angustis, deplanatis; processu prosternali inter coxas angustissimo, tibiis spinis apicalibus destitutis. — Zwischen *Lagria* und *Eutrapela* stehend und letzterer Gattung näher verwandt.

P. nuda. Elongata, livida, ferruginea, subnitida, capite thoraceque brunneis, antennis pedibusque fusciscentibus, femoribus in dimidio basali testaceis, thorace in disco inaequali, ante medium utrinque oblique impresso, profunde punctato. leviter rugoso, in medio foveolato; elytris glabre striatis; interstitiis fere irregulariter profunde punctatis; subtus castaneo-nitido, apice abdominis nigro. — Long. 6,5 mm.

Curculionidae.

45. *Ischnotrachelus inermis.* Griseo-fuscus, rostro hispidulo, supra longitudinaliter impresso, oculis prominulis, fronte tumida; thorace ad latera sat rotundato, longitudine parum longiore, intra apicem vix constricto; elytris punctato-striatis, thorace fere duplo latioribus, parallelis, humeris fere rectangulariter prominulis, plaga longitudinali mediana utrinque suturali, obliqua, ad humeros versus totos ampliata, maculaque postice diffusa posteriore elongata, fuscis, quibus interdum maculis fasciisve dilaceratis; tibiis anticis alteris robustioribus, intus haud seriatim tuberculatis, femoribus omnium pedum nequaquam dentatis, sed paulo dilatatis, dilatatione rotundato-obtusa. — Long. 6 mm. — Dem *I. granulicollis* Schh. sehr ähnlich.

46. *Ischnotrachelus abnormis.* Griseus vel fusco-griseus, elytris submaculatis vel fasciatis; rostro brevi, lateribus carinatis, carinulis postice convergentibus, linea impressa longitudinali, mediana, haud longa, oculis deplanatis, fronte cum vertice tumidis; thorace latitudine vix longiore, intra apicem et basin constricto, lateribus rotundatis, linea impressa longitudinali mediana antrosum obsoleta, elytris thorace fere duplo latioribus, humeris rectangularibus, in disco profunde, non autem crasse punctato-striatis, striarum interstitiis parum setulosis; pedibus anticis robustioribus, tibiis intus seriatim tuberculatis, femoribus omnibus dente submediano acuto instructis. — Long. 6—7,75 mm. — Weicht von allen übrigen Arten der Gattung durch die flachen Augen ab.

47. *Ischnotrachelus humilis.* Elongatus, obscure fusco-griseus, elytris vix maculatis, rostro brevi, versus oculos dilatato, cum fronte usque ad verticem tumidis, lateribus haud carinatis,

linea mediana impressa longitudinali fere ad verticem producta, oculis prominulis; thorace latitudine paulo longiore, intra basin constricto, lateribus parum rotundatis, linea impressa mediana longitudinali antrorsum obsoleta; elytris thorace multo latioribus, humeris rectangularibus, in disco sat crasse et profunde punctato-striatis, striarum interstitiis versus apicem parum setulosis, pedibus anticis vix elongatis, tibiis haud seriatim intus tuberculatis, femoribus omnibus denticulo acuto submediano instructis. — Long. 7 mm. — Scheint einigen von Thomson im Archiv. entom. beschriebenen Arten nahe verwandt zu sein.

48. *Ischnotrachelus major*. Griseo-fuscus, elytris oblique pallide fasciatis, rostro planato, fere plane fossulato, ad latera leviter carinato, in medio linea impressa instructo, oculis prominulis, fronte cum vertice parum tumidis; thorace latitudine vix latiore, lateribus rotundatis, apice leviter constricto, disco sine linea impressa anteapicali; elytris parallelis, thorace haud omnino duplo latioribus, humeris angulo obtuso prominulis; pedibus anticis robustioribus, tibiis intus seriatim tuberculatis, femoribus omnium pedum inermibus. — Long. 9,25 mm.

49. *Cimbus pullus*. Exiguus, elongatus, angustatus, pallide griseus, dense squamulatus; capite thorace parum angustiore, fronte tumida, rostro lato, parum attenuata, supra breviter bicarinato, in medio impresso, canaliculato; scrobiculis antennarum oblique et arcuate deorsum currentibus, oculos haud longe attingentibus; thorace ad latera leviter rotundato-ampliato, latitudine quarta parte longiore, linea mediana dorsali longitudinali levisime impressa, super caput rostrumque continuata; elytris postice attenuatis, apice denticulatis, punctato-striatis, striis haud impressis; limbo elytrorum cum thoracis griseo-albo; pedibus exiguis, tibiis anticis paulo arcuatis, femoribus omnibus denticulo acuto armatis, unguiculis ad magnam partem connatis. — Long. 7 mm. Diese unscheinbare Art weicht von den bekannten prächtigen Gattungsverwandten durch ihre geringe Grösse ab.

50. *Astycomerus* nov. gen. Tanymericinorum. Generibus *Astyco* et *Hadromero* proxime affine; rostro subbrevis, vix crasso, ad apicem fere attenuato; articulo antennarum funiculi septimo libero, scapo clavato, eadem fere latitudine ac funiculo, clava excepta; hujus articulo 1. apice clavato, secundo paulo brevior, 3.—6. brevissimis, 7. nonnihil crassior, clava brevi, ovali, acuminata; elytris thorace latioribus, humeris callosis, fere rectangularibus; pedibus anticis elongatis, femoribus sat incrassatis, tibiis

subarcuatis, apice mucronatis, pedibus posticis mediocribus, mediis exiguis, unguiculis in dimidio basali connatis.

A. spurius, Obsolete griseus, subtus ater, griseo-squamulosus, rostro ad apicem squamulis aeneis minimis ornato, antennis rufis, clavo fusco, rostro ad latera bicarinato, in medio sulcato, sulco ad occiput ducto, oculis convexis, sat magnis; thorace squamuloso, plane granuloso; elytris in ♂ postice attenuatis, supra cinereo-squamulosis, ♀ postice paulo dilatatis, griseis, macula singula transversa postmediana, prope suturam griseo-albida; pedibus atro-fuscis, griseo-squamulosis, femoribus haud denticulatis, posticis in medio atro-annulatis. — Long. ♂ 6,5—6, ♀ 7,5—9 mm.

51. *Astycomerus privignus* ♂. Rufus, griseo-squamulosus, subtus concolor, rostro glabro, rufo-castaneo, parum et breviter setuloso, ad latera distincte bicarinato, in medio longitudinaliter sulcato, sulco ad occiput ducto, puncto profundiore terminato; oculis rotundato-oblongis, paulo convexis, sat magnis; elytris parallelis, postice attenuatis, griseo-squamulosis, in disco suffuse fusco-variegatis; pedibus ferrugineo-rufis, femoribus griseo-squamulosis, posticis in medio fusco-annulatis. — Long. 5,5 mm. — Der vorigen Art sehr ähnlich, kleiner.

52. *Catamonus robustulus*. Brevis, cinereus, latus, subdepressus, oculis lateraliter productis, valde convexis, rostro latiusculo, ad latera carinato, in medio canaliculato, canaliculo ad verticem perducto, clypeo antice profunde triangulariter exciso, intus transversim ciliato, postice versus canaliculum producto; scapo antennarum thoracem attingente, funiculi articulis 3 primis elongatis, 2. longissimo, 3. brevissimo; thorace brevi, postice lato, antrorsum valde attenuato, ad marginem posticum magnopere bisinuato, ante scutellum producto; elytris sat humerosis, lateribus haud ampliatis, postice valde declivibus, seriato-punctatis, punctis longulis, profundis, pupillatis. — Long. 7,5—11,5 mm. — Den bekannten *Catamonus*-Arten fernerstehend.

53. *Omotrachelus* (ὄμος Schulter, τράχηλος Hals) nov. gen. Geonominorum. Pronoto brevissimo, longitudine plus triplo postice latiore, apicem versus attenuato, antice truncato, postice late bisinuato; elytris intra humeros coarctatis, constrictis, versus humeros delatos, compressis, ad thoracem versus prolongato et magna parte super hunc protrusis, quasi igitur inter basin et humeros ad incumbenda femora pedum anticorum mediorumque profunde

sinuatis, humeris productis, callo utrinque singulo prominulo; thorace cum parte elytrorum coarctata amplitudine horum fere duplo angustiore, thorace ipso duplo revera angustato; scutello oblecto; unguiculis liberis.

O. difformis. Flavo-griseus, ad latera variegatus, ubique squamulosus, vix elongatus, fere brevis, capite ad latera et subtus fusco, antennis fuscis, clava alboterminata, thorace grosse et sparsim punctato, setuloso, carinula longitudinali mediana antice obsoleta, in medio et ad latera fusco-nebuloso; elytris in disco obsolete fulvo-griseis, baseos maculis compluribus impressioneque humerali fuscis, illis obsoletioribus, fascia obliqua direpta, de callo humerali aborta, subdiscoïdali, parum geniculata, fere ad apicem protensa, pallide flava; extrinsecus fasciam usque ad marginem lateralem atro-fusculis, ad marginem flavo-variegatis, striis in disco lineariter impressis, punctis insculptis haud indistinctis, interstitiis striarum serie simplice parum setulosis. — Long. 6 mm.

54. *Blosyrus setifer.* Niger, dense fusco-griseus, rufo-griseo-squamosus, thorace vittis 2 longitudinalibus pallidis signato, fronte sat profunde trisulcata, rostro planato, in medio profunde canaliculato, canaliculo carinum exiguum includente, thorace supra grosse granuloso, lateribus in medio ampliatis, supra carinato; elytris ad humeros utrinque acute elevatis, pone hos ad latera fere sinuatis, in dorso striato-punctatis, punctis profundis, dense striatis, striis binis approximatis, interstitiis alternis distincte altioribus, interrupte albide setosis, haud tuberculatis. — Long. 7—7,5 mm.

55. *Blosyrus lentulus.* Niger, dense griseo-squamosus, fascia obliqua ultra discum elytrorum posita nebulosa, fronte haud profunde trisulcata, rostro sulcis duobus postice conniventibus impresso, antice triangulariter efossato, thorace ad latera anterieus ampliato, supra leviter transversim scrobiculato, plaga elongata discoïdali mediana elevata, laevi, glaberrima; elytris pone humeros et ultra discum tuberculatis, seriatim punctatis, punctis sat exsculptis, profundis, striis subcatenato-nodosi, haud impressis, interstitiis alternatim leviter, fere indistincte altioribus. — Long. 9—9,5 mm.

56. *Systates fossulatus.* Niger, disperse griseo-maculatus, squamulosus, capite thoraceque brevius, elytris longius setosis, his globosis, seriatim profunde et robustissime fossulato-sculptatis,

*fossulis transversis; antennis longissimis, scapo incrassato, thoracis medium attingente, funiculi articulis 3 primis, tertio minime, elongatis, ceteris obconicis; rostro tricarinato, a fronte separato, hac in medio longitudinaliter parum impresso, illo ad apicem dilatato, in medio profunde triangulariter exciso; segmentis abdominalibus 3 mediis aequalibus; ♂ angustiore, abdominis segmento basali deplanato, tibiis anticis mediisque in utroque sexu setosis. — Long. 6,5—8 mm. — Sehr nahe mit *S. hirtus* verwandt.*

57. *Catascythropus* nov. gen. Scythropinorum. Rostro capite brevior et angustior, versus apicem attenuato; antennis tenuibus, scapo oculos fere attingente ad marginem posteriorem, funiculi articulis 2 primis elongatis, secundo longior, primo incrassato, clavato; oculis sat magnis, deplanatis; thorace sat parvo, elytris fere duplo latioribus, humeris prominulis, callosis; pedibus anticis paulo elongatis, tibiis arcuatis, corbiculis femorum posteriorum apertis, unguiculis mediocribus, paululum connatis; segmento abdominali medio duobus sequentibus duplo longior.

C. acuticollis. Ater, fusco-squamulosus, rostro cum fronte canaliculato, ad latera breviter carinato, pone oculos plaga circumdata brevi nitida; thorace convexo, fere globuloso, postice et antice obtuso, ad finem disci posticum tuberculo, ex adverso scutelli, erecto, acuto, parvo extracto, superficie thoracis haud tenere granulato, ante apicem glabro; elytris convexis, amplis, postice haud declivibus, striato-punctatis, punctis mediocribus, profundis, dense seriatis, interstitiis latis, vix subconvexis; femoribus integris, in medio clavatis, anterioribus incrassatis. — Long. 8—10 mm. — In der Körperform am nächsten mit *Cecrastes argenteus* Schh. aus Madagascar verwandt.

58. *Lixus subnebulosus*. Corpus robustulum, fere breve, rostro laevi, punctulato, antennarum funiculi articulis 2 primis fere aequalibus, primo vix longior et nonnihil incrassato, fronte levissime transversim impressa, striolata, punctata; thorace conico, antrorsum attenuato, pone oculos parum constricto, latitudine baseos brevior, supra oblique subruguloso, linea elevata mediana, longitudinali fere irregulari, ad marginem posticum bisinuato, ante scutellum vix angulato; elytris minus elongatis, latitudine fere duplo longioribus, pube cinerea, praesertim postice, excepto tubere subnudato, adperso, circa scutellum fere in orbem late depressis, tuberculo postico, utroque elytro communi, depressionem hanc terminante, tuberculoque altero basali singulo ex interstitio

tertio erecto distincto, in dorso, medio fere excepto, leviter per transversum rugulosus; femoribus subtus denticulo acuto, anticorum sat robustulo, armatis; — Long. 18—19 mm. — Nahe verwandt mit L. validus Harold.

59. *Cleonus interstitialis*. Oblongus, niger, subtus griseo-tomentosus, segmentis 4 ultimis biseriatim maculatis nebulaque extrinsecus maculam segmenti secundi fusca; rostro vix brevi, lineariter bisulcato, fronte fossula punctiformi profunda signata; funiculi antennarum articulis 2 primis brevibus, aequalibus; thorace subconico, punctato, in medio disci carinato, utrinque subrugoso, vitta dorsali longitudinali sublyriformi, antice attenuata, atrofusca, ad latera fasciis 2 albogriseis, antice fere conniventibus; elytris albogriseo-tomentosis, fasciis 3 obliquis irregulariter fusco-atris, basali interrupta, interdum obsoleta, in dorso striato-punctatis, punctis variis, aut profundis aut obsoletis, per fascias positos majoribus, interstitiis alternatim elevatis, parum latioribus, ferruginatis. — Long. 13 mm.

60. *Cleonus mus*. Oblongus, atrofuscus, fusco-griseo-tomentosus, subtus concolor, segmentis 3 ultimis biseriatim maculatis, nebulis 2 distantibus basalibus vix conspicuis; rostro bisulcato, in medio carinato, puncto frontali profundo, antennarum funiculi articulis 2 primis brevibus, subaequalibus; thorace conico, in disco laevi, remote punctato, fusco, ad latera griseo; elytris fuscis, striato-punctatis, punctis inaequalibus, interstitiis planis, tertio ad basin latiusculo, elevato, atro-terminato; fasciis 2 vel fere 3 obliquis, nec sutur nec latera attingentibus, atrofuscis, simplicibus, callo anteapicali supra albo, infra obscure fuscato. — Long. 11 mm.

61. *Hylobius fasciculatus*. Oblongo-ovatus, humeris productis, elytris rursum paulo attenuatis, thorace ad latera rotundato, antice constricto, supra ruguloso; elytris seriatim rugosule fossulato-punctatis, hinc et illinc tuberculatis, callo anteapicali acuto, levissime pilosulis, fasciculis pilorum brevium aureis dispersis; rostro robustulo, elongato, leviter curvato, ante oculos utrinque longitudinaliter bifurcato, antrorsum laevi, subtilissime punctato, inter antennarum basin foveola ovali, parum impressa, exstructo, inter oculos fossula profunde insculpta. — Long. 14 mm. — Auch aus Ober-Guinea von Aquapim von Herrn Dr. Reichenow heimgebracht.

62. *Dysprosoestus* nov. gen. Hylobiiorum (δυσπρόσωστος = insociabilis, weil diese Gattung eine isolirte Stellung unter den Gattungsgenossen einnimmt). Corpus subdepressum, glabrum, thorace an-

trorsum attenuato, capite exiguo, elytris pone humeros simplicibus, rostro subcylindrico, supra ad latera bicarinato, parum curvato, ad apicem dilatato; funiculo antennarum scapo longitudine aequali, articulo primo vix elongatulo, 2. brevi, ceteris 5 transversalibus, 7. clavo haud annexo; oculis ovali-rotundatis; coxis anterioribus leviter separatis; femoribus clavatis, ad basin pedunculatis, tibiis femoribus sat brevioribus, compressis, intus bisinuatis, unguiculis liberis, distantibus.

D. costatus. Atro-piceus, subelongatus; rostro thorace paulo longiore, dense et profunde punctato; capite cum thorace exiguis, illo infra subtumido; thorace latitudine baseos vix longiore, supra densissime fossulato-punctato, longitudinaliter subruguloso, postice vix bisinuato, angulis posticis rectis; elytris humerosiis, ad basin dimidio fere latioribus thorace, subparallelis, postice leviter dilatatis, profunde crenato-striato-punctatis, punctis catenatis, angulariter exsculptis, in fundo interiore purpureo-pellucidis, interstitiis striarum alternatim costam praebentibus, plerisque (3., 5., 7., 8. 9.), alternatim subconvexis; segmentis abdominalibus ventralibus in medio late subdepressis. — Long. corp., rostro excepto, 9,5 mm.

63. *Coryssopus discolor. Brevis, subnitidus, fulvo-pallidus, piloso-squamulosus, fusco-maculosus, rostro rubro-castaneo, longitudine thoraci fere aequali, validiusculo, leviter arcuato oculis magnis, vitulinis, adspicientibus, in fronte valde approximatis, rotundatis; thorace brevi, antrosum attenuato, ad latera vix rotundato, plaga rotundata ante scutellum albula, utrinque late fuscato, antice maculis subfuscis in triangulo positis, inter se et cum alteris conjunctis, ornatis; elytris latis, mox pone basin ampliatis, versus basin attenuatis, in dorso gibboso-convexis, leviter striato-punctatis, maculis fasciisque, plus minusve transversim positis, fuscis; pedibus ferrugineis, albido-pilosulis, femoribus anterioribus singulo, posticis duobus dentibus armatis. — Long. 5,75 mm. — Dem *C. hexasticus* Schh. von Sierra-Leone sehr ähnlich.*

64. *Camptorrhinus frater. Oblongus, ater, subtus griseus, elytris plaga dorsali opaca communi, postice albo-terminata subcoloratis; rostro ad basin rugoso, dein vix punctato, laevi, ferrugineo; thorace baseos longitudine dimidio longiore, elytris angustiore, retrorsum angustato, ad latera rotundato, antice mox valde attenuato, fere constricto, carina dorsali, fere ad scutellum pertinente, tenui, dense et profunde per discum punctato, sparsim hispidulo; elytris subparallelis, thorace duplo longioribus, confertim*

subprofunde punctato-striatis, interstitiis 2. et 4., praesertim postice, elevatis. — Long. 7,75 mm. — Mit *Ephippiger* Boh. (Capland, Natal) am nächsten verwandt.

65. *Alcides griseolineatus*. Oblongus, subcylindricus, leviter convexus, haud crassus, griseo-fuscus, elytris griseo et albido lineatis, thorace minus ampliatus, ad latera rotundato, his et linea mediana longitudinali albidis, super dorsum granulato; rostro mediocri, fere recto, punctato, antice nitido, laevi; elytris thorace vix latioribus, haud humerosus, ad latera levissime rotundato-ampliat, punctato-striatis, striis impressis, punctis parvis, subrotundatis, profundis, interstitiis variis, aut latis, deplanatis, albido, griseoque tomentosus, aut angustioribus, subconvexis, nitidis, punctulatis; femoribus anticis bi-, posterioribus unidentatis. — Long. 6,33 mm. — Auch vom Quango (v. Mechow). — Zunächst mit *Albolineatus* Schh., *Exilis* Schh., *Rufus* Schh. verwandt.

66. *Alcides Guessfeldi*. Oblongo-ovatus, robustus, valde convexus, fusco-ater, parum nitidus; rostro mediocri, leviter curvato, vix ruguloso-punctato, rugulis obsoletis, levissimis, longitudinalibus, punctis singulatis, antice laevi, punctulato; thorace antrosum attenuato, antice constricto, ad latera rotundato, postice profunde bisinuato, lobo antescutellari acute porrecto, super discum granulato, granulis distinctis, deplanatis, linea mediana longitudinali lineisque lateralibus, stria antica tomentosa transversa, impressioni anteapicali imposita, suspensis, flavicanti-griseis; elytris leviter humerosus, subelongatis, lateribus compressis, macula ponescutellari, utrinque oblique lineiformi, stria humerali, interstitio quinto imposita, fascia discoidali transversa, maculis tribus direpta, maculaque anteapicali, angulari tenui, albogriseis. — Long. 8,5—10,5 mm.

67. *Hypocentrinus* nov. gen. prope *Centrinum*. Prosterno subcanaliculato, marginibus canaliculi leviter productis; mesosterno subdeclivi; coxis anterioribus sat separatis; antennis mediocribus, scapo oculos fere attingente, funiculi articulo 1. longulo, ceteris 6 brevibus, conicis, versus apicem crassescens, clava mediocri, haud robusta, ovali, fere non articulata; oculis magnis, planatis; rostro haud longiore thorace, a fronte linea impressa separato, ad basin gibboso, lateraliter compresso, dimidio basali crassiore, apicali tenui, cylindrico; elytris thorace duplo longioribus, sat latioribus, vix convexis, hoc mediocri, apice attenuato, ad marginem anticum truncato, posticum bisinuato; scutello triangulari.

H. ignobilis. Niger, ovalis, glaber, rostro longitudinaliter ruguloso-striato et punctato, thorace ad latera antrorsum rotundato, apice leviter constricto, supra profunde, dense, in disco minus rude punctato, linea dorsali longitudinali laevi, abbreviata; elytris subplanatis, fere opacis, punctato-sulcatis, punctis inter se remotis, haud profundis, interstitiis irregulariter et fere dense punctulatis. — Long. 5,75 mm.

68. *Cyamobolus clavicularis*. Oblongo-ovatus, subconvexus, ater, subnitidus, rostro curvato, longitudine thoraci aequali, punctulato, ad basin rugosulo, linea laevi elevata usque ad apicem pertinente; antennarum funiculi articulis 2 primis subelongatis, primo crassiusculo, secundo brevior, claviculo de funiculo fere disjuncto; thorace sat laevigato, punctis congregatis, profundis, latitudine baseos brevior, in dorso linea elevata longitudinali; elytris thorace fere triplo longioribus, catenate punctato-striatis, punctis quadratis, haud profundis, striis regularibus, interstitiis planis, latis, glabris; subtus glabro, nitido, haud exigue modo ocellorum punctato. — Long. 5,5 mm.

69. *Sipalus squalidus*. Niger, fuscatus, rostro ad basin leviter canaliculato, utrinque carinato, rugoso-punctato, antice sat glabrato, a basi ultra medium incrassato; thorace latitudine baseos fere dimidio longior, antrorsum rotundato-dilatato, apice constricto, in dorso versus apicem producto, tumido, supra rude sculptato, punctato-fossulato, fossularum interstitiis tuberculatis, in disco obsolete carinato; elytris rudibus, seriatim fossulato-punctatis, interstitiis alternis remote granulatis, alternis tuberculatis, tuberculis ad magnam partem sat validis, haud parum prominentibus. — Long. 16,5—19 mm. — Mit *S. mendicus* nahe verwandt.

70. *Sphenophorus simillimus*. Subdepressus, niger, glaberrimus, capite thoraceque laevissimis, haud punctulatis, elytris sat nitidis, striis vix punctatis, interstitiis planis, rostro brevi, parum curvato, pygidio truncato, rotundate marginato, in medio cristato, utrinque cristae profunde punctato, punctorum interstitiis illis magnitudine aequalibus, segmentis abdominalibus duobus primis ad latera glaberrimis. — Long. 17 mm. — Am nächsten mit *Sph. seminitidus* verwandt.

71. *Sphenophorus subulirostris*. Elongatus, ellipticus, depressus, niger, rostro tenui, longitudine thoraci aequali, arcuato, ad basin constricto et incrassato, supra seriatim punctato, an-

trorsum laevi, thorace antrorsum attenuato, intra apicem constricto, in disco remote, subtiliter, apice profundius punctato, linea longitudinali discoidali laevi, elytris thorace haud omnino dimidio longioribus, ad apicem singulis rotundatis, sulcato-punctatis, punctis haud profundis, densissime seriatim, striarum interstitiis planis, simpliciter seriatim punctatis; pygidio antice profunde sculptato-punctatis, postice dense et rude punctulatis, pedibus nigris. — Long. corp., rostro excepto, 11,5 mm. — Nahe verwandt mit *Planipennis* Gyll. (Indien), *Terebrans* Oliv. (Senegal) etc.

72. *Rhinopteryx errans*. *Rufofulvus*, rostro, antennis, femorum tibiarumque apice et basi tarsisque obscurioribus; rostro propius versus pectus geniculato, cum fronte canaliculato, antennis citra rostri medium insertis; thorace supra utrinque rufo-opaco, in medio inciso-sulcato, sulco flavescenti-cincto; thorace latitudine majore tertia parte longiore, intra apicem constricto, elytris thorace angustioribus, parallelis, apicem versus haud attenuatis, duplo fere longioribus thorace, ante apicem utrinque callosis, striato-punctatis, punctis efossis, sat profundis, interstitiis elevatis, sutura fuscata. — Long. 10,5 mm. — Nahe mit *Foveipennis* Thoms. verwandt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Kolbe H. J.

Artikel/Article: [Neue Coleoptera von Westafrika. 15-36](#)