© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ueber einige russische Hemipteren.

Von *O. M. Reuter.*

Nachdem ich meine Abhandlung „Synonymische Bemerkungen über Hemipteren" an die Redaktion der Berliner Entomologischen Zeitschrift gesandt hatte, bekam ich von dem ausgezeichneten russischen Entomologen, Herrn Staatsrath v. Jakovleff, eine Sendung von ihm beschriebener Heteropteren. Unter diesen fanden sich auch einige als neu aufgestellte Arten, die bei näherer Untersuchung sich als schon von früheren Autoren beschriebene Species erwiesen. Indem ich hier unten die Synonymik dieser Arten hervorhebe, füge ich hierbei einige Notizen über vier von einem anderen russischen Entomologen Krynicki, beschriebene Arten, die von späteren Autoren, auch von Jakovleff ganz übersehen sind.

1. *Scutellera obtusata* Kryn. in Ivanoff, Per. Vid. Klop. p. 6 (Trud. Charc. Obsch. Isp. Prir. T. IV, 1871) ist = *Phimodera galgulina* (H. Sch. Wanz. Ins. IV, p. 29, T. CXIX, Fig. 379 sub *Podops.*) Siehe auch: Jaroscheffski, Spis. Hem. Het. Preim. Charc. p. 41, 231 (1874).

2. *Scutellera albopunctata Kryn.* l. c. p. 6 = *Psacasta exanthematica* (Scop.) Put., Syn. Hem. France II, p. 11 (*Allionii* [Gmel.] Fieb., Eur. Hem. p. 376, 2.).

3 *Scutellera trigona* Kryn., l. c. p. 6, 6 = *Trigonosoma rusticum* (Fabr., Spec. Ins. p. 339, 5 sub *Cimex,* 1781, *aeruginosum* [Cyr. 1787] Put., l. c. p. 16, 2, *Nigellae* [Fabr. 1787] Fieb., l. c. p. 372, 1.)

4. *Aelia Panzeri* Kryn., l. c. p. 7, 11 = *Neottiglossa pusilla* (Gmel., Syst. Nat. p. 2160, 357, sub *Cimex* 1788, *inflexa* [Wolff 1806] Put., l. c. p. 48, 2, *Platysolen inflexus* Fieb., l. c. p. 354, 3.) Siehe auch Jarosch., l. c. p. 38, 215.

5. *Poecilocoris scitulus* Jakovl., Trud. Russk. Ent. Obsch, X, p. 17, 16, T. II, Fig. 2 (Separat) ist *Chroantha ornatula* (H. Sch., Wanz. Ins. VI, p. 93, H. CCXI, Fig. 664, sub *Cimex*).

6. *Strachia conspicua* Jakovl., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1881, p. 206, 1, sec. spes. typic. = *Eurydema Wilkinsi* (Osch. in litt.) Distant, Scient. Res. Sec. Yark. Miss., Rhynch. p. 5, Fig.4 (1879), sec. spec. typic.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

7. *Acompomorpha aterrima* Jakovl., Pol. Kauk. Kraja, p. 89 (1880), sec. spec. typic. = *Neurocladus brachiidens* (Duf., Sign. 1851) Put., l. c. p. 68, 1, ater Fieb., l. c. p. 199 (1861).

8. *Calocoris sanguineus* Jakovl., Bull, Mosc. 1881, p. 359, 9 (1882), sec. spec. typic. = *Lopus bicolor* Fieb., Neu. Entdeck. p. 8, 13 (Separ. aus No. 10 des VIII. Bd. Wien. Ent. Monatschr.), sec. spec. typ.

9. *Stenotus sareptanus* Jakovl., Bull. Mosc. 1877., Nov. Pol. Astr. Fauna p. 21 (Separat), sec. spec. typic. = *Oncognathus binotatus* (Fabr.) Fieb., Eur. Hem., p. 247 (♂).

10. *Camptotylus aphidioides* Jakovl., Bull. Mosc. 1881, p. 199, sec. spec. typic. = *Megalobasis Linae* Put., Ann. Soc. Ent. France (6), F. I, Bull. p. 65 (1881), sec. spec. typic.

Ueber eine neue Cucullia-Raupe an Rohrkolbenblüthe (Typha latifolia) und über das Vorkommen einer Microlepidopterenraupe in einem Erdpilz.

Von
H. Tetens.

1. Gelegentlich des Suchens nach *Nonagria*-Raupen (Rohrculen) in den Stengeln von Typha latifolia, dem gewöhnlichen Rohrkolben an den Ufern des kleinen Plönersees in Holstein, fand ich etwa Ende Juli an dem Blüthenkolben einer etwa 2—3 Fuss vom Ufer abstehenden Typha-Staude freisitzend eine 2—2½ Zoll lange *Cucullia*-Raupe, die von dieser und einigen nebenstehenden Pflanzen die Blüthen und Knospen der Kolben verzehrt hatte. Die *Cucullia*-Raupe, die ganz die eigenthümliche Ruhestellung und bei einer Berührung die characteristischen Bewegungen der Angehörigen dieser Gattung hatte, ähnelte in Zeichnung und Färbung derjenigen von *Cucullia Verbasci* L., war aber noch bunter gewürfelt, in der Grundfarbe grünlich- oder bläulichweiss mit lebhafter schwarzer und gelber Fleckenzeichnung, auch bedeutend grösser als die Raupe obiger Species. Das einzige von mir gefundene ausgewachsene Exemplar ging nach kurzer Gefangenschaft, in der es mit Typha-Kolben weiter gefüttert wurde, die allein es als Futter annahm, zur Verwandlung in die Erde, wobei es leider während des Ueberganges

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berliner Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 29

Autor(en)/Author(s): Reuter O. M.

Artikel/Article: Ueber einige russische Hemipteren. 158-159