

I. Uebersicht der beim Dorf Elos bei Kisamos auf der Insel Kreta von Herrn E. v. Oertzen gesammelten Dipteren,

von

V. v. Röder in Hoym, Herzogthum Anhalt.

Culex calopus Mg.

Mycetophila punctata Mg.

Limnobia nubeculosa Mg.

Nemotelus gracilis Lw.

Odontomyia flavissima Rossi.

Tabanus umbrinus Mg.

Tabanus decorus Lw.

Lomatia polyzona Lw.

Callostoma fuscipennis Mcq.

Acrocera globulus Pz. var.

Dioctria oedipus Lw.

Dioctria bicincta Mg. ♀.

Pycnopogon apiformis Lw.

Machimus (Asilus) setibarbus Lw.

Chrysopila aurea Mg.

Empis spec.?

Dolichopus griseipennis Stann.

Gymnopternus metallicus Stann.

Pipunculus zonatus Zett. var.

Ceria vespiformis Latr.

Merodon clavipes Fabr.

Merodon fuscinervis n. sp.

Merodonti fulvo Mcq. *similis*, sed *venis ad basin alarum late fusco-limbatis, apicem versus dilute fusco-cinereis*. ♂ Long. 16 mill.

In der Grösse, Gestalt und Färbung dem *M. fulvus* Mcq. sehr ähnlich.

Untergesicht schwarz, gelblich weiss behaart. Die beiden ersten Fühlerglieder gelbbraun, das dritte schwarz, an der Spitze abgerundet. Thorax gelblich behaart mit schwarzer Querbinde. Schildchen schwarz, gelblich behaart. Hinterleib rothgelb mit wenig hervortretenden schwarzen Rückenflecken, die vor dem Hinterrande des zweiten,

dritten und vierten Ringes liegen und aus dunkler Behaarung bestehen. Die übrige Behaarung ist hell. Die Hinterhüften sind einfach und die Hinterschienen unbewehrt. Schenkel schwarz; die Kniee der Vorder- und Mittel-Beine, die vordere Hälfte der Vorder- und Mittelschienen rothgelb. An den Hinterschienen ist das erste Drittel rothgelb. Tarsen der vorderen beiden Paare rothgelb, Tarsen der Hinterbeine schwarz. Flügel in der Färbung denen des *M. velox* Lw. ♂ ähnlich, nur nicht vollständig so dunkel gefärbt, sondern mehr braun; diese Färbung umgiebt die Längs- und Queradern ungefähr bis zur kleinen Querader und wird hinter dieser verwaschen. In den einzelnen Zellenkernen bleibt diese Färbung mehr durchsichtig. Schwinger hell.

Herr von Oertzen sammelte diese Art bei Elos in der Nähe von Kisamos auf der Insel Kreta.

Eumerus ruficornis Mg.

Xylota segnis L.

Syritta pipiens L.

Eristalis aeneus Scop.

Eristalis arbustorum L.

Helophilus nigrotarsatus Schiner.

Syrphus nitidicollis Mg.

Melanostoma mellina L.

Melithreptus taeniatus Mg.

Zodion cinereum Fabr.

Occemyia atra Fabr.

Phasia analis Fabr.

Phasia crassipennis Fabr.

Alophora atropurpurea Mg.

Micropalpus fulgens Mg.

Macquartia atrata Fall.

Sarcophaga atropos Mg.

Rhynchomyia speciosa Lw.

Rhynchomyia columbina Mg.

Idia lunata Fabr.

Dasyphora pratorum Mg.

Aricia erratica Fall.

Hylemyia strigosa Fabr.

Spilogaster notata Fall.

Coenosia tigrina Fabr.

Cordylura (Cleigastra) melaleuca Lw.

Tetanocera reticulata Fabr.

Limnia obliterata Fabr.

Dorycera maculipennis Mcq.*Helomyza pectoralis* Lw.*Scatophaga lutaria* Fabr.*Sepsis cynipsea* L.*Lauvania Elisae* Mg.*Sciomyza cinerella* Fall.*Opomyza germinationis* L.*Geomyza combinata* L.*Sapromyza* spec.*Sapromyza subvittata* Lw.*Mintho compressa* Fabr. (Athen).

II. Eine neue *Exoprosopa* aus Syrien

beschrieben von

V. v. Röder in Hoym (Anhalt).

Exoprosopa chalybaea n. sp.

Capite rufo-hirsuto. Antennis basi rufis, apice nigris. Thorace nigro-chalybaeo squamato; scutello ferrugineo, chalybaeo squamato; abdomine nigro-chalybaeo squamato, basi utrinque fasciculo aurantiaco, pedibus rubris, femoribus tibiisque posticis pennatis. Alis saturate castaneis, apice hyalinis. Cellulis submarginalibus tribus. Cellula posteriore prima aperta. Long. corp. 21 mill. Patria Beirut, Syria (Asia minor).

Diese Art gehört zu jenen *Exoprosopen*, welche gefiederte Hintersehenkel und Schienen haben, wie es bei *Exoprosopa apicalis* Wied. und *Ex. pennipes* Wied. auch der Fall ist.

Kopf ganz rothgelb, überall mit kurzen rothgelben Haaren besetzt. Fühler rothgelb, das dritte Glied schwarz, die beiden ersten Glieder gelb behaart. Thorax schwarz, schön stahlblau beschuppt; der Halskragen gelbroth behaart. Schildchen gelbbraun, stahlblau beschuppt. (Die Schuppen sind bei dem vorliegenden Exemplar theilweise abgerieben.) Hinterleib schwarz, stahlblau beschuppt, an der Basis der beiden Seiten mit pomeranzengelben Haarbüscheln. An den Seiten ist der Hinterleib mit längeren schwarzen Haaren gefranzt. Bauch schwarz, an der Basis länger, nach hinten zu kürzer schwarz behaart. Die Grundfarbe der Beine ist dunkelroth, die vier vordern Paare sind schwarz behaart, an den Hinterbeinen sind die Schenkel an der Ober- und Unterseite kurz schwarz gefiedert, die Schienen dagegen sind auf der Ober- und Unterseite lang schwarz gefiedert, wie dieses bei *Ex. pennipes* Wied. der Fall ist. Flügel schön

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Röder Victor Eduard von

Artikel/Article: [I. Uebersicht der beim Dorf Elos bei Kisamos auf der Insel Kreta von Herrn E. v. Oertzen gesammelten Dipteren. 73-75](#)