Charinotes Richteri nov. spec.

Ater, superne dense velutino-tomentosus, subtus parce cinereo-villosus, abdomine glabro, sanguineo, femoribus genibusque sanguineis. Longit. corp. 22 mm. lat. humer. 8 mm.

Patria: Brasilia (Santa Catharina).

Das einzige mir vorliegende Exemplar schliesst sich in den wesentlichsten Eigenschaften an die Gattung *Charinotes* Serv. an, von der es aber durch das dichte, schwarze Toment der Oberseite und Fühler und den nicht ganz übereinstimmenden Bau der letzteren etwas abweicht. Dieselben sind fast körperslang, ihr drittes Glied ist merklich länger als die drei folgenden, das fünfte und sechste sind nach der Spitze hin abgeplattet und verbreitert, die folgenden werden allmählich kürzer, breiter und immer mehr gerundet viereckig, das letzte, das zwölfte, ist das kleinste, verschmälert und stumpf abgerundet. Der Thorax trägt in einer Querreihe drei spitze Tuberkeln, von denen der etwas zurückstehende mittlere nach vorn in eine feine erhabene Längslinie verlängert ist. Von ihm aus ziehen ferner nach hinten zwei kammförmige Erhebungen, welche sich, nach vorn umbiegend, bis zu dem starken Seitendorne jederseits fortsetzen. Das Prosternum ist gröber runzelig, das Metasternum viel feiner punktiert. Der blutrothe Hinterleib ist platt, mit wenigen, in Querreihen stehenden Punkten. Die dünne, weissliche Behaarung der unteren Seite ist etwas zottig. Die fein gerandeten Flügeldecken sind allmählich nach hinten zugerundet und lassen die Analplatte frei.

Das einzige mir bekannte, weibliche, Exemplar befindet sich in der Sammlung des Herrn Direktor Dr. Richter in Pankow, dem ich die Art gewidmet habe.

Prof. Dr. Fischer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer

Artikel/Article: [Charinotes Richteri nov. spec 490](#)