

## Wenig bekannte Tagfalter.

Von *Eduard G. Honrath*.

### III.

---

*Anaea Laura* Druce ♀. Taf. II, Fig. 5.

Unterscheidet sich vom ♂ durch eine erheblichere Grösse (Länge des Vorderflügels 40 mm.), eine breite grünlich weisse Subapikalbinde auf den Vorderflügeln, einen gerundeten Aussenrand der letztern und durch die *A. Morvus* F. ähnlichen spatelförmigen Schwänze der Hinterflügel. Die dunkelgrün glänzende Grundfarbe hat einen hellern Ton als die des ♂, nur am Apextheile der Vorderflügel ist derselbe auf beiden Seiten der Binde tiefer gestimmt.

Die Grundfarbe der Unterseite ist wesentlich heller, fast rostgelb, jedoch soll auch die vom ♂ sehr variiren.

*A. Laura* ♀ ist als eine sehr grosse Seltenheit anzusehen; nach meinen vielseitigen Erkundigungen scheint es sogar bisher noch ganz unbekannt zu sein.

Sammlung Honrath.

*Anaea Panariste* Hew. ♀. Taf. II, Fig. 6.

Länge des Vorderflügels 48—50 mm. Im Flügelschnitte mit dem ♂ übereinstimmend, nur sind die Spitzen der Vorderflügel und die Schwänze, der erheblichem Grösse entsprechend, länger; dagegen sind Zeichnung und Färbung sehr verschieden.

Grundfarbe graubraun. Am Aussenrand der Vorderflügel verläuft eine Reihe von sechs länglichen mattgelben Flecken, von denen der obere und besonders die zwei untern sehr gross sind. Am Vorderrand steht ein kleiner Fleck von gleicher Farbe, und ein weiterer mehr weisslicher am Apex; letzterer ist grau bestäubt.

Auf den Hinterflügeln ist die graue Bestäubung des Apex weiter ausgedehnt. In der Vorderrandzelle steht gegen die Mitte hin ein grosser mattgelber Fleck; an dessen untere äussere Ecke anschliessend,

zieht sich zwischen dem schmal graubraun gefärbten Aussenrand und dem grossen rostbraunen Basalfelde eine breite mattgelbe Binde nach dem Analwinkel hin.

Die Unterseite ist dunkler als die des ♂, und hat nicht den silbernen Glanz wie dieses. Merkwürdiger Weise ist der nur auf der Oberseite des ♀ befindliche weissliche Apexfleck bei beiden Geschlechtern unterseits vorhanden.

Die Schwänze sind durch graue und gelbliche Beschuppung heller als die des ♂, die Franzen der Vorder- und Hinterflügel mattgelb.

Nach 2 Stücken (Sammlung Staudinger, — Honrath).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Honrath Eduard G.

Artikel/Article: [Wenig bekannte Tagfalter. 167-168](#)