© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Eine neue Buprestide aus Ostafrika.

Von

G. Quedenfeldt.

Actenodes Schmidti n. sp.

Parum convexa, sat nitida; capite, antennis, thorace et corpore subtus cum pedibus virescenti-aeneis. Capite rugoso-punctato, clypeo leviter emarginato, medio obtuse dentato; thorace sat dense et fortiter punctato, ad latera obsolete foveolato. Scutello acutissimo, concavo. Elytris ad medium usque parallelis, dense subtilissime punctatis, quadricostatis, sutura laete viridibus; lateribus nigro-purpureis, dorso vitta purpurea ornatis. Corpore subtus subdense punctato, abdomine convexo, lateribus aciculato; prosterni processu lanceolato, utrinque unidentato; femoribus anticis denticulatis, tarsis viridibus, quatuor posticis articulo basali elongato.

Long. 21 mill., lat. 7 mill. ♀.

Eine durch die hübsche Färbung der Oberseite ausgezeichnete Art, etwa von der Grösse der *Belionota canaliculata.* Kopf, Halsschild und Unterseite dunkelgrün erzfarben, der Klypeus vorne ausgerandet, mit einem stumpfen Zähnchen, dahinter mit schwachem Quereindruck; das Halsschild an der Basis um ein Drittel breiter als lang, nach vorne ziemlich stark, fast geradlinig konvergirend, in der Mitte punktirt, an den Seiten etwas runzelig, mit einem flachen, schrägen Grübchen in der Mitte des Seitenrandes und einem kleineren vor den Hinterecken; die Basis tief zweibuchtig, so dass die Hinterecken ziemlich spitz erscheinen, jedoch ohne scharfe Spitze, der Mittellappen gerade abgestutzt. Schildchen sehr spitz, seitlich gebuchtet um die Hälfte länger als breit, oben konkav. Flügeldecken breiter als das Halsschild, von der Schulter bis zur Mitte sehr schwach, alsdann etwas stärker verengt, mit etwas divergirenden, stumpfen Spitzen. Oberseite flach gewölbt, sehr dicht punktirt mit gerippter Naht und vier feinen Rippen, von denen die beiden inneren hinten abgekürzt sind und sich vereinigen. Die Naht ist auf der Mitte breit bläulich grün, vorn und hinten goldgrün gefärbt; diese Färbung geht zwischen der ersten und zweiten Rippe der ganzen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Länge nach zunächst in einen hellgrünen, dann goldigen und purpurfarbenen Streifen über, der breite Aussenrand färbt sich allmählig purpurschwärzlich. Die Unterseite ist in der Mitte ziemlich schwach und zerstreut, an den Seiten rissig punktirt, die Vorderschenkel mit einem spitzigen Zähnchen versehen. Die Art gehört in eine Abtheilung mit *Actenodes longitarsis* Thoms. und *vitticollis* Har. wegen des verlängerten ersten Tarsengliedes an den Mittel- und Hinterfüssen.

Der Käfer wurde von dem Stations-Chef bei der Ostafrikanischen Schutztruppe, Herrn Lieutenant Rochus Schmidt, nebst einer grösseren Zahl anderer Arten eingesendet und ihm zu Ehren benannt.

Eine neue Cetonide aus Ostafrika.

Von Demselben.

Eccoptocnemis seminigra.

Magnitudine E. Thoreyi, sed paulo robustior, nigra; elytris vitreo-lucentibus, nigro-suturatis. Corpore supra subtilissime, ad capitis thoracisque latera paulo distinctius, alutaceo, praeterea sparsim minutissime punctulato. Corpore subtus ad latera aciculato, mesosterni processu transversim ovali, femoribus posticis incrassatis.

Mas: tibiis anticis apice bidentatis, posticis basi intus excisis et bidentatis; femoribus posticis dente valido, acuto, armatis.

Fem.: tibiis anticis tridentatis, posticis rectis, femoribus inarmatis.

Long. 29 mill., lat. 14½ mill.

Ost-Afrika; Saadani. (Lieut. R. Schmidt.)

Von fast gleicher Grösse mit *E. Thoreyi*, jedoch verhältnissmässig gewölbter und breiter als diese sowohl, wie *Barthi* Har. und *superba* Gerst.

Mit Ausnahme der Flügeldecken ist der Käfer schwarz, der Klypeus ausgerandet und schmal aufgebogen; der Kopf dicht und fein chagrinirt und mit gröberen zerstreuten Punkten versehen; das Halsschild ist auf der Mitte nur schwach, nach den Seiten dagegen sehr dicht und fein runzelig punktirt, die eingestreuten Pünktchen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berliner Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: 35

Autor(en)/Author(s): Quedenfeldt Gustav Friedrich Otto

Artikel/Article: Eine neue Buprestide aus Ostafrika. 135-136