

Griechische Heteroptera

gesammelt von

*E. v. Oertzen*¹⁾ und *J. Emge*,

verzeichnet von

O. M. Reuter.

Fam. Pentatomidae.

1. *Odontoscelis fuliginosa* L. Attika; Chios.
2. — var. *dorsalis* Hahn, Fieb. Cyclades, Naxos (E.).
3. *O. dorsalis* F., Dall. Attika (E.).
4. *Odontotarsus grammicus* L. Attika; Doris; Kumani; nördl. Sporaden, Skopelos, Skiathos; südl. Sporaden, Karpathos.
5. *Psacasta exanthematica* Scop. Attika; Aegina.
6. *Eurygaster maura* L. Attika; Olympos; Creta.
7. *E. integriceps* Put. Cyclades, Naxos (E.).
8. *E. nigrocucullata* Goeze, Reut. (*hotentotta* H. S. nec F.). Attika; Doris.
9. *E. hotentotta* F., Stål (= *maroccana* F., auct.). Creta.

1) Herr von Oertzen giebt folgende Angaben über die Reisen, auf welchen das nachstehend verzeichnete Material gesammelt wurde:

Herr Emge besuchte im Frühjahr 1887 einzelne der nördlich von Euboea gelegenen Sporaden zu Sammelzwecken und brachte von Skopelos und Skiathos Hemipteren mit; ausserdem sammelte er namentlich in der Umgebung von Athen und zwar besonders auf dem sumpfigen Terrain an der Bucht des Phaleron und an den Abhängen des Hymettos und des Pentelikon; ferner in Morea, Euboea (Delphi-Geb.), auf Naxos und Aegina. — Ich sammelte im Frühjahr 1882 in Attika (Umgegend von Athen), auf dem Parnass (Gegend von Arachova) und in Doris (Gegend von Lidoriki). In den Jahren 1884 und 1885 sammelte ich namentlich im östlichen Creta (Umgegend von Canea und bei dem Dorfe Elos im Thale Enneachoria) und in Morea (Umgebung von Nauplia und bei den Ortschaften Pyrgos, Olympia und Kumani in Elis); ferner auf den Inseln Kephalonia, Zante, Naxos, Aegina und Angistri. Im Jahre 1887 sammelte ich ausser in verschiedenen Gegenden Griechenlands namentlich im westlichen Creta (Lasithi-Geb.), der Karpathos-Gruppe und auf mehreren Inseln längs der kleinasiatischen Küste. In d. „Deutsch. Ent. Zeitschr.“ 1888, p. 369—371 findet sich eine eingehende Zusammenstellung der auf dieser Reise besuchten Gegenden. — Die aus dem Taygetos-Geb. und vom Olymp (in Thessalien) verzeichneten Arten wurden von Herrn Dr. Krüper gesammelt.

E. v. Oertzen.

10. *Trigonosoma falcatum* Cyr. Attika.
 11. *Tr. rusticum* F., Reut. (= *aeruginosum* Cyr.). Attika; Aegina.
 12. *Ancyrosoma leucogrammes* L. (*albolineatum* F. nec Goeze).
Doris; nördl. Sporaden, Skiathos, Skopulos; südl. Sporaden,
Symi.
 13. *Tholagmus flavolineatus* F. Attika.
 14. *Graphosoma semipunctatum* F. Attika; südl. Sporaden, Kos,
Rhodos; Creta.
 15. *Gr. lineatum* L. Attika; Euboea; südl. Sporaden, Nikaria, Rhodos;
Creta.
 16. *Derula flavoguttata* M. et R. Kumani in Elis d. 6. Aug. 1885.
 17. *Podops rectidens* Horv. Attika; Nauplia an den Wurzeln von
Binsen; Cycladen, Keos.
- Obs. Variat 1^o antennarum articulo secundo tertio distincte
breviore; 2^o pronoto lateribus subsinuatis; 3^o processu pronoti bre-
viore et latiore, latitudine haud longiore; 4^o incisura humerali magis
minusve profunda.
18. *Thyreocoris scarabaeoides* L. Attika.
 19. *Macroscytus brunneus* F. Attika; Chios; Cyclades, Tinos,
Naxos; Creta.
 20. *Geotomus punctulatus* Costa. Attika; Nauplia; Euboea; Cyclades,
Andros, Mykonos, Naxos; Creta.
 21. *G. elongatus* H. S. Parnass.
 22. *Cydnus aterrimus* Först. Attika; Naxos; Creta.
 23. *Tritomegas bicolor* L. Attika.
 24. *Canthophorus dubius* Scop. Korax-Gebirge; Attika; Parnass;
Naxos; Creta.
 25. *C. maculipes* M. et R. Südl. Sporaden, Karpathos; Creta, La-
sithi-Gebirge.
 26. *Ochetostethus nanus* H. S. Attika; Parnass; Doris; Insel
Angistri; Creta.
 27. *Sciocoris sulcatus* Fieb. Attika; Nauplia.
 28. *Sc. maculatus* Fieb. Attika; Naxos.
 29. *Dyroderes umbraculatus* F. (= *marginatus* F.). Attika.
 30. *Mustha spinosula* Lef. Attika; Euboea; Morea.
 31. *Apodiphus amygdali* Germ. Attika; Doris; Euboea; Kephallonia;
Morea; Samos, Dorf Marathocampos.
 32. *Aelia acuminata* L. Attika; Morea; südl. Sporaden, Karpas-
thos; Creta.
 33. *Neottiglossa leporina* H. S. Morea; Creta.
 34. *N. flavomarginata* Luc. Nördl. Sporaden, Skopelos (E.).

35. *Stagonomus bipunctatus* L., Reut. (= *consimilis* Costa). Nördl. Sporaden, Skopelos.
36. *St. amoenus* Brullé (= *bipunctatus* F. nec. L.). Samos; Rhodos; Creta.
37. *Eusarcoris inconspicuus* H. S. Attika; Morea; Creta.
38. *Staria lunata* Hahn. Attika; Euboea; Morea; Chios.
39. *Peribalus strictus* F. (= *distinctus* Fieb.). Attika (E.).
40. *Carpocoris purpureipennis* De G. Ueberall.
41. *C. varius* F. Attika; Cyclades, Syra, Keos; südl. Sporaden, Kalymnos; Creta.
42. *Dolycoris verbasci* De G. Attika; Parnass; Euboea; Kephallonia; südl. Sporaden, Karpathos; Creta.
43. *Palomena prasina* L. Attika; Euboea; Morea.
44. *Brachynema cinctum* F. Attika;
45. *Nezara viridula* L. Attika; Cyclades, Keos; südl. Sporaden, Nikaria, Karpathos.
46. — var. *torquata* F. Cyclades, Andros; Chios.
47. *Piezodorus incarnatus* Germ. Attika; Euboea; Keos; Chios; Rhodos; Creta.
48. *Rhaphigaster nebulosa* Poda (= *grisea* F.). Chios; Rhodos.
49. *Pentatoma rufipes* L. Morea, bei Divri auf Apollo-Tannen.
50. *Holcogaster fibulata* Germ. Attika; Rhodos.
51. *Eurydema ornatum* L. Creta.
52. *E. festivum* L., Reut. var. *pictum* H. S., Fieb. Attika; Rhodos.
53. *E. decoratum* H. S. Parnass; Creta.
- *54. *E. rugulosum* Dohrn 1). Südl. Sporaden, Karpathos.
- *55. *Bagrada stolidus* H. S. Attika (E.).
56. *Picromerus nigridens* F. Creta.
57. *Troilus luridus* F. Elis, Kumani.
58. *Zicrona coerulea* L. Attika.
59. *Elasmucha interstincta* L. Euboea; Creta.
60. *Cyphostethus tristriatus* F. Morea; Rhodos.

Fam. Coreidae.

- *61. *Phyllomorpha laciniata* Vill. Parnass; südl. Sporaden, Symi.
62. *Centrocoris spiniger* F., Horv. Attika; Morea; Creta, Stadt Candia.
- *63. *Spathocera lobata* H. S. Morea, Olympia.
64. *Coreus disciger* Kol. Bei Theben in Boeotien, bei Arachowa im Parnass.

1) Mit einem * bezeichnete Arten sind nicht früher aus Griechenland publiziert.

65. *Mesocerus marginatus* L. Attika; Nauplia; Euboea; nördl. Sporaden, Skiathos; Chios.
66. *Syromastes rhombeus* L. Doris; Euboea; nördl. Sporaden, Skopelos; Cyclades, Syra, Naxos; Chios; südl. Sporaden, Nisyros, Rhodos; Creta.
67. *S. sulcicornis* F. Insel Makroniscon; Euboea, Stadt Karystos; Cyclades, Naxos, Mykonos; südl. Sporaden, Kos, Karpathos; Creta.
- *68. *Gonocerus juniperi* H. S. Attika.
69. *G. insidiator* F. var.* *imitator* nov. var.
 Typo similis, sed antennis articulo secundo levius, tertio versus apicem fortius compresso-dilatatis, medio tota longitudine utrinque carinatis.
 Südl. Sporaden, Nikaria.
- *70. *G. acutangulatus* Göze (= *venator* F.). Attika; Parnass; Euboea; Rhodos; Creta.
71. [— var.* *simulator* nov. var.
 Typo paullo major, antennis articulo secundo levius, tertio versus apicem fortius compresso-dilatatis, medio tota longitudine carinatis.
 Peloponnesos, Parnassos; Morea, Cumani; Caucasus; in collectione mea].
72. *Pseudophloeus Waltlii* H. S. Attika; Naxos.
73. *Bathysolen nubilus* Fall. Attika (E.).
74. *Ceraleptus gracilicornis* H. S. Attika; Keos; Creta.
75. *Loxocnemis dentator* F. Samos, Dorf Marathokampos.
76. *Bothrostethus annulipes* Costa. Creta.
- *77. *Dasycoris scabricornis* Panz. Korax-Gebirge.
78. *D. hirticornis* F., Coqu. (*hirsutus* Fieb.). Attika; Parnass; Euboea; Naxos.
79. *affinis* H. S. (*hirticornis* Fieb.). Korax-Gebirge; Samos.
80. *Strobilotoma typhaecornis* F. Attika; Kephallonia.
81. *Microlytra fossularum* Rossi. Nauplia; Creta.
82. *Camptopus lateralis* Germ. Attika; Keos; Creta.
- *83. *Stenocephalus agilis* Scop. Korax-Gebirge; Attika; Euboea; Cyclades, Keos, Naxos; Samos; südl. Sporaden, Kasos; Creta.
84. *Corizus hyoscyami* L. Parnass; Samos; Creta.
85. *Rhopalus abutilon* Rossi. Samos; Creta.
86. *Rh. crassicornis* L. Creta.
87. *Rh. hyalinus* F. Südl. Sporaden, Karpathos; Rhodos.
- *88. *Rh. rufus* Schill. Euboea; Samos, Dorf Marathokampos.
89. *Maccevetthus lineola* F. (= *errans* F.). Attika; Boeotia; südl. Sporaden, Kasos, Rhodos.

Fam. Berytidae.

90. *Berytus tipularius* L. Parnass; Kephalonía, Ainos-Gebirge; Samos; Symi.
- *91. *B. aduncus* Fieb. f. brach. Südl. Sporaden, Samos, Symi.
- *92. *Neides pilipes* Put. Elis, Kumani.
- *93. *N. setipennis* Saund. Süd-Euboea, Karystos.
94. *N. montivagus* Fieb. Aegina; Elis, Kumani; Umgebung von Athen.
95. *N. Signoreti* Fieb. f. brach. Creta.
- *96. *Apoplymnus pectoralis* Fieb. Albanien, Küstenstadt Avlona.
97. *Metacanthus elegans* Curt. Albanien, Avlona; Attika (E.).

Fam. Lygaeidae.

- *98. *Lygaeus leucopterus* Göze (*familiaris* F.). Attika.
- *99. *L. saxatilis* Scop. Attika; Euboea; Creta.
100. *L. equestris* L. Korax-Gebirge; Attika; Cyclades, Keos; Chios; südl. Sporaden, Karpathos; Creta.
101. *L. pandurus* Scop. (= *militaris* F.). Attika; Makronisi; Boeotia; Euboea; Cyclades, Keos, Mykonos, Naxos, Andros; südl. Sporaden, Kasos; Creta, Elasa.
102. *L. creticus* Luc. Attika; Euboea; Keos; Naxos; Creta.
103. *L. albomaculatus* Göze (= *apuanus* Rossi). Parnass; Euboea; Cyclades, Tinos; Creta.
104. *L. superbus* Poll. (= *punctatoguttatus* F.). Attika; Euboea; Cyclades, Syra, Naxos; Creta.
- *105. *L. Tristrami* D. et Sc. f. brach. Attika; Nauplia.
106. *Lygaeosoma reticulatum* H. S. Attika; Cyclades, Keos, Syra, Naxos.
107. *L. erythropterum* Put. Attika (E.); Cyclades, Keos, Syra; südl. Sporaden, Kos; Rhodos, Kloster Artemidi.
108. *Arocatus longiceps* Stål. Attika (E.); Elis, Kumani d. 23. Juli; südl. Sporaden, Nikaria.
109. *Coenocoris nerii* Germ. Griechenland, ohne Localitäts-Angabe.
- *110. *Orsillus maculatus* Fieb. Rhodos bei Dorf Kastelo, Kloster Artemidi; Creta bei Kanea.
111. *O. Reyi* Put. Attika bei Athen (E.); Aegina; Karpathos.
- *112. *Nysius senecionis* Schill. Attika, Umgebung von Athen.
113. *Cymus glandicolor* Hahn. Attika; Creta.
- *114. *C. melanocephalus* Fieb. Attika (E.).
115. *Cymodema tabidum* Spin. Attika (E.); Creta.
116. *Ischnorrhynchus geminatus* Fieb. Bei Athen (E.); Creta.
117. *Ischnodemus sabuleti* Fall. Attika.

- *118. *Blissus Doriae* Ferr. var. *obscurus* Reut.

Ut typus, sed antennis pedibusque obscure ferrugineis, pronoto toto nigro vel solum ipso margine basali tenuiter piceo, hemielytris (formae brachypterae) nigro-fuscis, appendice membranacea sordide albicante. Rev. d. Ent. 1888, p. 223.

Attika (E.).

- *119. *Henestaris laticeps* Curt. Attika (E.).
 *120. *H. halophilus* Burm. (*geocoriceps* Ant.). Attika (E.).
 *121. *Engistus boops* Duf. Attika (E.).
 122. *Geocoris erythrocephalus* Lep. Akarnanien.
 123. *G. siculus* Fieb. Attika (E.).
 124. *G. lineola* Ramb. Attika (E.).
 *125. *Artheneis alutacea* Fieb. Creta.
 126. *Heterogaster urticae* F. Nauplia; Naxos; Rhodos; Creta.
 127. *Platyplax inermis* Ramb., Hörv. Attika.
 128. *Cymophyes ochroleuca* Fieb. Attika (E.), Nauplia.
 129. *Macropterna inermis* Fieb. Euboea; Dystos.
 *130. *Microplax interrupta* Fieb. Attika (E.).
 131. *M. albofasciata* Costa. Attika; Süd-Euboea, Berg Ocha; Keos.
 *132. *Brachyplax palliata* Costa. Bei Athen.
 Obs. Specimen nuper exclusum ad Athen lectum cum descriptione *Br. linearis* Scott bene congruit; hac species verisimiliter haud distincta.
 *133. *Metopoplax origani* Kol. Albanien, Avlona; Attika; Rhodos, Artemidi.
 134. *Oxycaenus hyalinipennis* Costa. Attika; Rhodos.
 135. *Macroplax fasciata* H. S. Attika; Creta.
 *136. *Bycanistes costalis* Leth. Morea, Pyrgos d. 14. Juli 1885.
 137. *Paromius leptopoides* Baer. Attika; Nauplia.
 138. *P. gracilis* Ramb. Olympia; südl. Sporaden, Nikaria.
 139. *Rhyparochromus colon* Fieb. et Put. Creta; Kephallonia.
 140. *Rh. praetextatus* H. S. Attika (E.); südl. Sporaden, Symi, Karpathos; Creta.
 141. *Rh. puncticollis* Luc. Attika; Nauplia; Naxos; Chios.
 142. *Rh. chiragra* F. Attika; Parnass; Nauplia; Kephallonia.
 *143. *Rh. dilatatus* H. S. Attika (E.).
 144. *Proderus Bellevoyei* Put. Naxos.
 145. *Tropistethus holosericeus* Scholtz. Attika; Angistri; Euboea, Karystos; Keos; Creta.
 *146. *Ischnocoris punctulatus* Fieb. Attika; Kephallonia; Naxos; Creta.
 *147. *Aoploscelis bivirgatus* Costa. Attika, 1 Ex. macropt.

148. *Lamprodema maurum* F. Attika.
- *149. *Plinthisus fasciatus* Horv. Albanien, Avlona; Attika; Angistri; Creta.
150. *Pl. hungaricus* Horv. cum var. *globosus* Horv. Attika; Süd-Euboea; Cyclades, Keos; Creta.
151. *Pl. coracinus* Horv. Albanien; Attika (E.).
152. *Stygnus sabulosus* Schill. (= *pedestris* Fall. nec Panz.). Morea, Olympia; Zante; südl. Sporaden, Nikaria.
153. *St. fuliginus* Geoffr. (= *arenarius* Hahn). Bei Athen.
154. *Lasiocoris antennatus* Mont. Creta, Lasithi-Gebirge.
155. *L. apicimacula* Costa. Creta, Lasithi-Gebirge; Andros; Berg Kovari.
156. *Peritrechus gracilicornis* Put. var. *antennis articulis secundo et tertio ferrugineis*. Olympos, 1 Ex. d. 23. April.
- *157. *P. ambiguus* Horv. Nauplia.
- *158. *P. pusillus* Horv. Nauplia.
- *159. *P. meridionalis* Put. Albanien, Avlona; Attika, Phaleron, bei Athen; Cycladen, Keos.
160. *P. sylvestris* F. (= *luniger* Schill.). Attika.
161. *Hyalochilus ovatulus* Costa. Albanien, Avlona; Angistri; Attika bei Athen; Keos.
162. *Microtoma atrata* Göze. Attika; Cyclades, Keos, Syra, Tinos, Naxos; südl. Sporaden, Kos, Karpathos.
163. *Trapezonotus agrestis* Fall. Süd-Euboea, Berg Ocha.
- *164. *Tr. Ubrichii* Fieb. Creta bei Kanea.
165. *Culyptonotus Rolandri* L. Attika.
- *166. *Pachymerus validus* Horv. Graecia.
167. *P. consors* Horv. Attika.
168. *P. quadratus* F. Cephalonia.
169. *P. minusculus* Reut. Attika; Samos; Creta, Lasithi-Gebirge, Dorf Elos in Kisamos.
170. *P. pini* L. Euboea.
171. *P. phoeniceus* Rossi Korax-Gebirge; Cyclades, Keos, Tinos, Andros; Chios, Umgebung von Hagios-Galos.
172. *P. vulgaris* Schill. Morea; Kumani in Elis d. 4. August.
- *173. *P. pineti* var. *confusus* Reut. Morea; Kumani in Elis.
- *174. *P. inarimensis* Costa. Attika (E.).
175. *P. alboacuminatus* Göze (= *pedestris* Panz.) var. *funereus* Put. Insel Andros, Berg Kowari.
176. *Beosus quadripunctatus* Müll. (= *erythropterus* Brullé). Attika; Nauplia; Euboea, Karystos; südl. Sporaden, Nikaria; Creta, Lasithi-Gebirge.

177. *Beosus maritimus* Scop. (= *luscus* F.). Korax-Gebirge; Creta.
178. *Dieuches syriacus* Dohrn. Süd-Euboea, Karystos.
179. *Neurocladus brachiidens* Duf. Elos im westl. Creta.
180. *Ischnopeza hirticornis* H. S. Attika; Chios; Creta, Lasithi-Gebirge.
181. *Emblethis verbasci* F., Stål. Attika (E.).
- * 182. *E. ciliatus* Horv. Corfu; Attika; Nauplia; Euboea, Aliveri; Cyclades, Keos, Andros; Chios; südl. Sporaden, Kos, Karpathos.
- * 183. *Lethaeus cribratissimus* Dohrn. Attika (E.); Süd-Euboea, Karystos; Cyclades, Keos, Andros; Chios; Samos bei Dorf Marathocampos; Symi; Rhodos bei Dorf Kastelo; Creta, Elos, Lasithi-Gebirge, Sitia.
- * 184. *L. nitidus* D. et Sc. Corfu.
185. *Eremocoris fenestratus* H. S. Phtiotis.
186. *Drymus pilipes* Fieb. Zante; Umgebung von Athen; Morea, Kumani in Elis; Chios, Umgebung von Hagios-Galos; südl. Sporaden, Chalki.
187. *Scolopostethus adjunctus* D. et Sc. Attika (E.).
188. *Sc. decoratus* Schill. Südl. Sporaden, Nikaria.
189. *Taphropeltus contractus* H. S. Albanien, Avlona; Attika (E.); Morea, Olympia.
190. *T. nervosus* Fieb. Keos, Naxos; Creta.
- * 191. *Thaumastopus marginicollis* Luc. Creta, Lasithi-Gebirge.
192. *Scantius aegyptius* L. Attika; Cyclades, Keos, Naxos, Syra; südl. Sporaden, Kos, Karpathos, Kasos; Creta.
193. *Pyrrhocoris apterus* L. Attika.
194. *P. marginatus* Kol. Albanien, Avlona.
- * 195. *P. niger* Reut.

Oblongus, totus niger, nitidus, solum margine laterali pronoti et corii omnium angustissime fusco-testaceo; rostro apicem coxarum intermediarum attingente, articulo primo marginem anticum prosterni attingente et articulo antennarum primo longitudine aequali; antennis articulo primo capitis longitudine, secundo latitudini frontis et oculi unici simul longitudine aequali; pronoto callis ad unum confluentibus, convexis, nitidis, inpunctatis, basi profunde sat grosse punctato; hemicytris basin segmenti quinti paullo superantibus, totis coriaceis, apice recte truncatis, sat subtiliter vage punctatis; tibiis tarsisque nonnihil picescentibus. Long. 8 mm. *P. marginato* Kol. similis, sed magis elongatus, fortius nitidus, fere totus niger, antennis aliter constructis. Reut., Rev. d'Ent. 1888, p. 224.

Creta, Lasithi-Gebirge, 2 Ex.

Fam. Tingitidae.

196. *Piesma variabilis* Fieb. Attika bei Athen (Emge).
 *197. *P. Kochiae* Beck. Attika (Emge).
 198. *Serenthia atricapilla* Spin. Albanien, Avlona; Nauplia; Creta.
 199. *S. laeta* L. Attika.
 200. *Campylostira pilifera* Reut. Corfu.
 *201. *C. ciliata* Fieb. Attika.
 *202. *Acalypta hellenica* Reut.

Breviter ovalis, nigricans, superne fuscescenti-grisea, antennarum articulis secundo et tertio tibiisque ferrugineis, illarum articulo secundo sat gracili, basi subito dilatato; capite spinis frontalibus brevibus; pronoto carinis lateralibus basin versus divergentibus, vesicula apicali brevi, parum prominente, apice late rotundata, margine laterali biseriatim areolata, angulis anticis truncatis; elytris margine laterali uniseriatim areolato, spatio suturali biseriatim et ante apicem 3—4-seriatim areolato, spatio discoidali medio 5—6-seriatim areolato, laterali 4—5-seriatim areolato, areolis omnibus parvulis, sat irregulariter dispositis. Long. ♂ $1\frac{1}{3}$, ♀ 2 mm. Reut., Rev. d'Ent. 1888, p. 224, 3.

Attika. Auch auf dem Taygetos (Krüper) und Corfu (Reitter).

A. parvulae Fall. statura et magnitudine similis, differt autem spatio elytrorum suturali usque a basi biseriatim areolato antennisque distincte crassioribus; ab. *A. gracili* Fieb. statura brevior et latior, spatio elytrorum suturali postice 3—4-seriato, discoidali 5—6-seriato lateraliq. saltem 4-seriato, areolis multo minoribus divergens; ab ambobus vesica apicali pronoti minus prominente, apice multo latius rotundata distincta.

*203. *Dictyonota lugubris* Fieb. Ohne Lokalitäts-Angabe.

*204. *Derephysia brevicornis* Reut.

Nigra, pedibus ferrugineis; antennis breviusculis, articulo tertio disco pronoti vix longiore et articulo quarto parum magis quam duplo longiore; pronoto disco carinis tribus altis lamellaceis vitreis uniseriatim areolatis, margine laterali latissime explanato, vitreo, ante apicem triseriatim, cetero biseriatim et basi uniseriatim areolato; elytris vitreis, limbo laterali late explanato, biseriatim areolato, arcis seriei interioris majoribus, hic illic interdum area unica magna; costulis omnibus areolarum nigro-fuscis vel fuscis. Long. $3\frac{1}{2}$ mm. Reut., Rev. d'Ent. 1888, p. 224, 4.

Korax-Gebirge.

D. foliaceae Fall. similis, differt antennis obscurioribus et multo brevioribus, abdomine nigricante costulisque areolarum obscure fuscis.

*205. *Galeathus semilucidus* Jak. Athen.

*206. *G. multiseriatus* Reut.

Corpore, capite discoque pronoti nigris, cetero superne vitreus; antennis pedibusque pallide flavis, illis articulo tertio quarto saltem triplo longiore, setis exsertis longioribus instructo; capite spinis gracilibus longis, albis, anterioribus apicem capitis sat longe superantibus; pronoto lateribus late explanatis, fortiter rotundatis, apice longe acuminato-productis, apicem capitis attingentibus et ibi areolis tribus compositis, dein biserialim areolatis, serie interiore usque ad apicem ab areolis quatuor majoribus, exteriori ab areolis novem minoribus composita, disco subaenescente, subtilissime punctato, vesica apicali tectiformi, medium spinæ capitis intermediae attingente, biserialim areolata, serie superiore ab areola unica magna, inferiore ab areolis tribus composita, vesicis discoidalibus magnis semiglobosis, postice late distantibus, a latere visis quadriseriatim areolatis, costulis plerumque dilute fusciscenti-cinctis, vesica processus basalis alta vesica apicali fere triplo majore, biserialim areolata, areolis tribus mediis seriei superioris (formae macropterae) plerumque infuscatis, areola postica seriei inferioris maxima; elytris limbis lateralibus ipsa basi angustissimis, dein autem subito fortiter angulatis, late explanatis, triseriatim areolatis, retrorsum convergentibus (forma brachyptera) vel usque ad apicem parallelis (forma macroptera), apice late rotundatis, vesica discoidali fortiter (f. brach.) vel minus fortiter (f. macr.) elevata, postice subperpendiculariter truncata, antice depressa; costulis setulis albidis instructis. Long. f. macr. $3\frac{4}{5}$, f. brach. $2\frac{2}{3}$ mm. — Reut., Rev. d'Ent. 1888, p. 225, 5.

Attika.

A. speciebus omnibus mihi cognitis (*G. cellularis* Jak. mihi gnota) hemielytrorum marginibus lateralibus triseriatim areolatis divergens.

*207. *Tingis pyri* F. Rhodos.

*208. *Phyllontochila angustata* H. S. Albanien, Avlona.

209. *Ph. testacea* H. S. Südl. Sporaden, Kos, Nikaria, Symi.

210. *Ph. hellenica* Put. Attika; Naxos (E.).

211. *Ph. cardui* L. Attika; Naxos.

212. *Tropidochila geniculata* Fieb. Attika (E.).

213. *Tr. geniculata* var. *griseola* Put. Attika; Olympia.

214. *Catoplatus carthusianus* Goeze. Nauplia.

215. *Physatochila dumetorum* H. S. Attika (E.); Morea, Kumani in Elis.

216. *Monanthia Echii* Schr. (= *Wolfii* Fieb.). Attika; Naxos; Creta.

217. *Monosteira unicastata* M. et R. Attika (E.); Kephalaria; Rhodos.

*218. *M. lobulifera* Reut.

Oblongo-ovata, superne testacea, glabra; antennis pedibusque flavis, illis articulo secundo tertio duplo et dimidio longiore, hoc infuscato; capite ferrugineo, spinis quinque horizontalibus albis instructo, spinis verticis illis frontis aequae longis; pronoto subtiliter punctato, carina tenui haud areolata, processu basali versus apicem nigro, areolis majoribus, foveolaeformibus, marginibus lateralibus angustis, albis, carinaeformibus haud vel minutissime areolatis, sed in tertia apicali parte subito in lobum triangularem minute triseriatum areolatum dilatato-explanatis, hoc lobo apice externe fere sub angulo recto rotundato; disco utrinque prope angulos laterales longitudinaliter impresso, lateribus extra impressionem fasciaque pone anulum apicalem plerumque obscurius et saturatius ferrugineis; corio areolis punctiformibus, macula paullo pone basin aliaque ad apicem areae discoidalis albidis, magis minusve late fuscoferrugineo-terminatis, margine laterali anguste uniseriatim areolato, areolis sat magnis, costulis fuscis, costa corii exteriori sinuata, unde area laterali medio dilatata, area discoidali costa transversali divisa; membrana distincte areolata, costulis hic illic praecipue medio fuscis; pectore fusco, ventre ferrugineo. Long. $2\frac{2}{5}$ — $2\frac{1}{2}$ mm. Reut., Rev. d'Ent. 1888, p. 225, 6.

Attika.

A *M. unicastata* M. et R. corpore minore et obscuriore marginibusque pronoti antice in lobum prominentem explanatis mox distincta.

Fam. Aradidae.

219. *Aradus dilatatus* Duf. Attika.

220. *A. dilatatus* var. *nigricans*, pronoto quam in typo paullo angustiore.

Morea, Divri, unter Rinde der Apollo-Tanne (*Abies cephalonica*), Ende Juli.

221. *A. varius* F. (*pictus* Bär.). Berg Ainos in Kephalaria unter Rinde von *Abies cephalonica*. Attika unter Rinde von *Pinus aleppensis*; Parnassos; Euboea (E.).

222. *A. Krueperi* Reut. Attika bei Athen d. 3. Juli unter Eichenrinde.

Fam. Hydrometridae.

223. *Hydrometra stagnorum* L. Attika; Creta.

224. *Velia rivulorum* F. Parnass; Creta.

225. *Gerris rufoscutellata* Latr. Morea; Skopelos.

226. *G. lacustris* L. Parnass; Morea, Olympia.

227. *G. argentata* Schumm. Attika (E.).

Fam. Reduviidae.

228. *Ploiaria domestica* Scop. Cyclades, Keos.
229. *Metapterus linearis* Costa. Attika (E.).
230. *Polytoxus siculus* Costa. Attika (E.); Morea, Nauplia.
231. *Pygolampis bidentata* Goeze. Nauplia; Creta.
232. *Sastrapada Bürensprungi* Stål. Attika (E.).
233. *Oncocephalus pilicornis* H. S. Rhodos.
234. *O. sp.* (defekt). Creta.
235. *Holotrichius denudatus* Costa (*Cyrilli* Costa). Attika; südl. Sporaden (sec. v. Oertzen in litt.).
236. *H. obtusangulus* Stål. Morea, Nauplia; Cyclades, Naxos (E.).
237. *Pasira basiptera* Stål. Albanien, Avlona; Boeotien, Theben; Euboea, Karystos.
- *238. *Reduvius pallipes* Klug. Attika (sec. v. Oertzen in litt.).
239. *Pirates hybridus* Scop. Attika; Euboea; südl. Sporaden, Kos; Creta.
- *240. *P. strepitans* Ramb. Morea, Nauplia.
241. *P. chiragra* F. Nauplia.
- *242. *Sphedanolestes pulchellus* Klug. Olympia; Kumani in Elis d. 1. August; nördl. Sporaden, Skopelos.
243. *Harpactor iracundus* Poda. Syra; Chios; Rhodos; Creta.
244. *Coranus aegyptius* F. Kephalaria; südl. Sporaden, Nikaria; Cycladen, Naxos.
245. *C. tuberculifer* Reut. Attika (E.).
246. *Nagusta Goedeli* Kol. Attika; Creta.
247. *Prostemma guttula* F. Attika.
248. *Pr. sanguineum* Rossi. Nauplia.
249. *Pr. Krueperi* Stein. Phaleron bei Athen.
250. *Nabis apterus* F. (*brevipennis* Hahn). Attika; Euboea; Creta.
251. *N. lativentris* Boh. Korax-Gebirge; Cycladen, Andros; südl. Sporaden, Nikaria; Creta, Lasithi-Gebirge.
252. *N. major* Costa. Nauplia.
253. *N. capsiformis* Germ. Creta, Umgebung des Dorfes Elos in Kisamos.
254. *N. ferus* L. Attika; Creta.
255. *N. rugosus* L. Morea, Kumani in Elis.
256. *N. viridulus* Spin. Albanien, Avlona; Attika auf Tamavix.

Fam. Acanthiidae.

257. *Acanthia Mülleri* Gmel. (*flavipes* F.). Attika, Phaleron.
258. *A. pallipes* F. Attika; Euboea.
259. *A. melanoscela* Fieb. var. * *pallidipennis* Reut.

Typo similis, sed hemielytris albidis, clavo, gutta apicali excepta, corioque basi, sutura clavi anguloque interiore, maculis duabus mediis tribusque exterioribus in lineam positis nigris, ultimo cum angulo exteriore apicali nigro confluyente. Reut. Rev. d'Ent. 1888, p. 226, 7.

Elis.

260. *Acanthia lateralis* Fall. Elis.

261. *A. lateralis* var. *eburnea* Fieb. Elis.

262. *Leptopus hispanus* Ramb. Attika (E.).

263. *L. spinosus* Rossi (*echinops* Duf.). Attika (E.); Creta.

Fam. Ceratocombidae.

264. *Ceratocombus coleoptratus* Zett. Attika (E.).

*265. *Cryptostemma pusillum* J. Sahlb. Attika, Umgebung von Athen.

Fam. Cimicidae.

266. *Cimex lectularius* L. Griechenland, Creta, überall.

Fam. Anthocoridae.

267. *Lytocoris campestris* F. Attika.

268. *Piezostethus obliquus* Costa. Südl. Sporaden, Nikaria.

269. *Temnostethus tibialis* Reut.

Oblongo-ovatus, niger, annulo medio articuli secundi antennarum tibiisque anterioribus rufescenti-testaceis, tibiis posticis piceo-nigris, tarsis piceis; rostro piceo-nigro coxas intermedias attingente, articulo primo insertionem antennarum vix superante; pronoto formae brachypterae lateribus apicem versus sat late subreflexo-marginatis, medio levissime sinuatis; hemielytris formae brachypterae medium segmenti quinti abdominis attingentibus, clavo, corio, embolio, cuneo membranae discretis, hac apicem cunei hand superante, ceteris fusco-testaceis, clavo interne, apice embolii cuneoque obscurius fuscis. Long. 3 mm. Rev. d'Ent. 1888, p. 26, 8.

Creta in Kisamos.

A *T. pusillo* H. S. colore pedum et hemielytrorum, horum longitudine et pronoto formae brachypterae lateribus antice latius et distinctius marginatis mox distinctus.

270. *Anthocoris nemoralis* F. Rhodos; Creta.

*271. *A. Minki* Dohrn. Kephalaria.

272. *A. gallarum ulmi* De Geer. Attika.

273. *Triphleps nigra* Wolff. Attika; Cyclades, Naxos; Samos; südl. Sporaden, Karpachos; Creta.

274. *Brachysteles parvicornis* Costa. Attika.

275. *Xylocoris ater* L. Duf. Attika (E.).

276. *Scoloposeelis angusta* Reut. nymphe. Attika (E.).

277. *Microphysa psclaphiformis* Curt. ♂. Attika (E.).

Fam. Capsidae.

- *278. *Pithanus Marshalli* D. et S. Attika (E.).
- 279. *Acetropis carinata* H. S. Creta.
- 280. *A. Gimmerthali* Flor. Creta.
- 281. *Stenodema calcarata* Fall. Attika.
- 282. *St. laevigata* L. Attika; Olympia in Elis.
- 283. *Notostira erratica* L. Parnass.
- 284. *Megaloceraea recticornis* Geoffr. (*longicornis* Fall.). Attika (E.).
- 285. *Trigonotylus ruficornis* Fall. Attika (E.).
- 286. *Monalocoris Filicis* L. Morea, Kumani in Elis d. 6. August.
- 287. *Lopus infuscatus* Brullé. Attika; Naxos; Karpathos; Creta.
- *288. *Dioncus neglectus* F. Creta.
- *289. *Phytocoris Populi* L. Kumani, in Elis (sec. v. Oertzen in litt.).
- 290. *Ph. Tiliae* F. Kumani in Elis (sec. v. Oertzen in litt.).
- 291. *Ph. Pini* Kirschb. Kephallonia; Aegina; Morea, Kumani in Elis; Creta.
- 292. *Ph. varipes* Boh. Attika.
- 293. *Ph. albicans* Reut. Morea, Kumani in Elis.
- 294. *Ph. Signoreti* Perr. Morea, Kumani in Elis d. 22. Juli und 11. August.
- 295. *Ph. albofasciatus* Fieb. Aegina; Morea, Olympia.
- 296. *Ph. parvulus* Reut. Kephallonia, Ainos d. 30. August; Attika, Athen in d. königl. Hofgarten.
- 297. *Calocoris ochromelas* Gmel. (*striatellus* F.). Attika; Morea; Creta.
- *298. *C. Schmidtii* Fieb. Attika.
- *299. *C. fuscescens* Reut. Attika; südl. Sporaden; Rhodos.
- 300. *C. ticinensis* Mey. Attika.
- 301. *C. hispanicus* Gmel. var. *scarpunctatus* F. Attika; Karpathos; Creta.
- 302. *C. hispanicus* var. *nankineus* Duf. Rhodos.
- 303. *C. lineolatus* Goeze (*Chenopodii* Fall.). Attika; Aegina.
- 304. *C. norvegicus* Gmel. (*bipunctatus* F.). Creta.
- 305. *C. histrio* Reut. Samos, Marathocampos; Rhodos, Kloster Artemedi.
- 306. *Megacoelum strigipes* Reut. Attika (E.); Aegina.
- 307. *Stenotus binotatus* F. Morea.
- 308. *Lygus pratensis* L. Attika; Euboea; Creta.
- 309. *L. pratensis* var. *gemellatus* H. S. Kumani und Olympia in Elis.
- *310. *L. atomarius* Mey. Korax-Gebirge.
- 311. *L. cervinus* Mey. Attika bei Athen (E.); Creta.

- *312. *Lygus apicalis* Fieb. Pyrgos d. 6. August; Kumani in Elis; Creta.
313. *L. Kalmi* L. Attika (E.).
314. *Cyphodema instabilis* Luc. Attika bei Athen (E.); Creta.
315. *Charagochilus Gyllenhali* Fall. Attika (E.).
316. *Poeciloscytus cognatus* Fieb. Attika.
317. *Camptobrochis punctulatus* Fall. Attika (E.).
318. *C. lutescens* Schill. Creta (sec. v. Oertzen in litt.).
- *319. *C. Putoni* Mont. Attika (E.).
320. *Deraecoris schach* F. Attika; Skopelos; Nisyros; Rhodos; Creta.
321. *D. schach* var. * *cunealis* Rent.
- Typo similis, sed corio toto nigro, cuneo ut in typo. Rev. d'Ent. 1888, p. 227, 9.
- Attika; südl. Sporaden, Kos.
- *322. *D. schach* var. *Novaki* Horv. Attika; Creta bei Kanea.
323. *D. scutellaris* F. Attika; Kumani in Elis.
324. *D. segusinus* Müll. (*lanarius* L.). Morea, Kumani in Elis.
325. *D. segusinus* var. *danicus* F. Attika.
326. *Pilophorus pusillus* Rent. Morea, Kumani in Elis.
- *327. *P. angustulus* Rent.

Oblongus, angustulus, medio sat fortiter coarctatus, superne parum nitidus, capite pronoto scutelloque subtiliter molliterque brevius et densius cinereo-pilosulus vel pubescens, hemielytris subtiliter parcius fulvo-pubescentibus, longe remote et suberecte fusco-pilosis; scutello macula utrinque, corio fasciis duabus, anteriore suturam clavi attingente, posteriore per clavum in linea recta continuata, fascia integra basali cunei strigisque lateralibus obliquis pectoris et ventris niveo-squamosis; capite, epipleuris pronoti mesostethioque castaneis, capite medio late aeneo-nigricante; antennis articulo primo secundoque ultra medium castaneis, basi tertii late quartique anguste albidis; hemielytris cinnamomeis, pone fasciam posteriorem tota latitudine nigris vel nigro-fuscis, corii limbo apicali tamen dimidio interiore cuneoque limbo laterali flavo-testaceis; clavi basi et apice, corii parte nigricante extra venam cuneoque nitidis; coxis albidis, basi fuscis; pedibus fusco-castaneis; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustiore, vertice oculo dimidio (σ) vel $\frac{2}{3}$ (φ) latiore; antennis articulo quarto tertio haud longiore, secundo versus apicem sensim incrassato (σ φ); pronoto basi longitudine paullo latiore, lateribus fortius sinuatis; femoribus pilis longis marginalibus destitutis. Long. $4\frac{1}{4}$ — $4\frac{3}{4}$ mm. Rent., Rev. d'Ent. 1888, p. 227, 10.

Morea, Kumani in Elis d. 14. Juli und 4. August. Auch auf dem Taygetos-Gebirge (Krueper).

Colore *P. cinnamoptero* Kirschb. simillimus, sed multo angustior, superne pilosus, antennis aliter coloratis, corio apice interne opaco cuneoque fascia basali integra niveo-squamosa ornato mox distinguendus. *P. confuso* Kirschb. major et angustior, medio magis coarctatus et postice minus dilatatus, colore hemielytrorum longe diverso, capite, pronoto scutelloque pilositate multo brevior et molliore cinerea vestitis, pilis etiam hemielytrorum brevioribus, femoribus pilis longis marginalibus destitutis structuraque antennarum optime distinctus. A *P. sinuaticolli* Reut., cui maxime affinis videtur, antennarum articulo secundo utriusque sexus versus apicem sensim incrassato nec subito fortius clavato, pilositate longiore aliisque notis supra commemoratis divergens.

*328. *Mimocoris coarctatus* M. et R. Attika, Athen im königl. Garten; Kumani in Elis d. 28. Februar.

329. *Halticus luteicollis* Panz. Parnass; Skopelos.

330. *Pachytomella Passerinii* Costa (*minor* Costa). Attika bei Athen.

*331. *P. parallela* Mey. Creta (sec. v. Oertzen in litt.).

332. *Orthocephalus proserpinae* M. et R. (*coracinus* Put.). Morea, Olympia d. 13. Februar.

*333. *Camptotylus Reuteri* Jak. Morea, Westküste von Elis auf Tamarix.

334. *Macrolophus nubilus* H. S. Morea, Elis; südl. Sporaden, Symi.

335. *Dicyphus errans* Wolff. Creta.

336. *Globiceps sphegiformis* Rossi. Kumani in Elis; Kos; Rhodos.

*337. *G. sordidus* Reut. ♂. Attika (E.).

338. *Orthotylus nassatus* F. (*striicornis* Kirschb.). Attika.

339. *O. flavosparsus* C. Sahlb. Morea, Kumani in Elis.

340. *O. rubidus* var. *Moncreaffi* D. et S. Attika.

341. *Heterotoma merioptera* Scop. Skopelos; Rhodos.

342. *Malacocoris chlorizans* Fall. Morea, Kumani in Elis d. 30. Juli und 13. August.

343. *Reuteria Marqueti* Put. Morea, Kumani in Elis d. 29. Juli und 13. August auf Quercus, zahlreich.

344. *Conostethus venustus* Fieb. Creta d. 13. April.

345. *Thermocoris Munieri* Put. Attika.

346. *Macrocoleus aurantiacus* Fieb. Creta d. 13. April bei Canea, Elasa.

347. *Macrotylus quadrilineatus* Schr. Rhodos bei Kloster Artemedi.
 348. *Macrotylus nigricornis* Fieb. Attika (E.).
 349. *Harpocera hellenica* Reut. Attika (E.).
 350. *Psallus ancorifer* var. *fuscinervis* Reut. Attika; Morea, Kumani in Elis d. 11.—22. Juli; nördl. Sporaden, Skiathos; südl. Sporaden, Nikaria, Samos; Rhodos.
 351. *P. variabilis* Fall. Creta, Elasa,
 *352. *P. carduellus* Horv. Rhodos, Kloster Artemedi.
 *353. *Plagiognathus bipunctatus* Reut. Morea, Pyrgos.
 354. *Pl. albipennis* Fall. Attika.
 355. *Chlamydatus saltitans* Fall. Attika (E.).
 *356. *Campylomma Oertzeni* Reut.

Inferne picea, superne sordide albicanti-grisea, nitida, pilis nigris et flavis pubescens; capite testaceo, clypeo concolore; oculis fuscis; antennis (feminae) articulis duobus primis nigris, secundo ipso apice duobusque ultimis albidis, articulo secundo latitudini capitis cum oculis aequalongo; pronoto basin versus colore in testaceum vergente; hemielytris apice embolii cuneoque, angulo interiore excepto, infuscatis; membrana leviter grisescente, areolis cum venis colore corii, illis saepe medio hyalinis: pedibus albidis, femoribus anterioribus puncto marginis superioris ante apicem serieque punctorum marginis inferioris nigris. posticis seriebus duabus punctorum marginis superioris punctisque 3—4 magnis marginis inferioris nigris; tibiis spinulis nigris e punctis nigris nascentibus, his punctis versus basin tibiaram magnis, tibiis anticis dimidio apicali inpunctatis. Long. 2½ mm. Reut., Rev. d'Ent. 1888, p. 228, 11.

Attika; südl. Sporaden, Nikaria.

C. diversicorni Reut. colore antennarum et clypei similis, sed minor et multo obscurior, corpore inferne obscure piceo, cuneo infuscato etc. distincta.

- *357. *Sthenarus nigripilis* Reut.

Ovatus, niger vel rufescenti-niger, nitidus, superne subtilissime griseo-pubescens, pilis pallide aureis faciliter divellendis hic illic adpersis, adhuc pilis nigris sat depressis pubescens, his pilis in capite, pronoto et lateribus corii magis exsertis; capite pronoto fere duplo angustiore; antennis fulvis, articulo secundo fere 2/5 apicalibus ultimisque obscure fuscis, secundo (feminae) apicem versus incrassato, latitudine capitis basali circiter 1/5 longiore, duobus ultimis simul sumptis secundo fere brevioribus; membrana cum areolis et venis nigricante, areolis exceptis vivaciter iridescente, apice femorum, tibiis

tarsisque flavis, tibiis spinulis nigris e punctis sat magnis nigris nascentibus, tarsorum articulo ultimo nigro. Long. $3\frac{1}{3}$ mm. Reut., Rev. d'Ent. 1888, p. 228, 12.

Attika.

Sth. oculari M. et R. sat similis, sed latior, statura fere *Sth. maculipedis* Reut., structura coloreque antennarum nec non corpore superne pilis nigris instructo mox distinctus.

358. *Tuponia Tamaricis* Perr. Attika (E.).

Fam. Notonectidae.

359. *Notonecta glauca* L. Parnass; Keos; Creta.

360. *Plea minutissima* F. Attika; Enboea.

Fam. Corisidae.

361. *Corisa Geoffroyi* Leach. Attika; Creta.

362. *C. Fallenii* Fieb. Creta.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Reuter O. M.

Artikel/Article: [Griechische Heteroptera 17-34](#)