

Eine neue *Delias* von Flores.

***Delias descombesi lydia* m. n. subspec.**

Unterscheidet sich von *oraia* Doherty von Sumbawa und Lombok durch die reicher und heller gelbe Färbung der Unterseite aller Flügel, besonders des Apicaltheiles der Vorderflügel und die viel breiter gelben Ciliae, was namentlich auf der Oberseite auffällt. Das ♀ differiert oberseits zudem noch durch das Fehlen der blauschwarzen Medianzeichnungen und Binden auf den Hinterflügeln und hat auf diesen unten eine orangefarbene grün beschuppte Zelle, welche bei *oraia* schwarz ausgefüllt und bestäubt ist.

Der Marginalrand der Hinterflügelunterseite ist in beiden Geschlechtern schmaler schwarz gesäumt als bei *oraia*.

♂ Vorderflügelänge 40 mm., ♀ 38—40 mm.

Beschreibung nach ca. 10 ♂♂ und 2 ♀♀, welche October und November 1896 in Süd-Flores gesammelt wurden.

Berlin, 28. Juli 1897.

H. Fruhstorfer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Eine neue Delias von Flores. 15](#)